

# తొట్ పనులు

(ఉద్యానశిల్పం)

డాక్టర్ తమ్మన్న  
డాక్టర్ పి.టి. శ్రీనివాస్



ప్రచురణ

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి



# తోటపనులు

(ఉద్యానశిల్పం)

రచయితలు  
డాక్టర్ తమ్మన్న  
డాక్టర్ పి.టి. శ్రీనివాస్

సంపాదకుడు  
గోపీకృష్ణ



ప్రచురణ  
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు  
తిరుపతి  
2001

# **THOTA PANULU**

**(Udyana Silpamu)**

**An Introduction to Gardening (Telugu)**

*Authors*

**Dr. THAMMANNA**

**Dr. P.T. SRINIVAS**

*Edited by*

**Sri S. KRISHNA REDDY (Gopikrishna)**

T.T.D. Religious Publications Series No. 594

First Edition : March 2001

Copies : 2000

© All Rights Reserved

*Published by*

**Sri P. KRISHNAIAH, I.A.S.,**

Executive Officer,

T.T.Devasthanams,

Tirupati - 517 507.

*DTP Setting:*

**Students Xerox, Tirupati.**

*Printed at*

**T.T.Devasthanams Press**

Tirupati - 517 507.

**SRI VENKATESWARA CENTRAL  
LIBRARY & RESEARCH CENTRE**

ACC No 73188.....

DATE: . . .

TIRUPATI.



# విన్నపము

తోట పనులు, సేద్యం వ్యవసాయం అని ఏ పేరుతో పిలిచినా అవన్నీ సాస్య వృషికి సంబంధించిన పనులు. మన రైతులు తర తరాల నుంచీ పారంపర్యంగా చేస్తూ వస్తున్న యీ సేద్యం గురించి ఒక గ్రంథం వ్రాస్తే, వారు అషామాషిగా చేసే పనులు యిన్ని వున్నాయో, వాటిలో యింత అర్థం వుందో, యింత చేస్తే అంత పంట పండుతుందో అనే విషయాలు తెలిసి అక్షర్యం కలుగుతుంది.

సేద్యం గురించి ఆంగ్లంలో అనేక గ్రంథాలున్నాయి కానీ ప్రాంతీయ భాషలలో చాలా తక్కువ. అందులోనూ తెలుగులో మరీ తక్కువ. కన్నడంలో ఎక్కువ గానే ఉన్నాయి. కన్నడంలో వున్న పుస్తకాలు కూచిన తరువాత కన్నుపిట్టి అలాంటి పుస్తకాలు తెలుగులోకి తీసుక రావాలనిపించింది. తొలి ప్రయత్నంగా ఇంటి తోటలు అనే పుస్తకం వ్రాస్తే తిరుపతి దేవస్థానం వారే దానిని ప్రచురించి పుణ్యం కట్టుకొన్నారు. తీరా తెలుగులో వ్రాసిన ఆ పుస్తకం తరుపతి కన్నడంలోకి కూడ తర్జుమా అయింది.

ఆ ప్రోత్సాహంతో తోట పనులు యింకా వివరంగా శాస్త్ర జ్ఞానం చొప్పించి వ్రాయాలనిపించింది. ఈ దశలో కన్నడంలో ప్రచురితమయిన ‘సాస్య వృషి’ అనే పుస్తకం కూడటం తటస్థించింది. దానిని ఎమ్.ఎల్. ఆనంద రామయ్య గారు వ్రాశారు. ఆయన కర్ణాటక ఆర్కియాలజీ డిపార్టుమెంటులో హార్టి కల్చరల్ డైరెక్టరు. గొప్ప అనుభవజ్ఞుడు. విజ్ఞాని. క్లిష్టమయిన విషయాలను సరళంగా అరటి పండు ఒలిచి పెట్టినట్టు సులభతరంగా చెప్ప గల దిట్ట. ఆయన వ్రాసిన పుస్తకమే మాకు ఆదర్శమయింది.

ఆ విధంగా యీ పుస్తకం ఆవిర్భవించింది. ఈ తోట పనులు చాలా విస్తృతమయినవి. దీనిని మూడ భాగాలుగా విభజిస్తే, మొదటి భాగమే యింతయింది. ఇంకా రెండు భాగాలున్నాయి. అయినా దేనికదే సమగ్రం. మా మాతృభాష

కన్నడం. తెలుగులో వ్రాసినప్పుడు ఆ రోటు స్పష్టంగా కనబడింది. ఆ రోటుపాట్లు అధిగమించడానికి ప్రయత్నించాము.

ఇంత బిచ్చిత గ్రంథాన్ని అచ్చు వేయడానికి అంగ బలము, ఆర్థిక బలము కావాలి. అవి రెండూ ఛన్న తి.తి.దే. వారిని ఆశ్రయించాము. సేద్యంలో కాశీ, ఉద్యాన వన పోషణలో కాశీ, ఉత్సాహవంతులయిన సామాన్యులకు అంటే జైతాహిక కృషివలులకు పుపయోగపడుతుందనే పుద్గేశ్యంతో తి.తి.దే. ప్రచురణల కమిటీవారు దీని ప్రచురణకు అంగీకరించారు. వారికి ధన్యవాదములు. శ్రీ వేంకటేశ్వరునికి కూడ స్వంత సేద్యముంది కదా. అనేక తోటలు, ఉద్యాన వనాలు, పేరు మోసిన తిరుమల గార్డెన్స్ అన్నీ ఆయనవే కదా!

దేవస్థాన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ శ్రీ ఐ.వి. సుబ్బారావు, సంయుక్త కార్య నిర్వహణాధికారులు శ్రీ పి.బొలసుబ్రహ్మణ్యం, శ్రీ ఆర్. రామకృష్ణయ్య, ఎంతో సహాయం చేశారు. వారికి మా కృతజ్ఞతాభివందనములు. సి.ఆర్.ఓ. సుబ్బిష్ గౌడ్, సప్తగిరి ఎడిటర్ శ్రీ ఎన్.ఎస్. రామమూర్తి, ప్రెస్ మేనేజర్ శ్రీ ఎం. లక్ష్మణరావు ఆయన సెబ్బంది కూడ సహాయం చేశారు. వారందరికీ మా కృతజ్ఞతలు.

మా కోరికమేరకు మా అన్ని ప్రచురణలకు పరేనే దీనికి కూడ సంపాదకత్వము వహించి, ఈ గ్రంథానికి రూపు రేఖలు దిద్దిన శ్రీ ఎస్. కృష్ణారెడ్డి (గోపి కృష్ణ), రిటైర్డ్ హెడ్క్వార్టర్, శ్రీ వేంకటేశ్వర ఉన్నత పాఠశాల, తిరుపతి వారికి మా ప్రత్యేక ఎందనములు. ఇంకూ యీ గ్రంథ రచనలో, ప్రచురణలో మౌను ప్రత్యక్ష, పరోక్ష సహాయ సానుభూతులందించిన సర్వులకూ మా కృతజ్ఞతలు.

హైదరాబాదు,

12-5-2000

- డాక్టర్ తమ్మన్న.

- డాక్టర్ పి.టి. శ్రీనివాస్.

## ముందుమాట

‘కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం’ - అన్నారు. కృషితో దుర్భిక్షం వుండదని పెద్దలమాట. అందువల్లనే కృషీవలులు నిరంతరం శ్రమిస్తూవుంటారు. అలా శ్రమించి తిరుమల శ్రీవారికి నిత్యమంత్రపుష్ప తోయకైంకర్యము నిర్వహించిన తొలి కృషీవలుడు తిరుమలనంది. ఆయన ఆడుగు జాడలలో నడిచి, అల్వారు చెరువు త్రవ్వి, రామానుజ పుట్టేరి పూదోటలలో పూలు పండించిన ఆనందాల్వారు రెండవ కృషీవలుడు. తదనంతరం ఎందరో చాత్తాద శ్రీవైష్ణవులు తిరుమల తోటలలో కృషీవలులయినారు.

ఇటీవలి కాలంలో మూడువందల ఎకరాల మేరకు దేవస్థానపుతోటలను విస్తృతపరచి, ఒక్క రోజుమొక్కలలోనే 600 రకాలకు పైగా సాగుచేయించి, నర్సరీ తోటలు పెంచి మిస్ట్ చాంబర్లు వెలయించి, తిరుమల ఉద్యానవనాలకు ఎనలేని కీర్తినిచ్చి పెట్టిన తమ్మున్నగారు నవీన కృషీవలుడు.

తన కుమారుడు చి॥ పి.టి. శ్రీనివాస్ తో కలసి ఈ పుస్తకం రచించారు. ఇందుకు వీరు అభినందనీయులు.

పూలు పూయించడానికి, లేదా ఏ పంటయినా పండించడానికి యింత శాస్త్రమున్నదా అని ఈ పుస్తకం చదివిన వారికి ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. తిరుమలనంది అనంతసూరి ఏ పుష్పశాస్త్రములు పఠించిరో తెలియదుగాని మనము మాత్రము పూదోటలు పెంచాలంటే యీ తోటవనుల పుస్తకం తప్పక పఠించవలసినదే.

భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణభగవానుడు చెప్పినట్లు “అన్నము వలన సర్వ జంతుజాలము కలుగును. వర్షం వలన అన్నము కలుగును. యజ్ఞము వలన వర్షము కలుగును. ఆ యజ్ఞము కర్మవలననే కలుగును.” అలాగే సస్య కృషి కూడా నిరంతర యజ్ఞము కావున అది కృషి (కర్మ) వలన సాధ్యము. కృషి చేయనెంచిన ఔత్సాహిక కృషీవలులకు ఈ పుస్తకం దిక్పాచిలాంటిది. దీని సహాయంతో సేద్యసాగరమును దాటి సత్ఫలితములను పొందవచ్చును.

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు చేయుచున్న ప్రజాహిత సంఘసేవా కార్యక్రమములో పుస్తక ప్రచురణ ఒకటి. ఈ ప్రచురణోద్యమం ద్వారా వేదాంత, పురాణోపాస, భక్తి, ఆలయ చరిత్రాది గ్రంథములు వందలకొలది ప్రచురించి ప్రజలకందించినాము. ఈ పుస్తకము ఆ ప్రచురణల కోవకు చెందినదే. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తదితర ప్రచురణలలాగే ఈ పుస్తకం కూడ చదువరుల ఆదరణ పొందగలదని తోటపనులలో అన్ని విధాల మార్గదర్శకంగా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాము.

కార్యనిర్వహణాధికారి`  
 తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు,  
 తిరుపతి.

డాక్టర్ సి. నారాయణరెడ్డి, M.P.

(జ్ఞానపీఠ్ అవార్డు గ్రహీత)

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సాంస్కృతిక మండలి అధ్యక్షులు

హైదరాబాదు,

తేది : 8-1-2001.

## సస్యదర్శిని

విత్తనం ఒళ్లు పులకిస్తే మొక్కవుతుంది. మొక్కలూ ప్రాణుల్లాంటవే. ప్రాణుల అవయవాల్లో ఉన్నట్టే మొక్కల అంగాల్లో కూడా రకరకాల జీవకోశాలుంటాయి. పచ్చగా ఎదిగే మొక్కలు ఆరోగ్యానికే, ఆనందానికే ప్రతీకలు. ఈ గ్రంథ రచయితలు డా॥తమ్మన్న, డా॥పి.టి.శ్రీనివాస్ సస్యాలకు సంబంధించిన సమగ్ర గ్రంథం రూపొందించారు. అందుకే ఈ “ఉద్యానశిల్పం” అనే గ్రంథాన్ని ‘సస్యదర్శిని’ అని అంటున్నాను.

మొక్కలకు సంబంధించిన విజ్ఞాన సర్వస్వం ఈ “ఉద్యానశిల్పం” బీజ దశనుంచి పత్రదశ వరకు వివిధ పార్శ్వాలను పరిశోధించి రచించిన గ్రంథమిది. సస్యశాస్త్రజ్ఞులకు ఆకరగ్రంథం లాంటిదిది.

ఈ రచనలో శాస్త్రీయ వైజ్ఞానిక దృష్టితోపాటు మానవీయదృష్టి కూడా ఉండడం నన్ను అమితంగా ఆకర్షించిన విషయం. మనుషుల్లాగే చెట్లకు కలిగే గాయాలను గురించి కూడా రోగాలొస్తాయని విశ్లేషించి చూపారు. పుష్పశయ్యలను, పర్ణశయ్యలను కూడా స్పృశించి చూపారు. ఈ రంగంలో తెలుగులో సమర్థంగా రచించిన ఈ పుస్తకాన్ని వివిధ భారతీయ భాషల్లోకి అనువదిస్తే ఉపయుక్తంగా వుంటుందని నా అభిప్రాయం. చక్కని ప్రయోగాత్మక, వైజ్ఞానిక గ్రంథాన్ని రచించిన ఉభయరచయితలకు నా అభినందనలు. ప్రచురించిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారికి ప్రత్యేక ప్రశంసలు.

డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి

# విషయసూచిక

పేజీ నంబరు

1. మొదటి అధ్యాయము  
సస్యనిర్మాణం వాటి జీవన విధానం 1
2. రెండవ అధ్యాయము  
సస్యోత్పాదన (మొక్కల వ్యాప్తి) 54
3. మూడవ అధ్యాయము  
సస్యక్షేత్రం మట్టి నిర్వహణ 125
4. నాలుగవ అధ్యాయము  
సస్యపోషణ - తోట పెంపకానికి కావలసిన ఎరువులు 144
5. ఐదవ అధ్యాయము  
తోట ఉపకరణాలు 180
6. ఆరవ అధ్యాయము  
తోటపనులు 193
7. ఏడవ అధ్యాయము  
కుందీల కృషి 219
8. ఎనిమిదవ అధ్యాయము  
మొక్కల కొమ్మల కత్తిరింపు
9. తొమ్మిదవ అధ్యాయము  
సస్య సంరక్షణ (మొక్కల సంరక్షణ) 245
10. పదవ అధ్యాయము  
తోట సంవిధానం (విన్యాసం) నిర్మాణం 273

## మొదటి అధ్యాయము

### సస్య నిర్మాణం : వాటి జీవన విధానం

తోటమాలి తోటను అలంకారం కోసమో, ఉపయోగాల కోసమో పెంచుతాడు. తోటలోని మొక్కలు ఏ అడ్డు లేకుండా సాఫీగా పెంచాలంటే మొక్కల నిర్మాణం, ఉల్బాదన, మొక్కల భాగాల నిర్మాణం, వసుల స్వభావం, పెంచే రీతి, సంతానాభివృద్ధి క్రమం, సన్నేవేశాలు, ఏ యే పరిస్థితులలో ఏయే విధంగా ఒకదానితో ఒకటి చేరి మొక్కల పరస్పర సంబంధాల్ని వృద్ధి చేసుకొనే విధానం, వాటి జాతి, వంశం, వర్గం మొదలైన విషయాలను స్థూలంగా వీలైతే స్పష్టంగా తెలుసుకోవడం మంచిది. సస్యశాస్త్రాన్ని స్థూలంగా చదివుండాలి. వీలయినంత స్థూలంగా పరిచయం చేసుకొని వుండాలి. ఎక్కువగా ఈ శాస్త్రాన్ని చదివి అర్థం చేసుకొన్నకొద్దీ, తోటలో మొక్కల్ని, చెట్లని ఎంతో పుష్కగా వృద్ధి చేసుకోగలుగుతాము. అంతేకాకుండా తోటపని ఎంతో చక్కగా చేయగలుగుతాము. చక్కటి ఫలితాన్ని కూడా అందుకోగలుగుతాము.

మొక్క, సజీవ పదార్థం. ప్రాణులలాగే మొక్కలు కూడా ఆహారాన్ని గ్రహిస్తాయి. శ్వాసిస్తాయి. ఇతర ప్రాణులలాగే పెరుగుతాయి. సంతాన వృద్ధి చేస్తాయి. షీటిస్తాయి. కొన్ని సూక్ష్మ మొక్కలకి తప్ప, మిగిలిన మొక్కలకు ప్రాణులవలే వివిధ కార్యాలను జరిపే భాగాలున్నాయి. ప్రాణుల అంగాలు పొర, పల్లం, మాంస ఖండం, రక్తం, నరాలు మొదలైన అంగాంగాల ద్వారా నిర్మాణమైనవి. మొక్కల అంగాలలో రకరకాల జీవకోశాలు సమూహంగా ఉంటాయి. ఈ జీవ కోశాలలో నిర్దిష్టమైన ఆకారం, రూపం, లోపలి నిర్మాణం వుంటాయి.

స్థూలంగా మొక్కలలో రెండు భాగాలుంటాయి. 1. భూమిలో ఉండు వేరు భాగం 2. భూమిపైనుండే ప్రకాండ భాగం. సామాన్యంగా భూమి లోపల పెరిగే భాగం వేరే అయినా బంగాళా దుంపలవంటి మొక్కలలో కాండం, దుంప రెండూ భూమిలోపలే పెరుగుతాయి. అదేవిధంగా మట్టి మొదలైన కొన్ని చెట్లలో వేళ్లు భూమి లోపల, బయట రెండు స్థలాలలోను పెరుగుతాయి.

భూమిపై పెరిగే ప్రకాండం ద్వారా కాండం, రెమ్మ, ఆకు, మొగ్గ, పువ్వు, కాయ, విత్తనాలు మొదలైనవి పై భాగాన పెరుగుతాయి. కొన్ని మొక్కలలో ఈ భాగాలు మార్పుచెంది భూమి లోపల పెరగడం జరుగుతూ వుంటుంది. పువ్వులనిచ్చే మొక్క, యొక్క, వివిధ భాగాల్ని చిత్రం-1లో సూచించడమైనది. ఈ భాగాల వివరాలు, విధానాలను, వాటి వసులను, తెలుసుకొందాము.

#### 1.1 పువ్వులనిచ్చు మొక్క, యొక్క వివిధ భాగాలు :


1. ప్రక్క వేళ్లు 2. తల్లి వేళ్లు 3. మధ్యాంతర కణుపు 4. కణుపు (Node) 5. మొగ్గ 6. పువ్వు 7. ఫలం 8. కాండం 9. రెమ్మ 10. ఆకుల కాడ (వలె వృత్తం) 11. ఆకు అంచు 12. మధ్య నరాలు 13. ఆకు నరాలు.



11



1-2 A




1-2 B






1.3




b




a

1.5



1.4



b

1.6



c

## వేరులు

వేరు, మొక్క, యొక్క క్రింద లేదా లోపలి భాగం. క్రిందుండే భాగాలన్నీ వేర్లు కావు. నిజమైన వేరు విత్త నాలలోపలుండే భాగం ఏకసింపి, విస్తరించి భూమిలోపలికి వెళ్ళే భాగం ఈ భ్రూణ మూలాన్ని 'ప్రథమ మూలం' రాడికల్ అంటారు. (విత్తనాల భాగాలను చూడండి) పాడవుగా పెరిగిడి రాడికల్ ప్రథమ వేరు (Primary root) : కంది, బీన్సు, చిక్కడు మొదలైనవి (Dicotyledons)

ఈ ప్రథమ వేరు ఎక్కువ కాలం జీవించి క్రమంగా పెరుగుతూ వుంటుంది. దీనిని తల్లి వేరు అని అంటారు. (చిత్రం 1.2 A, B) ఈ వేరు నుండి బయలుదేరే చీలికలు ద్వితీయ లేదా తృతీయ వేర్లు (Secondary or Tertiary roots) తల్లి వేరు సామాన్యంగా నేరుగా క్రిందికి దిగుతుంది. వీటి చీలికలు ప్రక్కలకో, నేల నను మట్టానికో పెరుగుతాయి.

1.2 A చిత్రం, 1.2 B. చిత్రం.

1.2 తల్లి వేరు : A ప్రథమ లేదా తల్లి వేరు. B దాని నుండి బయలు దేరిన ద్వితీయ, తృతీయ వేర్లు.

కొన్ని మొక్కలలో భ్రూణ మూలం వదిలి, వేరు చోట్ల నుండి కాండపు క్రింద, చీలికలు, కణుపు, ఆకు మొదలైన చోట్ల నుండి వేర్లు పెరుగుతుంటాయి. ఇవి సామాన్యంగా వచ్చే చోట నుండి కాక, వేరు స్థలాం నుండి పెరుగుతాయి. కాబట్టి వీటిని ఆసామాన్య వేర్లని అంటారు (Adventitious roots). ఇవి కూడా భూమి లోకి దిగి సామాన్య వేర్లలాగే నీరు, పోషకాలను పీల్చుకొంటాయి. ఇవి మొక్కలకి ఆధారం (Support)గా వుండొచ్చు లేదా మట్టి ఊడలు లాగ భూమిపైనే ఉండొచ్చు.

ఈ ఆసామాన్య వేర్లలో కొన్ని రకాలు రాగి, పరి, నవ ధాన్యాలు, ఉల్లి పాయలు, సుగంధరాజు మొదలైనవి. ఏకదళ మొక్కలలో (Monocotyledons) ఈ వేర్లు కాండపు క్రింది భాగం నుండి, గుంపుగా, గుత్తుగా పెరుగు తాయి. దీనిని గుంపువేర్ల సముదాయం అని అంటారు. (చిత్రం 1.3) కొన్ని సందర్భాలలో ఆకుల అంటు గ ట్టి, లేదా రసాయనిక పదార్థాల్ని వేసి, వాటి నుండి, అందులోనూ ఆకు తొడిమనుండి వేర్లు వస్తుంటాయి. వీటిని పత్ర వేరు (Foliar roots) - పత్ర సంబంధ వేర్లు అని అంటారు. (చిత్రం 1.4) బ్రయోఫైలం (Bryophyllum) అనే జాతి మొక్కలలో ఆకుల అంచు నుంచి వేర్లు బయలుదేరి భూమిలోకి దిగి కొత్త మొక్కల్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి.

కొన్ని మొక్కలలో మొక్కల క్రింది భాగం నుండి లేదా కణుపు నుండి, కణుపు మధ్య నుండి వేర్లు వస్తుంటాయి. ఈ స్వభావం గల గులాలి మొదలైన కాండపు మొక్కల ముక్కలనుండి వేర్లు వచ్చేటట్టు చేయడానికి అంటు గడుతూ వుంటారు.

1.3 బొంత వేర్లు (Fibrous roots)


1.4 పత్ర సంబంధ వేరు (Foliar roots)

1.5 a, b చిత్రం



a

16a




a

17a




e

17e




b

17b



c

17c



d

17d

1.5 a. కణుపు నుంచి వేర్లు బయలుదేరుట. b. కణుపు మధ్యాంతరం నుండి వేర్లు బయలుదేరుట.

తల్లి వేరు లేదా అసామాన్య వేర్లు, కొన్ని మొక్కలకు, రూపంలో మార్పులు వస్తూ వుంటాయి. అవోరాన్ని కూడబెట్టుకొని ఉబ్బి పెరుగుతాయి. అటువంటి వేర్లు లావుగా కండ కలిగి వుంటాయి. ఈ రకపు వేర్లను రూపాంతర వేరు (Modified root) అంటారు

#### తల్లి వేరు రూపాంతరం (Modified tap roots)

1. ముల్లంగి మొదలైన వాటిలో తల్లివేరు మధ్య భాగం ఉబ్బి : పైన, క్రింద భాగాలు మొనదేలి సన్నగా వుంటాయి. దీని ఆకారం కండెలాగ (Spindle or Fusiform) చిత్రం 1.8a.

1. 6 b కండె రూపం, ముల్లంగిలో కండె రూపం .

2. టర్నిప్ : బీబీరూట్‌లలో ప్రథమ వేరు మొక్కపై భాగం ఉబ్బి గుండ్రంగా వుంటుంది. క్రింది భాగం పొడవుగా సన్నగా మొనదేలి పెరుగుతాయి. వీటిని టర్నిప్ ఆకారం (Napiform - మూపురాకారం) అని అంటారు.

1.6 b. చిత్రం

1.6 b బీబీ రూట్‌లో మూపురాకారం.

3. క్యారట్ దుంపలో పై భాగం వెడల్పుగా ఉబ్బి, క్రింది భాగం క్రమేణ మొనదేలి సన్నగా అవుతుంది, శంఖు ఆకారంలాగ (Conical) చిత్రం 1.6 c.

1.6 c క్యారెట్ దుంపలో శంఖు ఆకారం

4. ఛత్రాక్ష పువ్వు (నాలుగు గంటల పువ్వు Four O' clock flower) మొక్కలలో ఉబ్బి వేరు ఏ ఒక్క నిర్దిష్ట ఆకారంలోనూ ఉండదు. వీటిని దుంపవేరు (Tubercular root) అని అంటారు.

#### అసామాన్య వేర్లు రూపాంతరం

1. చిలకడ దుంప మొదలైన కొన్ని వేర్లు ఎటువంటి నిర్దిష్ట రూపాన్ని పొందకుండా అవోరాన్ని గ్రహిస్తాయి. వీటిని దుంప లేదా చిలకడ దుంప (Tuberous root) అని అంటారు. చిత్రం 1.7 a.



1.7 a. చిత్రం రూపాంతరం పొందిన అసామాన్య వేరు (Adventitious roots). తీపి చిలకడ దుంప వేరు (Asparagus).

2. డేలియా (Dahlia) : పిల్లి తీగలు (Asparagus), రూలియా (Ruellia) మొదలైన దుంపలలోని కాండపు క్రింద భాగాన్ని గుత్తి కట్టి పెరగడం చేత వీటిని గుత్తి దుంపలని సమూహ దుంపలని అంటుంటారు.

1.7 b. చిత్రం (Fasciculated roots)

1.7 b డేలియా దుంపల గుత్తిగా వున్న దుంప వేర్లు.

3. మామిడబ్బం, ఆరో రూట్ మొదలైన వాటిలో వేర్లు చివర్లు మాత్రం వుబ్బి వుంటుంది. దీనిని గుబురు వేర్లు అని అంటారు. కొంత మంది దీని బొడివ వేర్లు అని వ్యవహరిస్తారు. చిత్రం 1.7 c.



1.7 c మామిడి అల్లం - గుబురు వేర్లు (Nodulose roots)

4. ఏక దూలు ఇత్యాది చెట్లలో వేర్లు మణిపూసలవలె వుంటాయి. కాబట్టి వీటిని పూసల వేర్లు లేక మణి వేరు అని వ్యవహరిస్తారు.(Beaded root) 1.7d. చిత్రం

1.7d. గోరు చిక్కడు : పూసల వేర్లు.

మరి కొన్ని మొక్కలలో వేర్లు ఉంగరాలను గ్రుచ్చినట్లుగా రింగులు రింగులుగా వుంటాయి. చిత్రం 1.7 e.

చిత్రం 1.7 e. ఉంగరాల వేర్లు (Ringed roots)

మరి చెట్లు వాటి వేర్లు : ఊడ వేళ్లు (Prop-or stilt roots) ఈ రకపు వేర్లు భూమిలో పాతుకుపోయి కొత్త మొక్కలుగా మొలకెత్తుతాయి. చెట్టు క్రమంగా ప్రధాన చెట్టుకి ఆధారాలైనందున వీటిని ఊతవేళ్లు అని అంటారు. కలకత్తాలోని ఇండియన్ బోటానికల్ గార్డెన్లో సుమారు 2000 సం.ల వాటి మర్రి చెట్టు వుంది. ఇది సుమారు 2 ఫర్లంగుల మట్టు కొలత వరకు విస్తరించి వ్యాపించి వుంది. దీని యందు ఏది తల్లి వేరు, ఏది పిల్ల వేరు, తల్లి వేరు ఎప్పుడు చెట్టుగా అయింది అని చెప్పడం కష్టం.

5. మట్టి మొదలైన చెట్లలో కాండము లేక చీలికల నుండి వేర్లు బయలుదేరి క్రిందికి దిగుతాయి. ఇవి ప్రధాన చెట్టుకి ఆధారాలైనందున వీటిని ఊత వేళ్లు అంటారు. చిత్రం 1.7 f.

1.7 f. చిత్రం.



6. మిరియాలు : తమల పాకులు పోథాన్ - మొదలైన తీగలలో కణుపులనుండి, మరికొన్ని సందర్భాలలో కణుపుల మధ్యంతరం నుండి వేర్లు బయలుదేరుతాయి. ఇవి ఏదైనా ఆధారం పైన, స్తంభాలపైన, లేదా పారిజాతం, పొగడ చెట్ల వంటి చెట్లపై ప్రాకడానికి అనువుగా వుంటాయి. ఈ వేర్లు ఒక రకపు జీగురుని కురిపించి, ఆశ్రయ చెట్ల కాండానికి అంటుకొంటాయి. వీటిని ఎగప్రాకే వేర్లు అంటారు. (Climbing roots) చిత్రం. 1.7 g.

1.7 g. చిత్రం. తమల పాకులు - ఎగప్రాకే వేరు.

7. వరాన్లు (వరోప) జీవులు (Parasites) ఇంకొక చెట్టు పై ఆధారపడి జీవించే మొక్కలు తంగేడు (Cassitha) వేరు, జొన్నల వేర్లు పైన పెరిగిడి అగ్నిచెట్టు మొదలైన వాటిలో వీటి వేర్లు భూమి మీద అంటుకోకుండా ఇతర చెట్లపైన వారి వాటి రసాన్ని పీల్చుకొని పెరుగుతాయి. కాబట్టి వీటిని పీల్చే వేర్లు అని అంటారు. చిత్రం 1.7 h.

1.7 h. పీల్చే వేరు (Haustoria)

8. సీత పువ్వు (Orchids) వరోప జీవి మొక్కలలాగే ఆశ్రయ మొక్కలపైన పెరిగినా, వాటి రసాన్ని పీల్చుకోవు. వరోప జీవాలు కావు. వీటివేర్లు స్పాంజ్లాగుండి, గాలిలో ఊగులాడుతూ వుంటాయి. వీటి ద్వారా గాలిలో వున్న తేమను పీల్చుకుంటాయి. వీటిని వృక్షోప జీవి వేర్లు అంటారు. (చిత్రం 1.7 i.) అమృత తీగలు (Tinospora) మొదలైన వాటిలో ఈ గాలి వేర్లు పసుపుగా వుండి ఆకుల లాగే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరుపుతాయి. 1.7 i.



1.7 i. చిత్రం సీతపువ్వు (ఆర్కిడ్) వృక్షవజీవి వేర్లు (Epiphytic roots) ఆహారంగాలవుతాయి.

అందుచేత నీటిని జీర్ణాంగ వేర్లని వ్యవహరించవచ్చు. (Assimilatory roots) చిత్రం 1.7 j.

1.7 j. చిత్రం సంగార తీగ, నీటి క్రోటన్ పచ్చని జీర్ణాంగ వేరు.

## వేర్లు పనులు

వేర్లకు ముఖ్యంగా మూడు కార్యాలున్నాయి. 1. భూమి లోపలకు చొచ్చుక పోవడం, 2. నీటిని, పోషకాలను పీల్చుకోవడం 3. వేరు నుంచి ప్రకాండానికి, ప్రకాండం నుంచి వేరుకు నీటిని, పోషకాలను ఒకదాని ద్వారా ఇంకొక దానికి అందివ్వడం, ముఖ్యంగా, చిలకడ దుంప మొదలైన చెట్లలో వేర్లకు ఇంకొక పని కూడావుంది. ఆహారపు సేకరణ, సేకరించినదాన్ని నిల్వ చేయడం.

మొక్కలు, ప్రాణుల వలె చరించవు. కావున మొక్కలు నిలిచి వుండడానికి వేర్లు సహాయకారిగా వుంటాయి. చెట్టుపైన డేరావలె వుండే వేర్లు ఈ మొక్క డేరాను నిలిపే పగ్గాలు. మట్టి కణాలే గూడులు. వేర్లు మట్టి కణాల చుట్టూ గట్టిపడి వుండటంచేత, మొక్కలను లాగిన వేర్లతోపాటు మట్టి కణాలు వాటితోపాటు పైకి వస్తాయి. మొక్కల పెరుగుదలకు అనేక రకాల ఆహారాంశాలు, పోషకాలు కావాలి. వీటిలో కొన్ని గాలిలో వుంటాయి. నీటిని వ్రలా ద్వారా గ్రహిస్తాయి. నత్రజని, పాస్ఫరస్, పొటాషియం మొదలైన ఖనిజ పోషకాలకు, కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు కావలసిన నీటిని, మట్టిని మొదలైన వాటిని పీల్చుకొనేది ఈ వేర్లద్వారానే.

ఈ నీరు, పోషక పదార్థాలు కేవలం వేర్లకేకాక, ప్రకాండపు ప్రతి అంగాలకూ అవసరమవుతాయి. అదేవిధంగా ఆకులు గాలి నుంచి గ్రహించిన పోషకాలు వ్రలాకే కాక వేర్లకు కావాలి. అనగా వేరు గ్రహించిన పదార్థాలు ప్రకాండానికి ఇలా ఒకదాని నుంచి మరొకటి గ్రహించడమనేది వేర్ల ద్వారానే సాగుతుంది.


## వేర్ల నిర్మాణం

ప్రథమ వేరులో గాని, ద్వితీయ వేరులో గాని కొన్ని భాగాల్ని చూడవచ్చు. సామాన్యంగా అనేక వేర్లలో నాలుగు భాగాలుంటాయి. 1. చివరున్న వేరు తొడుగు (Root Cap) 2. దీని వెనుక చురుకైన వృద్ధి భాగం (విభాజ్య కణజాల మండలం) 3. దీని వెనుక వేరు పొడవు లాపు అయ్యే భాగం - లంబ భాగం 4. ఆ తర్వాత బలీసే భాగం ఈ వివిధ భాగాల్ని చిత్రం 1.8 లో చూపబడింది.

ప్రతి వేరు చివర సూక్ష్మమైన, చురుకైన వేర్ల మొనల్ని కాపాడడానికి రక్షక తొడుగు అనేది వుంటుంది. ఇది నూది గుచ్చడానికి ఉపయోగించే తొలిత(Thimbles)లాగ వుండి మట్టి కణాలు దూరీదానికి అనుకూలంగా వుంటుంది. 1.8 చిత్రం.

1.8. మొక్కల వేర్ల వివిధ భాగాలు : 1. వేరు తొడుగు 2. వృద్ధి భాగం 3. లంబ భాగం 4. బలీసే భాగం. రక్షక తొడుగు వెనుక భాగం : కొన వృద్ధి అయ్యే భాగం, ఇది పెరిగినంతసేపు తొడుగు మట్టి కణాల్ని దూసుకొని, వేరు ముందుకు సాగుతుంది. దీని వెనుక భాగం, వేరును పొడుగయ్యేట్లు చేస్తుంది. ఈ మూడు వేరు భాగాలు, వృద్ధి, రక్షణ పనులను చేస్తాయే తప్ప, మట్టి నుంచి పోషకాల్ని గాని, నీటిని గాని పీల్చుకోవు. ఈ విధంగా





110

111.



నీటిని పీల్చుకొనే భాగం నాల్గవ భాగం. ఈ భాగంలో అనేకానేక సూక్ష్మమైన మృదువైన వేరు రోమాలుంటాయి. అందువేత ఈ భాగాన్ని వేరు రోమపుభాగం అని వ్యవహరిస్తారు. ఒక్కొక్క రోమము ఒక్కొక్క జీవ కోశము వాచిన భాగం.

1.9 a వేరు రోమములు

1.9 b మాగ్నిఫై చేసిన రెండు వేరు రోమాలు.

ఈ వేరు రోమాలే మట్టి కణాలకు అంటుకొని ఆ కణాలలోనున్న పోషకాల్ని ద్రవరూపంలో గ్రహిస్తాయి. వేరు రోమాలే మొక్కల నోరు. నీటి ప్రాముఖ్యత ఎంత ముఖ్యమంటే ఉదాహరణకు గోధుమకు రోజాకు 2 లీటర్లు నీరు కావాలి. కొన్ని చెట్లు ఇంకా ఎక్కువ నీటిని గ్రహిస్తాయి. ఇంత నీటిని గ్రహించే దానికి సహాయపడేది ఈ వేరు రోమాలే. ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు లెక్కవేసి, రై (Rye) అనే చిన్న గోధుమ చెట్టు వేరు రోమాలను పాడుగా జోడిస్తే ఐదు మైళ్ళంత పొడవుగా జోడించవచ్చని పేర్కొన్నాడు. గడ్డి పెరిగిన ఒక ఘన అంగుళమంత మట్టిలో కనీసం 16 నుంచి 20వేల అడుగుల పొడవంత వేరు రోమాలుండినవి. ఇందులో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం వేర్ల పొడవే ఎక్కువ. ఒక సూర్యకాంతి చెట్టులో సుమారు 1400 అడుగుల పొడవున్న వేర్లుంటాయి. ఒక చిన్న గడ్డి మొక్కల్లో 3-4 వేల అడుగుల పొడవు వేర్లు ఉండొచ్చు. ఈ విధంగా ఉండే లక్ష్యాంతర వేరు రోమాల పొడవు వేల కొలది అడుగులంత పొడవు ఉంటుందనడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.

ఈ వేరు రోమాలు ఖణికాలు - ఎక్కువ కాలం బతకవు. వేరు పొడవైన కొద్దీ పాత వేరు రోమాలు మరణిస్తాయి. కొత్త రోమాలు పెరుగుతూ వస్తాయి. సామాన్యంగా వేరు రోమపు భాగం 1 నుంచి 6 సె.మీ. వరకు పెరుగుతుంది. వేరు రోమాలు పీల్చుకొన్న పోషకాలు, నీరు వేర్లలోని ఒక భాగాన్ని చేరి, అందులోనున్న నాళాల ద్వారా పైకిక్కుతాయి. ఈ భాగం వేరును, అడ్డంగా చిల్చలాగా కోసి సూక్ష్మదర్శినిలో గమనిస్తే ఈ నాళాల నిర్మాణం స్పష్టమవుతుంది. చిత్రం 1.10

1.10 లేత వేరు శెనగ మొక్క వేరును అడ్డంగా కత్తిరించి, స్పష్టమైన చిల్చలాగా పెట్టి దూరదర్శినిలో చూడగా కనిపించే చిత్రం 1. వేరు రోమం 2. వెలువలి చర్మం 3. కార్టిక్స్ 4. లోవలి చర్మం 5. పరివృత్తం 6. వేర్లే అంగాంశం 7. మరియు 8. నీటి గొట్టం 9. పోషకనాళాలు 10. బెండు.

దీర్ఘ యొక్క వెలువలి పొరే, వేరు యొక్క బాహ్య చర్మం (Epidermis). ఈ బాహ్య చర్మము నుంచే వేరు రోమాలు బయలుదేరుతాయి. ఈ బాహ్య చర్మపు లోవలి పొరే వేరు యొక్క చిప్ప (వల్లంం Cortex) దీని లోవలి పొర అంతః శ్చర్మం. పాత వేర్లలో ఈ అంతఃశ్చర్మం లావుగా వుంటుంది. ఇది లోవలికొచ్చిన నీటిని బయటకీ పోకుండా అడ్డుగానిలుస్తుంది. అంతఃశ్చర్మం లోవలి భాగాన్ని పరివృత్తం, లేదా (Pericycle) అని అంటారు. ఈ పరివృత్తం ద్వారానే వేర్లలో చీలికలు ఏర్పడుతాయి. వేరులోని ఇతర భాగాల ద్వారా చీలికలు ఏర్పడవు. ఈ పరివృత్తం లోవలికి నీరు వెళ్ళడానికి నీటి గొట్టం లేదా క్షైలమ్ (Xylem) ఇదే. గాఢ చిల్చలోపెట్టి మైక్రోస్కోపు ద్వారా గమనిస్తే ఈ గొట్టాల నక్షత్రంలాగా వ్యాపించి వుంటాయి. ఈ నక్షత్రపు బాహువుల మధ్య ఇంకొక రకపు గొట్టాలున్నాయి. ఇవే పోషకాల్ని తీసుకువెళ్ళే పోషక కణజాలాలు. ఈ రెండు రకాల గొట్టాల

మధ్య ఒక కోశపు పొర వుంది. ఇదే పెరిగే భాగం. కాంబియం (Cambium) పొర. దీని ద్వారానే వేరు లావుగా పెరిగేదానికి వీలు కలుగుతుంది. వేర్ల సంఖ్య, దిగిడి లోతు, విస్తరించడం మట్టిలోని జలాంశం, దాని సారవంతత, మొక్కల పుల్కారదన క్రమం, నీటికి అనుగుణంగా వుంటుంది. సారవంతమైన మట్టిలో వేర్ల వ్యాప్తి, ప్రసరణ ఎక్కువ. పాత మట్టిలో తక్కువ.

మొక్కలు పెరిగినంతగా, వేర్ల సమూహం వ్యాపిస్తూ వుంటుంది. కానీ నీటిని, పోషకాల్ని పీల్చుకొనే వేరు రోమాలున్న భాగాలు సస్యపు అక్ష నుంచి దూరం అవుతూ వస్తాయి. చిన్న మొక్కలలో ఈ భాగపు భాగం, దగ్గరగానే వుంటుంది. కానీ పెద్ద మొక్కలలో ఈ భాగపు భాగాలు, క్రింది నుండి దూరంగా దొడ్లిపోతాయి. ఈ కారణంచేత పెద్ద మొక్కలకు క్రింద భాగం దగ్గరలో ఎరువు వేయడం వల్ల ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. నీటికి ఎక్కువైన, క్రింది భాగం నుంచి కొంచెం దూరంగా వేయాలి. క్రింది భాగాన్నుండి పై భాగానికి ఎంత దూరమో అంత దూరంలో పొడుచేసి ఎరువుని, నీటిని వేయాలి. 1.11 చిత్రం

1.11 పెద్ద చెట్టుకు లేదా వుణ్ణానికి ఎక్కడ ఎరువుని వేయాలనే విషయాన్ని సూచించే చిత్రం. మొదటి సంవత్సరం 'a, a' స్థలంలో, మరుసటి సంవత్సరం 'a, b' స్థలంలోనూ ఈ విధంగా క్రింది భాగం నుంచి దూరంగా వేయాలి. Sa. క్రింది భాగాన వేయరాదు. నీటిని కూడా ఈ విధంగానే దగ్గర వేయరాదు.


పెద్ద మొక్కల క్రింది భాగానికి దగ్గరగా ఎరువును, నీటిని పీల్చుకొనే వేరు రోమాలు పెరుగుటకు, క్రింది భాగానికి దగ్గరగా వున్న కొన్ని చీలికలైన వేర్లను కత్తిరిస్తారు. ఈ పనులను వేరు ఖండనం అని అంటారు. ఈ విధంగా ఖండించినప్పుడు అక్కడ కొత్త వేర్లు - వాటి జతలో వేరు రోమాలు చిగురిస్తాయి.

పెద్ద చెట్లు : పెద్ద గాలి వచ్చినప్పుడు దూరంలో ఉండి వేరు రోమాలున్న వేర్లు రాలిపోతాయి. ఈ కారణం చేత నీటిని, పోషకాలను గ్రహించలేక చెట్టు ఎండిపోతుంది. ఎండిపోకుండా వేయడానికి క్రింది భాగానికి దగ్గరపున్న వేర్లను కత్తిరించిన, అక్కడ కొత్త వేర్లు వచ్చి, పెద్ద గాలి నుండి సురక్షితంగా వుంటాయి.

### కాండం (Stem)

వేరు విత్తనాల భ్రూణ మూలంగా వికాసమొంది భూమి క్రింద దిగిడి భాగమయితే, ప్రకాండం, విత్తనం ప్లూముల్ (Plumule) ప్రథమ కాండం, విస్తరించి భూమిపైకి వచ్చే భాగం మన కంటికి కనిపించే భాగం. ఈ ప్రకాండమే కొమ్మల చీలికలు, ఆకులు, మొగ్గ, పువ్వు, పండ్లను భరించే భాగం. వేరు సస్యపు అక్షానికి క్రిందికి దిగిడి భాగమయితే ప్రకాండం ఈ అక్షపు పైకి పెరిగే భాగమవుతుంది. సామాన్యంగా ఈ ప్రకాండం లేతగా వున్నప్పుడు వచ్చుగానే వుంటుంది. దీని చివర వృద్ధి భాగాన్ని కొన్ని సూక్ష్మ ఆకులు కాపాడుతాయి.

ప్రకాండంలో సామాన్యంగా కణుపులు వుంటాయి. వేరులలో ఈ రకపు కణుపులు అపురూపం. ఈ కణుపుల మధ్య భాగాన్ని కణుపును మధ్య కణుపు అని అంటారు. కొన్ని మొక్కలలో కణుపుల మధ్య ఎక్కువ అంతరం ఉండనే వుండదు. ఒకవేళ వుండినా స్పష్టంగా వుండదు. ఈ కణుపుల ద్వారా ఆకులు, రెమ్మలు, పువ్వులు చిగురిస్తాయి. కణుపులో వున్న మొగ్గ అలైంగిక లేదా శాకీయ మొగ్గ అయి వుంటే దీని నుంచి





1.13




1.15



1.14



1.14 c and d



రెమ్మలు వండి, వగిలి పైకిగాని, ప్రక్కకుగాని పెరుగుతాయి. అంతేకాక ఈ కొనలో శాకీయ లేదా పువ్వుల మొగ్గలుంటే ఆ దిక్కులో వృద్ధి ఆగిపోయి పువ్వులు బయటకు వస్తాయి. సామాన్యంగా కాండము సిలిండర్ (Cylinder) ఆకారంలో వుంటుంది. కాని తుంగ గడ్డి మొదలైన వాటిలో ముమ్మూలలు అవుతాయి. తులసి, కొన్ని తాటి మొక్కలలో నాల్గు మూలలుండటం కలదు. కొన్ని తేలిక పేర్లలో కాండాలు ఉబ్బెత్తుగా వుంటాయి. చెఱకులో కాండం, ముడులు, ముడులుగా ఉంటుంది. జంట కాండం (Jointed Stem) చిత్రం 1.12 a, e.

1.12 (a - e) a. గొట్టం, b. ముమ్మూలి, c. నాల్గు మూలలు, d. ఏరుతగ్గు, e. జంట

కొత్తంబరి మొదలైన మొక్కలలో కాండం బోలుగా ఉంటే కొన్ని మొక్కలలో కండ నిండి ఉబ్బుకొని వుంటుంది. కాండం మొక్క యొక్క అక్షం భూమిపైన లేదా భూమిపై ఉండే భాగమని వెనుక చెప్పబడింది. కాని కొన్ని మొక్కలలో కాండం భూమిలోవలనూ ఉండొచ్చు.

కాండ నిర్మాణం ఒకరకంగా వుండదు. కొన్ని కాండాలు, వేరుగా, గట్టిగా, బలంగా పెరుగుతాయి. మరి కొన్ని నిదారుగా నిలబడలేని కాండాలు, దుర్బలమైనవి, భూమిపైన వ్యాపించేవి. లేదా చుట్టుప్రక్కల గట్టిగా వున్న నిదారు కాండాలపైనే, స్తంభం మొదలైన ఆధారాలపైనే ఎగబ్రాకుతాయి. మరి కొన్ని భూమి లోపలనుండి అప్పుడప్పుడు మొగ్గలను బయటకు తోస్తుంటాయి.

నిదారు కాండాలు : కొబ్బరి, వక్క, తాటి చెట్టు వంటి వాటిలో కాండం చీలికలు చీలకుండా, నిదారుగా లావుగా స్తంభంలాగా పెరుగుతుంది. దాని పైన అక్కడికక్కడే రాతిపోయిన ఆకులను మూసి రెమ్మలుంటాయి. ఇటువంటి కాండాన్ని కాడ్కెక్స్ (Caudex) అని అంటారు. 1.13 a చిత్రం.

1.13 a. a) కొబ్బరి చెట్టు (Caudex)

వెదురు మొదలైన వాటిలో కాండం అనేక సంది లేదా, చేరికలతో కూడి వుంటుంది. కణుపులు నిండి మందంగా వుండి కణుపు నడిమి భాగం బోలుగా వుంటుంది. ఈ రకపు కాండాన్ని చెఱుకు (Culm) అని అంటారు. (1.13 b) చిత్రం.

1.13 b. వెదురు పొదలు లేదా బొంగులు

ఉల్లిపాయలు అమారిలిస్ (Amaryllis), అంతూరియం, సుగంధ రాజం, కెల్‌డియం (Caladium) కమలం మొదలైన వాటిలో కాండం భూమిలోవలె వుంటుంది. భూమిలో వుండి ఎన్నో ఆకులను భూమి సమతలం నుంచి బయటకు తోస్తాయి. ఈ ఆకుల గుంపు, వేరు నుంచి వచ్చినట్టే కనిపిస్తుంది. పుష్పించే కాలంలో మాత్రం ఈ అంతర కాండం నుంచి ఆకుల గుంపు ద్వారా కాండం వలె కనిపించే పొడవైన కాడ ఒకటి బయటికి వచ్చుకొని వస్తుంది. ఈ వచ్చుకొని వచ్చిన కాడ చివరన పువ్వులు పూస్తాయి. ఇదే పువ్వు చిగురించే బాగం. దీన్ని (Scape) స్కేప్ అంటారు. పుష్పించిన తర్వాత ఈ పుష్పకాండం ఎండిపోతుంది. బయట చూడడానికి ఈ రకపు కాండాలకు కాండమే లేనట్లు ఉండుటచే వీటిని కాండహీనాలు లేదా కాండ రహితాలు (Acaulescents) అంటారు. చిత్రం 1.14 a.

1.14 a. ఉల్లిపాయల మొక్క వుంతహీనం.

సామాన్యంగా అనేక మొక్కలలో కాండపు పెరుగుదల కొంతకాలం అయిన తర్వాత నిలిచిపోయి కొమ్మలు చీలుతూ, రెమ్మలుగా విస్తరిస్తూ పెరుగుతుంటాయి. ఈ రకపు కాండపు పెరుగుదలను డెలిక్విసెంట్ (Deliquescent) ప్రసిద్ధాంత లేదా పార్క్వాడ్ ప్రముఖ అని అంటారు. కానీ క్యాసరికె, సరమామిడి మొదలైన మొక్కల చెట్లలో కాండం పెరుగుతూనే వుంటుంది. పెద్ద రెమ్మలు క్రింద చిన్నవి, సన్నవి పైన ఉంటాయి. ఇటువంటి పెరుగుదలను ఎక్స్-కరెంట్ (Ex-curret) పెరుగుదలంటారు.

1.14 b. క్యాసరికే శంఖు ఆకారంలో బహిర్వక్ర కాండం.

నిర్జల కాండాలు : నేలపైన ఊగులాడుతూ పెరిగేది నిర్జల ప్రకాండంలోనూ ఎన్నో రకాలున్నాయి. కాండాల కణుపుల నుండి వేరు బయటకు రాకుండా పెరుగుతూంటే ప్రొస్పేట్ కాండమంటారు. ఉదా. పోర్చులక విష్ణుక్రాంతి (1.14 c) వీటిని జాడు కాండం అని వ్యవహరిస్తూంటారు.

1.14. c. విష్ణు క్రాంతి ముఖవడి కాండం కొన్ని మొక్కలలో కొద్ది దూరం ముఖవడిగా పెరిగి, ఆ తర్వాత చివర కొద్దిగా మొలకెత్తుతుంది. వీటిని డిక్యుంబెంట్ (Decumbent) 1.14 d కాండం అని అంటారు. ఉదా. గుబురు వామంతి.

1.14. d. గుబురు వామంతి ఉద్యక్ర.

ట్రైడాక్స్ (గడ్డి చేమంతి) బోయర్ హవేయా మొదలైన వాటిలో అనేక రెమ్మలు భూమిపైన అన్ని దిక్కులలోనూ విస్తరించి పెరుగుతాయి. ఇటువంటి కాండాల్ని డిప్ర్యాన్ 1.14 e. కాండం అంటారు.



1.14 e. రక్తపునర్జన్య చెదరు (విసరిత) కాండం.

వీరిది కాండం కణ కణాలకి వేరు చిగురోస్తే వాటిని తీగలని అంటారు. (క్రిప్పర్) వీటి ప్రభేదాల్ని తోటమాలి బాగా తెలుసుకొని ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం అనేక రకాల మొక్కల్ని అంటుకట్టడం ద్వారా, తీగల ద్వారా వృద్ధి చేసుకోవలసి వస్తుంది. అనేక రకాల మొక్కలు విస్తరించి పెరగడమనేది ఈ తీగల ద్వారా జరుగుతుంది. కొన్ని లతల కాండాలు, భూమిలో విస్తరిస్తాయి. కొన్ని కొద్దిగా భూమిలోపల, కొద్దిగా భూమి పైన ప్రసరిస్తాయి, ఈ తీగలలో ముఖ్యంగా నాలుగు రకాలు 1. రన్నర్ (Runner) భూమిపై ఉండే తీగ 2. స్టోన్ భూమిపై వుండే రెమ్మ 3. ఆఫ్ సెట్టులు 4. సక్లర్లు.

1. తీగలలో కాండపు రెమ్మ మృదువుగా వుండి, కణుపు నడిమి భాగం పాడవుగా వుండి, నేలపైన విస్తరించి, కణుపు నుంచి అక్కడికక్కడే కొత్త మొక్కలు పెరుగుతుంటాయి. వీటినే రన్నర్ అని అంటారు. ఉదా : చింత చెట్టు, స్ట్రా బెరీ, బ్రాహ్మి. చిత్రం 1.15 a.

1.15 a చింత చెట్టు రన్నర్లు.

2. స్టోలమలలో తల్లి చెట్టు యొక్క కాండం గుప్తంగా వుంటుంది. దాని నుంచి బయలుదేరిన రెమ్మలు భూమిలోపల అడ్డంగా వేరు వేరు దిక్కులలో విస్తరిస్తాయి. ఈ రెమ్మల చివరన మొగ్గ ఏకసంచి భూమి పైకొస్తుంది. ఆకులతో వేరే ప్రత్యేకమొక్కలుగా అవుతాయి. ఈ రకపు భూమిలోపలున్న కాండపు రెమ్మలను స్టోల్ అని అంటారు. ఉదా. కేశవ (కాచ గడ్డ), జాముకీ పువ్వుల తీగ, కొన్ని రకాల మల్లెలు, డ్రేసిన



1.15



(Dracaena) చిత్రం 1.15 b.

1.15 b. కేశవ దంటు స్థలములు.

3. ఆఫ్ పెట్టులు : భూమిపై ప్రాకే తీగవంటిది. ఆకులు, కంకుల చేత సన్నగా వుంటాయి. సుమారుగా కొంచెం లాచైన కాండాన్ని వెలువలికి తోస్తుంది. ఈ సమూహం భూమికంటుకున్నప్పుడు వేళ్లు చిగురిస్తాయి. ఉదా : ఎఫీసియా అంతరికం చిత్రం 1.15c.

1.15 c. అంతర గంగ యొక్క ఆఫ్ పెట్టులు.

4. సక్లర్లు స్టోలన్ లాగే భూమి లోపల కాండం నుంచి బయలుదేరి ఉపకాండమేర్పడుతుంది. అనగా ఇది అడ్డంగా పెరగడానికి బదులు వంకరగా పైకెక్కి క్రింది భాగానికి కొద్ది దూరంలో కొత్త ఆకులు కాండాలకు వస్తాయి. తల్లి చెట్టు నుంచి వేరువడి ప్రత్యేక చెట్టుగా మారేటప్పుడు వేళ్లు చిగురించి ప్రత్యేక మొక్కగా మొకెత్తుతాయి. ఉదా : చామంతి, పుదీన (చిత్రం 1.15d.)

1.15 d. చామంతి సక్లర్.

మరొక రకపు నిర్మల కాండం - ప్రాకే తీగ, మట్టుకొనే తీగ, బలాణీ, గుమ్మడి కాయ మొదలైనవి - ఈ రకపు తీగలు. వాటి కాండాలు చాలా తేలికైనవి, పాడైనవి. అన్ని దిక్కులలోనూ చీలికలు ఉంటాయి. వీటిలో కొన్ని ఆధార సహ్యలన్, స్టంబాలన్, తంతులన్, కర్రలన్, ప్రాకడానికీ, ఉపయోగ పరమకొంటాయి. ముఖ్యంగా ఇందులో ఆరు రకాలున్నాయి. వీటిని గూర్చి ముందు వివరించబడింది.

### కాండపు రూపాంతరాలు

కొన్ని మొక్కలలో కాండం లేదా రెమ్మలు నేరుగా పెరిగి, ఆకు, రెమ్మ, పువ్వులు పూయడానికి బదులుగా, కొన్ని విశేష వనల కోసం రూపాంతరాన్ని పొందుతాయి. ఈ రూపాంతరాలలో కొన్నింటిని రన్నరు - స్టోలన్లు, ఆఫ్సెల్, సక్లర్లని ఇంతకు ముందే వివరించబడింది. ప్రకాండపు వెలువలి పెరుగుదల (ముందు చూడండి) కూడా ప్రకాండపు రూపాంతరమే.

ఇంకా కొన్ని రకాల రూపాంతరాలు ఇక్కడ సూక్ష్మంగా వివరించబడినాయి. రూపాంతరం పొందిన కాండాన్ని సహ్యాభివృద్ధి కోరకు మార్పుకొనవచ్చు. అందుచేత వీటి గురించి ఎక్కువ వివరాలు, సహ్యాభివృద్ధి, ఆధ్యాయంలో ఇవ్వబడినాయి. భూమిలోపల కాండం కొన్ని రాతి పొరలలో రూపాంతరాన్ని పొందుతుంది.

1. రైసోములు (Rhizomes) ఉపకాండం, గుప్త కాండం, ఇవి భూమి మట్టుపై క్రింది భాగాన్ని వ్యాపించే కొద్దిగా లావుగావున్న కాండాలు వీటిలో అక్కడికక్కడే కణుపులు వుంటాయి. ఈ కణుపుల పైన పొర రూపంలో ఆకులుంటాయి. చివరి మొగ్గలూ వుంటాయి. ఈ గుప్త కాండపు క్రింది భాగం నుంచి కొన్ని మృదువైన వేళ్లు బయలుదేరుతాయి. కొన్ని మొక్కలలో ఈ గుప్త కాండం నుంచి చీలికలు చీలుతాయి. ఋతు ధర్మాన్ని అనుసరించి చివరన్న మొగ్గ వికసించి ఆకులు మొదలైన వాటిని భూమిపైకి త్రోస్తాయి. కొన్ని నెలల తర్వాత ఈ వెలువలి భాగం ఎండిపోతుంది. ఆ తర్వాత గుప్త కాండం ప్రక్కనున్న మొగ్గలు వికసించి, తర్వాత



1.17



1.18



1.16a



1.16b

బుతువులో చెట్లను పైకిత్రోస్తుంది. ఉదా : ఆలోకేషియా, క్యానా, అల్లం. చిత్రం. 1.16 a & b.

1.16 a & b. a) రైసోము పొర వంటి ఆకు మూయబడింది.

b) అల్లపు (శొంఠి) రైసోము 1. కణుపు 2. మొగ్గ. 3. పొర.

2. ట్యూబరులు : (Tubers) ఇవి కాండపు క్రింది భాగాన ఉచ్చిన చివరి భాగం. భూమిలోని చీలికలైన దుంపలు చెట్టు క్రింది భాగం నుండి ఆకుల కంకుల నుండి బయరుదేరి భూమి లోపల అడ్డంగ విస్తరించి చివరకు ఉబ్బుతాయి. ఈ ఉచ్చిన భాగాన్ని దుంపలు అని అంటారు. దీనిపైన కొన్ని పీలకలు లేదా మొగ్గలుంటాయి. వీటి ద్వారా కొత్త మొక్కలు చిగురిస్తాయి. ఈ దుంపలకు వేర్లుండవు. ఉదా : బంగాళా దుంప చిత్రం 1.17.

1.17 బంగాళా దుంపల ట్యూబరు.

3. బల్బులు (Bulbs) : ఇవి కూడ భూమిలోపలుండే కాండాలే కానీ పొడవుగా పెరగవు. బల్బులో రెండు స్పష్ట భాగాలుంటాయి. 1. నన్నని, చిన్న, ఉచ్చి తట్టలాగుండే భాగం డిస్క్. 2. దాని నుంచి బయలుదేరిన కండతో కూడిన పొరలాగ వుండే ఆకు (Fleshy scale leaves) ఈ పొర వంటి ఆకుల వెలుపలి భాగంలో పొరలు ఎండి, తేలికగా అవుతాయి. బల్బు క్రింది భాగం నుండి వేర్లు బొంత బయలుదేరుతుంది. ఉదా : ఉల్లిపాయలు, తెల్ల ఉల్లి పాయలు, సుగంధ రాజం (చిత్రం 1.18) లిల్లీలు, కొన్ని సమయాలలో కండతో కూడి పొర వంటాకులు కంకులలో నున్న మొగ్గలు, వికసించి, మరొక బల్బుగా పరిణమించవచ్చు. ఉదా : అమర్ లిల్లీస్.

1.18 సుగంధ రాజపు బల్బు (లశునం)



4. కారమ్ములు : ఇంకా దట్టంగా ఉండే రైసోములని అనొచ్చు. ఇవి లావుగా, గట్టిగా, కండతో కూడి భూమి లోపల ఉండే కాండాలు. ఆకారం సుమారుగా గుండ్రంగా ఉండి చప్పడిగా వుంటుంది. వీటి పొరలు లేని బయటికి కనిపించవు. ఈ ఆకుల కంకులలో వున్న మొగ్గ పెరిగి, కొత్త కందాలుగా పెరుగుతాయి. దీని క్రింద భాగం నుండి, కొన్ని సమయాలలో ప్రక్కనుంచి వేర్లు పెరుగుతాయి. ఉదా సువర్ణగడ్డ, గ్లాడ్ యోలసు చిత్రం. 1.19 a, b.

1.19 a, b. a) గ్లాడ్ యోలస్ కారమ్ము b) బల్బుకీ కారమ్ముకు వున్న భేదాలు. ఎడమవైపు ఉల్లిపాయలు కుడివైపు గ్లాడ్ యోలస్, కారమ్ము ఘన రూపపు లశునమనవచ్చు.

కోటలో పెరిగడి వివిధ రకాల రైసోములు మొదలైన వాటిని క్రింద పట్టిక రూపంలో ఇవ్వబడింది.

రైసోములు : ఆకిమెనిస్ (Achimenes) అనిమోను (Anemone) ఇరిస్ (Iris) గడ్డ జాతి, క్యాన, ఆలోకేషియా. కొన్ని పెన్సీలు : అల్లం, పసుపు, ఏలక్కాయ.

ట్యూబరులు : బెగోనియా, కలెడీయం, సైక్లామెన్, గ్లోరి యోస (Gloriosa) సెన్సీటియా, గ్లాక్సినియా.



120



119b

బల్బులు : ఉల్లిపాయలు, అమర్ లిట్టీస్, క్రినమ్, యుకారిస్, హేమంతస్, హయాసింత్, ఐరిస్, లిల్లీలు, మస్కారి, నార్సిస్, ట్యూలిప్, జైసిరాంతస్.

కారములు : గ్లాడియోల్స్, అసిడంతిర, క్రాకస్, ప్రీసీయ, ఇక్లియ, కేసరి. సాధారణంగా ఈ రకపు రూపాంతరం పొందిన కాండాలు మొక్కలు ఆహారాన్ని చేర్చి పెట్టే ఉగ్రాణాలు లేదా సహృదీవుద్ధి కోసం ఆహారాన్ని చేర్చిపెట్టే భాగాలు.

కాండపు భాగాలు : పైన వివరించిన రూపాంతరం పొందిన కాండాలను వదలి, సాధారణ లేదా ప్రతినీధి రూపకాండంలో ఉండే ముఖ్య భాగాలివి. చిత్రం. 1.20.

ప్రతినీధి రూపపు కాండంలోని ముఖ్య భాగాలు : 1. చివరి మొగ్గ, 2. పువ్వు, 3. కంకుల మొగ్గ, 4. ఆకు పిడి, 5. ఆకు, 6. రెమ్మ, 7. కాండపు అంగాంశాలు, 8. కణుపు, 9. కణుపు నడిమి, 10. ఆకుల రెమ్మ, 11. ఆకుల కంకులు.

1. కణుపు ఆకు కాండానికి అంటుకొనుండే భాగం (Node) 2. కణుపు నడిమి 3. చివరి మొగ్గ కాడ 4. రాలిన ఆకుల కాడలు 5. కంకుల మొగ్గ 6. కక్ష లేదా పత్ర కక్ష 7. చివరి మొగ్గ 8. వలక వికించే పార.

### కాండపులోపలి నిర్మాణం (Internal Structure of Stem)

ఏదైనా ప్రతినీధి రూపపు కాండాన్ని కణుపు మధ్య అడ్డంగా కత్తిరించి బిళ్ళగా కోసి సూక్ష్మ దర్శిని ద్వారా చూస్తే కాండపు లోపలి నిర్మాణం స్పష్టమవుతుంది. చిత్రం (1.21 A & B).


1.21 A మొక్క జొన్న కాండపు తేలికైన అడ్డు బిళ్ళ సూక్ష్మ దర్శినిలో ఏ విధంగా ఉండునో సూచించే చిత్రం.

1. వెలుపలి చర్మం 2. ఫ్లెరనాక్రమే 3. పేరనాక్రమే 4. నాలాల కట్టు.


1.21 B. లోపలి చెట్టు దారునికనించే తీరం. 1. చర్మం 2. కార్టేన్స్ 3. ప్రథమ పోషక గొట్టం 4. రస గొట్టం 5. కేంద్రియం 6. ద్వితీయ నీటి గొట్టం 7. ప్రథమ నీటి గొట్టం.

ఇందులోనూ పేరులో ఉండేటట్లు నీటి గొట్టాలు, రస గొట్టాలుంటాయి. కానీ పేరులో ఈ గొట్టాల కట్టు మధ్యలో వుండే కాండంలో కేంద్రం నుంచి పుల్కారంలో ఈ గొట్టాల బాహ్య పుత్రం ఉంటుంది. మొక్కల తొడుగు గొట్టం కట్టిన పుత్రపు లోపలి భాగం కందం. నీటి గొట్టం, రసగొట్టాల మధ్య ఒక పుత్రం ఉంటుంది. ఇదే చురుకుగా వుండే కేంద్రియ పార. దీన్ని కాండపు జీవాక్షమని అంటారు. ఈ పారలోని కోశాలు చురుకుగా వుండి, పెరుగుతూ రెండు భాగాలుగా అవుతాయి. కాండం లావుగా కావడమనేది ఈ విభాజ్య కణాల వృద్ధి చేతనే. అందుచే దీన్ని వృద్ధి పారలని అనవచ్చు. ఇవి వృద్ధి పారలేకాక కొత్త అంగాల్ని తయారు చేసే కణాలు, గాయాల్ని మాన్చి నశింపజేసేవి, నశించిన భాగాల్ని మరల జీవింపజేసే కణాలు, కేంద్రియం కణాల పనులు తోటమాలికి తోట వనిలో చాలా ముఖ్యమైనవి. దీనికి నాలుగు రకాల పనులున్నాయి.


1. ఇది వర్తమాన అంగాంశం - పెరుగదలకు అంగాంశం కాండం, లావు ఎక్కడం దీని ద్వారానే .లావు ఎక్కిగానే కొత్త గొట్టాలను రసగొట్టాలను తయారు చేస్తుంటాయి.



1.21A



1.21C



1.21B

2. ఇవి చెట్లను కొట్టి అలంకారప్రాయం చేసేటప్పుడు లేదా ఇంకే కారణం చేతనో అయ్యే గాయాల్ని మాన్పి, దుష్ప్రతి నుంచి రక్షిస్తూండే కణాలు.
3. పీలకల్ని వేసేటప్పుడు, మొక్కల్ని అంటుగట్టి ఆ మొక్కల్ని నాటేటప్పుడు, అంటు గట్టడానికి కత్తిరించేటప్పుడు క్యాంసర్ లేదా జట్టు తయారు చేసే కణుపు పొరలు.
4. అపాధారణ వేర్లు బయలుదేరేది ఈ కణాల ద్వారానే.
5. ఏక దళ మొక్కలలో పునర్వృద్ధి లేదు కాని ద్విదళ మొక్కలలో కత్తిరించిన తర్వాత కొత్త చీలికలు, మొలకలు, కొత్తగా చిగురిస్తాయి. దీనికి కారణం, ఏకదళ మొక్కలలో కేంద్రీయం కణాల పొర వుండదు. ఏకదళ మొక్కలైన రాగి, వరి, గోధుమ, ఉల్లిపాయలు మొదలైన వాటి కాండాల రోవలీ నిర్మాణం వేరుగా వుంటుంది. కందివప్పు, చిక్కడు, సూర్యకాంతం, గులాబీ, నిమ్మ మొదలైన ద్విదళ మొక్కల రోవలీ నిర్మాణం వేరుగా వుంటుంది. చిత్రం 1.21 c.లో ఆ భేదం చూపబడింది.

1.21 C. సూర్య కాంతి మొక్క రోవలీ నిర్మాణం.

ద్విదళాలలో ప్రతి గొట్టాల దొంతర్లలోనూ వెలుపల రసగొట్టాలు, రోవలీ నీటి గొట్టం, మధ్య కేంద్రీయం కణాల పొరలుంటాయి. గొట్టాల దొంతర్ల మధ్య వచ్చేడు రేఖలుంటాయి. ఇవి కాండపు మధ్య బెండు నుండి బయలుదేరిన అంగాంశం. చివ్వు లేదా తొడుగులలోనూ కొన్ని పొరలున్నాయి. బాహ్యపొరలను కోస్తే లేత మొక్కలలో వచ్చుగా వుంటాయి.

పెద్ద కాండాన్ని కోస్తే అందులో అనేక వుల్లాల్ని చూడవచ్చు. ఒక్కొక్క వుల్లం ఆ సంవత్సరపు పెరుగుదల ముగిసిన తర్వాత నిశ్చయమైనవి. ఈ వుల్లాల్ని లెక్కపెట్టి చెట్టుకు ఎన్ని సంవత్సరాలని చెప్పవచ్చు. ఈ వుల్లాలను వార్షిక వృద్ధి వుల్లం అని అంటారు. ఏక దళ మొక్కల కాండపు నిర్మాణం ద్విదళాల మొక్కల కాండపు నిర్మాణముకన్నా సరళమైంది. బాహ్యపొరే బాహ్య చర్మం. కాండం కొంచెం గట్టిగా వుండేటట్టుగా దీనిలో కొంచెం నారుంటుంది. గొట్టాల దొంతర్ల చుట్టూ వుల్లంలో ఉండడానికి బదులుగా చెదరి ఉంటుంది. ఈ గొట్టాల దొంతర్లలో నీటి గొట్టం రసగొట్టాలు మాత్రమే వుంటాయి. వీటి మధ్య కేంద్రీయం కణాల పొరలుండవు.


### కాండంలో చీలికలు చీల్చే విధానాలు

కాండంలో చీలికలు వివిధ మొక్కలలో వివిధ రీతులలో చిలుకాయి. చీలికలలో ముఖ్యంగా రెండు విధానాలు. 1. కొమ్మలలో పార్శ్వ చీలికలు 2. కొమ్మలలో ద్విభాజీ చీలికలు.

మొదటి విధానంలో కొమ్మలలో చీలికలు ముఖ్య కాండపు ప్రక్కల నుంచి పెరుగుతాయి. దీనిలోను ఎన్నో రకాలున్నాయి. ఈ రకాల్ని 1.22 చిత్రంలో చూడవచ్చు. ఈ చీలికలు మధ్యాంశాల అయివుండవచ్చు. ఈ క్రమంలో, కాండపు చివర పెరుగుతూ, ప్రక్కనుంచి కొమ్మలు మొలకెత్తుతుంటాయి. క్రిందున్న రెమ్మలు చివరున్న రెమ్మలకన్నా పొడవుగా వుంటాయి. ఈ విధంగా మొక్క లేక చెట్టు, గోపురం ఆకారంలో పెరుగుతుంటాయి. ఉదా : నర్సే చెట్టు, మరికొన్ని చెట్లలో కొమ్మలు అంత్యాంశాలవ్వచ్చు. అప్పుడు చివరి



1.23



1.24



1.22





2




3



4



b



c

1.25 a-c



పెరుగుదల ఆగిపోయి, ప్రక్కనుంచి కొమ్మలు పెరుగుతాయి. క్రింద భాగాన ఉన్న కొమ్మలు చివరి రెమ్మలకన్నా చిగురించి పెరుగుతాయి. రెండవ విధానంలోను కొన్ని రకాలున్నాయి. వీటిని 1.23 చిత్రంలో చూడవచ్చు.

1.22 కొమ్మల చీలికలు 1. మధ్యరంధ్ర విధానం 2. నిజ అంత్యరంధ్ర విధానం 3. పుచ్చిక చుట్టుకొనే అంత్యరంధ్రం, 4. సుడి అంత్యరంధ్రం.

1.23 కొమ్మలలో ద్విభాజీ చీలికలు కరండం.

కొండపు పనులు : కాండాలకు 5 రకాల పనులున్నాయి. ముఖ్యమైనవి. ఆకుల నుంచి వేరుకు ఆచారాన్ని, వేరు నుంచి ఆకు మొగ్గ మొదలైన భాగాలకు పోషకాల్ని, నీటిని అందించే పని. రెండోది, కొమ్మలు రెమ్మలకు ఆధారం. మూడోది ఆకులను మోస్తూ, అన్ని ఆకులకు కావలసినంత వెలుతురు, సూర్యరశ్మి లభించేటట్లు నిలబెట్టేవి. దీనికి తోడు, మొగ్గ, పువ్వు, కాయలను భరించే పని. సాధారణంగా కొన్ని కాండాలు. రూపాంతరం పొంది అవార సేకరణ అంగాలవుతాయి. లేతగా వున్నప్పుడు, పచ్చగావున్నప్పుడు కొద్దో, గోప్తో ఆచారాన్ని తయారుచేసుకుంటూ వుంటాయి.






## ఆకు (పత్రం)

ఆకు మొక్క యొక్క ఆచారాన్ని తయారుచేసే అంగం, అలాగని మొక్కలో ఏ ఇతర భాగాల ద్వారా ఆచారం తయారు కాదని చెప్పడానికి వీలు లేదు. పచ్చగా వుండే భాగాలన్నింటిలోనూ కొద్దో గోప్తో ఆచారం తయారవుతుంటుంది. కాని ఎక్కువగా సమర్థవంతంగా తయారయ్యేది ఆకులలోనే. ఆకుల నిర్మాణం అచికాండాన్ని అతుక్కొన్న రీతి, ఆచారం తయారు చేయడానికి తగిన విధంగా ఏర్పాటైయుంది. ఆకులు విశాలంగా వెడల్పుగా, పచ్చగా వుండటంతో, ఎక్కువ పరిమాణంలో విస్తారంగా ఆకులపై సూర్య రశ్మి పడడానికి గాలిలో బాగా అక్సిజన్, కార్బన్-డై ఆక్సైడ్, నీటి ఆవిరి వినిమయమవడానికి సహాయకారిగా వుంటుంది.

సామాన్యంగా ఆకులలో మూడు భాగాలు ఉంటాయి. వెడలైన, తేలికైన, చప్పటైన ఆకు అంచు లేదా పత్ర చివరంచు, ఆకు కాడ కొమ్మ, పత్ర వృంత రేకులు, ఆకుల క్రింది భాగం లేదా క్రింద పత్రాల పీటం. ఒక ప్రతినీధి రూపపు ఆకు వివిధ భాగాలను 1.24 చిత్రంలో చూపబడింది. పై తెలిపిన మూడు భాగాలు కాకుండా. పత్ర పువ్వు, మధ్య నాళం లేదా మధ్యన్నా, ఈనెలు, నడిమి ఈనెలు, చిన్న ఈనెలు, ఆకు అంచు, ఆకు చివర పత్రపు అగ్రం ఇవికూడా ఉన్నాయి.

1.24 సరళ పత్రపు వివిధ భాగాలు. 1. పత్రాంగం 2. పత్రాలంచు 3. ఆకుల చివర్లు మొనడేలుండటం 4. నరం లేదా ఈనెను 5. నడిమి ఈనె 6. పత్ర పువ్వులు 7. తొడిమలు 8. పత్ర దళం 9. క్రిందిభాగం (పత్ర పీఠం).

ఆకుల అంచులు : ఇది పచ్చగా, మృగ్గిన, తేలికైన, చప్పటి భాగం. ఈ ఆకుల అంచు సరళంగా వుండొచ్చు. లేదా మూడు భాగాలలో వుండొచ్చు. నారింజ ఆకువలె మందార మొదలైన మొక్కలలో ఆకుల అంచులు చీలుండవు. ఇటువంటి సరళ పత్ర భిన్నంకాని, అభిన్న ఆకులను ఏక పత్రాలని అంటారు. కొందరు అభిన్న పత్రాలని అంటారు. అంచులు చీలికలై యుంటే వీటిని సంయుక్త పత్రం అంటారు. రేకులను చిన్న ఆకులని అంటారు.



సన్నని చిన్న ఆకులు కొన్ని ఉప పత్రాలు సుమారుగా సరళ పత్రాన్నే పోలి ఉంటాయి.

పత్రాలు సంయుక్తంగా వున్నప్పుడు మొక్కలకు అనుకూలంగా వుంటాయి. ఆకులు చీలికలు లేక అసంయుక్తంగా వుంటే కొద్దిగా ఇబ్బంది కలగవచ్చు. చీలికలై సంయుక్తాలుగా వుంటే అవి చిరిగిపోవు. చీలికలుండే ఆకుపైన ఆకు పెరిగి క్రింది ఆకులకు నీడ ఏర్పడదు. జల మొక్కలలో ఆకు వెడల్పుగా ఉండి విభిన్నమయ్యేది ఎక్కువ. ఈ నిర్మాణంతో అయినంత వరకు ఆకులను సూర్యరశ్మి తగిలేట్టుగా నిలబడడానికి అనుకూలం. సంయుక్తపత్రాలలో ఎన్నో రకాలు.

1.25 (a. k.) a. గరిక పత్రం b. చీలిన గరిక పత్రం c. ఉపచీలైన గరిక పత్రం దై పిన్నేట్ d. భిన్న పత్రాలు త్రిపత్రం. e. తాటి పత్రం f. పారపిన్నేట్ g. ఇంపార పిన్నేట్ h. డికాంపాండు i. తాటి త్రిపత్రం j. తాటి సంయుక్త దళ పత్రాలు k. తాటి ఫేటక పత్రాలు.

1. గరికాకు (Pinnales) ఇందులో ఆకు తొడిమ పొడవుగా మధ్య కాండం, రాకిన్లాగా పెరుగుతుంది. దీని నుంచి ఉప పత్రాలు పక్షి ఈకలులాగ బయలుదేరుతాయి. ఉదా : తంగేడు జాతికి చెందిన మొక్కలు.

2. కత్తికాయ వెట్టు (గుల్మేహార్) చింత, మొదలైన వాటిలో మధ్య కాండం చీలికలు చీలి ఒక్కొక్క కొమ్మ ఒక్కొక్క ఉప పత్రాన్ని కలిగిఉంటుంది. ఈ రకపు భిన్న పత్రాల్ని ద్విదళ గరికాకులు (Bipinnate) అని అంటారు.

3. మునగ కాండలలో చీలిన ఆకులు మరల చీలికలుగా చీలుతాయి. మునగకాండలలో ఆకులు చిన్న చిన్నవిగా చీలి ఎన్నో రెమ్మలుంటాయి. మళ్ళీ ఈ రెమ్మలు చీలికలు కలిగిఉంటాయి. వీటిని 'ఉప చీలికల'ని అంటారు. సోనే పట్టిలోనూ ఈ విధంగానే వుంటుంది.


4. ఏక్కుడు మొదలైన వాటిలో ఆకు మూడు ఉపపత్రాలతో చేరుంటుంది. వీటిని త్రిపత్రాలని అంటారు. (Trifoliate)

5. ఆవాలు : నువ్వులు, బూరుగ, దాపిన్ వీటిలో ఉప పత్రాలు చేతిలోని ఐదు వేళ్లవలె ఆకు తొడిమ నుండి బయలుదేరుతుంది. వీటిని కాటిపత్రాలు అంటారు.


6. గరికాకులలో రెండు వైపులా సమ సంఖ్యలో ఉపపత్రాలుంటే వీటిని పిన్నేట్ ఆకు అంటారు. చింత, గుల్మేహార్, అత్తిపత్తి వీటిలో ఈ విధంగానే ఉంటుంది.

7. గరిక ఆకులలో ఉప పత్రాలు బేసి సంఖ్యలో వుంటే వీటిని ఇంపారినేటు ఆకు అంటారు. గులాబి, వేప, కర్రపాకు, గిరికర్ణిక వీటిలో ఉప పత్రాలు ఈ విధంగానే చేరుంటాయి.


8. కొత్తంబరి, క్యారెట్టు, కాస్సాను మొదలైన చెట్లలోని ఆకుల గరికలు మూడుకన్నా ఎక్కువగా చీలికలు చీలుంటాయి. వీటిని డికంపోసు ఆకులంటారు. ఆకుల వెడల్పుల నిర్మాణంలోనూ అనేకనేక వ్యత్యాసాలున్నాయి. అకారంలోనూ, అంచులలోనూ, అగ్రంలోనూ, శరీరంలోనూ, అంతః, బాహ్య చర్మాలోనూ భేదాలుంటాయి. ఆ భేదాల్ని గుర్తించడానికి, వర్గించడానికి సాధ్యమవ్వడమేకాకుండా, ఆకు రూప నిర్మాణం, అందవందలను ఇంకా సూక్ష్మంగా చూసి అనందించవచ్చు. 1.26 చిత్రం.



16







5



7

1-26



126



1.26 అకుల ఆకారం 1. రేఖాకారం 2. ఈటీ ఆకారం 3. హిమోగ్ల ఈటీ ఆకారం 4. ఆయాకారం 5. అండాకారం 6. హిమోగ్ల అండాకారం 7. అండ వృత్తాకారం 8. హృదయాకారం 9. హిమోగ్ల హృదయాకారం 10. బాణాకారం 11. వలయాకారం 12. భేటాకారం 13. వజ్రాకారం 14. మూత్రపిండాకారం 15. చుమచ్చాకారం 16. హిడిబగ్గీయ ఆకారం 17. లైర ఆకారం 18. జెజె ఆకారం 19. కుడుగోలి ఆకారం.

1. రేఖా కారం (Linear) : ఈ ఆకారపు అకులు వెడల్పు తక్కువ. అకుల అంచులు సుమారుగా సమాంతరంగా వుంటాయి. ఉదా : గడ్డి అకులు. ఇందులో కొన్ని దబ్బణం ఆకారంలోను, మూడి ఆకారంలో సీలిండురు వలె వుంటాయి.

2. భల్లా కారం : కుంతాకృతి. ఈ అకుల క్రింది భాగం వెడల్పుగా వుంటాయి. అకు క్రమంగా మొనదేలుతుంది. ఉదా : పెదురు గడ్డి.

3. హిమోగ్ల ఈటాకారం : ఇందులో చివరి భాగం వెడల్పుగా వుండి, తొడిమ దగ్గర, అకు చివర్లు మొనదేలి ఉంటుంది. ఉదా : బిల్వాకు.

4. ఆయాకారం : ఈ అకులు పొడవుగా, వెడల్పు సుమారుగా రెండింతలు, అంచు సుమారుగా సమాంతరంగానే వుంటుంది. ఉదా : ప్రత్తి, నాగజెముడు, అరటి ఇత్యాది.

5. అండాకారం : ఇందులో క్రింది భాగం వెడల్పుగానూ, చివరి భాగం తక్కువ వెడల్పుగానూ గ్రుడ్డులా గుంటుంది. ఉదా : మజ్జీ, మందారం.

6. హిమోగ్ల అండాకారం : ఇది గ్రుడ్డు తలక్రిందులుగా వేస్తే ఎలాగుంటుందో అలాగుంటుంది. పై భాగం వెడల్పుగానూ, క్రింది భాగం కొద్దిగా చిన్నగానుంటుంది. ఉదా : అడవి బాదామి.

7. దీర్ఘ వృత్తాకారం - ఎలిప్సు (Ellipse) : అండ వృత్తం. ఉదా : నేరేడు, జామ, వనస.

8. హృదయాకారం (Cordate) : ఉదా : రాత్రి రాణి, తమలపాకులు.

9. హిమోగ్ల హృదయాకారం (Obcordate) : ఉదా : చింత.

10. బాణాకారం (Sagittate) : ఉదా : కేసరి, కొన్ని అంతేరియాలు, తెలెడియాలు.


11. చక్రాకార లేదా వలయాకార : ఉదా : తామర, నాస్టరొషియం.


12. భేటాకార ఆకారం (Peltate) : అకు తొడిమ అకు క్రింద లేదా అంచున్న భాగంలో అంచు నుంచి లోపలికి వేరుంటుంది. ఉదా : తామర, ఆముదం, ఫరంగి, కేసరి.

13. వజ్రాకారం (Rhomboid)

14. మూత్రపిండాకారం (Reinform) లేదా నెల బీన్ను బీజాలాకారం. ఉదా : బ్రహ్మీ (Centella asiatica)

15. చుమచ్చాకారం (Spathulate) : పూర్తిగా చుమచ్చావలె వుండదు. చివరి భాగం గుండ్రంగాను, క్రింది భాగం చిన్నదిగానూ ఉంటుంది. ఉదా : కెలాండం, చింత చెట్టు.





11




9



8



5



10

1.27



16. పెడిభృష్టియుకార : పిడి ఉంటే (భృష్టియులాగుంటుంది) ఉదా : తెల్ల పుల్లిపాయల తీగ, కందగడ్డ.
17. లైర్ ఆకారం (Lyrate) : లైర్ అనే వాద్యకారంలో ఉంటుంది. ఉదా : ఆవాలు, ముల్లంగి.
18. ఉల్లి సంబ ఆకారం (Cuneate) : ఉదా : అంతరగంగ.
19. కుదులి ఆకారం (Falcate) : ఉదా : యూకలిప్టస్ గ్లాబులీస్.
20. ముడతలవాడు (Plicate) : ఇందులో ఆకు వెడల్పు, ఈన పైన మడతలుంటాయి. ఉదా : ఈతాకు, కొబ్బరి ఇత్యాదివి.

ఆకు అంచుల వైవిధ్యం. ఇవి 1.27, (1-12) చిత్రాలలో చూపబడినాయి.

- 1.27 (1-12) ఆకుల వైవిధ్యం 1. ఖండం లేదా పూర్తి అంచు 2. అల ఆకారపు అంచు 3. పల్లు వంటి అంచు.
4. రంపపు అంచు 5. జైసెరేట్ అంచు 6. కేకంపు 7. క్రినేట్ అంచు 8. చీలిన అంచు 9. ఎక్కువ వంకరైన రంపపు అంచు 10. వెంట్రుకంపు 11. ముళ్ల అంచు 12. గరిక అంచు.
1. అభాండం - లేదా సంపూర్ణాంచు (Entire Margin) : పీటిలో గుంటగాని, వంకరగాని లేకుండా ఆకు అంచు సంపూర్ణంగా వుంటుంది. ఉదా : పనస, మజ్జి.
2. అలల ఆకారము : వంకర్లు తిరిగిన అంచు. ఉదా : పాలియోర్తియా, పత్రజీవి, పెసలు, కొన్ని క్రోటసులు. ఎక్కువ తిరిగియుండి రేపాండు అని అంటారు.
3. పల్లంపు - కూర్పుల్ అంచు : మొండి పల్లలాగ వుంటాయి. ఉదా : మందార. ఇందులో పల్లంపు సమకోణంగా బయటికి చాచుకొని వుంటుంది.
4. రంపపు అంచు : ఉదా : ఆకాలిఫ, కొన్ని మందారాలు, గులాబీలు, వేవ.
5. జైసెరేట్ : రంపపు అంచుమళ్ళా రంపపు అంచు పల్లలాగ చీలుంటాయి. రంపపు పల్లు చాలా సన్నంగా వుంటే వాటిని పెర్యరేట్ (Serrulate) అని అంటారు.
6. రేకంపు లేదా తుమ్మిలించికంపు : ఆకు అంచు వెడల్పు భాగాలుగా చీలుంటాయి. ఉదా : ఆముదం, ఫిరంగి, ద్రాక్ష.
7. గుండ్రటి పల్ల అంచు : ఉదా : అడవి వెలగ, బ్రయోఫైలం.
8. విరిగిన లేదా చీలిన అంచు : అంచు మధ్యవరం వరకు చీలి వుంటుంది. ఉదా : పగడ చెట్టు, పెద్ద అపిల్, బేరి.
9. హిస్టోగ్ - రంపపు అంచు : రంపపు పల్ల వంకర తిరిగింటాయి.
10. వెంట్రుకంపు (Ciliate).
11. ముళ్ళ అంచు (Spinous) : ఉదా : కస్తూరి.
12. గరిక అంచు (Pinnatifid).

## నరాలు లేదా నాళాల విన్యాసం (ఈనెల విన్యాసం) (Venation)


నరాలు లేదా నాళాలు (ఈనెల) ఆకుల తొడిమ నుంచి మొదలై ఎన్నో చీలికలుగా చీలుతాయి. వీటికి రెండు రకాల పనులుంటాయి. అకు ఆడుగును వెడల్పుగా ఉన్న వంజరమే ఈ నాళాలు (ఈనెలు). రెండోది ఈ నాళాలు (ఈనెల) ద్వారానే వేరు నుంచి పీల్చుకొన్న లేదా గ్రహించిన నీరు, అహారం ఆకుల అంగాంగాలకి చేరేది. అంతే కాకుండా అక్కడ, తయారైన ఆహారం కాండానికి వేరుకు అందిస్తాయి.


ఈ నరాల పనుల (విన్యాసం)లో ముఖ్యంగా రెండు రకాలున్నాయి. 1. నెట్‌వర్క్, నిర్ణీత క్రమంలో పనిచేసే విధానం—(Network, reticulate) (సంవర్గ, సాపేక్ష) 2. సమానాంతర సరవిన్యాసం (Parallel Venation) సామాన్యంగా ఏకదళాలలో నరాలు (ఈనెలు) సమాంతరంగానే ఉంటాయి. ద్విదళాలలో నరాలు పెట్టు లేదా వల వలై ఉంటుంది. వరస వర్ణి కందగడ్డ, కేసరి మొదలైనవి ఏకదళాలైన నరాలు/ఈనెలు వలై ఉంటాయి. అదేవిధంగా సురూపిన్న మొదలైనవి ద్విదళాల గుంపుకు చేరినను నరాలు (ఈనెలు) సమాంతరంగానే ఉంటాయి.

నడిమి ఈనె (మధ్యనాళం) (Midrib) అకు క్రింద భాగమందు చివర వరకు ఉంటుంది. దీని నుంచి బయలుదేరే ఉపనాళ రకాల రీతి ఈవిధంగా వుంటుంది.


1. గరికాకులో నరాలు (Pinnate) ఈ ఆకులలో నరాలు ఉపనాళాలుగా నరికలాగ వ్యాపిస్తాయి. ఇందులో మధ్యనరం ప్రాముఖ్యంగా కనిపిస్తుంది. ఉదా : అశ్వత్థాకు, మామిడి, జామ, యూనికాస్టేట్ (Unicostate) విన్యాసమని వ్యవహరిస్తారు. చిత్రం : 1-28a.

1-28 a పత్రనాళ విన్యాసం వలవలై ఉన్న ఈనెల విన్యాసం a గరికవలై.





a



b



c

129

2. పేళ్ళవలె (Palmate) ఉపనాళాలు మధ్య నరాల నుంచి బయలుదేరుతాయి. ఈ విన్యాసంలో మధ్యనరం ఉబ్బికనిపించదు. ఆకు తొడిమి, నుంచి సుమారు ఒకే గాత్రపు (మందపు నాళాలు) వెళ్ళవలె బయలుదేరి వాటి నుంచి చీలికలు చీలుతాయి. దాని నుంచి ఉపచీలికలు బయలుదేరుతాయి. ఈ కారణంచేత ఈ విన్యాసాన్ని మల్టికాస్టేట్ (Multicostate) అని వ్యవహరిస్తారు. ఈ విన్యాసంలోను రెండు క్రమాలున్నాయి.
1. అవసరణ క్రమం. ఆకు తొడిమ నుండి కొన్ని లావైన నాళాలు (ఈనెలు) పేళ్ళ వలె చేరతాయి. ఫరంగి, దోసకాయ, ఆముదం, మందారాలలో ఈవిధంగానే ఉంటాయి. చిత్రం 1-28b.

1-28 b పేళ్ళ వలె విముఖంగా వుండేవి (divergent)

2. ఏకాగ్రముఖ క్రమం ఇందులోనూ కొన్ని లావునాళాలు ఆకు క్రింద భాగం నుంచి బయలుదేరుతాయి. కాని ఈనాళాలు మాగి, మళ్ళీ ఆకు అగ్రభాగం చేరుతాయి. ఈ రకపు వాటిని ఏలికి, దాల్చిన, కర్పూర చెట్లకులలో చూడొచ్చు. (చిత్రం 1-28c)

1-28 c పేళ్ళ వలె ఏకాగ్రముఖం (Convergent) కర్పూర చెట్టు.

3. సమాంతర విన్యాసం (Parallel) ఇందులోనూ రెండు క్రమాలున్నాయి. ఇందులో ముఖ్యమైన మధ్యనరం నుంచి సమాంతరంగా చీలికలు లేదా ప్రక్కన నరాలు బయలుదేరుతాయి. అంతు దగ్గర లేదా అగ్ర భాగం వైపు నుంచి కూడా ఈనెలు బయలుదేరుతాయి. అరటి, అల్లం, వసుపు, క్యాసలలో ఈవిధంగా ఉంటాయి. చిత్రం 1-29 a.


1.29 సమాంతర నాళాల విన్యాసం a. గరిక వలె (క్యాస) తాటిముంజ (మంగులు) తాటి చెట్లలో తొడిమ నుంచి నరాలు అవసరణ క్రమంలో (వృతీరేక క్రమంలో) విసన కర్రవలె విస్తరిస్తాయి. 1.29 b. చిత్రం.

1.29 b. ఏకాగ్రముఖ (తాటిముంజ)


గడ్డి, వెదురు మొదలైన వాటిలో ఈ పెద్దనరాలు సమాంతరంగా ఆకు చివరలలోకి వెళ్తాయి. 1.29c.



1.29 c. విముఖ వెదురు

1. మొన చివర (acute) చివరి అంతు 90° కన్నా తక్కువ. దబ్బుళపు మొనవలె సూచ్యాగ్రం - మందారపు ఆకు చివరలాగుంటుంది.
2. పూజ్యాగ్రం (accuminate or caudate) అశ్వత్థ చెట్టు ఆకు వలె చివర క్రమేపి చిన్నదవుతూ తోకలాగ వుంటుంది.
3. అతీక్ష అగ్రం మొరటుగా ఉంటే కొన (obtus) చివరిభాగం మొన లేకుండా మొండిగా వుండటం - మట్టి - ఆ జాతికి చెందినది.
4. ముళ్ళ మొన, గుండ్రని అగ్రం ఉన్నట్టుండి మొనదేలుతుంటుంది. (mucronate) సంధ్యా పువ్వుం, గోరవి, తంగేడు ఆకులు.



1:30





[ 3 ]

5. శిఖరాగ్రం (emarginate) వివరన అంటుకొని లేదా గుంటవడుతుంటుంది. మేక తీగలు (Goats foot creeper) (*Ipomea pescaprae*) కంచునాచ్చం, చింతాకు రకానికి చెందినాకులు.

6. కొద్దిగా శిఖరాగ్రం (అల్ప శిఖరాగ్రం) (retuse) పై విధంగానే కాని అంటుకొనేది చిన్నది. రాతి పాన్ను, చిన్న పాన్ను, సురపాన్ను, అంతర్ గంగలలో ఈ రకపు ఆకుల కొనలుంటాయి.

7. శృంగ ఆగ్రం -(Cuspidate) వివర పాడవుగా గట్టిగా వచ్చగానున్న ముళ్ళుంటాయి. అనాస, ఈత ఆకులు, తాటి ఆకులు.

8. గిరిజాల తిరిగిన కొనల (Curly tip or tendril & cirrrose) వివర్ణ రంగులు తిరిగి, గిరిజాలవలె వొంపుగా ఉంటుంది. ఆరటి చెట్లు దారులాగ (దండులాగ) బయట (వెలుపల) తెల్లగా వుంటుంది.

9. ఊన కొన (మొండి) (Truncate) పైన్ (*Caryota urens*)లో వివరి ఊన లేదా మొండిగా వుంటుంది.

1.30 ఆకు కొనల వైవిధ్యం (వల్లూగ్రం -apex)

1.30 చిత్రం. (1-9)లో చూపబడినది.

1.30 ఆకు కొనలు (వల్లూగ్రం-apex) 1. సూచ్యగ్ర (మొనదేలిన), 2. పూజ్యగ్రం (తోకలాగ) 3. మొండిగ్రం (మొండికొన) 4. ముళ్ళ కొన 5. అంటుకొనే కొన (శిఖరాగ్రం) 6. అల్పశిఖరాగ్రం 7. శృంగాగ్రం (కొండెం లాగ) 8. రింగుల (గిరిజాల) కొన 9. ఖండిత కొన

ఆకు శరీరపు వైవిధ్యం

1.31 చిత్రం.


1.31 ఆకు క్రింద భాగపు వైవిధ్యం 1. కృష్ణం (attenuated) 2. లఘుకోసం (acute) 3. మొండి (obtuse) 4. లూన (truncate) 5. ఏటవాలు (వికార oblique) 6. కర్ణాకారం (auriculate) 7. హృదయాకారం 8. బాణాకారం 9. హస్తాకారం 10. ఖేటకాకారం 11. వలయాకారం 12. ఖేటక బాణాకారం.

### ఆకు నిర్మాణం

వల్లపు వెలుపలి చర్మం నిమ్మ ఆకు వలె మృదువుగా (నయంగా glabrous) ఉంటుంది. లేదా మొరటుగా (rough) ఉండొచ్చు. ఈ తాటను సులభంగా నలిపిపారేయవచ్చు (mealy) పొగాకు వలె జిగురుతో అంటుకొని కలిసి ఉండొచ్చు. (glutinous) వచ్చగా మెరుస్తుండవచ్చు (glauous) ముళ్ళతో చేరుండవచ్చు. లేదా వెంట్రుకలతో చేరుండవచ్చు. (hirsute) ఈ వెంట్రుకలు దోసకాయలో ఉన్నట్లు మొరటుగా (బంటుగా) ఉండొచ్చు, లాండాన లాగ చాలా మొరటుగా (Scabrid) ఉండొచ్చు. లేదా మృదువుగా నెయ్యిలాగ (pubescent or Villous) కేశయుతంగానూ ఉండొచ్చు. లేదా ఈ కేశాలు పాడవుగా (Pilose) ఉండొచ్చు. లేదా వెంట్రుకలు ఒకదానితో ఇంకొకటి అల్లకొని జడగా ఉండొచ్చు. (tomentose) లేదా రింగులుగా (wooly) దుప్పటిలాగుండవచ్చు. కరివేపాకు, నిమ్మలలో, ఆకులలో శరీరంపైన అందులోనూ క్రింది భాగంలో సూనె కార్చే గ్రంధులు రంధ్రాలు ఉంటాయి. వెలుతురులో చూస్తే, పైకిలేచి నిలబడి కనిపిస్తాయి. (Gland dotted)



1.32



33



లేదా లాటి రోని రకాలు వలె కండలో నిండి ఉండొచ్చు. (Succulent) రసభరితంగా లావుగా మృదువుగా ఉండొచ్చు. (fleshy) అకు హృదయాకారంలో (Coriaceous)లా ఉండొచ్చు. పొరలాగ తేలికగా ఉండొచ్చు. (membranaceous) లేదా తేలికైన పొర ఎండి, పచ్చగా లేకుండాను ఉండొచ్చు. (Scarious) మరికొన్ని పారిజాతం వలె పెడనుగా (మొరటుగా) ఉండి త్వరగా విరిగి పోయేట్టుగా ఉండొచ్చు (Crustaceous).

అకు తొడిమ (అకుపిడి) కాడలు (Petiole) వలె వుంతుం

వైవిధ్యం :


అకు కాడలు సామాన్యంగా గుండ్రంగా (స్పంభాకారంలో - cylindrical) ఉంటాయి. కొన్ని మొక్కలలో ఈ తొడిమ పైన రంధ్రం (groove) తగ్గుతుంది. అకుపైన వడిన నీరు ఈ రంధ్రం ద్వారా పారి ప్రవహిస్తాయి. తొడిమ పని అకు అడుగు భాగాన్ని సూర్యని వెలుతురుకు ఎదురుగా ఉండేట్టుగా చూడడం. ఈ తొడిమ పాడవుగా వుంటే అకు అడుగు భాగం బయటకు (వెలువలికి) వచ్చి ఎక్కువ సూర్యరశ్మిని పొందుతున్నను. సామాన్యంగా అనేక ఏకదళ మొక్కలలో వరి, రాగి, మొదలైన వాటిలో అకులకు కాడలుండవు. కొన్ని ద్విదళ మొక్కలలోనూ కాడలుండవు. ఇటువంటి కాడలు లేని అకులను వృంతహీన వల్రం (Sessile) వృంత రూత/స్థాముర) అని, తొడిముండే, వృంత వల్రం (Petiolate) అని వ్యవహరిస్తారు. చిత్రం 1.32 a - c 1.32 (a - c) అకుల కూడిక 1. వృంత హీనం (తొడిమ లేకుండా ఉండేది) 2. వృంత యుక్తం 3. అకుల ద్వారా తొడిమ (పిడి) ఉండడం (Perfoliate) (రంధ్రయత ఫలకం).

అకు తొడిమ మృదువుగా, పాడవుగానూ ఉండొచ్చు (ఫిలిఫారం Filiform) తంతు రూపంలోనూ ఉండొచ్చు. టెరెట్ (Terete) పొడైన గీతలను కలిగిఉండొచ్చు. స్ట్రయేట్ (Striate) చిల్లుపడియుండొచ్చు. (grooved) చప్పటిగానుండొచ్చు (flattened) సమతలంగానూ ఉండొచ్చు. లేదా మూల మూలలుగాను కోణాకారంగాను (angled) ఉండవచ్చు.

అకు తొడిమలలోను, కొన్ని వైవిధ్యాలున్నాయి. రూపాంతరాలున్నాయి. అకు కాడ పొరవలె వెడల్పుగా పెరగొచ్చు. రెక్కల వలె విస్తరించి వృద్ధి పొందవచ్చు (పెరగవచ్చు). (Winged petiole) చకోత పండు వలె (1.33 a - అనాన పండు) ఉండవచ్చు. ఆస్ట్రేలియాలోని ఒక జాతి గొబ్బలి లేదా అకాసీయ (acacia) తొడిమ సమతలంగా కుడుగోలులాగుంటుంది. దీన్ని ఫైలోడ్ (Phyllode) అంటారు. (దళవర్ణ దిండు) (1.33 b) మరి కొన్ని జల మొక్కలలో (Water hyacinth) ఈ కాడ స్పాంజ్ లాగ ఉబ్బి ఉంటుంది. నీటిలో తేలడానికి (1.33 c) అనుకూలంగా ఉంటుంది.

1.33 (a-c) (a) రెక్క తొడిమ (అనాన) (b) దళ వర్ణ దిండు (ఫైలోడ్) (c) గడ్డని అంటుకొని అకుపిడి (తొడిమి) వాలర్ హైయాసింత్ లో నైహూటన్ మొదలైన వాటిల్లో, తొడిమ రింగు రింగులుగా తిరిగి వల్రపీఠం అడుగు కాండానికి చేరున్న భాగం (చేరుకొనే భాగం) తొడిమ సమతలమైన (క్రింది భాగం చప్పటి భాగం).


కొన్ని మొక్కలలో వల్రపీఠం చిన్నదిగా ఉండి కాండాన్ని పూర్తిగానో, ఒక భాగంగానో అంటుకొని ఉంటుంది. దీన్ని అకు ముసుగు (Leaf sheath) అని అంటారు. గడ్డి, అరటి మొదలైన వాటిల్లో ఈ అకు



1-34




1



2



3




4





5

1-35



1.36



B

1.37

ముసుగు (అకు ఒక అచ్చాదనం) కాండాన్ని పూర్తిగా ఆవరించుకొని (ఆవరించి) గొట్టులాగుంటుంది. కత్తి ఒరలాగ ఏకదళ మొక్కలలో ఉంటాయి. గడ్డి మొదలైన వాటిలో ఇది సర్వసాధారణం. ఆరటిలో కాండమని వ్యవహరించే (పిలువబడే) ఆరటి వండు, ఈ అకు ఒరల నుంచే నిర్మితమైనది. ద్విదళ మొక్కలలో పత్ర పీఠం నుంచి రెండు ప్రక్క మొలకలు మొలకెత్తుతాయి. చెవుల లాగ - వీటిని అకు చెవులు - స్టిప్యుల్స్ (Stipules) పత్ర పువ్వులని అంటారు. వర్షపు మొక్కలలో ఈ పత్ర పువ్వులు ముళ్ళుగా రూపాంతరాన్ని పొందుతాయి. వేరుశనగ, బఠాని, పింత, గుర్రమోహర్ (కత్తికాయ) వీటిలో తొడిమ క్రింది భాగాలు ఉబ్బి ఉంటుంది. అప్పుడు దీన్ని పల్వినస్ (Pulvinus) (ప్రతిపూత తల్పం) అని అంటారు. ఇది నూళ్ళ అంగమై ఎండ మొదలైన బయటి ప్రేరణలకు (Stimulus) తగినట్లు అకుల భంగిమను (Position) మార్చడానికి సహాయం చేస్తుంది. చిత్రం (1.34) పత్ర పువ్వులు, సామాన్యంగా పచ్చగా వుంటాయి. కొన్ని సమయాలలో వాడుంటాయి. ఇవి కొంతకాలమైన తర్వాత రాలిపోవచ్చు. లేదా చాలాకాలం వుండొచ్చు. వీటి పని లేతగానున్నప్పుడు అకుని కాపాడడం. పచ్చని పత్రపువ్వులు కొన్ని సమయాలలో అకులపరి ఆహారాన్ని తయారు చేస్తాయి. గులాబీ, వేరు శనగలలో పత్రపువ్వులు అకు కాడకు కొంత దూరంగా అంటుకొని పెరుగుతాయి. కాడకు రెక్కన్నట్టుగా ఉంటుంది. బఠాని, జముకీ అకులలో ఈ పత్ర పువ్వులు వెడల్పుగాను వచ్చగా ఉంటాయి.

#### 1.34 ఈడిన తొడిమ క్రింది భాగం (Pulvinus)గిరికర్ణికలు (Clitoria)


గోంగూరలో ఇవి ముళ్ళుగా రూపాంతరాన్ని పొందుతాయి, ఎలాచి, అత్తిపత్తి, వీటి ముళ్ళు కూడా పత్రపువ్వు రూపాంతరాన్ని పొందుతాయి. సరిసరికల్లలో ఇవి చుట్టుకొని గిరిజాలూగా రూపాంతరాన్ని పొందుతాయి. (చిత్రం 1.35)

1.35 పత్ర పువ్వుల రూపాంతరం 1. గులాబీలో అంటుకొని ఉంటుంది (Adanate). 2. మెట్ట తామర, (Smilax) లో లతాంగంగా వుంటుంది (Tendrill) 3. ఎలాచిలో (ఏలక్కీ) ముళ్ళలాగుంటుంది. 4. బఠాని Sపత్ర పువ్వుగల ఉంటుంది. 5. విష కందులు.

కొన్ని మొక్కలలో అకులను పోలిన ఉపాంగాలుంటాయి. నిజమైన అకులు (foliage leaves) సామాన్యంగా పచ్చగా వుంటాయి. కాండం లేదా రెమ్మలపైన పెరుగుతాయి. విత్తనాల అకులు (seed leaves) విత్తనాల భ్రూణ (ముందు చూడండి) నుండి రాతగినవి. ఉల్లిపాయలలో చుట్టూ ఉండే పొరలు పొలకేకల ((Scale leaves) లోవలీ పొర వంటి అకులు రసపూరితంగా ఉంటాయి. ఈ పొర అకులకు తొడిమ ఉండదు. కొన్ని మొక్కలలో పచ్చలేక వివిధ రంగుల అకులు బ్రాక్టులుగా (Bract leaves or bracts) ఉంటాయి. అక్షంలో పువ్వులుంటాయి. బోగన్ విలా రంగు బ్రాక్టుల మధ్య ఉండే రంగులేని పువ్వు (చిత్రం 1.36).

1.36 బోగన్ విలా యొక్క బ్రాక్టులో బీజకణాల్ని (Spores) స్పల్లగా దుమ్ములాగుండే కణాలు ధరిస్తాయి. చిత్రం (1.37 a & b) ఫెర్న్స్ అకులలో బీజ కణాలు.

1.37 బీజకణాలను (Spores) పొందిన (మోసిన) ఫెర్న్స్ మొక్క అకు a. వీపు పైన (వీపు పైభాగాన్ని) b. అంచులో.



1-38

ఆకుల జీవావధివలు విధాలు. కొన్ని పుట్టిన కొంతకాలానికే రాలిపోతాయి. వీటిని శీఘ్రపతన వృక్షములు (Caducous - కాడుకన్) అంటారు. ఆకులు ఒక ఋతుకాలం జీవించి చలికాలంలో రాలిపోతే వాటిని వార్షిక లేదా డెసిడ్యుయస్ ఆకులు (annual or deciduous leaf or leaves) అని అంటారు. ఒక ఋతువుకన్న ఎక్కువ కాలం జీవిస్తే వాటిని విరస్థాయి లేదా నిత్య వచ్చాకులు (నిత్య హరిత వృక్షాలు) (Persistent or ever green) అని అంటారు. నిత్య హరిత మొక్కలలో ఆకులు రాలనే రాలవని కాదు. రాలుతూ ఉంటాయి. కొత్త ఆకులు చిగురిస్తూంటాయి. మొక్క ఎప్పటికీ మోడు పోదు. (మొక్క మొండిగా వుండదు). ఆకుల జీవిత కాలం కొన్ని మరుభూమిలో మొక్కలలో పలువారాలలో రాలిపోయేవి, మరికొన్ని నెలలో రాలిపోయేవి. సూడాకుల చెట్లలో (పైన్ మొదలైనవి) 3-4 సంవత్సరాలకి రాలుతాయి.

సామాన్యంగా ఆకు అడుగు భాగం (క్రింద భాగం) ఆకు తొడిమ సమతలం లేదా సమ పీఠంలో (Same plane)లో ఉంటాయి. కాని కమలం నాస్పరోషియం మొదలైన వాటిలో అడుగు భాగం తొడిమకి సమకోణంగా (లంబకోణంగా right angle) లేదా లంబంగా ఉంటుంది. (Peltate leaf) కొన్ని ఆకులు భూమి సమానంగా (నేలసమానికి) సమాంతరంగా (horizontal) ఉంటాయి. ఆకు పైభాగం క్రింది భాగంలో భేదముంటుంది. (dorsiventral leaf) ఆకులలో పైభాగం ఎక్కువ వచ్చగా ఉంటుంది. అనేక ఏకదళ మొక్కలలో లంబంగా పెరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఉండడంవేత ఆకు రెండు ప్రక్కల సూర్యని వెలుతురు పడుతుంది. (Isobilateral leaf) ఆకు గొట్టంలాగ, ఉల్లిపాయలలో ఉండేటట్టుగా ఉండి నేరుగానో, క్రిందివైపుకో పెరుగుతుంటుంది. (Centric leaf) మధ్యాకు (కేంద్ర పత్రం)గా ఉంటుంది. అప్పుడు ఆకులన్నింటికీ అన్నివైపులనూ, సూర్యరశ్మి ప్రసరిస్తుంది (పడుతుంది). అనాస, నారంజి, సుగంధరాజం వీటిలో ఆకుల క్రింద భాగం నుండి పై కాండం నుంచి గుంపుగా బయలుదేరుతాయి. (Radial leaves) ముల్లంగి, ఆవాలు మొదలైన వాటిలో కాండపు పైభాగపు ఆకు (Couline leaves) లేదా క్రింది భాగం నుంచియూ ఆకులు బయలుదేరుతాయి.



### ఆకుల (పత్రాల) రూపాంతరాలు (Leaf Modifications)

కొన్ని మొక్కలలో ఆకులు మరొక రూపాన్ని పొంది, వేరే పనులను నిర్వహిస్తాయి.

#### 1. మొదటి రూపాంతరం (ప్రథమ రూపాంతరం)

కొన్ని ఆకులు చుట్టూ చుట్టుకొని రింగులు రింగులుగా (leaf tendrils) రూపాన్ని పొందుతాయి. ఈ రింగులు మొక్క పైకి, ప్లాకడానికి (ఎక్కడానికి) సూక్ష్మసాధనం, అని ఏదైనా కొత్త వస్తువులకి (పదార్థాలకి) స్పర్శిస్తే (తాకితే) దాన్ని చుట్టూ ఉపపత్రాలు చుట్టులు చుట్టుకుంటూ పెరుగుతాయి. బిగ్నానుం వెనుస్ట (Bignonia Venusta) అనే నారింజ రంగు పువ్వు పుష్పిస్తుంది. పువ్వు ఆ చెట్టు కొన (చివర) ఉప పత్రాలు మాత్రమే. ఈ విధంగా రూపాంతరాన్ని పొందుతాయి. (gloriosa) గ్లోరియోసా, ఆకు చివర రింగులు రింగులుగా చుట్టుకొంటాయి. సరసపర్ణి - పరంగి (Smilax aspera) లో పత్ర పువ్వులు రింగులు తిరిగి గూసులాగ- వుంటుంటాయి. విష కందులు (కేసరి కందులు, ముసురు వప్పు)లో పువ్వులకు చుట్టుకొని ఉంటాయి. (చిత్రాలు 1.38 a-e).

1.38 (a - e) ఆకుల రూపాంతరాలు లతాంతాలు (చుట్టూ చుట్టుకొని ఉండడం) బలాబీలో పైనున్న ఉపఆకులు



39

లతాంతాల్సినవి. b. ముసురు పప్పు (విష కందులు) పూర్తి ఆకు చుట్టూ చుట్టుకొని ఉండడం. c. గ్లోరి యోస (Gloriosa) ఆకు చివర మాత్రం చుట్టుకొని ఉంటుంది. d. చివరున్న ఉప పత్రాలు లతాంతులుగా వుంటాయి. e. బిగ్నోనియాలలో.

2. కొన్ని మొక్కలలో ఆకులు లేదా ఆకులు భాగాలు ముళ్ళుగా రూపాంతరం పొందవచ్చు. బొప్పాయిలో ప్రక్కనున్న మొగ్గలనుంచి ఆకులకు బదులుగా ముళ్ళు పెరుగుతాయి. ఈతలో పత్రాంగం ముళ్ళుగా రూపాంతరం పొందడం ఇంతకు ముందే తెలుపబడింది. కస్తూరి, దత్తూరిలో ఆకుల అంచులు ముళ్ళుగా రూపాంతరాన్ని పొందుతాయి. తాటి రకానికి చెందిన ఆకుల అంచు, చివరలు రెండూ ముళ్ళుని పెంచుతాయి.
3. కొన్ని సమయాలలో ఆకులు పొరలుగా నవుతాయి. ఉల్లిపాయలలో ఈ పొర ఆకు రసభరితంగా ఉంటుంది. మట్టి, ప్రత్తి మొదలయిన వాటిలో ఈ పోరాకులు చిన్న ఆకుల రక్షణ కవచాలు అవుతాయి. సర్వే చెట్టులో ప్రతికలుపులోనూ ఈ పొరలు వృత్తంలో పెరుగుతాయి.
4. నీటి బుడగల యొక్క (నీటి మొక్క-జలసస్పాల్) (utricularia) ఆకు చీలుంటుంది. కొన్ని మొక్కలు, బెల్లాన్ లాగ ఉల్లి ఉంటాయి. ఈ బుడగల సహాయంతో ఈ మొక్క చెరువులో తేలుతూ ఉండడం, చూడొచ్చు. నీటికి ఒక కవచపు వాకిలి ఉంటుంది. దీని ద్వారా చిన్న జల ప్రాణులు ఈ బుడగల లోపల చేరుతాయి. కాని వెలుపలికి రాలేవు. ఈ ప్రాణులను మొక్కల ఆహారంగా గ్రహిస్తాయి.

ఆకులు కాండాన్ని చేరుకొనేరీతి (పత్ర విధానం - Phyllotaxy పత్ర విన్యాసం)

ఆకులు కాండంపైన లేదా రెమ్మలపైన ముఖ్యంగా 3 రీతులలో చీలుంటాయి.

పర్యాయ క్రమం : 1. అవాలు, మందార, సూర్యకాంతి మొదలైన మొక్కలలో ఒక కణుపు నుంచి ఒక ఆకు పెరుగుతుంది. దీన్ని పర్యాయ లేదా ఏకాంతర క్రమం (alternate) అంటారు. (చిత్రం 1.39 A).


1.39 కాండము పైన పత్రాల విన్యాసం. A. పర్యాయ (alternate)

2. అభిముఖ క్రమం జతాకుల (opposite) ఒక కణుపులో రెండు ఆకులు ఎదురు బదురుగా, ఒకదానికొకటి అభిముఖంగా పెరుగుతాయి. తులసి మొదలైన చెట్లలో (మొక్కలలో) ఒక జత ఆకులు, ఇంకొకదాని క్రింద లేదా పై జతకి సమకోణంగా పెరుగుతాయి. ఇది అభిముఖ జత లేదా తిర్యక్ క్రమం. డెకుసేటు (decussate) క్రమం - కొన్ని మొక్కలలో జామ, గోరవి మొదలైన వాటిలో ఒక జత ఇంకొక దానిపైన లేదా క్రింద భాగాన్ని పెరుగుతాయి. దీన్ని సూపర్ పోస్టెడ్ (Superposed) క్రమమని అంటారు. (చిత్రం 1.39 B)

1.39 B కాండంపైన, పత్రాలు జతగానో, లేదా విన్యాసంగానో పెరగడం (అభిముఖంగా ఆకులు పెరగడం).

3. కణికలు : నవ్వుపల్లెలు (మద్ది, కలబంద, నీడమొన్న (Alstonia scholaris) అల్లిమంద మొక్క (allamanda) తేనె గడ్డ (honey thorn) వీటిలో ఒకే కణుపు నుంచి రెండుకన్నా ఎక్కువ ఆకులు చుట్టూ వర్తులంగా పెరుగుతాయి. ఈ క్రమం చుట్టూ మట్ట తిరిగి లేదా వర్తుల క్రమంలో (Whorled) (వలయ యుక్తంగా) చిత్రం 1.39 C పెరుగుతాయి.





1. 4)

### 1.39 C. వర్తుల (Whorled) ఆకారంలో ఆకులు.

పత్రాల అంతర్నిర్మాణం (చిత్రం 1.40)

1.40 పత్రాల అంతర్నిర్మాణం 1. వెలుపల వుండే బాహ్య చర్మం 1.a. క్రిందున్న బాహ్య చర్మం, 2. క్యూటికల్ 3. పత్ర రంధ్రం 4. కాండకాశాలు 5. మధ్య అంగాంశం (మినోఫిట్) 6. పాలసేడ్ పెరేన్కైమ 7. స్పాంజ్ పెరేన్కైమ 8. వాయుపుకోశం 9. నాళాల కట్టు ప్రతినిధి రూపపు (Typical) ఒక ఆకును అడ్డుగా లాగి కోసి సూక్ష్మదర్శినిలో చూస్తే అందులో కొన్ని కోశాల పొరలను (Cell-layers) చూడొచ్చు.

పై పొర క్యూటిన్ (Cutin) పొర, ఇది మైనపు పొర దీనిపైన పత్రపు బాహ్య చర్మం - క్యూటికల్ (Cuticle) ఏక పొరుంటుంది. ఇది చాలా తేలికగా వుంటుంది. పెడనుగానూ ఉంటుంది. వెలుతురు ప్రసరింపజేస్తూంటుంది. ఈ పొర ఆకులోని రోవలున్న నీటిని సులభంగా బయటకెళ్ళునీయదు. ఈ బాహ్య పై చర్మం (Upper epidermis) మైనం వంటి పదార్థాన్ని కారుస్తుంది. ఈ మైనపు పొర పైపేర్కొన్న క్యూటిన్.

ఈ చర్మపు పై భాగాన్ని పొడవైన కోశాల పొరలుంటాయి. దీన్ని ప్యారిసేట్ పెరెంకైమే (Palisade parenchyma) పొరలని వ్యవహరిస్తారు. దీనికి కారణం ఇవి కర్రలతో చేయబడిన స్థంబాలుగా చేర్చిన కంచెలాగుంటుంది. దీన్ని కంచే తోరణపు పొరలని అంటారు. ఈ పొరకు పై భాగానికి స్పాంజ్ లాగుండే అంగాంశముంది. వీటి కోశాలకు తెలిసిన, స్పష్టమైన ఆకారం లేదు. కోశాలు సరళంగా జతకూడాడంతో మధ్య మధ్యన ఖాళిజాగ ఉంటుంది. వీటిలో గాలి నిండుకుంటుంది. ఈ కోశాల మధ్య ఆకుల మధ్య నరం లేదా మధ్యనాళాల నుంచి, బయలుదేరిన ఆనీకనేక నీటి గొట్టాలు, అవోరపు గొట్టాలు ముక్తాయమవుతాయి. ఈ పొరను స్పాంజ్ పెరెంకైమ (Spongy parenchyma) అని అంటారు.

ఈ పొర క్రింద ఆకుల క్రింది భాగంలో మరొక చర్మపు పొర ఉంటుంది. క్రింది చర్మం (Lower epidermis) ఈ చర్మం కూడా ఏకపొర (Single layer). ఈ క్రింది చర్మం పొరల మధ్య మధ్య కొన్ని విశిష్ట ఆకారపు కోశాలుంటాయి. అర్థ చంద్రాకృతి, ఆకారపు కోశాలుంటాయి. ఇవే ఆకుల నోళ్లు (నోళ్ళు) పత్ర రంధ్రాలు, స్టోమాటాలు, వీటి మూలంగానే ఆకులు గాలినుంచి పోషక పదార్థాలను, బొగ్గు పులుసు వాయువును, పొందేది. వీటి ద్వారానే మొక్కలు శ్వాసిస్తాయి. వీటి మూలంగా వేరు నుంచి పీల్చుకొన్న నీటిని ఆవిరి రూపంలో వెలువలికి త్రోస్తుంది.

ఈ రంధ్రం రెండు అర్థ చంద్రాకృతి : అర్థ చెకోడిలవరి ఉండే నాళాల ద్వారా నిర్మితమైనది. ఈ కోశాలకు నేరుగా లేదా అర్థ గాజాకారంగా విభజించే శక్తివుంది. ఈ కోశాలు వేరైనప్పుడు మధ్య భాగపు నోరు - రంధ్రం చిన్నదవుతుంది. సాగినప్పుడు పెద్దదవుతుంది. చిత్రం (1.41)

1.41 పత్ర రంధ్రం 1. రంధ్రం 2. రక్షక కోశం 3. బాహ్య చర్మపు కోశం.

గాలిలో తేమాంశం తక్కువగా వుంటే - ఎండే (ఆరిపోయే) వాతావరణముంటే, ఎక్కువ నీటిని వెలువలికి త్రోసి ఎండే పోవచ్చు. ఈ జల నష్టాన్ని తక్కువ చేసుకోవడానికి, ఈ కోశాలు నేరుగానై, పత్ర రంధ్రాన్ని చిన్నది చేస్తాయి. లేదా మూసివేస్తాయి. తేమాంశం ఎక్కువగానున్నప్పుడు జలాన్ని (నీటిని) వెలువలికి

త్రోయడానికి అనుకూలంగా పత్రరంధ్రాలు వెడల్పువుతాయి. ఈ విధంగా గాలిలోని తేమాంశానికి అనుగుణంగా పత్ర రంధ్రాలు మారుతూ ఉండడం చేత ఈ కోశాలను రక్షక కోశాలు (Guard cell రక్షకణాలు) అంటారు. ఈ రకపు కోశాలు, పత్ర రంధ్రాలు సామాన్యంగా ఆకుల క్రింది భాగంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి, పై చర్మంలో తక్కువ. ఒక చదరపు మిల్లీ మీటర్ కి ఆకు క్రింద భాగంలో 50 నుండి 500 రంధ్రాలుంటాయి.

## పత్ర క్రియ - పత్రాల (ఆకుల) పనులు

సామాన్యంగా పచ్చగానున్న ఆకులు మూడు రకాల పనులను చేస్తాయి. అవోరాన్ని తయారుచేయడం, మొక్కల మధ్య గాలిని మార్పు (వినిమయం) (Interchange of gases) చేయడం, అధిక నీటికి బాష్పీకరించడం.

ఈ పనులే కాకుండా కొన్ని మొక్కలు నీటిని, మరి కొన్ని అవోరాన్ని చేల్చిపెట్టే సేకరణ అంగా (Storage organs) లుగానూ ఉంటాయి. కొన్ని మొక్కలలో ఆకులు మొగ్గలను ధరిస్తాయి (రక్షిస్తాయి). ఈ మొగ్గల ద్వారా సంతాన వృద్ధి జరుగుతుంది. మరి కొన్నింటిలో ఆకులు మొక్కలు ఏదైనా ఆధారంపైన ప్రాకడానికి (ఎక్కడానికి) సహాయపడతాయి (చూడండి - చుట్ట చుట్టుకొనే ఆకులు).

ఆకుల మధ్య కార్యక్రమాల గురించి తోటమాలి కొద్దిపాటి వివరాలను తెలుసుకొని ఉండటం మంచిది. పత్రక్రియ మొక్కల జీవనంలో చాలా ముఖ్యమైంది. ఈ క్రియ సరిగా సతతంగా (ఎప్పుడూ) జరుగుతూ ఉండడానికి తోటమాలి సరైన, పరిస్థితులను మొక్కలో కల్పించడం ద్వారా సమర్థవంతంగా మొక్కల్ని పెంచడానికి సాధ్యమవుతుంది.

అవోరాన్ని తయారు చేయడం ఆకుల ప్రధాన కార్యక్రమం. ముఖ్యంగా చక్కెర, పిండి పదార్థాలు (Sugar and Starch) పగటి పూట సూర్యరశ్మి సహాయంతో తయారు చేసుకోవడం, ఈ విధంగా తయారు చేయడానికి ఆకుల పచ్చదనం లేదా (Chlorophyll) పత్రహరితం ఆకులలో ఉండే ఆకుపచ్చని పసరు పదార్థం అవసరం. ఇది మొక్క యొక్క ఇతర అంగాలలో కొద్దిగానో, గొప్పగానో ఉన్ననూ, ఎక్కువగా ఉండేది ఆకుల లోనే. ఇది ఉండడం చేతనే, మొక్కకి ఆకుపచ్చని రంగు కలుగుతుంది. ఇది కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ (బొగ్గుపులుసు వాయువు) ఆక్సిజన్ ప్రాణ వాయువు, హైడ్రోజన్, నైట్రజన్ (నత్రజని) మెగ్నీషియం, నీటిలో సంయోగం చెందే పదార్థాలు. ఇది రసాయనికమై, మన రక్తపు ఎరువు రంగును హిమోగ్లోబిన్ (haemoglobin) పోలుతుంది. ఈ రెండింటికి గల భేదం, హిమోగ్లోబిన్ లో ఇనుము (iron), హరిత పదార్థంలో మెగ్నీషియం ఉంటుంది.

పచ్చని ఆకులో ప్యాలోసెడ్ కోశాలలో రక్షపు కోశాలలో ఈ రెండింటి మధ్యకోశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పై చర్మం క్రింది (లోపలి) చర్మాలలో ఇవి ఉండవు. ఉంటేనూ చాలా కొద్దిగా మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ హరిత పదార్థం మొక్కలకి అంతెందుకు సమస్త ప్రాణులకు ముఖ్యమైన పదార్థం. ఎందుకంటే అన్ని ప్రాణులకూ ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో మొక్కలే ఆహారం. మాంసాహారులైన పులులు, సింహాలు, శాఖాహారులైన జింక, మేకలను తింటాయి. ఈ జింక, మేకలు, సస్యాహారాన్నే గ్రహిస్తాయి. ఈ సస్యాహార ప్రాణులు లేకపోతే మాంసాహార ప్రాణులే ఉండవు. అందుచేత ప్రాణులు జీవిస్తుండడమనేది ప్రత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో మొక్కల ద్వారానే. మొక్కలు జీవించడం అందులోని హరిత పదార్థం ద్వారానే జరుగుతుంది.

హరితం సూర్యుని వెలుతురు నుంచి (వెలుతురు వేడికాదు) కొన్ని భాగాలు పీల్చుకొని, ఆ వెలుతురులో అణిగియున్న శక్తి ద్వారా, మూల వస్తువులైన బొగ్గుపులుసు వాయువు, ప్రాణవాయువు, హైడ్రోజన్, నత్రజనిని చేర్చుకొని, సంయోగం చేసి మొదట చక్కెరని, పిండివదార్థాన్ని, ఆ తర్వాత సారమైన ప్రోటీనులను తయారు చేస్తుంది. ద్యుతి చేత, జరగటం చేత, ఈ క్రియను కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ద్యుతి సంశ్లేషణ, పోటో సింటేసిస్ (Photo Synthesis) అని వ్యవహరిస్తారు.

సరళమైన మూలపదార్థాల నుండి, హరిత పదార్థం సస్యహారాన్ని తయారు చేయడం చేతనే జీవవక్రం సవ్యంగా జరిగిపోతుంది. ప్రాణులు శ్వాసించినప్పుడు గాలిలోని ప్రాణవాయువుని గ్రహించి, బొగ్గుపులుసు వాయువును (కల్బష్ వాయువు) బయటకు త్రోస్తుంది. గాలిలో ఉండవలసిన శాతం కన్నా ఎక్కువగా బొగ్గుపులుసు వాయువుంటే, అది విషవాయువు అవుతుంది. కాని మొక్కలకి కార్బన్ డై ఆక్సైడు, ఆహారాన్ని తయారు చేసే ప్రధాన పదార్థం, అకులలోని హరిత పదార్థం, సూర్యరశ్మి ద్వారా, దీన్ని ఆక్సిజన్ కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ గా విభజించి, కార్బన్ డై ఆక్సైడును గ్రహించి, ప్రాణవాయువును వెలుపలికి త్రోసి, వాయువును శుభ్రపరుస్తుంది. హరితం లేకుంటే ప్రపంచం నిర్మానుష్యమై యుండేది.

అకులలో జరిగే పత్రక్రియ చాలా రకాలు - చాలా సంకీర్ణమైంది, సరళమైంది కాదు. అందుచేతనే అకుని మొక్క యొక్క రసాయనిక, కర్మాగారమని వ్యవహరిస్తూంటారు. ఈ కర్మాగారపు యంత్ర భాగం పత్రపు పోలీసెడ్ కోశాలు, మధ్య కోశాలు, రక్షక కోశాలు, ఈ కోశాలకు నీటిని, వేరు నుండి పీల్చుకొని నత్రజని మొదలైన భరణి ఆహారకణాలను, ఇవ్వాలి నది నీటి గొట్టాల వని, ఆహారపు నాళాలు మధ్యనరం, దాని నుంచి బయలుదేరితే అనేక ఉప నరాలు లేదా నాళాలివి. ఈ కర్మాగారానికి, కావల్సిన ముడి పదార్థాలు, ఏవంటే, పత్రరంధ్రాల ద్వారా వాయువు నుండి, పొందే కార్బన్ డై ఆక్సైడ్, వేగ నుండి పీల్చుకొన్న, నీళ్ళు, ఖనిజాలు, పోషక పదార్థాలు (నత్రజని ఇత్యాదివి). ఈ ముడి పదార్థాలనుండి మొక్కలకు కావల్సిన చక్కెర, పిండి పదార్థాలు ప్రోటీను మొదలైన అనేక రకాల పదార్థాలను తయారుచేసే పదార్థాలకు నాయకుడు, హరిత పదార్థం. ఈ కర్మాగారాన్ని నడవడానికి కావల్సిన శక్తి సూర్యుని వెలుతురు (సూర్య రశ్మి). మొట్ట మొదట ఈ హరిత పదార్థం కార్బన్ డై ఆక్సైడును, నీటిని మూల పదార్థాలు గ్రహిస్తుంది. కార్బన్ డై ఆక్సైడు ప్రాణ వాయువు. హైడ్రోజనులుగా విభజింప బడతాయి, విశ్లేషిస్తాయి. ఆ తర్వాత ఈ మూల పదార్థాల్ని, సంయోగం లేదా సంశ్లేషించి, చక్కెర పిండి పదార్థాలను తయారు చేస్తుంది. ఈ విశ్లేషణ, సంశ్లేషణ క్రియకు కావల్సిన శక్తి వెలుతురు నుండి పొందుతుంది, కాని ఈ ద్యుతి సంశ్లేషణ క్రియ సవ్యంగా సరిగ్గా జరగాలంటే కార్బన్ డై ఆక్సైడు ఉండి అకులపైన వెలుతురు పడుతూ ఉంటే మాత్రమే చాలదు. అకులలో కావల్సినంత నీడ ఉండాలి. ఈ విధంగా ఉండకుండా ఉంటే కిరణ జన్య సంయోగ క్రియ తగ్గుతుంది. పెరుగుదల కుంటుపడుతుంది. కాండం, మొగ్గ, పువ్వు, కాయ ఎండకుండా చూడాలి.

చక్కెర పిండి పదార్థాలు తయారైన తర్వాత వీటిని నత్రజని మొదలైన పదార్థాల జతలో సంయోగ పరిచి (కలిపి) ప్రోటీనులు మొదలైన రకరకాలైన ఆహార పదార్థాలను తయారుచేస్తుంది. ఈ ఆహారం గొట్టాల ద్వారా మొక్కల ఇతర భాగాలకు అనగా కాండం, మొగ్గ, పువ్వు, కాయ, వేరు మొదలైన భాగాలకు చేరుతాయి.

సామాన్యంగా హరితాకు పై భాగాన్నే ఎక్కువగా ఈ సంయోగ క్రియ జరుగుతుంటుంది. దీనికి కారణం వెలుతురు. ఆకు భాగం పైనే ఎక్కువగా ప్రసరిస్తుంటుంది. అందుచేత ఆకు పై భాగం ఆకు క్రింది భాగం కన్నా ఎక్కువ వచ్చిగా ఉంటుంది.

ఆకుల రెండవ పని కార్బన్ డై ఆక్సైడును విశ్లేషించినప్పుడు ప్రాణవాయువు వేరు వడుతుంది (వేరవుతుంది). దీన్ని పత్ర రంధ్రాల ద్వారా గాలితోపాటు బయటకి తోస్తాయి. అంతే కాకుండా, మొక్కలు, ప్రాణులు, ప్రతి జీవకోశాలకు, ఉపిరాడుతుండాలి, బొగ్గు పులుసు వాయువును బయటకు వదులుతుండాలి, ఈ పని మన దేహంలో (మన శరీరంలో) శ్వాసకోశాలలో జరుగుతుంది. ఆకులు మొక్కల శ్వాసకోశాలవుతాయి.

ఆకుల మూడవ పని ఎక్కువైన నీటిని మొక్క నుండి గ్రహించి బయటకు త్రోయడం, ఈ క్రియను బాష్పీకరణం (Transpiration) అని అంటారు. దీనికి కారణం అధికమైన నీరు అవిరి రూపంలో వెలుపలికి వెళ్ళడం చేత, ఈ బాష్పీకరణం, పత్రరంధ్రాల ద్వారానే జరుగుతుంది.

గాలిలో తేమాంశం (చమ్మ/తడి) తక్కువగా వుంటే ఎండిపోతూ ఉంటే (ఎండిపోయేట్టుగా వుంటే) ఎక్కువ నీళ్ళు విసర్జన (బాష్పీకరణం) కాకుండా ఉండేటట్టు పత్ర రంధ్రాలు చిన్నవవుతాయి. తేమాంశం ఎక్కువగా వున్నప్పుడు ఈ రంధ్రాలు పెద్దదవుతాయి. ఈ విధంగా నీటిని విసర్జించడానికి ఆకులు తమ పత్ర రంధ్రాల్ని హెచ్చు చేయడం వల్ల, ఆకుల ద్వారా ఎక్కువ నీళ్ళు వెలుపలికి వెళ్లిపోతాయి (వెళ్తాయి). ఇది అనివార్యకార్యం. నివారించలేనిది. మొక్కల వేర్లు మట్టిలో ఉన్న పోషకాల్ని ద్రవ రూపంలో, నీటి మూలంగా పీల్చుకోవాలి. ఈ విధంగా పీల్చుకొనేటప్పుడు, పోషకాలు కరిగిన నీళ్ళు (ద్రవం solution) నిర్బలం (weak)గా ఉండాలి. అందుచేత మొక్కలు కొద్ది పోషకాల కోసం ఎక్కువ నీటిని గ్రహించాల్సి వస్తుంది. ఈ నీటిలో కొంత భాగాన్ని మాత్రం మొక్కలు తమ కోశాలలో మిగుల్చుకొంటాయి. చాలా భాగం పత్ర రంధ్రాల ద్వారా బాష్పీకరణమవుతుంది. మొక్కల నుండి ఎన్ని నీళ్ళు బయటికి వెళ్తాయనడం, కొన్ని ఉదాహరణల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. సుమారుగా పెద్దదైన చెట్టు ఒక రోజులో సుమారు 1000 కిలోల నీటిని అవిరి రూపంలో బయటకు త్రోస్తుంది. ఒక ఎకరా మొక్క జొన్నల పెరుగుదల అవధి కాలంలో (నిర్జీత కాలంలో) 1100 టన్నుల నీటిని గ్రహిస్తుంది. 11 అంగుళాల వర్షం పడితే, ఎంత నీళ్ళు నిలుస్తుందో అంత నీటిని గ్రహిస్తుంది.

1 టన్ను గోధుమలు ఉత్పత్తి అవ్వడానికి మొక్కలు 500 టన్నుల నీటిని వేర్ల నుంచి పీల్చుకొని బాష్పీకరణం చేయాలి. టన్ను బంగారా దుంపలు పెరగడానికి 640 టన్నుల నీళ్ళు కావాలి.

ఈ బాష్పీకరణం సస్పటివనానికి అత్యవసరమైంది. ఇవి ఎక్కువైన కొద్దీ, మొక్కలు వేరు నుంచి ఎక్కువ నీటిని, తద్వారా ఎక్కువ పోషకాలనూ గ్రహిస్తాయి (పీల్చుకొంటాయి). ఈ బాష్పీకరణ నుంచి మొక్కల ఉష్ణమట్టం ఎక్కువ కాకుండా చల్లగా ఉంటుంది.

సామాన్యంగా వెలుతురున్నప్పుడే బాష్పీకరణం ఎక్కువగా జరుగుతుంటుంది. చీకటిలో ఎక్కువగా జరుగుతుంది. దీనికి కారణం వగలు పత్ర రంధ్రాలు తెరిచుంటాయి. రాత్రి మూసుకొని ఉంటాయి. అంతేకాకుండా వగలు వేడి ఎక్కువగా ఉండడం చేత బాష్పీకరణం కూడా ఎక్కువగానే జరుగుతుంది. వేసవి కాలంలో చలికాలం కన్నా ఎక్కువ నీటిని విసర్జిస్తుంది. అదేవిధంగా గాలి ఎక్కువగా ఉన్న కాలంలోనూ ఎక్కువ


నీటిని విసర్జిస్తుంది, అందువేత, ఈ కాలంలో మొక్కలకి ఎక్కువ నీటిని వేయాలి వస్తుంది.

శుష్క ప్రదేశాలలో - అనగా వర్షం లేని ప్రదేశాలలో ఆ ప్రదేశపు మొక్కలు ఎక్కువ భాషు విసర్జనని అడ్డుకోడానికి, తమ ఆంశాలలో ఎన్నో మార్పులను చేసుకుంటాయి. లావుపాటి చర్మం (క్యూటికల్) కొన్ని చర్మపు పొరలు, వెంట్రుకలు (కేశాలు) పొర, మైనపు పొర మొదలైన వాటిని ఆకుల పైన పెంచుకొంటాయి. ఈ ప్రదేశపు మొక్కలు ఆకులలో వత్తరంద్రాలు గుంటలుగా వుంటాయి. గాలి వీచడానికి తగినట్లుగా వేడి గాడ్లులు తగలకుండా, ఇవి సంఖ్యలోనూ, తక్కువగా వుంటాయి. కొన్ని మొక్కలలో కార్కుపొర పెరగడమూ కద్దు. కార్కు ద్వారా నీళ్ళు ఆవిరి కాజాలదు. అనేక మొక్కలు ఆకుల విస్తీర్ణతను తక్కువ చేసుకొంటాయి. ఇనుక ప్రదేశపు మొక్కల ఆకులు చిన్నవి లేదా సూదిలాగ మొనదేలిన ఆకులుంటాయి. వేసవిలో నీటిని రాలుస్తాయి. కొన్ని మొక్కలు ఆకులలోని నీటిని చేర్చి పెట్టుకొంటాయి. ఇటువంటి వాటిని సక్యూలెంట్ (succulent మాంసకృతులు) రసభరితాలు అంటారు. ఇవి తాటిచెట్టు జాతికి చెందిన మొక్కలు.

పై పేర్కొన్న మూడు ప్రక్రియలేకాకుండా, కొన్ని మొక్కలలో ఆకులు వేరే పనులను కూడ చేస్తాయి. ఉల్లిపాయలలో ఆకులు (ఎర్రగడ్డ - వల్లాల గుంపు) ఆహారాన్ని చేర్చి పెడతాయి. బ్రయోఫైలం గాయపడిన బిగ్గినియ ఆకులు మొదలైనవి మొగ్గలను తయారుచేసి వాటి ద్వారా సంతాన వృద్ధి చేసుకొంటాయి. ఫెర్న్లలో ఆకులు విత్తనాలను మోస్తాయి. కొన్నిరకాల ఫెర్న్లలో నడిచే ఫర్ను (Walking fern, *Adiantum caudatum polyodium flagelliferum*) ఆకు చివర సాగి నేలనంటుకుంటుంది. అక్కడ నుంచి వేర్లు బయలుదేరుతాయి. కొత్త మొక్కలు పెరుగుతాయి.

## మొగ్గలు (Buds)

తోటవూలికి మొగ్గల విషయం స్పష్టంగా తెలిసి ఉండాలి. మొక్కలు చిగురించినప్పుడు, పీలకలు పేసినప్పుడు ఈ మొగ్గల భాగాలువయోగపడతాయి. మొగ్గలంటే అనేకులు పువ్వుల మొగ్గలనే (Floral buds) భావిస్తుంటారు. పువ్వులలోని మొగ్గలు కాకుండా, ఆకు, రెమ్మలను వికసింపజేసే ప్రకాండం మొగ్గలూ (Vegetative buds) ఉంటాయి. కొన్ని మొక్కలలో పువ్వులో మొగ్గ ఏది ? ప్రకాండపు (ఆకు, రెమ్మలు) మొగ్గలు ఏవనేది గుర్తించవచ్చు. మరికొన్ని మొక్కలలో ఇవి రెండూ ఒకే రకంగా వుంటాయి. కొన్ని మొగ్గల నుంచి ఆకులు రెమ్మలు, పువ్వు వికసిస్తూంటాయి (వస్తుంటాయి). మొగ్గలు మొక్కల చివరుండోచ్చు లేదా కాండపు ప్రక్కనుండోచ్చు. నీటిని అనుక్రమంగా తుది మొగ్గ (కొనమొగ్గ Terminal bud) పార్శ్వమొగ్గ (Lateral buds) అంటారు. ప్రకాండపు మొగ్గలలో ఆకులు మొదలైనవీ, పువ్వుల మొగ్గలలో పువ్వుల భాగాలూ సూక్ష్మ రూపంలో (అవికారపు రూపంలో) ఉంటాయి. చివరన కాండం, రెమ్మలు పొడవు పెరగడం, జరుగుతుంటుంది. ఈ చివర్లు ఇంకా వికసించి ఆకులు - అవికాస వల్లాలు చుట్టూ చుట్టుకొని, ఒత్తుగా గుంపు గుంపులుగా పెరుగుతుంటాయి. ఈ గుంపే చివరి మొగ్గ పెరుగుదలకు అయినంత వరకు కాండపు కణాంతరం (internode మధ్య కణుపు) పెరిగి చిన్న ఆకులు వేరొత్తూ వస్తాయి (వేరువుతాయి). (చిత్రం 1.42 A & B) రెమ్మ మొదట మొక్కగా వుంటుంది (మొగ్గవుతుంది) ఈ మొగ్గలు ఆకులకు, కాండాలకూ మధ్య వుండే కణుపు లేదా కక్షిలో ఉండాలి. అందువేత నీటిని కంకులు లేదా కక్షియ మొగ్గ (పర్యపు మొగ్గ - axillary buds) అంటారు.



1.42 A



1.42 B

1.42 A. మొగ్గలు 1. తుది మొగ్గ (చివరి/కొన మొగ్గ) 2. ఆకు రెమ్మ 3. కంకుల మొగ్గ , పిల్ల మొగ్గ, కసి మొగ్గ 4. అనుసంగిక సహాయక మొగ్గ 5. ఆకు.

సామాన్యంగా అనేక పుష్పాలను వికసింపజేసే మొక్కలలో పుష్పీయ మొక్కలలో ఈ పిల్ల మొగ్గలుంటాయి. అలాగని వెంటనే ఇవన్నీ రెమ్మలుగా వికసిస్తాయని చెప్పడానికి వీలులేదు. అనేక సమయాలలో నే సహజ వాతావరణ కారణాల చేత వీటి నుంచి రెమ్మలు వస్తాయి. కొన్ని మొక్కలలో ఈ మొగ్గలు ఎక్కువ కాలం గుప్తంగా ఉంటాయి. ముఖ్యకాండాన్ని ఏ కారణం చేతనో కత్తిరిస్తే, అది మళ్ళీ చిగురిస్తుంది. ఈ మొక్కల స్వభావాన్ని తోటమాలీ, మొక్కలు ఎత్తుగా పెరగకుండా, విశాలంగా గుబురుగా విస్తరించి పెరగడానికి ఉపయోగించుకుంటూ వుంటాడు. ఆ విధంగా చేయడానికి తుది మొగ్గల్ని గిట్టుతుంటారు. అప్పుడు క్రింది భాగపు చిరు మొగ్గలు జీవించి, అనేక రెమ్మలను బయటకీ విడుస్తాయి.

1.42 B. స్థలాంతరం పొందిన మొగ్గలు. కొన్ని మొక్కలలో మొగ్గలు స్థలాంతరమవ్వడం. 1. హికోరియ. ఒక సంవత్సరపు కాండపు పైన 2. పేకన్ కాండపు పైన 3. పై కనిన a. ప్రథమ b. ద్వితీయ మొగ్గలు c. వక్క మొగ్గ (పార్శ్వ మొగ్గ) చివర ఉంటుంది.


కొన్ని సమయాలలో చిరుమొగ్గలు ప్రక్కన పెద్ద మొగ్గలు పెరగడమూ కలదు. దీన్ని సహాయ అనుసంగిక మొగ్గ (accessory bud) అంటారు. ఇవి సామాన్యంగా గుప్తంగా వుండిన కొన్ని సందర్భాలలో అవసరమైనప్పుడు, వక్ర సమయం వచ్చినప్పుడు చిగురు తొడిగి, మొరటైన రెమ్మలను వెలువలకీ విడుస్తాయి.

సామాన్యంగా కాండపు మొగ్గలు, కాండపు చివరనో, ఆకు కంకులలోనూ, (ఆకు తొడిమ దగ్గరో) ఉంటాయి. కాని, కొన్ని మొక్కల జాతులలో ఈ మొగ్గలు మొక్కల ఇతర భాగాలలోనూ ఉంటూ ఉంటాయి. చిలకడ దుంప (గేబుసు గడ్డలో) ఇవి వేరుపైన ఉంటాయి. వేరు మొగ్గ - అడవి అరటి మొదలైన బ్రయోఫైలం (Bryophyllum) కులానికి చేరిన మొక్కల ఆకులలో పైనుంటాయి. పత్ర మొగ్గ (foliar buds) (చిత్రం 1.43) ఇటువంటి మొగ్గలు బెగోనియ (begonia) అడవి తెల్లలిపాయలు (Scilla) కన్నే ఆకులు మొదలైన మొక్కల జాతులలోనూ ఉంటాయి. మరికొన్ని మొక్కలలో ఈ రకపు సహాయక మొగ్గలు కాండం, రెమ్మలలో కణుపులు లేని స్థలలో పెరుగుతూంటాయి, కొన్ని చెట్ల క్రింద భాగాన్ని కత్తిరిస్తే, కత్తిరించిన భాగం చుట్టూ, ఈ రకపు మొగ్గలు చిగురుస్తాయి. మొదట ఇవి చిన్న చీలికలుగా, పిల్ల మొగ్గులుగా పెరగొచ్చు.


1.43 బ్రయోఫైలో అసామాన్యమైన మొగ్గలు.

మొగ్గులు సూక్ష్మమైనవి. వీటిని స్వభావికంగా ఎండ, గాలి, వర్షాల బారిననుండి రక్షించడానికి చిన్నవైన అవికాస పత్రాలు ఒకదానిపై మరొకటి పెరిగి మొగ్గులను ఈ పత్ర పొరల మధ్య దాచి పెట్టుకొంటాయి. లేదా ఈ మొగ్గులపైన కేశాలు (సన్నని తీగలు) ఉండొచ్చు. లేదా వాటి చుట్టూ రాతి వంటి, జీగురు కవచాలుండొచ్చు. లేదా మొగ్గు చుట్టూ గట్టైన పొరలు (Scales) ఉండొచ్చు. ఈ విధంగా పొరలతో మూసిన మొగ్గుల్ని పొర మొగ్గులు (Sclaly buds) అని అంటారు. ఈ రకపు మొగ్గులను మజ్జీ, వనస, అలసందులు మొదలైన మొక్కలలో చూడొచ్చు. కొన్ని చోట్ల మొగ్గుపైన మైనం వరి ఉండే పొర వుంటుంది. దీని చేత మొగ్గు లోపలి తేమ ఎండదు. బయటకీ తేమ అంటుకోదు.





1-43



B



A



C

1-44

మొగ్గలు కొన్ని సమయాలలో వివిధ రకాలైన రూపాలని ధరిస్తాయి. ఇటువంటి వానిని రూపాంతర మొగ్గలు (modified buds) అని అంటారు.

ప్యాషన్ ఫువర్స్ (passion flower) ద్రాక్షలో మొగ్గ, వత్తుగా చుట్టుకొని రింగులు రింగులుగానూ (tendrils మెలితిరిగిన, మలి తీగ) దురంతా, (duranta) మొగలి చెట్లకులు ముళ్ళుగానూ కొన్ని మొక్కలలో బల్బిల్ (bulbil - చిన్న పిలకలు) గానూ రూపాంతరాన్ని పొందుతుంటాయి. ఈ పిలకల్ని పాతికే కొత్త మొక్కలు పెరుగుతాయి. (చిత్రాలు 1.44 A, B, C).

జాచు చెట్టులో ఉండేటట్టుగా ఒక కణుపులో ఒకే ఒక్క మొగ్గ ఉండొచ్చు. ద్రాక్ష మొదలైన మొక్కలలో ఒకే కణుపులో ఒకటికన్నా ఎక్కువ సంఖ్యలో మొగ్గలుండొచ్చు. వీటిలో కొన్ని ముఖ్యమైనవి, మిగిలినవి, సామాన్యంగానో గుప్తంగానో ఉండొచ్చు. ముఖ్య మొగ్గకి (ప్రధాన మొగ్గకి) ఇబ్బంది కలిగితే ఇతర మొగ్గలు చిగురుస్తాయి.


1.44 మొగ్గల రూపాంతరాలు. A. జాముకి (లోలాకుల పువ్వు) పువ్వులు లతాతంతుగా B. డ్యూరాంటలో ముళ్ళుగా C. మొగలిలో పిలకలు. పీచు (Peach).

కొన్ని సమయాలలో గులాబీలలో కణుపులలో మొగ్గ లేకుండా పోవచ్చు (రాకపోవచ్చు) దీనిని గ్రుడ్డి మొగ్గలు (blind buds) లేదా గ్రుడ్డి కణుపులు (blind nodes) అంటారు.


సుప్తమైన గుప్త మొగ్గలు (dormant and latent buds) అనేక పువ్వుల మొగ్గలు (పువ్వు, ఫలమిచ్చే మొగ్గలు - flower and fruit buds) సంవత్సరపు నియత కాలంలో విస్తారంగా వికసించి బలుస్తాయి. ఇవి చలికాలంలో పెరగకుండా సుప్తంగా (నిద్రావస్థలో) ఉంటాయి. వసంత కాలం వచ్చిన వెంటనే చిగురిస్తాయి, వికసించి పుష్పిస్తాయి. చిగురులు మొలకెత్తుతాయి. కొన్ని సమయాలలో ఈ మొగ్గలు రాలిపోతుంటాయి. కాని చాలాకాలం (చాలా సంవత్సరాలు) సుప్తంగా ఉండిపోతుంటాయి. వీటిని గుప్త మొగ్గలు (Latent buds) అంటారు. మొక్కలను బాగా కత్తిరించినప్పుడు ఇవి చిగురించి మొలకెత్తుతాయి.

బోగన్విలా (bougainvillea) మొదలైన చెట్లలో దారు తక్కువగా వుండటం చేత రసభరిత రెమ్మలు బయలుదేరుతుంటాయి. వీటిని నీటి రెమ్మలు (Water shoots, water sprouts, gourmandisers) నీటి ప్రకాండం, నీటి అంకురం, నీటి కాండాలు అని అంటారు. ఇటువంటి రెమ్మలు ఎక్కువగా గుప్త మొగ్గల ద్వారానే వికసిస్తాయి (చిగురిస్తాయి).

ప్రకాండపు వెలువలి పెరుగుదల (Out growths of shoots) ప్రకాండం నుంచి మొగ్గ, రెమ్మ, ఆకు, పువ్వు మొదలైన స్వాభావిక భాగాలు కాకుండా, కొన్ని మొక్కలలో కేశాలు, బిరుసైన కేశాలు (bristles - దృఢ కంటకాలు) ముళ్ళు మొదలైన బాహ్య పెరుగుదలను చూడొచ్చు. ఈ భాగాలు కొన్ని ప్రకాండపు వెలువలి భాగం నుండి పెరుగుతాయి. మరికొన్ని లోవలి భాగం నుండి పెరుగుతాయి. బాహ్య చర్మం ద్వారా (వెలువల నుంచి) పెరిగేదే కంటకాలు (కేశాలు) ఇవి కాండం, ఆకు, పువ్వుల బాహ్య చర్మం నుంచి పెరుగుతాయి. వీటిలో 5 విధాలున్నాయి.



145



146

1. కాండ రోమం (Shoot hairs)

2. క్రుంగడి కేశాలు (Stinging hairs) ఉదా : తురుచి తీగ (చీరెడి చెట్టు - nettle)

3. గ్రంథి కేశాలు - జిగురును కాల్చే కేశాలు. (glandular hairs) ఉదా : పొగాకు, చిత్రమూలం, మంకెన చెట్టు (రక్తపునర్జన్యం).

4. సూక్ష్మ రోమాలు : ఉదా : డయేనియ, వీనస్ ఫ్లైట్రాప్ (Venus fly trap) దీనిలో ఆకు నుంచి పాడైన కేశాలు పెరుగుతాయి. వీటిని ఎగిరెడి పురుగులుగాని, మరేదైన లాకితే ఈ అటకేశాలు మూసుకొని, పురుగులను బైటిలుగా చేస్తాయి. ఈ కేశాల ప్రక్రియను సూచించే సూక్ష్మ రోమాలు (Sensitive hairs).

5. ధృడకంటకాలు (bristles) ఉదా : అనాసన్, లాటి జాతికి చెందినది. (చిత్రాలు 1.45, 1 & 2)

1.45 ప్రకాండపు బాహ్య పెరుగుదలలు 1. అనాసన్లో (పైనాఫిల్) ధృడకంటకాలు 2. చిన్న కేశాలు (కుటక కేశాలు)



లోపలినుంచి పెరిగిడివి. a. ముళ్లు (thorns) ఉదా : గులాబి ఇత్యాదివి. b. పొరలు (scales) ఉదా : బోడిచెట్టు (orobanche) పొగాకు వేరుపైన పెరిగిడి వరోపజీవి. c. లిగ్యూలు (ligules - తుణపువ్వులు) - తుణపువ్వులు గడ్డి నాలుక, గడ్డిలోని రకాలు (ధాన్యాలలోని గడ్డి) ఆకుకూ, ఆకు కవచానికి మధ్య తేలికైన పొరనుంచి బయటకు (చెలుపలకి) వచ్చిన నాలుక. d. గ్రహణాంగం (Tentacle) పుష్పాంగం. ఉదా : పురుగు వడ్డ చెట్టు (drosera sundew) (చిత్రాలు 1.46, 1.4)

1.46 ప్రకాండపు లోపలి పెరుగుదల. 1. గులాబిలో ముళ్లు (ము) 2. బోడి చెట్టులో పొర 3. గడ్డిలో తుణుకాలు (లి) 4. పురుగు వడ్డ చెట్టులో గ్రహణాంగం (టి).

ఈ భాగాల పెరుగుదలచేత మొక్కలకి ముఖ్యంగా రక్షణ లభిస్తుంది. కేశాలు, ముళ్లు ఉంటే, ఈ మొక్కలను ప్రాణులు తినవు (నోరు పెట్టవు). గంధం, జిగురు ఉంటే, ఆ చెట్ల జోలికి ప్రాణులు పోవు. కాండపు రోమం నుంచి మొక్కల నీరు ఆవిరి అయి చెలుపలకి వెళ్ళేది తక్కువ. సామాన్యంగా ఉష్ణ ప్రదేశాలలో మొక్కలలో వీటిని చూడొచ్చు. వివరీతమైన చెలుతురు, వర్షాల భారీ నుంచి ఇవి మొక్కల్ని కాపాడుతాయి. కొండపు కేశాలుండటం చేత దాని పై ఎక్కువగా నీరుగా ఉంటుంది. వర్ష, విత్తనాలపై పెరిగిడివి వాటి ప్రసరణకి (వికసించడానికి) అనుకూలం (ముందు చూడండి).

## పువ్వు

తోటమాలి పువ్వులను అలంకారం కోసమో, రంగుల కోసమో, సువాసన కోసమో కాకుండా, పువ్వుల నుంచి కాయలు, పండ్లు, విత్తనాలు, ఫలాన్ని పొందడానికి, విత్తనాల కోసం, కాయల కోసం, వర్ణకోసం మొక్కల్ని పెంచుతాడు. దాని కోసం కష్టపడతాడు. అలాగని మొక్కల ఇతర భాగాల ద్వారా అతనికి ఏ ప్రయోజనం లేదని కాదు. దుంపలు, పిలకలు, చెట్టు, తొడిమలు, జిగురు, రాళ్లు, మట్టి, ఆకు, నీరు వీటికోసం కూడ పెంచుతాడు. కాని ఎక్కువగా మొక్కల్ని వాటి పువ్వుల కోసం, ఫలాల కోసమే పెంచుతారు. పువ్వు ఒక రీతిలో



1.47B

కాండపు రూపాంతరం - మొక్కల సంతాన వృద్ధి కోసం రూపొందించబడిన మార్పు. అంటే పువ్వు మొక్క, యొక్క అంగాంగం (Sexual organ). ఆకు మొదలైనవి అలైంగిక అంగం (asexual or vegetative organ).


ఒక రకపు పువ్వులో నాలుగు (సామాన్యంగా పువ్వులో) భాగాలు ఉంటాయి. (చిత్రం 1.47 A & B).

1.47 A. పువ్వులోని నాలుగు వృత్తాలు. 1. పువ్వు పత్రం (Calyx) (రక్షక పత్రావళి) 2. ముకుటదళం (Corolla - ఆకర్షణ పత్రావళి) 3. పురుష భాగం - స్త్రీమను (Stamen కేసరం) 4. స్త్రీ భాగం - పిష్టెల్లు (Pistil - అండకోశం).

మొదటి వృత్తం లేదా భాగం అన్నింటికన్నా బయట (వెలుపల) ఉంటే రక్షక పత్రావళి (పువ్వుపత్రం Calyx). ఇది సామాన్యంగా ఆకు వలె వచ్చిగా వుంటుంది. దీన్ని దళాలని (రేకుల్ని) పత్ర దళం పువ్వుపత్రం - (Sepals) రక్షక పత్రావళి అని వ్యవహరిస్తారు.

1.47 B. పువ్వు భాగాలు. 1. పువ్వు వృంతం (పిడి/కాడ/టోడిమ) 2. పువ్వు పీఠం 3. పువ్వు పాత్ర (గిన్న) 4. ఉప పువ్వు పాత్ర (గిన్న) (epicalyx) పరిపక్వ పువ్వువలె (పుటదళోపరిపువ్వులు) 5. రక్షక పత్రావళి (పువ్వు పత్రం sepals) 6. ఆకర్షణ పత్రావళి ముకుట దళాలు - పువ్వు దళం (Corolla) 7. పువ్వు రేకులు (దళాలు - Petals) 8. పురుషాంగం (స్త్రీమను) 9. స్త్రీ భాగం - పిష్టిల్ (అండకోశం).

రెండవ వృత్తం రక్షక పత్రావళికి లోపలున్న ముకుట (ఆకర్షణ పత్రావళి) దళం. దీన్ని రక్షక పత్రావళి అని అంటారు. రక్షక పత్రావళి, పువ్వుదళాలు ఒకే ఆకారంలో ఉన్నా లేదా ఒకే రంగును కలిగివున్నా, లేదా ఈ రెండింటిలో ఒకటి లేకపోయినట్లైతే, ఈ రెండు భాగాలను కలిపి పుష్పావరణ పరిపత్రాలు (perianths) అని వ్యవహరిస్తారు. మూడవ వృత్తం - ఈ రెండింటి లోపులుండే భాగం - పురుషాంగం - కేసరం అండ్రీషియం (androecium) పురుష భాగంలోనూ కొన్ని ఉపభాగాలున్నాయి. మృదువైన తీగవలె ఉండే కేసర దండాలు (filaments) వీటి చివరన పరాగ కోశం (anther Sac). ఈ కోశాల లోపల పొడి రూపంలో పరాగం (Pollen) ఉంటుంది. ఈ పరాగమే మొక్క యొక్క పురుష వదార్థం (కేసర వదార్థం) గర్భధారణకు అవసరమైన వదార్థం. పరాగ కోశాలు, కేసరాలు, ఈ పరాగాన్ని కాపాడెడి, లేదా భరించే (మోసే) భాగాలు మాత్రమే. కేసర దండు, పరాగ కోసం, పరాగాన్ని చేరి స్త్రీమను (Stamen)లు అవుతాయి. నాల్గవ వృత్తం పుష్పపు అత్యంత లోపలి భాగం (లోపలి వృత్తం). ఇదే పుష్పపు స్త్రీ భాగం - గైనిషియం లేదా పిష్టిల్ (gynoecium or pistil) ఈ భాగాల ముఖ్య వదార్థం అండకోశాలు (ovules). ఇదే పరాగ స్పర్శ చేత గర్భం ధరించి బీజాలవుతాయి. ఈ అండ కోశాలు (అండాల్ని) కాపాడెడి కోశాన్ని అండ కోశం, అండాశయం (Ovary) అని అంటారు. ఈ అండాశయం నుంచి తీగలు బయలుదేరుతాయి. వీటిని శలాకం (Style) అని అంటారు. పరాగ అండాన్ని చేరుతాయి ఈ తీగలు. లేదా గొట్టాల ద్వారా అండం చేరుతాయి. శలాకపు చివరన ఉబ్బుకొని ఉన్న అంటుకొనే సింబియం ఉంటుంది. ఈ శలాకపు చివరను శలాకాగ్రం (Stigma or Stigmatic surface) అని అంటారు. పరాగం ఈ శలాకాగ్రం పై పడినప్పుడు దీని అంటు దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటుంది. పరాగపు ఈ రకపు క్రియకు (పట్టుకోవడాన్ని) పరాగ స్పర్శ క్రియ (pollination) అని అంటారు. పరాగ సంపర్కమైన కొంత కాలానికి శలాకాగ్రపు తేమ చేత పరాగం మొలకెత్తుతుంది. గొట్టంవలె (నాళం) పెరుగుతుంది. ఇదే పరాగ గొట్టం (పరాగ నాళం pollen tube)



1-48

ఇది శలాకపు ద్వారం భేదించుకొని (పిల్చుకొని) అండకోశం విత్తును చేరి దాని ద్వారా అండానికి చేరి, దాని జతలో కలుస్తుంది. ఈ సంయోగం - పురుష, స్త్రీ వరాగాల సంయోగం. దీన్నే గర్భధారణ (Fertilisation) క్రియ అని అంటారు. ఈ క్రియ జరిగిన తర్వాత ఈ అండం పెరిగి, విత్తనమవుతుంది. అండాన్ని మోసిన అండకోశం కాయ లేదా ఫలమవుతుంది. (చిత్రం 1.48).

1.48 ఒక సంపూర్ణ పుష్పపు బాహ్య నిర్మాణాన్ని, గర్భధారణను స్థూలంగా చూపించేది చిత్రం. కా - కాడ. 1. రక్షక వల్రావతి (పుష్ప వల్రం) 2. పుష్ప దళం 3. కేసర దండం 4. వరాగ కోశం 5. వరాగం 6. అండాశయం 7. అండం 8. శలాకం 9. శలాకాగ్రం 10. వరాగ పురు - వరాగ శలాకాగ్రంపై పడి పెరిగిన (మొలకెత్తిన) వరాగ మొలకలు. 11. శలాకము ద్వారా దిగి అంతమవ్వడం 12. అండంలో సంయోగం చెందడం లేదా గర్భం ధరించడం.

ఈ నాల్గు పుష్ప వల్రాలను (whorls వలయాలు) భరించేది పుష్ప యొక్క తొడిమ (పీడి) పూతొడిమ, పుష్పపు కాడ (Flower stalk pedicel - పుష్పకాడ, వృత్తం) ఈ తొడిమ చివరుట్టు ఉంటుంది. ఈ ఉట్టిన భాగాన్ని లాలమస్ పుష్పదారం (receptacle thalamus) అంటారు. (పుష్ప పీఠం).

అన్ని పుష్పాలలోనూ పై తెలిపిన అన్ని భాగాలూ ఉండవు. అన్ని భాగాలూ - నాల్గు పుష్పపుల్తలూ పుష్ప మట్టా ఉంటే దాన్ని పూర్ణ పుష్పం (Complete flowers) అనియూ, ఏదైనా ఒక వృత్తం లేకపోయినట్లైతే అసంపూర్ణ పుష్పం (incomplete flowers) అని వ్యవహరిస్తారు.

ఒకే పుష్పంలో పురుష, స్త్రీ భాగాలు రెండూ ఉంటే వాటిని ద్విలింగ పుష్పాలు (bisexual or hermaphrodite flower) అని అంటారు. పురుష భాగమో, లేదా స్త్రీ భాగమో ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఉంటే వాటిని ఏక లింగ పుష్పాలు (unisexual flowers) అనీ, కేవలం పురుష భాగముంటే వాటిని కేసర పుష్పాలు (Staminate flowers) పురుష పుష్పాలు (మగ పుష్పాలు) అనీ కేవలం స్త్రీ భాగం మాత్రమే ఉంటే వాటిని సగర్భ పుష్పం - స్త్రీ పుష్పాలు (Pistillate flowers) అని అంటారు. ఈ రెండూ లేకుండా ఉంటే వాటిని నిర్లింగ పుష్పాలు (Neuter flowers) అంటారు.

**లింగ రహిత పుష్పాలు ఉదాహరణలు :**

సంపూర్ణ పుష్పం : నారింజ, చిక్కడు పువ్వులు, మందార, అవిన ఇల్లాదివి.

అసంపూర్ణ పుష్పాలు : శ్రీగంధం, వంకాయ పువ్వు, ఈశ్వరి (*Aristolochia indica*)లు.

ద్విలింగ పుష్పాలు : స్పటిక (బాగ్గీయ) పారిజాతం.

ఏకలింగ పుష్పాలు : గుమ్మడి, పొద్దు, ఆముదపు పువ్వులు.

ఒకే మొక్కలో స్త్రీ, పురుష, నిర్లింగ పుష్పాలు పూస్తే వాటిని పాలిగ్యామస్ మొక్క (Polygamous Plant) అంటారు. మామిడి, గుండుమల్లి (*Polygonum barbatum*) నీటి కణికలు (నీటిలోని చిన్న ఆకులు, నాచరకం) (*Polygonum glabrum*). ఒకే మొక్కలో పురుష, స్త్రీ పుష్పాలుంటే వాటిని ఏక గృహత్వ పుష్పాలు





1.49



A



B



C

1.50

మోనోసియస్ పువ్వు (monococious) గుమ్మడి మొదలైన బోడి (బొద్ది) పువ్వులు (gourds) ఆముదపువ్వులు, మొక్కజొన్న పువ్వులు ఈ రకానికి చెందినవి. పురుష పువ్వుల్లో వికసింపజేసి (ఇచ్చే) మొక్కలు, స్త్రీ పువ్వులను ఇచ్చేవి ఉభయ గృహాత్మ్య పువ్వులు దైయలసియస్ (dioecious) అని అంటారు. సరంగి, తాటిముంజ, ఈత మొదలైనవి ఈ రకానికి చెందినవి.

తోటమాలి అందులోనూ అలంకారం కోసం తోటను పెంపేవారు (ornamental gardeners) పువ్వుల వైవిధ్యాన్ని కొంచెం వివరంగా తెలుసుకొని ఉంటే మొక్కల్ని గుర్తించడం, సులభమవుతుంది. పువ్వు యొక్క కాడ (పువ్వు కాడ) ఇది పొడవుగా (మందారలాగ) ఉండొచ్చు. లేదా చిన్నదిగానూ ఉండొచ్చు. కొన్ని మొక్కలలో కాడ ఉండనే ఉండదు.

పుష్పపీఠం (పుష్ప దార) పుష్పపు తొడిమ ఉభయ భాగం ఈ పీఠం పైనే పుష్పపు పువ్వులు చేరి ఉంటాయి. సామాన్యంగా, ఈ పీఠం చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. కానీ కొన్ని మొక్కలలో ఇది పొడవుగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. (చిత్రం 1.49) అందులో కలుపులుంటాయి.

1.49 పుష్ప పీఠం (పుష్పదారం - Receptacle) a. దళాలకు సైమన్ మధ్యనున్న భాగం ఉబ్బుకొని ఉండటం (Androphore) (నీటి ఆడుగున నాటిన విత్తనపు పువ్వులో) జి. కనక చంప మొదలైన వాటిలో సైమను, పిప్పిలిన మధ్య భాగం ఉబ్బి ఉంటుంది (Gynophore).


నీలి పువ్వులు ఇటువంటివి. ఇందులో పొడవు పుష్ప పీఠాలను చూడొచ్చు. ఇందులో రేకులకూ (దళాలకూ) కేసరాలకూ మధ్య పుష్ప పీఠం పొడవుగా ఉంటుంది. తొడిమ (కాడ) (*Capparis brevispina*) రాజతరు (కనక చంప) (*Pterospermum heyneanum*) పువ్వులలో కేసరానికి, అండకోశానికి మధ్య ఈ పీఠం పొడవుగా ఉంటుంది. గులాబిలో ఇది సానరులాగ (కొద్దిగా రోతున్న పల్లెలాగ) పుదాకారంలో (Concave) ఉంటుంది. కమలంలో ఇది స్పాంజ్ లాగ ఉబ్బి పీపాలాగుంటుంది. 1.50 A - C చిత్రాలు.

1.50 A-C తొట్టిలో పెట్టిన చెట్టు. B. గులాబి C. కమలాలలో గ్రెనోఫోర్ (గ్రె) పుష్పపీఠం (కా).


వంకాయ, సబువంగి, ఆవాలు మొదలైన పువ్వులలో అండకోశం పుష్పపు ఇతర భృత్తాలకన్నా పైకుంటుంది. ఈ ధకవు పువ్వులను ఉన్నత అండపోశపు పుష్పం, హైపోగైనస్ పువ్వు (*hypogynous flower*) అండ కోశపు మధ్యానికీపైన ఇతరభృత్తాలు ఉంటే, దీన్ని నిజ అండకోశపు పువ్వు ఎపిగైనస్ పువ్వు (*epigynous*) అనియూ, అండకోశపు సమమట్టుంలో ఇతర పువ్వుల భాగాలుంటే అటువంటి వానిని సమస్తా అండకోశపు పువ్వులు పెరిగైనస్ పువ్వు (*perigynous*) వ్యవహరిస్తారు. చిత్రం 1.51 A; a-d, 1.51 B.

1.51 A (a-d) పుష్ప పీఠంపైన పుష్ప వల్రం (రక్షక పత్రావళి) దళాలున్న రీతి a. హైపోగైనస్, b & c పెరిగైనస్, d. ఎపిగైనస్.

1.51 B. a. ఇక్కడ దళాలు వేరు వేరుగా ఉన్నాయి. అండకోశం ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నది. b. ఇక్కడ దళసంయుక్తంగా వున్నది. అండకోశం నిలబడినట్లుగా (నిలువు స్థానంలో) ఉంది. హైపోగైనస్ పువ్వుల (కొబ్బరి, మామిడి, మందార త్యాదివి).




A



B




C



D

1.51A




A



B

1.51B



35A



B




1.52



1. 53



164



165

ఎద్దువన పువ్వులు : జామ, బేరికాయ, గుమ్మడి జాతికి చెందినవి (gourds).

పెరిగైన పువ్వులు - గులాబీ, బతాణి, చిక్కడు ఇత్యాదివి.

బ్రాక్టులు (bracts) పువ్వునన్నీ కాండపు భాగం నుంచి, కొన్ని పోషకరకాల ఆకులు కొన్ని మొక్కల్లో ఉంటాయి. వీటి బ్రాక్టులు (bracts) అని అంటారు. ఈ రకపు ఆకులు బూ గెనివిలియం పాయన్ సెటియ (polinsettia) మొక్కల్లో రంగు రంగు పువ్వుల రేకుల వలె (దళాలవలె) ఉంటాయి. అరటి, వక్క, కొబ్బరి మొదలైన తాట చెట్లలో, మొక్కజొన్న, అంతోరియం, (anthurium) కెలిడియో వీటిలో ఈ బ్రాక్టులు పెద్దవిగా ఉండి, పువ్వును, పువ్వుల గుత్తులను, సంపూర్ణంగా మూసి ఉంటుంది. ఈ రకపు ముసుగు బ్రాక్టులను పీట్ లేదా స్పేత్ (spathe) అని అంటారు. (చిత్రాలు 1.52 A - B) గుండుమల్లి, సూర్యకాంతం ఇంటునంటి పువ్వులలో ఒకటికన్నా ఎక్కువ చుట్టూ బ్రాక్టులుంటాయి. ఇవి పువ్వుల గుంపుని ఆవరించుకుంటాయి.

1.52 A పాయిన్సెట్లో బ్రాక్టు. B. i. అంతూరియం స్పేత్ (పీట్) ii. అరటి iii. కొబ్బరి iv. మొక్కజొన్న - వీటిలో స్పేతులు. ఇటువంటి బ్రాక్టులను ఇన్వోల్క్యూర్ (involucre) అంటారు. వత్తి, మందార పువ్వులలో, రక్షవల్రావతి క్రింద చిన్న పువ్వు రక్షక వల్రావతి, బ్రాక్టుల చుట్టూ ఉంటుంది. దీన్ని ఉపపుష్ప వల్రాలు (epicalyx) అంటారు. (చిత్రం 1.53 1 & 2).

1.53. 1. సూర్య కాంతి ఇన్ వోల్క్యూర్ 2. మందారపు i ఉప పుష్ప పాత్ర e. ఉపరక్షక వల్రావతి

రక్షక వల్రాల నైవిధ్యం (వత్ర పుష్పాల నైవిధ్యం) (calyx) : అనేక పుష్పాలలో రక్షక వల్రాలు వచ్చగా వుంటాయి. కాని గుల్మోహారి, నాస్టర్ షియమ్ మొదలైన వాటిలో ఇవి రంగు రంగులుగా వుంటాయి. (వెలు రంగులుగా వుంటాయి) ఈ రక్షక వల్రాలు వేరు వేరుగా వుండొచ్చు. (చిన్న రక్షక వల్రాలు - పాలిసెపలస్ - Polyssepalous) లేదా వేరుండవచ్చు. సంయుక్త రక్షక వల్రావతి - గ్యామోసెపలస్ (gamosepalous) వంకాయ, మిరచికాయలలో సంయుక్తమై యుంటుంది. ముసింద (Mussaenda) అనే అలంకారపు ఆకు చెట్లలో ఒక ఏక రక్షక వల్రంగా విశాలమవ్వడమే కాకుండా, తెల్లగా, ఎర్రగా, రంగులు కలిగి ఉంటాయి. చామంతి, కాస్మాస్ (Cosmos), డేలియా (dahlia) లలో ఇది కేవల రూపంలో ఉండొచ్చు. వంకాయ, వత్తి, మొదలైన వాటిలో కాయలు వచ్చిన తర్వాత కూడ రక్షక వల్రావతి రాలిపోకుండా, కాయకు అంటుకొని ఉంటుంది (persistent calyx) (చిత్రాలు 1.54 a-e).

1.54 రక్షక వల్రాల నైవిధ్యం a. గ్యామోసెపలస్ - ఒకటిగా వుండటం. b. పాలిసెపలస్ - గొట్టందాగ, c. పరిస్పింట్ - రాలకుండా నిలిచుండటం. d. పాపస్ (pappus) మృదువైన కేళాలుగా రూపాంతరం పొందుండటం. e. ముసిందలో (గుమ్మడిలో) పుష్ప దళంవలె రంగుదాల్చి రూపాంతరం పొంది ఉండటం.





పుష్ప దళాల నైవిధ్యం (corolla) : ఈ భాగామే సామాన్యంగా పుష్పపు రంగు రంగుల భాగం. కొన్ని సమయాలలో సువాసనను వెదజల్లుతాయి. ఇది కూడ భిన్నంగా (విడిగా) ఉండొచ్చు లేదా పాలిపెటలస్ (polypetalous) వేరుండొచ్చు. (సంయుక్త దళ - గామోపెటలస్ (gamo petalous). ఈ పుష్ప దళాలలో అనేక రకాల, రూప, గాత్ర (మందం) జతకూడటంలో నైవిధ్యముంటుంది. వాటిలో ముఖ్యమైన వాటిని ఈ క్రింద పొందు పఠచినాము.

1. అవాలు, క్యాబేజీ, కాలిఫ్లవర్, ముల్లంగి, కాండిట్స్ (candytuft) మొదలైన వాటిలో నాల్గు భిన్న దళాలు శిలువ (cross) వలె వేరి ఉంటాయి. (శిలువ దళాలు - క్రూసిఫారం - cruciform). అనేక పుష్ప దళాలలో రెండు భాగాలను చూడచ్చు. చిన్నదిగా ఉండే కాడ (పీడి) తొడిమ ఉండే వంజ (claw) విశాలంగా (వెడల్పుగా) ఉండే క్రింది భాగం (limb).
2. పింక్ (pink) మొదలైన వాటిలో పొడవైన వంజ ఉండే 5 దళాలుంటాయి. దళాల అడుగుభాగం ఈ వంజకు సమకోణంగా (right angled) లేదా, లంబంగా ఉంటుంది (caryophyllaceous).
3. గులాబీ మొదలైన పుష్పాలలో వంజాలు మోటుగా చిన్నవిగా లేదా లేకుండా వుంటాయి (rosaceous).
4. గంట పుష్పాలు (కంప్యానుల - Campanula) (గంటపువ్వులు)లో దళాలు గంట రూపంలో వేరి ఉంటాయి.
5. రైల్వే తీగ (ఐపోమియ) వసువు కణికలు కొన్నింటిలో దళాలు - బుద్దిమంతునిలాగ (లాలిక - Funnel) వేరుంటాయి - (లాలిక - గరాటు) ఆకారంలో ఇన్ఫండ్ బులి ఫారమ్ (infundibuli form).
6. సూర్యకాంతం : ఒక పువ్వుల సముదాయపు గుచ్చం (గుత్తి) ఒక్కొక్క చిన్న పువ్వు గొట్టం ఆకారంలో (tubular) దళాలని పొంది ఉంటుంది.
7. జిజ్జీద పువ్వులు (వినియకుని పువ్వులు - కొన్ని కాసికణికలు) (Vinca rosea - periwinkle)లో దళాలు చక్రాకారంలో ఉంటాయి. (rotate - రోటేట్ దళం - wheel shaped).
8. బలాణి, బీన్న మొదలైన పువ్వులలో దళాలు సీతాకోక చిలుకలవలె కనిపిస్తాయి. (సీతాకోక చిలుకల వంటి దళాలు - పాపిలియోనేషియస్ - papilionaceous) వీటిలో రెండు రెక్కల వంటి దళాలు (wing petals) రెండు వడవ వంటి, పొట్టి చిన్న దళాలు (Keel petals) ఒక జెండా, ప్రధాన దళం (Standard petal) ఉంటాయి.
9. తులసి, సాల్వియా (salvia) పువ్వుల దళాలు రెండు పెదవుల వలె ఉంటాయి. (Two lipped : బైలేటియల్ - bilabiate).
10. అంటిరైసమ్ (antirrhinum) పువ్వులలో క్రింది పెదవి నాలుక వలె (సర్ప్సేట్ దళాలు - personate petals) బయటకి చాచి వుంటాయి.

కొన్ని పువ్వులలో పుష్ప దళాల నుంచి కొన్ని ఉపాంగాలు (appendages) పెరుగుతూంటాయి. అంటిరైసమ్లో దళాల గొట్టం బాతు కొండియలాగుంటుంది - సంపీలాగ (ప్యాకేట్ - గిబ్బస్ - saccate, gibbous) కరణ కుండలం, నాస్పర్ షియమే లార్క్స్పూర్ (Larkspur) పువ్వులలో దళాల గొట్టాలు పొడవుగా మొనదేలిసట్టుగా (స్పూర్ - spur) ఉంటుంది. కణికలు నీలిపువ్వులు దళాల చివర మరొక ఉపనాళం చుట్టూ బయలుదేరుతాయి. వీటిని కిరీట దళాలు (కోరోన - Corona) చుట్టవ అంటారు. (చిత్రం 1.55, 1.14).

1.55 పుష్ప దళాల వైవిధ్యాలు 1. శిలువ వలె (క్రూసిఫారం) 2. వంజలాగే కార్మోస్టైలేషియస్ 3. చిన్న వంజ





వలె (రోసేషియన్) 4. గంటలాగ (కంపాన్యులేట్) 5. గరాటు వలె - (Funnel form) 6. గొట్టుం లాగ 7. చక్రం వలె 'రోజేట్' 8. సీతాకోక చిలుక ఏని ఏపిల్లి శేషియన్ 9. రెండు పెదపుల వలె (టైలెడియల్) 10. నాలుక వలె వర్చనెట్ 11. అనిర్బుత ఆకారం (అర్బిడివలె) 12. సంపి వంటి దళం (సంపి దళం) (గిబ్బిన్) 13. రేలేట దళం a. నీలి పువ్వులో b. దాడరలో 14. చాచిన (పెర్చి) నాస్టరేషియల్ అంపటట్టుగా (రు మెగ్గ). కేసరం, అండ భాగాలలోనూ ఎన్నో వైవిధ్యాలున్నాయి. వీటి వివరాలు తోటమాలికన్నా సస్యశాస్త్రజ్ఞునికి సంబంధించిన విషయమువ్వటం చేత దీని ప్రస్తావన ఇక్కడ అనవసరం. కాని మొక్కల్ని గుర్తించడానికి, అవి ఏ జాతికి, కులానికి, వంశానికి చేరినవనో విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈ భాగాల సంఖ్య, నిర్మాణం మొదలైన వాటిని కొద్దిగా, స్థూలంగానైనా తోటమాలి తెలుసుకొని ఉండటం మంచిది. పురుషాంగం (ఆండ్రోషియం) వరాగకోశం (వెనుక చూడండి) సామాన్యంగా రెండు చేరిన ముక్కలుగా వుంటాయి. ఈ కోశాలను కేసర దండాలు మోస్తూంటాయి. ఆవాలు, ముల్లంగి, మొదలైన వాటిలో కేసర దండం అండకోశపు క్రింది భాగానికి చేరుకోవచ్చు. మూల సంధితం, బేసిఫిక్స్డ్ (basifixed)దండం సంపంగిలో సంపూర్ణంగా చేరుండొచ్చు. గుంసక్క, ఆడ్మెట్ (adnate) దండం, గడ్డి అందులోని రకాలు, ధాన్యాలు, పాములు మొదలైన వాటిలో వెనుక (ఏవుకు) మధ్య భాగాన కోశం గాలిలో ఉగులాడేటట్టుగా అంటుకొని ఉండొచ్చు. లోల విర్బచైల్ (versatile) దండం (చిత్రం 1.56).

1.56 వరాగ కోశం కేసరానికి అంటుకొన్న రీతి (అతుక్కునే రీతి) a. మూల సంధితం (బేసిఫిక్స్డ్) b. గుంసక్క (ఆడ్మెట్) c. పుష్ప సంధితం (దార్సిఫిక్స్డ్) d. లోల (వర్బచైల్) e. పాల్సియల్ సంధి భాగం పొడవుగా వుండి, వరాగకోశపు రెండు గొట్టాలను వేరు చేస్తూంటాయి. క్రింద ముక్కలలో వరాగముండదు. బోలుగా వుంటుంది.

కేసర దండం వేరువేరుగానుండొచ్చు. లేదా ఒకటిగా చేరుండొచ్చు. కొన్ని పువ్వులలో కేసర దండాలన్నీ ఒకటై, వరాగకోశం వేరుగా వుండటంకద్దు. వత్తి, బెండలలో ఈ విధంగానే ఉంటుంది. ఈ నిర్మాణాన్ని ఏక సంబంధ కేసరం, మోనో టెల్మిన్ (monadelphous stamens) అని అంటారు. బఠాణి, బీన్లు మొదలైన వాటిలో కేసర దండాలు రెండు కట్టలుగా చేరుండొచ్చు. వీటిని ద్విబంధ కేసరం, డయడెల్మిన్ కేసరం (diadelphous stamens) అని అంటారు. బూరుగ, ఆముదం, నిమ్మలలో ఇవి రెండుకన్నా ఎక్కువ కట్టలుగా చేరుంటాయి. ఇటువంటి వాటిని బహుబంధ కేసరం - పాలిడెల్మిన్ కేసరం (polyadelphous) అని వ్యవహరిస్తారు.

సూర్యకాంతం, కుసుమాలు, చెండుమల్లెలలో కేసర దండం వేరుగా ఉండి, వరాగ కోశం చేరుంటుంది. దీన్ని సంయుక్త వరాగ కోశం - సిన్ జీనీషియస్ కోసం - (syngenesious) అని అంటారు. గుమ్మడి, దోసకాయలలో కేసర దండాలు, వరాగ కోశాలు చేరుంటాయి. (చిత్రం 1.57 a-d).

1.57 (a - d) కేసరాలు చేరుండటం. a. ఏక సంబంధం (మోనోడెల్మిన్) b. ద్విబంధం (టై డెల్మిన్) c. బహుబంధాలు (పాలిడెల్మిన్) d. సంయుక్తం (సిన్జీనీషియస్)


ఒక పువ్వులోని కేసరాలన్నీ సమానమైన పొడవుండాలని లేదు (ఉండవు కూడ). ముల్లంగి, ఆవాలులో కొన్ని పొడవుగానూ, మరొకొన్ని పొట్టిగా వుంటాయి. కేసరాల సంఖ్య మాత్రం ఒకరకపు మొక్కకు ఒక నిర్దిష్ట



1.57



1.58



1.58

సంఖ్య ఉంటుంది. సంఖ్యలో భేదాలుండవు. అల్లంలోని రకపు అల్లం అయినా సరే ఎక్కడ ఏ విధంగానైన పెరగని అందులో ఒకే రకపు కేసరాలుంటాయి. (ఒకే కేసరముంటుంది).

కమలాపండు (వారింజ)లో అసంఖ్యాకంగా వుంటాయి. సామాన్యంగా ఏకదళ సస్యాలలో మోనో కాటిటిడనులలో మూడు లేదా వాటి అవవర్ణ సంఖ్యలో (6, 9, 12 ఇత్యాదివి) కేసరాలుంటాయి. ద్విదళాలలో ఐదు లేదా దాని అవవర్ణ (10, 15, ఇత్యాదివి రెట్టింపు) కేసరాలుంటాయి.

ప్ర. లేదా గర్భాంగం : గ్రెనీషియ లేదా పిస్టిల్. కొన్ని పుష్పాలలో ఒకే అండాశయం లేదా కార్పెల్ (Carpel) ఉంటుంది. బలాణి, దీన్నులలో ఈ విధంగానే ఉంటాయి. ఒకటి అండాశయం అంటే ఒక అండకోశం దాని నుంచి ఒక శలాకం, దాని చివరలో ఒక శలాకాగ్రం ఉంటుంది. ఇటువంటి వాటిని ఏకండాశయాలు, మోనోకార్పెలులు (monocarpels) అని అంటారు. ఒకటికన్నా ఎక్కువ అండాశయాలు, అండకోశాలు, శలాకాలు, శలాకాగ్రాలు ఉంటే, వీటిని బహు అండాశయాలు, పాలికార్పెలులు (polycarpels or compound carpels) అని అంటారు. ఈ కార్పెలులు - గులాబీ, కమలం, సంవంగులలో ఉండేటట్టుగానే, వేరు వేరుగా ఉండొచ్చు. విభక్త అండాశయం. అపోకార్పెస్ (Apocarpus) గా ఉండొచ్చు. లేదా ఆవాలు, పత్తి, నిమ్మలలో ఉండేటట్టుగా ఒకటిగా వేరి సంయుక్త అండాశయంగా, సిన్కార్పస్ పుష్ప (syncarpous)గా అయ్యుండొచ్చు. (చిత్రం 1.58 a - d).

1.58. ప్ర. భాగపు వైవిధ్యాలు a. సిన్కార్పస్ పిస్టిల్ 1. శలాకాగ్రం 2. శలాకం 3. అండకోశం b. అపోకార్పస్ పిస్టిల్ i. కమలంలో ii. సంవంగిలో iii. గులాబీలో c. వీటిలో శలాకాగ్రాలు - వేరు వేరు మందార వరి d. శలాకం వేరు వేరు డయాండ్రస్లో e. అండకోశం, వేరు వేరుగా - కణికలలో f. అండకోశం వేరు వేరుగా రెక్కలు ఉండటం. g. శలాకాగ్రం - తలలాగ, h. శలాకాగ్రం - తట్టలాగ (disc) i. శలాకం ముక్కుగా అవ్వడం j. శలాకాగ్రం - నక్షత్రంలాగుంటుంది (radiate) k. శలాకాగ్రం - పక్షుల గరికవలె (plumose) l. దారంలాగ (Filiform) m. పొడవు (linear) n. బ్రాన్స్ వర్న్ (transverse) o. శలాకపు చీలికలు పుష్పదళం లాగ (petaloid).

### పుష్పాల పనులు (Functions of flowers)

పుష్పాల పని విత్తనాలను ఉత్పత్తి చేసి, దాని ద్వారా సంతానాభివృద్ధి చేయడం. అలాగని పుష్పాలన్నీ విత్తనాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయనికాదు. కొన్ని బాహ్యకారణాల చేత విత్తనాలను ఉత్పత్తి చేయలేకపోవచ్చు. కొన్ని మొక్కలలో పుష్పాలున్నను, సహజంగానే విత్తనాలు తయారుచేసుకుంటూ ఉంటాయి. కాని సామాన్యంగా పుష్పమంచి కాయ, ఫలం, విత్తనం, దాని ద్వారా సంతానం కలుగుతూ ఉంటాయి.

విత్తనాలు ఉత్పత్తి అవ్వడానికి రెండు క్రియలు జరగాలి. 1. పురుష, ప్ర. భాగాల సంపర్కం - పరాగ స్పర్శ (pollination) 2. గర్భధారణ (Fertilisation). మెను చెప్పినట్లుగా పుష్పంలోని పురుషాంగంలో ముఖ్యమైంది పరాగం. ఇవి చాలా సూక్ష్మమైన కణాలు. ఒక అంగుళం పొడవులో 200 నుంచి 1000 పరాగ కణాలు జోడించవచ్చు. అంత సన్నగా వుంటాయి. దుమ్ములాగ గరకుగా, గాలిలో చాలా దూరం వర్ణిస్తాయి. సామాన్యంగా ఈ పరాగం పసుపుగానో, తెల్లగానో ఉంటుంది. ఈ పరాగపు కణాలు పరాగ కోశంలో బలీసి, కోశం బద్దలై

బయటకు వస్తుంది. ఈ వరాగ కణాలు బరువు చేతనో, గాలిచేతనో, నీటి చలనం చేతనో, కీటకాల ద్వారానో, ప్రాణుల మూలంగానో అదే పువ్వు లేదా, ఆ మొక్క యొక్క వేరొక పువ్వుతోనో లేదా వేరొక మొక్క యొక్క పువ్వు శలాకాగ్రంథినో పడుతాయి. ఈ రకపు వరాగ చేరికను, సంవర్గాన్ని, వరాగ స్పర్శం (వరాగ సంవర్గం) అని అంటారు.

ఈ స్పర్శించబడిన వరాగం శలాకాగ్రంథిన పడిన కొంత కాలానికి మొలకెత్తుతాయి. ఈ మొలకలు గొట్టంలాగుంటుంది. వెదజల్లిడానికి సహాయపడే ఆకారంలో ఉంటుంది. ఈ మొలక శలాకాన్ని ఫేదించుకుంటూ అండకోశంలో విత్తనం వల్లి, అండకోశం లోపల చేరుతుంది. ఆ తర్వాత అక్కడున్న అండంలో కలుస్తుంది. ఈ రకపు సంయోగాన్నే గర్భాధారణ అని అంటారు. గర్భాధారణమైన తర్వాతే అండం విత్తనంగా పెరుగుతుంది. అండకోశం ఈ బీజాన్ని (విత్తనాన్ని) రక్షించే కాయ వండుగా పెరుగుతుంది.

ఒక పువ్వుయొక్క వరాగం అదే పువ్వు యొక్క శలాకాగ్రంథిన పడితే, ఆ క్రియను శ్వాసక్రియ వరాగ స్పర్శ (self pollination) ఒక మగ (పురుష) పువ్వు లేదా ద్వీలింగ పువ్వు యొక్క వరాగం అదే మొక్క యొక్క స్త్రీ పువ్వు (పువ్వు) లేదా ద్వీలింగ పువ్వును స్త్రీ వరాగంపై పడినమా ఆ క్రియను స్వక్రియనే అంటారు.

ఒక మొక్కలో పువ్వు యొక్క వరాగం మరొక మొక్క యొక్క పువ్వులోని శలాకాగ్రంథి పడితే దీన్ని పరదీయ వరాగ స్పర్శ (cross pollination) అంటారు. వరాగ స్పర్శ అనేక విధాలలో జరుగుతుందని తెలుపబడింది. భద్రాక్షి పువ్వు (విభూతి లేదా నాల్గు గంటల పువ్వు Four O' clock flower - Mirabilis)లో కేసరదండం ఆ పువ్వు యొక్క శలాకాగ్రంథిపై పడి, వరాగకోశాన్ని పీల్చి, వరాగాన్ని శలాకాగ్రంథిపై పట్టాడు. సూర్యకాంతం, మందారాలలో శలాకాగ్రంథి వరాగకోశంపై వారి వరాగం పొందుతుంది.

గోరవ, పువ్వులో (Ixora) శలాకం, పెరిగేటప్పుడు పత్రదళానికి అంటుకొని ఉన్న అంబకోశం ద్వారా వెల్లుంది. ఆ విధంగా గాలిలో ఎగిరేటప్పుడు, వరాగ స్పర్శ జరుగుతుంది. ఈ రకపు వరాగ స్పర్శ యాంత్రికమైంది (mechanical). వరాగాలు గాలి ద్వారా వెదజల్లి శలాకాగ్రంథిపై పడుతుంది. ఇటువంటి చోట్ల పువ్వులు సామాన్యంగా, రంగు రంగులుగా వుండవు. కీటకాల్ని ఆకర్షించడానికి రంగు కావాలి. గాలి ద్వారా వరాగస్పర్శకు కీటకాలు అవసరం లేదు. అందుచేత రంగు అవసరం లేదు. గడ్డి, ధాన్యాలు, వెదురు, చెరుకు మొదలైన మొక్కలలో గాలి ద్వారానే వరాగస్పర్శ జరుగుతుంది.

వల్లిస్నేరియ (Vallisneria) అనే జలసస్యంలో నీటి చలనం ద్వారా వరాగ స్పర్శ జరుగుతుంది. కాని నీటి నుంచి బయటకొచ్చే పువ్వులలో (కమలం మొదలైన వాటిలో) వరాగస్పర్శ గాలిద్వారానో, కీటకాల ద్వారానో జరుగుతుంది. అనేక సస్యాలలో వరాగ స్పర్శ కీటకాల ద్వారానే జరుగుతుంది. ఇటువంటి పువ్వులు పైన పేర్కొన్నట్లుగా రంగు రంగులుగా వుంటాయి. కీటకాల్ని ఆకర్షించడానికి రంగు ఒకటికాకుండా, కొన్ని పువ్వులు గంధం, సువాసన వెదజల్లి, కీటకాలు వచ్చేటట్లుగా చేసుకొంటాయి. ఈ గంధాన్ని చల్లడానికి కొన్ని ముడులు (ముళ్ళు) ఉంటాయి. వచ్చిన కీటకాలు అసంతృప్తకాకుండా, ఈ పువ్వులలో మకరందం (nectar) ఉంటుంది. ఈ మకరందం ఉన్న చోటుకు కీటకాలు వాలినప్పుడు, వాటి శరీరానికి వరాగం అంటుకొంటుంది. మరొక పువ్వుపై ఈ కీటకం మకరందాన్ని పీల్చుకోడానికి వాలినప్పుడు దానికంటుకొన్న వరాగం ఆ పువ్వు యొక్క

శలాకాగ్రాన్నే అంటుకొంటుంది.

పువ్వుల రంగులు దట్టంగానూ, దళాలు వివిధ రూపాలు దాల్చినంత కీటకాలకు ఆకర్షణ ఎక్కువ అవుతుంది. సామాన్యంగా ఎక్కువ దట్టమైన రంగున్న పువ్వుల్ని సీతాకోక చిలుకల్ని, ఎరుపు, నీలం, తెలుపు పువ్వులను, తేనెటీగలను, వసుపు పువ్వులను తుమ్మెదలను, చెడువాసనున్న పువ్వులను దోమలను ఆకర్షిస్తాయి. పువ్వుల రంగులు, వాటి దళాలకే ఉండాలని లేదు. పువ్వుల ఇతర భాగాలనూ రంగులను కలిగి ఉండొచ్చు. ముసిండిలో ఒక పువ్వువలెనే రంగును కలిగి ఉంటుంది. వెనుక తెలుపబడింది. బూగ్స్ విలియం పాయ్స్ సీటియలో బ్రాక్కులు రంగును కలిగి ఉంటాయి. పువ్వుల మకరందాన్ని అనేక సంయుక్త రంభపు పువ్వులలో కారుస్తాయి. ఈ మకరందం ఒక విశేష మకరంద గ్రంథి (Nectary) లో తయారవుతుంది. ఈ గ్రంథి సామాన్యంగా పువ్వు లోపల, లోతుగా ఉంటుంది.

పువ్వుల గంధం : కొన్ని మొక్కలలో సంత, లేదా రాత్రులలో పువ్వులు వికసిస్తాయి. చీకటిలో మొక్కలు రంగుద్వారా కీటకాల్ని ఆకర్షింపజాలవు. అందుచేత ఈ రకపు పువ్వులకు రంగులు అవసరం లేదు. ఇవి సామాన్యంగా ప్రాద్దుతే పూస్తాయి. ఈ పువ్వులలో ఆకర్షితయై యైన రంగులకు బదులుగా ఈ పువ్వులలో సువాసన కీటకాల్ని అందులోనూ సీతాకోక చిలుకల్ని (Moths) ఆకర్షిస్తాయి. అందువల్ల సామాన్యంగా రాత్రి వికసించే పువ్వులు సువాసన కలిగి తెల్లగా వుంటాయి. సామాన్యంగా కీటకాల ద్వారా వరాగస్పర్శ జరిగేడి, పువ్వులలో వరాగం, జిగురు, లేదా అంటు, లేదా ముళ్లతో కూడి ఉంటుంది. కీటకాలకీ ఆ పువ్వుల వరాగం సులభంగా అంటుకొంటుంది.


### పువ్వుల గుత్తులు (Inflorescence) పుష్ప మంజరి

కొన్ని మొక్కలలో గుత్తుల చివరనో, ఆకుల కంకులలోనో, పువ్వుల ఒంటొంటిగా పెరుగుతాయి. మందారం, సంవంసుల వలె మరికొన్ని మొక్కలలో అనేక పువ్వుల గుత్తులుగా (గుంపుగా) పెరుగుతాయి. సూర్యకాంతం వలె ఈ గుత్తులు కూడ మొక్క చివరనో, ఆకు అక్షం నుంచో, బయలుదేరవచ్చు (పూస్తాయి) ఈ గుత్తులనుంచి కొనలు చీలుతుంటాయి.

ఈ కొనలు లేదా ఈ చీలికల విన్యాసం (arrangement) ప్రకారం పువ్వుల గుత్తులను కొన్ని వర్గాలుగా విభజించున్నారు. ముఖ్యంగా పువ్వుల గుత్తులలో రెండు గుంపులున్నాయి (రెండు రకాలున్నాయి). 1. అంత్కారంభాలు - సైమోస (Cymose) పుష్ప మంజరి 2. మధ్యారంభాలు - రేసిమోస్ (Racemose) పుష్ప మంజరి.

పేరు సూచించేటట్లుగానే అంత్కారంభాల గుత్తులలో - పువ్వులు చివర అంత్కారంలో ఆరంభమై, ఆ తర్వాత క్రింద లేదా మధ్య భాగపు పువ్వులు క్రమంగా వికసిస్తాయి. మల్లెలలో ఉండేటట్లుగా, చివర పువ్వులు వికసించడం చేత ఈ పువ్వుల గుత్తులు ముందుగా పెరగవు. పొడవు పెరగవు. ఈ విధంగా ఉండటం చేత ఈ గుత్తులో పువ్వుల సంఖ్య నిర్దిష్టంగానూ, ఖచ్చితంగా (సమానంగానే) ఉంటాయి.

మధ్యారంభ గుత్తులలో క్రింద లేదా మధ్య నుంచి పువ్వులు వికసిస్తాయి. గుత్తిలో చివర్లు ముగిసిపోదు.




1.59






1




2



4



7





8



10

1-60

1-4, 7-10



1.60

అందుచేత ఇవి పెరుగుతూ, పొడవు అవ్వవచ్చు. అందుచేత గుత్తులలో పువ్వుల సంఖ్య అనిర్దిష్టం. సంఖ్య ఖచ్చితమైందికాదు. దంటి, పాల్వాయి, మొదలైన పువ్వులు ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఈ రెండు రకాల పువ్వుల గుత్తులలోను వైవిధ్యముంది. అనేక అంతర్భేదాలున్నాయి.

**అంత్యరంభాలు (చిత్రాలు 1.59, 1-3 Cymes)**

1.59 పువ్వుమంజరి - పువ్వు గుత్తుల (గుచ్చాల) వైవిధ్యం అంత్యరంభాలు. 1. బైపారస్ 2. హెలికాయడ్ (గుండంగా) 3. స్కాల్సియాయడ్ (చీలికవలె).

మల్లెలో మూడే పువ్వులు చివరిది పెద్దది (జ్యేష్ఠ మొదట వికసిస్తుంది) అనంతరం మళ్ళీ ప్రక్కలున్నవి. క్రింద ఉన్నవి, చిన్నవి. వికసిస్తాయి. ఈ విన్యాసం సరళమైనందున దీన్ని సరళ విన్యాసం - సరళ సైము అని అంటారు (Simple cyme)

విషమ దారిలో ఒక్కొక్క గుత్తి చివర ఒక్క పువ్వు ప్రక్కలలో మల్లెల వలె రెండు చిన్న పువ్వులు ఉంటూ ఉంటాయి. రెండు చీలికల కొనలు (కొనలు) బయలుదేరుతాయి. ఈ చీలికల కొనలలో పువ్వులు, దాని ప్రక్కనుంచి మరి రెండు చీలికల కొనలు బయలుదేరుతాయి. ఈ రకపు పువ్వుల గుత్తులను (గుచ్చలను) బైపారస్ లేదా డై బేసియల్ సైమే. (Biparous or Dischiasial cyme) లేదా నిజ సైము (true cyme) అని అంటారు. పింకు, తెగ, బోగన్ విలియా, గోరవిలో ఈ రకపు పువ్వుల గుచ్చాలంటాయి. ప్రధాన కొన చివరన పువ్వు, దాని చుట్టూ చీలికల పువ్వులు ఏక కాలంలో వికసిస్తాయి. ఈ రకపు గుచ్చలను (గుత్తులను) మల్టీపారస్ లేదా పాలిబేసియస్ సైము (Multiparous or polychasial cyme) అని అంటారు.

కొన్ని మొక్కలలో ముఖ్య ఆశ్రపు చివర ఒక పువ్వు వికసిస్తుంది. (మొలకెత్తుతుంది). ఒక చీలిక కలుగజేస్తుంది. కొంత కాలమైన తర్వాత ఈ చీలికల చివరన ఒక పువ్వు, మరొక చీలికలు వస్తాయి. (మొలకెత్తుతాయి) వీటిని యూనిపారస్, మనోబేసియస్ సైము (Uniparous or Monochasial cyme) అని అంటారు. ఇందులో రెండు రకాల పువ్వులు, చీలికలు ఒకే పార్శ్వంలో ప్రక్కన పెరుగుతూ ఉంటాయి. దిగ్వియ డెల్లిలో (హెమెరోకాలిగ్) మొదలైన వాటిలో త్రోసిడివంటి ఈ పార్శ్వ గుత్తులను హెలికాయడ్ సైము (Helicoid cyme) అని అంటారు. పత్తి, పీలియోట్రాస (Heliotrope) ఫ్రీసియ (Freesia) పురుగులు వట్టి చెట్లలో గుత్తులు, చీలికలు, ఎడంవైపున, కుడివైపున ఒకటైన తర్వాత ఒకటి (వర్తాయంగా) చీలుతుంది. ఈ రకపు గుత్తులను స్కాల్సియాడ సైము (Scropioid cyme) అంటారు.

**మధ్యరంభాలు (చిత్రాలు 1.60, 1-10) (Racemose Inflorescence)**

1.60 1-4, 7-10. మధ్యరంభ పువ్వు గుత్తులు. 1. గోసే లేదా రేసము 2. మిశ్రమంజరి లేదా ప్యానికల్ 3. తేన లేదా ధ్రుకు 4. తీగల పిల్లితోక - క్యాబ్రిరా (కెనవ, కెరెడినంత) A. ప్రి పువ్వు B. పురుష పువ్వు C. అనుబంధం 6. తాళ గుచ్చంలాంటి పురుష పువ్వు - అనుబంధం D. పైత (మూసడి పిట్ట/తట్ట) 7. పువ్వు చిత్రం (గొడుగు) కారింబు 8. చీలికలు గొడుగు (చిత్రం) (అంబెల్ - సంయుక్తం) 9. అంబెల్ (సరళి) 10. చెండు మంజరి (క్యాపిట్టలం).

అవలు, ముల్లంగి మొదలైన వాటిలో గుచ్చాల మధ్య అక్షం నుంచి ప్రక్కన అనేక పుష్పాలు బయలుదేరుతాయి. చిన్నది లేదా క్రింది నుంచి ప్రక్కన అనేక పుష్పాలు బయలుదేరుతాయి. చిన్నది లేదా క్రింది పుష్పాల తొడిమ పొడవుగా ఉండి, పైనున్న పుష్పాల తొడిమ క్రమేణా చిన్నదవుతూ పెరుగుతాయి. ఇటువంటి పుష్ప గుచ్చాలను రేఖము (Receme) అని అంటారు. గుర్రమొహరీలో, వనసలో మధ్య అక్షం నుంచి పుష్పాలకు బదులుగా ఈనలు కాడలు చీలికలు చీలి, ఈ చీలికలు పుష్పాలను పైకి త్రోస్తాయి. వీటిని సంయుక్త మధ్యాంధ్రం, మిశ్రమంజరి, ప్యానికల్ (Panicle) అని అంటారు.


దండు, అడుసోగ్ (Adathoda) ఉత్తరాణిలో ఇదే క్రమమున్నూ పుష్పాలకు తొడిమ ఉండదు. ఈ రకపు గుత్తులను కెనె, కరికీ, స్ట్రై అని అంటారు. ఈ రకపు కంకులు గడ్డి, ధాన్యాలలో చిన్నవిగా వుంటాయి. ఈ చిన్న కంకులను మిశ్రమంజరి అనియో, కంకీలగాగో వేరి ఉంటాయి.

పొన్నెర, అకాలిఫా (Acalypha- రంగు ఆకుల చెట్టు) లలో పుష్పాలు కంకీలుగా ఉన్ననూ కంకీల మధ్య అక్షం లేదా దిండు (Main axis) పొడవుగా వేరి జతగా ఉంటాయి. (జోడించి ఉంటాయి). వీటిని క్యాటికీన్ (Catkin - పిల్లికోక తీగలు - తోక) అని అంటారు. కెనె, కెలేడియో, అరటి, వక్క, కొబ్బరి మొదలైన తాడులలో పుష్ప గుచ్చాలు కంకీలుగానే వుంటాయి. కాని మధ్య దిండు (అక్షం)న బాతు కొండిలాంటిది ఉంటుంది. అందుచేత ఈ రకపు గుచ్చాలను పొన్నెరటి - స్పాడిక్స్ (Spadix) అంటారు. మునుగును మట్ట - స్పేత్ (Spathes) అని అంటారు. కాండిటఫ్స్ (Candytuft) చిక్కడు వీటిలో గుత్తుల దిండు చిన్నది. క్రింది పుష్పాలు తొడిమ పొడవుగా ఉంటుంది. చిరున్న పుష్పాలతో తొడిమ చిన్నదిగా (పొట్టిగా) ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఉండటం చేత పుష్పాలన్ని ఒకే మట్టానికి, (ఒకేస్థాయిలో) ఉంటాయి. ఇటువంటి పుష్పాల గుత్తులను (ఫలం) గొడుగు, కారింబ్ (Corymb) అని అంటారు. కొత్తబరిలోనూ ఇలాగే ఉంటుంది. కాని ఇందులో చీలికలు చీలుంటాయి. అందుచేత దీన్ని సంయుక్త అంబెల్ అని జీలకఱ్ఱలోని వాటిని సరళ అంబెల్ (Compound and simple umbels) అని వ్యవహరిస్తారు.


సూర్యకాంతి, చెండుమల్లి, (గుండుమల్లి), కుసుమ, జినియ (Zinnia), గోగుపువ్వు, కన్నూరి మొదలైన పుష్పాలలో గుత్తుల ముఖ్య దిండు (పుష్పపాత్ర - receptacle - పుష్పననం) చాలా చిన్నదిగా వుంటుంది. అంతేగాదు, చచ్చుగా, పుష్పాలు చిన్నవిగాను ఉంటాయి. తొడిమ (కాడ) ఉండదు అందుచేత పుష్పగుచ్ఛం బంతిలాగ గుండ్రంగా ఉంటుంది. వెలువలున్న చిన్న పుష్పాలు మొదట వికసిస్తాయి. దూరం నుంచి ఈ చిన్న పుష్పాలు మొదట వికసిస్తాయి. దూరం నుంచి ఈ చిన్న పుష్పాలు సమూహం ఒకే పుష్పలాగ కనిపిస్తుంది. కాని దగ్గరకు వెళ్లి చూస్తే, బయట చుట్టూ పుష్పాలు సమంగా (పరిధి పుష్పాలు, కేంద్ర పుష్పాలు, కేపుష్పాలు - Ray florets) లోపల చుట్టూ గొట్టంలాగ (డిస్కోపుష్ప - Disc florets) ఇటువంటి పుష్పాల గుత్తులను చెండు గుత్తులు. చెండు మంజరి క్యాపిటలం (Head or capitulum) అని అంటారు.

## ఫలం, పండు (Fruit)



పుష్పంలో పరాగ పురుష జరిగి, గర్భాధారణైన తర్వాత, అండం బీజంగా పెరగడం మొదలుపెడుతుంది. దీని జతకు అండకోశమూ, కొన్ని సందర్భాలలో ఇతర భాగాలూ మార్పు చెంది, ఫలంగా (పండుగా)



1.61



1.62



1.63

పెరుగుతుంది. అందువేత ఫలాన్ని రూపాంతరం పొందిన అండకోశమనీ, దీజాన్ని (చిత్తనాన్ని) వికాసం (వికసించిన) అండమనీ భావిస్తుంటారు. అంటే ఫలం లేదా పండులో రెండు భాగాలుంటాయి. 1. అండకోశం రూపాంతరం పొందిన బాహ్య భాగం - ఫలావరణ - పెరికార్పు (Pericarp) 2. అండం పెరిగిన దీజపు భాగం.

అన్ని పళ్లలోనూ - చిత్తనాలు ఉండే ఉంటాయని చెప్పడానికి వీలులేదు. చిత్తనాలు లేని పళ్ళు ఉంటాయి. అరటి - దీజరహిత, వారిజ, ద్రాక్ష (Seedless oranges, and grapes) వీటిలో చిత్తనాలుండవు. ఈ పళ్లలో అండకోశపు చిత్తనం (బాహ్యవరణం) మాత్రమే రూపాంతరం పొందుతుంది. ఇటువంటి పళ్లను నిర్గంగ జన్య ఫలం (Parthenocarpic fruit) అంటారు. కాని అనేక పుష్పాలలో గర్భాధారణ కాకపోతే, అండకోశం పెరగక ఎండిపోతుంది.

ఫలావరణం (Pericarp) (పెరికార్పు) ఇది అండకోశపు చిత్తు యొక్క రూపాంతరం లావుగా ఉట్టి ఉండొచ్చు. లేదా తేలికగాను ఉండొచ్చు. ఉట్టి ఉన్న ఫలావరణంలో మూడు భాగాల్ని గుర్తించవచ్చు 1. వెలుపలి (బాహ్య) భాగం బాహ్యవరణం - పండు తోలు (చిప్ప) - ఎపికార్పు (Epicarp) 2. మధ్యవరణం - పండులోని కండ - మిసో కార్పు (Mesocarp) 3. అంతరావరణం - లోపలి భాగం - ఎండో కార్పు (Endocarp) ఈ అవరణం నారింజలో ఉండేటట్టు వలువని పొరగా ఉండొచ్చు. లేదా కొట్టిరి, మామిడి వలె గట్టిగా లేదా దింకలాగ గట్టిగా ఉండొచ్చు. (చిత్రం 1.61).


1.61 ఫలం (పండు) మామిడి పండు (అడ్డుకోత) 1. పండు చిప్ప (పై తోలు) ఎపికార్పు) 2. పండులోని కండ (మిసోకార్పు) 3. లోపలిభాగం డొక్క (ఎండోకార్పు) 4. దీజదళం (కాటలిడన్).

కొన్ని పండ్లలో ఫలావరణం ఈ విధంగా నిర్దిష్ట భాగాలుగా వుండవు. అండకోశపు భాగం మాత్రం రూపాంతరం పొంది పండుయితే, అటువంటి వాటిని నిజఫలం (True Fruit) అనీ, అండకోశంతో పాటు పువ్వులోని ఇతర భాగాలూ (తొడిమ, పుష్పపాత్రం, పుష్ప పత్రం, మొదలైనవి) రసభరితమై పెరుగుతూ ఉంటే అటువంటి పళ్లను మిథ్యాఫలం, సూడోకార్పు (Pseudocarp, false or spurious fruit) అని వ్యవహరిస్తారు.


కొండ ఉసిరిలో, కల్లిగ, మొదలైన వాటి ఫలాలలో పుష్పపత్రం నిండుకొని పండవుతుంది. జామ, బే రికాయ (మరజామ) పుష్పపత్రం అండకోశం చుట్టూ కండగా పెరుగుతుంది. జీడి పండు (1.62 A & B) పువ్వు తొడిమ, పుష్ప పత్రం, ఉట్టి రసభరితమవుతుంది. ఇందులో నిజఫలభాగం పైనున్న దీజకాయ - దీజ తోలు (nut - జీడికాయ) పెంతుగల సీసాఫలంలో అనేక నిజదీజాలు చేరి కండతో మిథ్యాఫలంగా ఉంటుంది. అంజార (కర్పూరం) అనావన వీటిలో పూర్తి పుష్పం గుత్తులు కండతో నిండి మిథ్యాఫలమవుతుంది.

1.62 మిథ్యాఫలం (సూడోకార్పు) A. జీడి 1. దీజకాయ 2. కండ నిండిన పువ్వు తొడిమ (పుష్ప పత్రం) B. జీడి (మంతజీడి) 1. దీజకాయ 2. పుష్ప తొడిమ.


ఫలాలలో మూడు విధాలు: 1. పుష్ప యొక్క అండకోసం లేదా ఇతర భాగాల నుంచి ఒకే పండు రూపాంతరం దాన్ని సరళ ఫలం (Simple Fruit) అంటారు. ఇది నిజఫలమై ఉండొచ్చు. లేదా విధ్యాఫలమై ఉండొచ్చు. కాని ఏక ఫలమై ఉండాలి.



1.64



1.65



1.66



2. ఒకే పువ్వు యొక్క అనేక అండకోశాల నుంచి (ద్వారా) వళ్లు పెరిగితే, (సీతాఫలం - సంవంగి వలె) ఇవి సమూహ ఫలాలు - చేరి ఏర్పడు ఫలాలు (Aggregate Fruit) చిత్రం 1.63. 1-3.

1.63 1. సరళ ఫలం టోమాటో, 2. సమూహ ఫలం - సీతాఫలం 3. అంజార ఫలాల కత్తిరింపు (పొడవు చీలిక).

3. సంపూర్ణ పువ్వు గుత్తలు ఒక వండుగా రూపొందితే - వనసలాగ - అది సంయుక్త ఫలం (Composite or Multiple fruit).

సరళ ఫలం : వీటిలోను వలు బేధాలున్నాయి. రసం లేదా కండలేని ఎండిన ఫలాలు (Dry fruits) బఠాణి లాంటివి. (1.64) కండ లేదా రసం నిండిన కండ ఫలాలు (Fleshy fruits). ఎండిన వలాలలో కొన్ని చిప్చి, బీజాలను చల్లిన చిట్టిన ఫలాలవుతాయి. బీజ విధారక వళం (dehiscent fruits - స్పృటక ఫలం) మరికొన్నింటిలో బాహ్యవరణ చిట్లకుండా క్రుల్లి, లేదా వాడి బీజాలను బయటకు తోస్తాయి. అభేద ఫలాలు (Indehiscent Fruits)

1.64 1. ఎండు ఫలాలు - బఠాణి కాయ (లెగ్యూము) 2. కండ ఉన్న ఫలం - పోమ - జామ 3. అభేది ఫలం - క్యాగియాఫ్ఫిన్ - మొక్కజొన్న.

బఠాణి, కందులు మొదలైన చిట్టడి ఫలాలు గడ్డి బీజాలు, క్లెమాటిస్ (Clematis) మువ్వలు సూర్యకాంతి జీడి బీజాలు ఇవన్నీ అభేద ఫలాలు (చిత్రం 1.65 1-6).

1.65 విధారక మరియు అభేది ఫలాలు 1. అవాలు 2. వత్తి 3. భద్రాక్షి పువ్వు (నాల్గు గంటల పువ్వు - సంధ్య మల్లీ) A. ఫలం B. ఇన్ఫ్లూకేర్ (రాతిన పువ్వుల తొడిమి) C. కుదురు ప్యాకెట్టు, 4. సూర్యకాంతం 5. అత్తివత్తి 6. గోగుపువ్వు (జాతి). కొన్ని ఫలాలలో ఒక్కొక్క బీజమే ఉండే భాగాలు చిట్టి బీజాన్ని బయటకి తోస్తాయి. దీన్ని హైసోకార్పు (Schizocarp) అని అంటారు (1.66 1-2) ధనియాలు, జీలకర్ర, క్యారట్టు.


1.66 1. ధనియాలు (కొత్తిమీరి బీజాలు) 2. ధనియాలు చీలిన రీతి.

కండ ఫలాలు : వీటిలోనూ కొన్ని ప్రబేధాలున్నాయి. మామిడి, పీచు, ప్లమ్ (Plum) కొబ్బరి మొదలైన ఫలాలను డ్రూప్ ఫలం (drupe) అని వ్యవహరిస్తారు. వీటి ఫలావరణలో మూడు భాగాలుంటాయి. వీటి అంతరావరణం గట్టి (చిప్ప, పొట్టు) దీని గట్టి ఫలాలు పొట్టున్న ఫలాలనీ (Stone Fruits) రాతి ఫలాలు అని వ్యవహరిస్తారు. (చిత్రం 1.67a). టోమాటో కండతో కూడినది (బేరి). 1.67 b.


గుమ్మడి మొదలైన బోలు ఫలాలలో - పిపో (Pepo)లలో చిత్తనాలు కండకు అంటుకొని ఉంటాయి. బోడి (గట్టి) పువ్వు వత్తం బాహ్యవరణం కొత్త కండ వట్టిన భాగం. (చిత్రం 1.67c) దోసకాయ (Pepo)

జామ, మరజామ (బేరికాయ) మొదలైనవి పోమ ఫలాలు (Pome fruits) వీటి కండ పువ్వు పాత్ర రూపాంతరం పొందిన భాగం నిజమైన ఫలం లోపలుంటుంది. చిత్తనం చుట్టూ (చిత్రం 1.67 d).


జామ (పోము) పొడవుగా కత్తిరించ బడింది. నిమ్మ, నారింజ మొదలైన ఫలాలలో బాహ్యవరణ చిప్ప




1.67



1.68B



1.68A



1.69

లోపలి భాగమే (తెల్లగా స్పాంజ్‌లాగుండే పార్) మధ్యావరణం, తొనలే విభాగాలైన అంతరావరణం. ఇటువంటి ఫలాలను హెస్పెరిడియం (Hesperidium) అని అంటారు. (చిత్రం 1.67 e). నారింజ - హెస్పెరిడియం.

1.67 a. ప్లమ్, పీచు ఫలాలు b. టొమాటో కండతో కూడినది (టెలిరి) c. దోసకాయ (పెపో) d. జామ పాడవుగా కోసినది 1. పెరికార్పు, 2. విత్తనం, 3. కండ, 4. కార్టిక్స్, 5. పూతొడిమ చెండు, e. నారింజ (హెస్పెరిడియం)

## విత్తనం

గర్భం ధరించిన అండం పెరిగి విత్తనమవుతుంది. అనేక విత్తనాలలో ముఖ్యంగా రెండు బాగాలను గుర్తించవచ్చు. 1. భ్రూణం (embryo) 2. విత్తనాల పొడుగు (విత్తనపు కవచం - Seed coat). విత్తనపు కవచంలో రెండు పొరలు 1. బాహ్య కవచం (బయట) - బాహ్య దోగులు - టెస్టా (Testa) 2. లోపలి కవచం - లోపలి దోగులు - టిగ్మెన్ (Tegmen).

లోపలి కవచం సామాన్యంగా తెల్లగ, తేటగా ఉంటుంది. దీని పని లోపలుండే భ్రూణాన్ని కాపాడడం. బలాణి, ఆముదం, మొదలైన అనేక బీజాలలో బీజ కవచాలలో ఒక చిన్న గుంటవడి ఉంటుంది. ఈ గుంటే బీజపు తొనలు. అండ కోశానికి అంటిన భాగం - బీజనాభి - హైలం (Hilum) నెల చెక్కుడు, డబుల్ బీన్స్, విత్తనంలో ఇది స్పష్టమైన వెడలైనది ఉంటుంది. ఈ నాభి క్రింది కొనలు సూక్ష్మమైన కన్నం (సంధును) చూడొచ్చు. ఇదే బీజరంధ్రం. మైక్రోపైల్ (Micropyle) - గాలి, నీరు, భ్రూణాని లోపల చేరే ద్వారం. నీటిలో కొంతకాలం నానిన బీజాన్ని అదుముతే దాని ద్వారా నీరు, గాలి, గుళ్ల వెలువల వచ్చేదాని చూడొచ్చు.

బీజపు కవచం బలిసినప్పుడు, లోపలుండే భాగమే భ్రూణం - మునుముందు మొగ్గ అయ్యే భాగం, చిక్కుడు మొదలైన ద్విదళాలలో (dicotyledons) ఇది రెండు ముక్కలు (భాగాలు) లేదా బీజదళం లేదా మొలక - క్యాటిలేడన్ (cotyledons) అయ్యుంటాయి. ఈ దళాలకు అంటుకొని ఒక మొలకుంటుంది. మొలకల మొనదేలిన భాగమే భ్రూణమూలం - ప్రథమ మూలం - రాడికల్ (Radicle) మునుముందు వేరుగా పెరిగిడి భాగం. రెండు బీజదళాల మధ్య రక్షితమై యుండెడి, సూక్ష్మమైన గడ్డిపోచ (గరికవలె) ఉన్న భాగం బీజాంకురం - ప్రథమ కాండం - ప్లూమ్బూల్ (plumule) - మునుముందు ప్రకాండంగా పెరిగిడి భాగం (చిత్రం 1.68 A).


1.68 A. ద్విదళ బీజం. చిక్కుడు 1. బాహ్య తోలు చిప్ప 2. ప్రథమ కాండం (పూమ్బూల్) 3. ప్రథమ మూలం (రాడికల్) 4. బీజనాభి (భాగాలు) లేదా హైలము 5. బీజ రంధ్రం (మైక్రోపైల్) 6. బీజదళం.

బీజదళాలు కాకుండా, ఆముదం, సీతాఫలం మొదలైన బీజాలలో ఉబ్బి ఉన్న ఒక భాగముంటుంది. దీన్ని భ్రూణాహారం. (endosperm) ఎండోస్పెర్ము అని అంటారు. ఇది లేత మొగ్గ. సొంతంగా తన వేరు, ప్రకాండాల ద్వారా ఆహారాన్ని పొందే వరకు దానికి ఆహారాన్ని అందివ్వడం చేత దీన్ని భ్రూణాహారమని పిలువబడుతోంది. (చిత్రం 1.68 B.).

1.68 B. ఏకదళ బీజం. (గోధుమ) పాడవుగా చీల్చబడింది. 1. పెరికార్పు 2. భ్రూణాహారం 3. భ్రూణం.



1-70



1-71



1-72



1-73

46B

ఏక దళాలలో (monocotyledons) వరి, గోధుమలు మొదలైన ధాన్యపు బీజాలు - ఇటువంటి వాటిలో బీజ నిర్మాణం కొద్దిగా వేరుగా వుంటుంది. వరి 'చిత్తనం' చిత్తనాలు కావు. అది ఫలం ఒక చిత్తనమున్న ఏక బీజ ఫలం. దీని వెలుపల తోలు - పొట్టు భాగం - బీజ కవచం కాదు. అది వరి పువ్వు యొక్క బ్రాక్టులు దీన్ని తుష లేదా గ్లామె అని అంటారు (Glume). ఈ పొట్టును బిల్డే, చిత్తనం చుట్టూ ఉన్న ఎర్ర రంగు పొర - తప్పడు - ఇదే నిజమైన బీజకవచం భ్రూణానికి చేరినట్లుగా గురాణి ఆకారంలో ఉండే ఒక ఒక బీజదళముంటుంది. దీన్ని స్కటిలం (Scutellum) అని అంటారు. భ్రూణం, భ్రూణాహారం, ఒక పక్కకి ఉంటుంది. వరిని దంచినప్పుడు చాలా త్వరగా ఈ భ్రూణం, గురాణి ఆకారంలో ఉన్న బీజదళం వేరుపడుతుంది. మిగిలిన భాగమే బియ్యం - భ్రూణాహారం.

అన్ని చిత్తనాలలోనూ భ్రూణాహారం ఉండాలన్న అవసరం వేరు. చింత, వప్పు ధాన్యాలు మొదలైన వాటిలో భ్రూణాహారం ఉండదు. భ్రూణాహారపు పనులను - లేత మొలకలకు ఆహారాన్ని అందించే పనిని బీజదళాలే చేస్తాయి.

భ్రూణాహారమున్న బీజాలలో బీజదళాలు నీటిని పీల్చుకొనే అంగాలుగా వుంటాయి. అంతేకాకుండా మొలకలకు ఉత్తేజాన్ని ఇచ్చే జోడక వదార్థాన్ని తయారు చేస్తుంది. కాని ముఖ్యంగా బీజదళపు పని భ్రూణాన్ని రక్షించడమే. చిత్తనం మొలకెత్తడంలో రెండు రకాలున్నాయి. చింత, పత్తి, ఫరంగి, ఆముదం, దోసకాయ మొదలైన వాటిలో బీజం మొలకెత్తినప్పుడు బీజదళాలు మట్టి త్రోసుకుంటూ భూమి పై భాగానికి వస్తాయి. ఈ భూమి పైనున్న మొలకను ఎపిజీయల్ (Epigeal) మొలకని అంటారు. (చిత్రం 1.69).



1.69 ఆముదపు చిత్తనాల మొలకలు (భూమి పైనున్న మొలకలు - ఎపిజీయల్) 1. బీజకవచం 2. భ్రూణాహారం 3. బీజదళాలు 4. ఆకు 5. హైపోకాటిల్ 6. హైపోకాటిల్ (బీజదళపు అక్షం).

వేరు శెనగ, మామిడి, శెనగ, మొదలైన వాటిలో బీజదళాలు భూమిపై భాగానికి రావు. భూమిలోపలనే లేదా నేల సమ మట్టంలో ఉంటాయి. ఇటువంటి భూమి లోపలి మొలకల క్రమాన్ని హైపోజీయల్ (Hypogeal) మొలకని అంటారు. (1.70) సామాన్యంగా ఏకదళ సస్యాల మొలకలు ఈ రకానికి చెందినవి. కాని ఉల్లిపాయలు, ఏకదళమైనవప్పటికీ బీజదళం నేలపైన కనిపిస్తూంటుంది. (1.71).

1.70 మొక్క జొన్న మొలక (భూమి లోపల - హైపోజీయం) 1. ప్రథమ కాండం 2. ప్రథమ కాండపు కవచం (కోలియం టైట్ - Coleoptile) 3. ప్రథమ మూలపు కవచం (కోలియోరైజ్) (Coleorhiza).

1.71 ఉల్లి చిత్తనాల మొలక 1. బీజం 2. బీజపు పొడవు (నిలువ) చీలిక 3-9 మొలకల అంతాలు a. బీజ కవచం. b. భ్రూణాహారం c. ప్రథమ మూలం d. బీజదళం e. ప్రథమ కాండం f. హైపోకాటిల్ g. బొంత వేరులు (వేరులబొంత). కొబ్బరి మొలకల చిత్రం 1.72 లో చూపబడింది.


1.72 కొబ్బరి మొలక 1. టెంకాయ (కొబ్బరి కాయ) నిలువుగా కత్తిరించబడింది. (భ్రూ) - భ్రూణం (అ) - భ్రూణాహారం (బి) బీజపు కవచం (క) కరటం (వల్రాలు) 2. పెరుగుతున్న కొబ్బరికాయ వేరు. 3. పెరుగుతున్న కొబ్బరికాయ, నిలువు కత్తిరింపు బీజ - బీజదళం.




C



D






E



F





172

## బీజ ప్రసారం ( విత్తనాల విస్తరణ) (Seed Dispersal)

ప్రకృతిలో నిత్రనాలు సామాన్యంగా తల్లి చెట్టు క్రిందే మొలకెత్తి పెరగజాలదు. ఈ విధంగా పెరిగితే దానికి కావల్సిన ఆహారం, వెలుతురు, నీరు, గాలి లభ్యమవ్వదు. అందుచేత విత్తనాలు తల్లి చెట్టు నుంచి అయినంత దూరంగా విస్తరించి పెరగడానికి కొన్ని ఏర్పాట్లను, మార్పులను చేసుకొని ఉన్నాయి. విత్తనాలు ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటుకు వెళ్లడానికి ముఖ్యంగా ఈ క్రింద వివరించిన ఏర్పాట్లున్నాయి.

1. చెట్ల విత్తనాలు విస్తరించడం, కరణ కుండలాలు, ఆముదం, పారిజాతం, ఫ్లాక్సు (Phlox) మొదలైనవి ఉన్నట్లుండి చిట్టి కొన్ని అడుగు దూరాన్ని విత్తనాల్ని విసిరేస్తాయి. (వెదజల్లుతాయి). ఎండిన కరణ కుండలపు కాయ ముట్టుకోగానే చిట్లుతుంది. భమనాకు (Ruellia) కాయ, వర్షం కురిసిన వెంటనే చిట్లుతుంది. సుటికం (కనకాంబరం) ఫ్లాక్సు, ఉత్తరేణి, కాసులసరం (Andrographis) మొదలైనవి ఎండినప్పుడు చిట్లుతాయి. ఎండ బాగా ఉన్నప్పుడు ఇది చిట్లే శబ్దాన్ని విసవచ్చు. (చిత్రం 1.73).

1.73 చిట్లే కాయలు : భమనాకు కాయ. 1. బీజాన్ని విసిరేసే స్ప్రింగ్.

2. గాలిద్వారా విత్తనాలు వెదజల్లడం : గాలిలో చాలా దూరంగా వెళ్లి విత్తనాలు వెదజల్లడానికి కొన్ని బీజాలలో కొన్ని మార్పులు, ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. సోనేపట్రి, (oroxylum) సింకోన (Cinchona) (మలేరియా రోగనివారకం) వాడి, (Sterosperemum, tetragonum) మునగ కాడ, టెక్కొంమ (Tecoma) మొదలైన విత్తనాలకి రెక్కలుంటాయి. (చిత్రాలు 1.74 a - f) ఈ విత్తనాలు ఒరటుగా, పలుచగా ఉండటం చేతనూ, వీటికి రెక్కలుండటం చేతనూ, గాలిలో చాలా దూరం వెళ్లేవు.


1.74 రెక్కలున్న కాయ బీజాలు; a. సోనపట్రి b. సింకోన c. పాదరి d. మందారరెక్కలు e. మునగకాడ f. దుయ గెలుసు(Dioscorea)

కొన్ని సమయాలలో బీజాలకు బదులుగా ఫలానికి, రెక్కవుండటం కలదు. మాధవీలత, సాలవృక్షం, గోగు, అన్నతముల చెట్టు (Dipterocarpus indicus) కిరీలోభోగి మొదలైన పొటి ఫలాలకి రెక్కలుంటాయి. చిత్రం (1.75 a-e).

1.75 రెక్కల కాయల బీజాలు a. మేనా చెట్టు, b. కిరీలోభోగి, c. దుమ్ము, d. మాధవీలత e. తెల్ల భోగి.

సూర్యకాంతి, చెండు మల్లె మొదలైన వాటిలో పువ్వులు పూత్ర కేశరాలు మార్పు చెందుతాయి. ఈ కేశరాలు. బీజబలసిన తర్వాత కూడా మిగులుతుంది. ఇవి గాలిలో ఎరిగి చివరకి బిజ్జికొంటాయి. ప్యారాచూటలాగ గొడుగులాగ విచ్చుకుంటాయి. ప్యారాచూటలాగ (Parachute) గాలిలో పారాడడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. (వెదజల్లడానికి అనుకూలంగా వుంటుంది).

ఎక్క, కొడమురుకం, (Holarrhena) లేత అరటి, ఎలక్క అరటి, (Alstonia) బూరుగ వీటిలో విత్తనాలకు కేశరాలు ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటాయి. గాలిలో బాగా ఎగరలేవు, బాగా వెదజల్లేవు. కొన్ని మొక్కల విత్తనాలు చాలా సూక్ష్మమైనవి. అగరు, సీకాపువ్వు (orchids)లలోని విత్తనాలు అతి సూక్ష్మలు -



మమ్ములాగుంటాయి. అందుచేత గాలి ఈ విత్తనాలను చాలా దూరానికి విసిరి వేయగలవు. సింకోన విత్తనాలు కొన్ని గడ్డి విత్తనాలు ఈ రకానికి చెందినవి.

3. కొన్ని విత్తనాలు, ఫలాలు నీటి ద్వారా విస్తరిస్తాయి. నీటిలో తేలడానికి అనుకూలంగా వీటి వెలుపలి కవచం బెండుతో నిర్మితమై ఉంటాయి. కొబ్బరి విత్తనం (కొబ్బరికాయ) ఇదే విధంగా వుంటుంది. ఇది సముద్ర తీరాల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. తనకు తానే సముద్రంలో చాలా దూరం, చాలా కాలం తేలాడి, కొత్త ప్రదేశాన్ని చేరుతుంది. ఈ కారణం చేతనే, ఎవరూ నాటకుండానే కొబ్బరి, దేశంలో సముద్ర తీరాల్లో తనకు తానుగానే పెరుగుతూంటుంది. కమలా పువ్వు కూడ ఈ విధంగానే విస్తరిస్తుంది. దీని తొడిమ, బెండు, సహాయంతో నీటిలో తేలి, గాలిలో వెదజల్లలేవు. కొద్దికాలమైన తర్వాత ఇది (క్రొత్తి) ఫలం బయటకీ వస్తుంది. అప్పుడు అది నీటి క్రింది భాగానికి దిగి మట్టికంటుకొని మొలకెత్తుతుంది.

4. అనేక విత్తనాలు విస్తరించేవి ప్రాణుల ద్వారా, ప్రాణుల దేహానికి అంటుకోడానికి, ఈ విత్తనాలకూ, ఫలాలకూ ముళ్ళు, కొక్కెలు, బిరుసైన వెంట్రుకలు, అంటు గ్రంథలు (జిగురు) ఉంటాయి.

ఇసుక ఉమ్మెత్త (Xanthium Strumarium), పెద్ద బెండ (urena) వీటి ఫలాలకు కొండేలుంటాయి. (కొక్కెనలు) గడ్డి, గంజాయి, గంజగరిక గడ్డి, వీటిలో ఒకరైన కేశరాలుంటాయి. ప్రాకే ప్రాణుల శరీరానికి సులభంగా అంటుకొంటుంది. అనేక ముళ్ళ మొక్కల, కొమ్మలకు విత్తనాలకు ఈ రకపు ఉపాంగాలున్నవి (ఉత్తరేణి మొదలైనవి).

విత్తమాలం, పిల్లి అడుగుల తీగలలో (Boerhaavia) ఇత్యాదులలో విత్తనాలూ, ఫలాలు జిగురు (అంటు) కలిగి ఉంటాయి. ప్రాణుల శరీరానికి త్వరగా అంటుకొంటాయి (చిత్రాలు 1.76).

1.76 ప్రాణుల ద్వారా విత్తనాల విస్తరణ a. ఇసుక ఉమ్మెత్తు కొండి (కొక్కెన) వంటి ముళ్ళు, b. పెద్ద బెండ (urena), కొక్కెన c. గంజ గరికలలో ముళ్ళు d. పెద్ద గంజాయి గడ్డి విత్తనపు కాయ, e. ఎర్రగన్నేరు అంటు ఫలం, f. జిగురున్న పొరలు, కొక్కెనున్న బిరుసు కేశరాలు. g. పులుగోర్ల రెండు పెద్ద కొక్కెనలు.


కొన్ని పళ్ళు రంగుతో కూడి ఉండటంచేత పక్షులను ఆకర్షిస్తాయి. పక్షులు వీటి కండని తిని విత్తనాలను విస్తరింపజేస్తాయి. (అంజారం, జామ, ద్రాక్ష, సత్తి, అత్తి ఇత్యాదివి). కొన్ని పళ్ళని నక్క మొదలైనవి తిని విత్తనాలను ఉమ్మి ప్రసరింపజేస్తాయి. అన్నింటికన్నా ఎక్కువగా మానవులు విత్తనాల్ని, మొలకల్ని వేరు వేరు స్థలాల్లో, దేశాల్లో, ఒక చోట నుంచి మరొక చోటకు తీసికెళ్లి విత్తనాలను విస్తరింపజేస్తారు. బీజ విస్తరణలో మానవులు ప్రముఖ పాత్రవహిస్తున్నారు.

### మొక్కల స్వభావాలు (Plant Habits)

మొక్కల పెరుగుదలకు స్వభావాలకు అనుగుణంగా మొక్కలను

1. మూలికలు (మేత మొక్కలు, పచ్చి మొక్కలు - Herbs)

2. పొదలు (పొదలుగా పెరిగే పొదల మొక్కలు - Shrubs)



3. చెట్లు (దారు నిండియున్న దిండున్న మొక్కలు)

4. తీగలు (ప్రాకెడి, పైకెక్కిడి మొక్కలు - Creepers, climbers) అని విభజించుకోవచ్చు. మూలికలు, పాదలు వీటి గురించి ఇప్పుడిప్పుడే చెప్పడానికి వీలుపడదు. చెట్లు అందరికీ పరిచితమే. తీగల గురించి కొద్దిగా వివరాలు తోటమాలి తెలుసుకొని ఉండాలన్న ఆవశ్యకత ఉంది.


తీగల కాడలు తేలికగా వుంటాయి. పొడవు ఎక్కువగా ఉంటుంది. చీలికలు కూడా ఎక్కువగానే ఉంటాయి. అనేక చీలికలు చుట్టుప్రక్కలను గూళ్లని, కంభాలనే, గోడలను, రాళ్లను మొదలైన వాటిని, చెట్ల శ్రావ్లను అధారం కోసం పట్టుకొని పైకి ఎక్కిడానికి అనుకూలంగా విశేష అంగాలు ఉంటాయి. ఎక్కే క్రమం, లేదా రీతి ప్రకారం తీగలను 6 రకాలుగా విభజించవచ్చు (చిత్రాలు 1.77, 1.6)

1.77 1. తీగలను ఎక్కి పైకి వెళ్లే చిన్న వేర్లు. A. పై భాగం (పై శరీరం) B. క్రింది భాగం (క్రింది శరీరం) కొక్కెన (కొండి) ముళ్ళ ద్వారా ఎక్కే తీగలు 2. బోగన్విలా T-ముళ్లు 3. సన్నని (చిన్న కాచి చెట్టు) T-కొక్కెలు 4. మనోరంజని చెట్టు H. కొండి 5. బెత్తం-ముళ్లు 6. గులాబి-ముళ్లు.

1. చిన్న వేళ్ల తీగలు - (Rootlet Climbers) తమలపాకు, మిరియాల తీగ, పిప్పళ (Piper longum, long pepper) తీగ, అత్తి (Indian Ivy - Ficus pumila or Frepens) పోథాస్ (Pothos) మొదలైనవాటిలో కణుపుల నుంచి లేదా అధారం దొరికిన (లభించిన) చోటు నుంచి సన్నచిన్న వేర్లు బయలు దేరుతాయి. వీటి సహాయంతో అవి పైకి ఎక్కుతాయి. ఈ వేర్లు చివరన (కొన) అంటు బిళ్ల (adhesive disc) లేదా పంజా (పిల్లి అడుగుల వంటి - claws) ఉంటాయి. ఈ ఉపాంగాల ద్వారా అధార స్థలాల్ని పట్టుకొంటాయి. లేదా జిగురును (అంటును) కాల్చి, దానికి అంటుకొని పైకి ఎక్కుతాయి. బదనికలు (cuscuta-dodder) ఈ ఉపాంగాల్ని ఎక్కిడానికి మాత్రమే కాకుండా, సస్పరసాన్ని పీల్చుకొనే కోశావయవం హాస్టోరియా (haustoria) గానూ రూపొందింది, ఆశ్రయ చెట్ల లోపల ఊరి అందుండి పోషకాల్ని పొందుతుంది.

2. కొక్కెన తీగలు : (Hook climbers) మనో రంజని పువ్వు తీగ (కందాళ సంపంగి - Cupid's plant-Arta botys odoratis simus) లో పువ్వు పిడి (తొడిమ) నుంచి (పువ్వు / పప్పు పట్టునుంచి) ఒక కొక్కె బయలుదేరి దాని సహాయంతో చెట్టును ఎక్కుతుంది. బోగన్విలా మొదలైన తీగలలో ముళ్లు కొండిలాగుంటుంది. ఈ ముళ్ల సహాయంతో తీగలు ప్రాకుతుంది. అధారాన్ని పట్టుకొని పైకి పెరిగి ఇంకా గట్టిగా దాన్ని పట్టుకొంటుంది. కేన్ ఆకు (వెదురు ఆకు) కవచం చేత (Leaf Sheath) అనేక మొనదేలిన కొక్కెనలను వాచటి బయలుదేరి (హత్తుకొని) పైకి ఎక్కుతుంది. కొన్ని సమయాలలో ఈ బెత్తపు తీగలు 500-600 అడుగుల పొడవుగా ఇతర ఆశ్రయ మొక్కల చెట్లపైన పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇదేవిధంగానే గులాబి తీగలు చుట్టుప్రక్కల వ్యాపిస్తుంది.

3. నులి తిరగెడి తీగలు కొన్ని మొక్కలలో కాండపు భాగం లేదా ఆకు చివర్లు రింగు రింగులుగా, గూడలుగా తిరిగి రూపాంతరాన్ని పొందుతుంది. ఈ చుట్ట చుట్టుకొన్న గూడను, వగ్గానో, (గట్టిలాడు) తీగనో, మొక్కల చెట్ల రెమ్మలనో చుట్టుపట్టుకొని, పైకి ఎక్కుతుంది. నీలి జాముకి (Passion-flower - 1-78 1) అన్ని తీగలు (మించు తీగలు, ఎదురు తీగలు - Balloon vine - cardiospermum halicacabum) దోస మొదలైన వాటిలో ఈ నులితిరిగిన కాండపు భాగం బలాజోలోనూ, విషకందులలోనూ (1.78 2-3) బిగోనియాలో (Big-



1.78



4



5



1.78

6



nonia) అకుల భాగం, అడవి తీగల తామరలో (*Simlax zeylanica*) అకు కొనల భాగం శివశక్తి - (*Gloriosa-Superba*) (1:78:5)లో అకు చివరి కొనలు రింగులుగా తిరుగుతుంది. మంగర వల్లిలో (*Cissus quadrangularis*) చివరి మొగ్గ గురించే తీగవుతుంది.

4. అకు తీగలు (**Leaf climber**) క్లెమాటిస్ (*Clematis smilacifolia* - Virgin's Bower - పొట్టు తీగ)లో నాస్టరేషియం (*Nasturtium*)లో అకు తొడిమ వేరు చెట్టుకు తగిలితే అది దాన్ని చుట్టూ గట్టిగా పట్టుకొని పైకి ఎక్కుతుంది. గ్లోరియోసా అకుని తీగగా వ్యవహరించవచ్చు. (చిత్రం 1.78:4).

5. కాండపు తీగ (**Stem climber**) చుట్టుకొనే తీగలు Twiner ఎక్కి తీగలు Climber (నులితిరేగే తీగ) ఈ తీగలలో అశ్రయ మొక్క చెట్లను, కర్ర, స్తంభాల్ని ఎక్కుడానికి వీలుగా ప్రత్యేకమైన ఉపాంగాలుండవు. కాని కాండమే అశ్రయాన్ని చుట్టు గట్టిపడి, పైకిెక్కుతుంది. ఈ తీగలో ఎక్కి కాండపు భాగం లతలాగ తేలికగా పొడవుగా వుంటుంది. చిక్కడు, అలసంధలు, సంధ్యామాలతి (*Rangoon creeper*) ఎర్రమల్లెలు (*Quisqualis indica*) రైలు తీగ (పిల్లడుగులు - *ipomoea palmata* - Railway creeper) కామలత. (*Indian Forget-me-not Quamoclit pinnata*) గురువింజ (*Wild liquorice, crabs eye Abrus precatorius*) మొదలైనవి ఈ రకానికి చెందిన తీగలు. వీటిలో కొన్ని ప్రదక్షణ చేస్తాయి. (Clockwise, dextrorse) (ఉదా : మడిగెలుసు - ముడి చిలకడ దుంపలు - తొన గెలుసులు (*Dioscorea alata*) మరి కొన్ని అప్రదక్షణంగా (Anti clockwise - sinistrorse) తిరిగి ఎక్కుతాయి. బల్బు పెద్ద గెలుసు (*Dioscorea bulbifera*).

6. లియన్స్ (**Lianes**) (ఊయల తీగలు, చెట్టు తీగలు) ఇవి దట్టమైన అరణ్యంలో (హాసన, చిక్మంగుళూరు జిల్లాలోనే అరణ్యాలలో ఉంటాయి). పెరిగిడి తీగలు. ఇవి పెద్ద చెట్లను ఎక్కి అంతమవుతాయి. మాద్రవీలత (దాని గుత్తుల తీగలు - *Hiptage madablota*) కంచునాళ తీగ (*Bauhinia Vhalli*) (1.78.6) కుక్కతోక తీగ (గోరుచిక్కడు *Cowhage-Mucuna Prurita*) ఇత్యాదులు. ఇవి చెట్టుగానే పెరిగిడి తీగలు.

1.78 నులితిరిగిన గూడు తీగ, 1. జాముకి పువ్వు, 2. బలాణి, 3. కాడు లేదా విషకందులు T-నులి గూడు 4. క్లెమాటిస్, 5. గ్లోరియోసా, 6. తీగపువ్వు.

### సస్య వర్గీకరణలు (Plant Classifications)

మొక్కలలో లక్షాంతర ప్రభేదాలున్నాయి (Varieties). సుమారు మూడున్నర లక్ష వంతు సూరారు (Species) సస్యజాతులు (Genus) (సామాన్యంగా 'జాతి' అనే పదాన్ని ప్రభేదమనే అర్థంలో ఉపయోగిస్తారు. కాని సస్యశాస్త్రంలో 'జాతి' నే పదానికి వేరే అర్థం ఒక జాతిలో పలు వంశాలుంటాయి. ఒక వంశంలో అనేకనే ప్రభేదాలుంటాయి. వ్యవహారంలో తెలిపే జాతియే వేరు. సస్యజాతిలో పేర్కొనేది వేరు) పలుకులాలు (Families) ఉన్నాయి. వీటిని గుర్తించడానికి వాటి గురించి స్పష్టంగా వివరాలు తెలుసుకోవడానికి వీలుగా సస్యశాస్త్రజ్ఞులు సస్యాల్ని కొన్ని రీతులుగా వర్గీకరించి ఉన్నారు. తోటమాలి ఈ వర్గీకరణలను గురించి స్థూలంగా తెలిపి కొని ఉండటం మంచిది. అప్పుడు మొక్కల సంబంధాన్ని స్పష్టంగా తెలుసుకొని, చక్కటి తోటను పెంచగలుగుతాడు.

ప్రాణులలో రెండు కోట్లు వున్నాయి. సస్యకోటి (Plant Kingdom), ప్రాణికోటి (Animal Kingdom). సస్యకోటిలో ముఖ్యంగా రెండు వరంపరలున్నాయి. (Phylum - పైలం) లేదా విభాగాలు (Divisions)గా విభజించి ఉన్నారు.


1. విత్తనాలని (బీజాలని) పుష్పీయులు (Spermatophyta or Phanerogams)
2. అబీజాలు లేదా గుప్త పుష్పీయాలు (Cryptogams) బీజాల వరంపర అబీజ వరంపరకన్నా ఎక్కువ విస్తరిస్తాయి. అనంత రూపాన్ని పొందినవి. కొన్ని మొక్కల్ని వదిలేస్తే, తోటమాలి ఎక్కువగా పెంచే మొక్కలు బీజాలున్న మొక్కలే. అయినా, అబీజాల వర్గీకరణను కూడా తోటమాలి తెలుసుకొని ఉండాలి.

అబీజాలలో మూడు ఉపవిభాగాలు (Subdivisions) ఉంటాయి.

1. తాలోఫైట్ (Thallophyta) కాండం, ఆకు రెండూ సప్తంగా ఉండని కీచ సస్యాలు - సస్యాణువులు (బ్యాక్టీరియ - Bacteria) శిలీంధ్రాలు (ఫంజై - Fungi) పాచి, (అల్గీ - Algae) శిలావల్కలు (లైకెన్ - Lichen).
2. బ్రయోఫైట (Bryophyta) ఆకులతోనన్న మొక్కలు. వీటి జీవన చరిత్ర రెండు అంతాలలో సంపూర్ణమవుతుంది. ఈ అంతాన్ని సంతతి వ్యత్యాసం (Alternation of generations) అని అంటారు. ఈ ఉప విభాగపు సస్యాలు తమ జీవితంలో ఒక్కసారి అలైంగికంగా, మరొకసారి లైంగికంగా సంతానాన్ని వృద్ధి చేస్తాయి. మోస్ (Moss) మొదలైనవి. వీటిని పాత తడిగోడలపైన చెట్ల క్రింద భాగాలలో చూడొచ్చు.
3. టెరిడోఫైట్ (Pteridophyta) ఈ ఉపవిభాగపు మొక్కల వేరు కాండం, ఆకు మొదలైన భాగాలు స్పష్టమైన రూపాన్ని పొందుంటాయి. ఇవి కూడా కొమ్మల దగ్గి మొక్కలే. వీటిలోను సంతాన క్రియ రెండు రీతులలో జరుగుతుంది. ఒకటైన తర్వాత మరొకటి జరుగుతుంది. ఈ మొక్కల లోపలి అంతర్ నిర్మాణంలో నీరు, ఆహారనాళాలు స్పష్టంగా చూడొచ్చు. మిగిలిన 2 ఉపవిభాగపు మొక్కలలో ఈ స్పష్టత ఉండదు. పరబ్రాలు (Ferns) లైకోపోడియం (Lycopodium) సెలాజిన్ల (Selaginella) ఈ ఉపవిభాగపు మొక్కలు. పుష్పీయ, లేదా బీజపు మొక్కలలోనూ రెండు ఉప విభాగాలున్నాయి.
1. అనావృత్త బీజాలున్న మొక్కలు - బోడితల (బోడి) జీజాలు - నగ్న బీజాలు - జిమ్నోస్పర్ములు (Gymnosperms). ఈ ఉపవిభాగం ఒకవిధంగా మొక్కల సేతు (అనకట్ట వంటిది). క్రింద దగ్గిని ఫ్రీస్టోగామిక్, ఉన్నత సస్యాలను లోపలి గ్రహించి అంజియోస్పర్మిక్ మధ్యనున్న సేతువ సైకాడులు (Cycads) ఇటువంటి క్రింది (చిన్న) మొక్కలకి ఎక్కువ అంటున్నవి. పైను (Pines)లు ఉన్నత మొక్కలకు ఎక్కువ సంబంధముంటుంది.

ఈ ఉప విభాగంలో సుమారు 700 సస్యవంశాలు (Species) ఉన్నాయి. ఈ మొక్కల పువ్వులలో పుష్పవత్తంగానీ, పుష్ప దళాలుకానీ ఉండవు. అందుచేత వీటి బీజాలు (విత్తనాలు), వళ్లు, వళ్లు నుండి ఆ వృత్తమవ్వవు. అంతలేకు (అంతెలే) వీటిని నగ్న (బోడి) విత్తనాలని వ్యవహరిస్తారు.

ఈ ఉప విభాగానికి చేరిన అనే సస్యాలను తోటమాలి అలంకారం కోసం పెంపొందించు. సైకాడులు (గొడ్డు ఈతలు) పైను చెట్లు (ఉన్నత గిరులలో - పెరిగెడి మొక్కలు, సీసపు కడ్డలను చేయడం ఈ రకపు ఒక సైన్ నుండే) కోనిఫారాలు, నిదేలు (Gnetales - మృదువైన చెట్ల వంటివి) ఈ ఉపవిభాగాలకు చెందిన మొక్కలు.



79-

2. రెండవ ఉప విభాగమే అవృత బీజాలు - అంజియో స్పర్మైటులు (Angiosperms) ఉన్నత మొక్కలు. ఇవి పెద్ద ఉప విభాగం ఇందులో సుమారు 2 లక్షల సస్య వంశాలున్నాయి. సంఖ్యలో కాకుండా వైవిధ్యంలోనూ అతి పెద్ద విభాగం.

ఈ ఉపవిభాగంలో రెండు పెద్ద వర్గాలున్నవి (classes) - ఏక దళాలు (Monocotyledons) ద్విదళాలు (Dicotyledons) అంటే ఒకటిగా ఉండే విత్తనాలు (అతి భజ బీజాలు) రెండుగా ఉండే విత్తనాలు (విభజ బీజాలు) గడ్డి, ధాన్యం (వరి, రాగి, జొన్న, గోధుమ మొదలుగునవి) ఉల్లిపాయలు, అమారిలీస్ (Amaryllis) మొదలైన వాటిలో విత్తనాలు ఒకటే ఉంటాయి. కందులు, చిక్కుడు, బెండ, పత్తి మొదలగు వాటిలో రెండు విభాగాలుంటాయి.

ఒక్కొక్క వర్గాన్ని లేదా క్లాసుని కొన్ని ఉపవర్గాలు - సబ్ క్లాస్ (Subclass)లుగానో, ఒక్కొక్క ఉపవర్గాన్ని శ్రేణి, లేదా సీరీస్ (Series)గానూ ఒక్కొక్క శ్రేణిని తండ్రి లేదా కోహార్ట్ (Cohort)లుగానూ, ఒక్కొక్క కోహార్ట్ ను కులం లేదా ఫ్యామిలీ, లేదా న్యాచురల్ ఆర్డర్ (Family or Natural order)గానూ, ఒక్కొక్క కులాన్ని అనేక జాతి లేదా జీనస్ (genus)గానూ, ప్రతి జీనస్ అనేక వంశాలు లేదా స్పేషిస్ (Species)గానూ వర్గీకరిస్తారు. ప్రతి వంశంలోను అనేక ప్రభేదాలు (వైరైటీస్) ఉన్నాయి. ఉదా : మామిడి వండు. మామిడి వండు వంశంలో బాదామి, రసబూరి నీలం, మల్లోవ మొదలైన అనేక ప్రభేదాలున్నాయి. మామిడి వండు వంశం మ్యాజివర అనే జీనస్ కి చేరింది. ఈ జీనును అనాకార్డియేని కులానికి (నాచురల్ ఆర్డర్) చేరింది. అనుకార్డియేని పాలిపెటిల్ అనే ఉపవర్గానికి, ఈ ఉపవర్గం ద్విదళ వర్గానికి, ఈ ద్విదళ వర్గం అంజియోస్పర్మ ఉప విభాగానికి ఈ ఉపవిభాగ బీజ విభాగానికి చెందినది.

ఈ రకపు వర్గీకరణలో పువ్వుల నిర్మాణమే ముఖ్యమైన ఆధారం. ఆకు, ప్రకాండాలైన వైవిధ్యంపై ఆధారపడి వర్గీకరించడం సమర్థనీయమైందికాదు. దీనికి కారణం మొక్కలు పెరిగేడి సన్నివేశానికి తగినట్టుగా ఆకు, కాండాలు, ఆకారం, మందం (గాత్రం) రంగు మొదలైనవి భేదిస్తాయి. (వ్యత్యాసాన్ని పొందుతాయి) కాని పువ్వు నిర్మాణం దాని భాగాలు, వుత్తాల సంఖ్య మాత్రం ఆ వంశానికి నిఖరమైంది - ఆ వంశపు మొక్కల్ని ఎక్కడైనా, ఏ విధంగా పెరిగినా, దాని నిఖర స్వభావాదులు రీతులు ఒకేరీతిలో ఉంటుంది.

పువ్వు నిర్మాణాన్ని ఈ వర్గీకరణ కోసం చిత్ర రూపంలోనో సూత్రపు రూపంలోనో సూచిస్తారు. దీన్ని పుష్ప చిత్రం (Floral diagram) అనీ, పుష్ప సూత్రం (Floral Formula) అని వ్యవహరిస్తారు. 1.79 చిత్రంలో చిక్కుడు, కంది, మొదలైన మొక్కల ఉపకుల ప్యాపిలియోనేసి (Papilionaceae)ల పుష్ప చిత్రాన్ని సూచించడమైంది. పుష్ప చిత్రం ఆపైన దళం, ఆ తర్వాత పురుష భాగం. లోచల స్త్రీ భాగాలను సూచించడమైంది. 1.79 పుష్ప చిత్రం పాపిలియోనేసి పుష్పానిది.

దీని పువ్వు నిర్మాణాన్ని సూత్రం ద్వారా తెలపడానికి ఈ విధంగా రాస్తారు.  $(K_{(5)} C_{(5)} A_{(9)+1} G_{(1)})$  దీని అర్థం :  $K_{(5)}$  అంటే 5 పుష్ప పత్రాలు.  $C_{(5)}$  అంటే 5 పుష్ప దళాలు.  $A_{(9)+1}$  అంటే ఆంధీషియు లేదా పురుష భాగంలో 9 గుంపుకట్టిన కేసర + 1 విడి కేసరం.  $G_{(1)}$  అంటే గ్రెనీషియుం లేదా స్త్రీ భాగంలో ఒక కార్పెల్. G క్రింద అడ్డు గీత అర్థం - గ్రెనీషియుం ఉన్నత స్థానంలో ఉందని అర్థం.

ఏ చెట్టు, ఏ వంశం, ఏ జాతి, ఏ కులానికి చేరినదనే విషయం వచ్చే అధ్యాయాలలో (భాగాలలో) తెలుసుకుంటుంది.

## సస్యోత్పాదన (మొక్కల వ్యాప్తి) (Plant Propagation)

ప్రకృతిలో మొక్కలు, చెట్ల వ్యాప్తి సస్యోత్పాదన రెండు రీతులలో జరుగుతుంది. బీజాల ద్వారాను వేరు, కాండం, మొగ్గ, ఆకులు మొదలైన మొక్కల అబీజ భాగాల ద్వారాను. బీజోత్పత్తికి, పురుష, స్త్రీ భాగాలు రెండూ అవశ్యకమైనవి. పుష్పాలే మొక్కల స్త్రీ, పురుష భాగాలు. వీటి వలనే మొక్కలు వ్యాప్తి చెందుతాయి. వీటిని సస్యపు లైంగిక భాగమని, లింగభేదం లేని ఆకు, కాండం మొదలైన మొక్కల ఇతర అంగాలను లైంగిక లేదా నిర్లింగ (సస్యాల - Vegetative) భాగాలని వ్యవహరిస్తారు. బీజాల ద్వారా సస్యాలను పెంచుకొనే (వృద్ధిచేసుకొనే) సస్యోత్పాదన (సస్యసంతానాభివృద్ధి) క్రమాన్ని బీజ సస్యోత్పాదన లేదా లైంగిక సంతానాభివృద్ధి (Sexual Reproduction) అని, అబీజాల ద్వారా సస్యాలను పెంచే (వృద్ధిచేసే) క్రమాన్ని అబీజ లేదా అలైంగిక సంతానాభివృద్ధి (Vegetative reproduction) అని పిలుస్తారు.

ప్రకృతిలో బీజాల ద్వారా సస్యోత్పాదన ఎక్కువగా జరుగుతుంటుంది. సామాన్యంగా ఒకే వర్షాకాలంలో మొలకెత్తి, పెరిగి, ఫలాన్నిచ్చే వార్షిక సస్యాలు (Annuals) ఎక్కువగా పెరుగుతాయి. ఒకటి రెండు జీవన చక్రం బీజాలనుండి బీజాలయ్యే ద్వీవార్షిక సస్యాలలో (Biennials) చెట్లు, పాదలు మొదలైన వాటిలో సస్యభివృద్ధి బీజాల ద్వారాను జరగవచ్చును. కాండము, మొగ్గ, పత్రము, వేరు మొదలైన అబీజ సస్యాల ద్వారాను సస్యభివృద్ధి జరగవచ్చును. బహువార్షికాలలో (Perennials) ఎన్నో రకాలున్నాయి. ఆరటి, కందగడ్డ (సువర్ణ గడ్డ) మొదలైన వాటిలో బీజాలుండవు. ఇటువంటి అబీజ సంతానాభివృద్ధి క్రమంగా వృద్ధిచెందుతాయి. సాధ్యమైన చోట్లా, ప్రకృతిలో సామాన్యమైన బీజ సస్యోత్పాదన క్రమాన్ని అనుసరించి సస్యాలను వృద్ధిచేయడం శ్రేష్ఠమైన పద్ధతి. ఈ విధంగా చేయడం చేత కొన్ని అనుకూలాలున్నాయి. మొదటిది ఈ క్రమం సరైనది, సులభమైంది బీజాలని సకాలంలో కావల్సినంత లోతుకి (క్రిందికి) సరిగ్గా సిద్ధం చేసిన భూమిలో చల్లేవని. మొక్కలను నాటడం, రమ్మలనుండి వేరు చేయడం, కన్నేయడం. మొదలైన అబీజ సస్యోత్పాదన క్రమం సరైనది కాదు. సులభమైంది కాదు. విజయాన్ని సాధిస్తామని నిశ్చయంగా చెప్పుకోలేం. దీనికి కారణం ఈ క్రమాలను జయప్రదంగా నడిపించడానికి ఎక్కువ శ్రద్ధ జాగరూకత, బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది.

రెండవది బీజాల ద్వారా ఎక్కువ సస్యాలను వృద్ధి చేయడం సాధ్యమౌతుంది. దీనికి కారణం ఒకే చెట్టు నుండి కొన్ని నమూనాలలో వేలకొలది బీజాలు లభిస్తాయి. వీటి ద్వారా మూరారు సస్యాలను మొలకెత్తించ వచ్చు. అలా కాకుండా అదే చెట్టు నుండి అంటు కట్టుట ద్వారా కేవలం పది, ఇరవయ్య మొక్కలను ఉత్పత్తి చేయవచ్చును. అంటు కట్టినప్పుడు మొక్కలలో (చిగుర్లలో) వడిలే 5-6 చెట్లకన్నా ఎక్కువ చెట్లను తయారు చేయలేము.

మూడవది సామాన్యముగా బీజాలద్వారా ఉత్పత్తయిన మొక్కలు ఎక్కువ దృఢకరంగా ఉండటమే కాకుండా త్వరగా రోగాలకు లోనుకావు. ఎందువల్లనంటే ఇవి స్త్రీ పురుష సంయోగంవే వచ్చిన కొత్త సస్యాలు (మొక్కలు). ఈ సంయోగం మొక్కల పునర్జీవనానికి (Regeneration) తేజం (Vigour) లేదా వేరు నుంచి తయారయిన సస్యం తల్లి సస్యపు భాగమే తప్ప క్రొత్త నూతన సస్యం కాదు.

అయినా బీజాల ద్వారా ఉత్పాదనైన సస్యాలలో ఒకటి రెండు దుర్గుణాలు లేకపోలేదు. అబీజ భాగం నుండి పెంచిన సస్యాలన్నీ గుణలక్షణాలలోనూ, తల్లి సస్యాన్ని పోలుంటాయి. అయితే, బీజాల ద్వారా వచ్చిన (మొలకెత్తిన) సస్యాలు తల్లిదండ్రైన సస్యాల కొన్ని గుణాలనూ ఎక్కువగా వాటి అవగుణాలను పొందుతుంటాయి. వెనుక చెప్పినట్లుగా కొన్ని పుష్పాలలో వరాగస్పర్శ - అంటే పురుషభాగపు స్పర్శ స్వక్రియైయుంటుంది. అదే పుష్పపు లేదా అదే చెట్టు మరొక పుష్పపు వరాగ సంపర్కం అవుతుంది. ఈ స్వక్రియ వరాగ స్పర్శ (Self pollinated) నుంచి తయారైన బీజాల ద్వారా వచ్చే (ఏర్పడే) సస్యాలకు, తల్లి సస్యానికి, ఎక్కువ భేదముండదు. కాని వేరే చెట్టు పుష్పము వరాగ స్పర్శ, అన్య లేదా పరకీయ వరాగ స్పర్శ (Cross pollination) జరిగినప్పుడు ఇటువంటి బీజాల ద్వారా ఏర్పడే సస్యాలకు తల్లి సస్యానికి (తల్లి మొక్కకి) విభేదం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కొన్ని సమయాలలో ఎక్కువ వ్యత్యాసాలు (విభేదాలు) ఎక్కువ అవగుణాలూ కలుగుతుంటాయి. ఈ కారణాల చేత ఈ విభేదాలు అవగుణాలు ఎక్కువగా లేనటువంటి బీజాలను పొందడానికి నిశితంగా పరిశీలించి మిశ్రరూపాలలో ఉన్నతమైన వాటిని గ్రహించాలి.

బీజాల ద్వారా ఉత్పత్తయిన సస్యాలకున్న మరొక అవగుణమేమిటంటే అది సామాన్యంగా ఫలానిచ్చుట చాలా అలస్యం. అంటు కట్టిన చెట్లు చిల్లలు (రంధ్రాలైన) చెట్లు మొక్కల ద్వారా (అంటు కట్టుట ద్వారా) పెరిగిన చెట్లు త్వరగా ఫలాన్ని ఇస్తాయి. తోట పెంపకాన్ని బీజాల ద్వారా వృద్ధి పరచుకోవడంలో మూడు ముఖ్యోద్దేశాలున్నాయి. అవి : 1. ఎక్కువ మొక్కలను వృద్ధి చేసుకోవడం కోసం లేదా పెంపడానికికోసం చేస్తారు. 2. కొత్త రకాల (Variety) జాతి కొరకు లేదా విభేదం (Strain) తయారు చేయడానికి పెంచుతారు. 3. అంటుకట్టడానికి, పిలకలు వేయించడానికి, మొలకలు మొలకెత్తించడానికి కావల్సిన బీజాలు (నారు మొక్క) (Seedlings) లేదా స్టాకులు పెంచడానికి తోటని పెంచుతారు. 2, 3 విషయాల గురించి ఇంతకు ముందే వివరణలివ్వబడ్డాయి.

### బీజాల నమూనాలు : (Types of Seed) లేదా బీజాలలోని రకాలు

తోటమాలి అనేకరకాల సస్యాలను పెంచుతాడు. అందులోను పూదోటలలో వివిధ రకాల చెట్లను పెంచాలి వస్తుంది. అందుచేత బీజాల గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలిసికొని ఉండటం మంచిది. బీజాల అంగాలలో, లేదా, ఆకారంలోనూపంలో నిర్మాణంలో రకరకాలుగా విభేదాలుంటాయి.

1. కొన్ని ధూళిలాగ (చాలా) అతిసూక్ష్మంగా వుంటాయి. ధూళి బీజం ఉదా : బైగోనియా, లోబిలియా (Lobelia), క్యాలిమిలేరియా (Calceolaria), గ్లోక్సినియా (Gloxinia) పెటోనియా, సినిరేరియా కొన్ని

కల్వారు (Cactus) జాతికి చెందినది.

2. కొన్ని కండకో కూడుకొన్నవి : కండగల బీజాలు (Fleshy seeds) ఉదా : మాస బీన్లు, డబుల్ బీన్లు ఇత్యాదివి.
3. కొన్ని బీజాలలో బీజాల తొడుగు చాలా గట్టిగ (Hard Seeds) ఉంటుంది. ఉదా : బలాణి, అముదం, బాదామి, అక్రోటు (Walnut)
4. కొన్ని బీజాలలో నూనె ఎక్కువగా ఉంటుంది. (Oil seeds) జీడి బీజాలు, నూనె గింజలు. ఉదా : నువ్వులు, వేరుశనగ, సోయా బీన్లు మొదలుగునవి.
5. కొన్ని బహు బీజాలు (Multiple Seeds) ఒకే కోశంలో రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ బీజాలున్నవి. ఉదా : బీట్‌రూట్ (Beet root)

వివిధ రకాల బీజాలను మొలకెత్తించడానికి వివిధ రీతులలో బీజాలను పరిష్కరించి (treat) లేదా సంస్కరించి నాచాలి. బీజాలను గీకుట (బీజాలు తీయుట) రుద్దుట, ద్రావకములో అద్దడం, తడవడం, వేయించడం మొదలైన కార్యక్రమాలున్నాయి. కొన్ని సంస్కరణక్రమాలు (Seed treatment methods) విధానాలున్నాయి.

వివిధ బీజాలను ఏవిధంగా నాచాలి ?

ఘాత బీజాలు : వీటిని శుభ్రమైన ఎత్తు వల్లలు లేని చదునైన పేలలో పాతి, కుండ, తట్టు, పెట్టెలు మొదలైన వాటిల్లో స్పష్టంగా తేలికైన వాటిని పైపైనే నాచాలి. తేలికైన శుభ్రమైన విత్తనాల కొరకు జల్లెడవట్టిన ఆకుపాడి, లేదా ఇసుకలో కలిపినాచాలి. నాటిన తర్వాత వీటిపైన పన్నుని చిల్లులున్న జల్లెడలో కొద్ది తోటమట్టిని పేసి కలిపి స్పష్టంగా మూసివేయాలి. ఈ రకపు బీజాలను తట్టు లేదా పెట్టెలోనాటి దానిపైన ఒక గాజాను మూయాలి. అప్పుడు తట్టు మట్టి ఆరకుండా మొలకెత్తడానికి కావాల్సిన తేమ బీజాలకు లభిస్తుంది. గాజాపైన పాత వార్తా పత్రికను, మొలకెత్తే వరకు మూసి వుంచాలి. (బీజాలు మొలకెత్తడానికి కావాల్సిన చీకటి కలిగించడానికి) మొలకెత్తడానికి ప్రారంభించిన తక్షణమే ఈ కాగితాన్ని తీసి పెట్టాలి (చూడండి : కుండ కృషి నాటుటను).

కండ గల బీజాలు : వీటిలో కొన్నింటిలో కొంతకాలం నిల్వ వల్ల బీజపు తొడుగు గట్టిపడుతుంది. ఈ విధంగా గట్టిపట్టు బీజాలను నాటడానికి ముందు చన్నీళ్లలో లేదా నులివెచ్చునీటిలో, 14 గంటల కాలం నానబెట్టడం మంచిది. అప్పుడు మొలక వెలువరికి (బయటకి) రావడానికి కష్టము కాదు, అలస్యము కాదు.

గట్టి బీజాలు : క్యాన్ (Canna) బొప్పాయి (జాలియ) మొదలయిన వాటి బీజాలు చాలా గట్టిగా వుంటాయి. వీటిని మూడు రోజుల కాలం చాలా వేడిగనున్న నీటిలో నానబెట్టాల్సి ఉంటుంది. వేడి నీటిలో త్వరగా నానుతాయి. కొన్ని బీజాలను ఐదు రోజులు నానబెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా దీర్ఘకాలం నానబెట్టటప్పుడు

బీజాలకి గాలి సరఫరా తక్కువై మొలకెత్తకుండా ఉండడానికి అవకాశముంది లేదా సరిగా మొలకెత్తక పోవచ్చు. అందుచేత ప్రతి దినం కొత్త నీటిలో నాన బెట్టాలి.

ద్వీర్ణ కాలం నానబెట్టాల్సిన బీజాలు (Asparagus) ఆస్వరాగన్ (3 నుండి 5 రోజులు) ముడి అముదం (4 దినాలు). వేడి నీటిలో నానబెట్టడానికి నీటిని మరగిట్టుగా (180° 200° F 80 - 90°C) కాని ఆ నీటిలో బీజాన్ని రోలుఉడి వచ్చి అరదానకి కొంచెంసేపు వదలిపెట్టాలి. కొన్ని సమయాలలో ఉడికే నీటిలోను బీజాల్ని అడ్డుతుంటారు. ఈ విధంగా చేయడానికి బీజాలను బట్టలో చుట్టి ఈ మూటని రెండు నిముషాలు ఉడికే నీటిలో వుంచి తీసేయాలి.

గట్టి మువాలను బీజాలు : (Hard-coated seeds) గట్టి కవచాల ద్వారా నీళ్లు రోవరికి చేరడానికి కవచం కొంచెం నీటిని పీల్చుకోవడానికి వీలుగా దాన్ని పొడిపొడిగా విడివిడిగా అయ్యేటట్టు రుద్దాలి. అరేడు బీజాలుంటే చాకు సహాయంతో బయటి పొర (కవచాన్ని) గుచ్చి లేదా రుద్ది కవచం ద్వారా నీటిని బీజపు రోవరి భాగాన్ని చేరేట్టుగా చేయాలి. ఈ విధంగా చేసేటప్పుడు కంటికి లేదా చిగురుకి దెబ్బ తగలకుండా ఉండేటట్టు చూచుకోవాలి. ఎక్కువ లేదా చాలా బీజాలు ఉంటే వీటి జతకు కొంచెం గరకుగా ఉన్న ఇసుకను కలిపి రాయి లేదా నేలపైన రుద్దాలి. పిల్లి తీగల బీజాలు (Asparagus seeds) మొదలైన వాటిని ఈ రీతిలో మొలకెత్తిన జేస్తారు.

జిడ్డు బీజాలు (Oily seeds) : సామాన్యంగా జిడ్డు ఎక్కువగా ఉన్న బీజాలకి మొలకెత్తే శక్తి ఎక్కువ కాలం ఉండదు. త్వరగా మగ్గిపోతాయి. నువ్వులు, నల్ల నువ్వులు, వేరుశనగ, సోయాబీన్సు మొదలైన జిడ్డు (నూనె) బీజాలు కాకుండా, క్యారెట్ (Carrot), పార్నిప్ (Parsnip), సెలరీ (Celery), మ్యాగ్నోలియా (Magnolia), క్యామెలియా (Camellia) మొదలైన వాటిలోను జిడ్డు ఎక్కువ. వేడి ఉండే చోట ఉంచరాదు. వీటిని చల్లగా ఉండే (నేల మాళిగ మొదలైన చోట్ల) చోట చేర్చిపెట్టాలి. బీజాలలోని నూనె ఎండబానికి అవకాశమివ్వరాదు. ఎక్కువకాలం (చాలాకాలం) నుండి చేర్చిపెట్టరాదు. రెండు సంవత్సరాల కాలపు బీజాలను నాటకూడదు. (ఏత్తనాలుగా ఉపయోగించ కూడదు) వాటి మొలక శక్తి తగ్గిపోయింతుంది.

కొన్ని బీజాల మట్టు దొడ్లగా ఉండటం లేదా గుడ్డు అంటుకొని ఉంటుంది. ఉదా : కాఫీ, టమోటో, బొప్పాయి ఇటువంటి రకాలు వీటిని దొడ్లగా లేకుండా శుభ్రపరిచి ఉంచుకోవాలి, వీటిని ఒకటి, రెండు వారాలు గోరువెచ్చని నీటిలో నానబెట్టి ఆ తర్వాత రుద్ది కడగాలి. అంటు, మట్టి బీజాలకి మెత్తకొని ఉంటే, కొత్త బూడిద లేదా సున్నం వేసి వాటిని తీసేయాలి. కొన్ని చోట్ల వీటిని తీయటంకు దాహక వస్త్రాలను (Caustic) నీటిలో వేసి బీజాలను అందులో అడ్డుతుంటారు. బీజపు కవచం గట్టిగా ఉంటే ఈ రకపు పరిష్కారం ద్వారా ఏ హాని కలుగదు. అయితే ఈ కవచం తేలికగా ఉంటే ఈ క్రమాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా అనుసరించాలి.


బీజాల మొలకలను శీఘ్ర (త్వరిత)పరిచే విధానం : ఈ విధంగా శీఘ్ర (త్వరిత) పరచడానికి కొన్ని ఉపాయాలున్నాయి. వీటిలో కొన్నింటిని క్రింద సూచించడమేనది.




1. కొమ్మన చేర్చడం : కొన్ని గట్టి చెవులున్న (కమాలు) బీజాలను మడిలోనో, తట్టులలోనో, చల్ల దానిపైన తరగ లేదా గట్టి వరిని కాలుస్తారు. అనంతరం దానిపై నీటిని చల్లుతారు. అప్పుడు ఈ కొమ్మద్వారా మొలక (చిగురు చిగురిస్తుంది) శ్రీఘ్రంగా మొలకెత్తుతుంది.
2. క్రింది భాగంలో కాడలు ఎక్కువైయ్యేట్లు చేయడం : మడులలో ఎక్కువ కొమ్మలు రావడానికి (ఎక్కువ చేయడానికి) మడిలోని మట్టి క్రింద గుఱ్ఱం లేదా గాడిద లద్దిన వరుస్తారు. ఇవి పొరలు ప్రగతి లేకుండా ఉన్న స్థానంలోనే ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ కాడలను బయటికి తీస్తాయి. (చూడండి సస్య పోషణని) ఈ కాడనుంచి మడిలో నాటిన బీజాలు శ్రీఘ్రంగా మొలకెత్తుతాయి. క్యాన (Canna), తాటి నూనె (Oil palm - *Elaeis guinensis*) మొదలైన వాటి బీజాలను గుఱ్ఱపు లద్ది కలిపిన మట్టిలో 2, 3 వారాలు బలంగా నాటుతారు. ఆ మట్టిలో ఉత్పత్తయ్యే కాడలు వీటి చిగురలను శ్రీఘ్రంగా చిగురింప చేస్తాయి (మొలకలను త్వరగా మొలకెత్త జేస్తాయి).
3. శీతలంగా ఉండేటట్లు చేయడం (చల్లగా ఉండేటట్లు చేయడం) : కొన్ని బీజాలు మొలకెత్తడానికి పూర్వం కొంత కాలం సుస్తావస్తలో ఉంటాయి. ఈ సుస్తావస్త 3-4 నెలలు (మాసాలు) కాలాలై యుంటాయి. ఈ అవధిని తగ్గించడానికి కొన్ని క్రమాలు (మార్గాలు) ఉన్నాయి. బీజాలను సుమారు 35° F నుంచి 41° F (2° నుంచి 5° C) శీతలంలో 1-2 నెలల కాలం ఉంచాలి. గులాబీ బీజాలను ఈ రీతిలో చేసుకోతారు.
4. రసాయనిక క్రమం : క్యాన, తాటి నూనె బీజాలు మొదలైన కొన్ని బీజాలు గంధకామ్లంలో 5 నిమిషాలు అద్ది (ఉంచి) ఆ తర్వాత కడిగి నాటితే మొలకలు త్వరగా వస్తాయి. అలాగే క్లోరిన్ (Chlorine) నీటిలో (60 cc నీటికి రెండు బొట్లు క్లోరిన్) నిర్జల ఫార్మిక్ ఆసిడ్ (500 భాగాల నీటికి ఒక భాగం ఫార్మిక్ ఆమ్లం) నిర్జల అమోనియం (గాఢత లేని అమోనియం), ద్రావకం, మొదలైన రసాయనికాలలోనూ బీజాలను నానబెడుతారు. అప్పుడు బీజపు కవచం నీటిని పీల్చుకొంటుంది. ఈ విధంగా నానబెట్టిన బీజాలను ఎక్కువ రసాయనం బీజంపై నిలువకుండేట్లుగా శుభ్రంగా కడగాలి. ఉదా : చిలుకడ దుంప బీజాలను, గాఢ గంధకామ్లంలో (Concentrated Sulphuric acid) 20 నిమిషాలు నానబెట్టితే అప్పుడు మొలక శ్రీఘ్రంగా మొలకెత్తుతుంది. ఈ విధంగా చేయకుండా ఉంటే చిలకడదుంపల బీజాలు మొలకెత్తవు. ఒకవేళ మొలకెత్తినా చాలా నిదానంగా మొలకెత్తుతాయి. స్ట్రాబెరీ (Strawberry) (తుప్ప వండ్లు), వండ్ల బీజాలను ఇదే ఆమ్లంలో 15 నిమిషాలు నానబెట్టాలి. స్పినేచ్ (Spinach) బీజాలు మొలకెత్తడం చాలా నిదానం. వీటిని సమభాగం (సరిసగం) గాఢ గంధకామ్లన్ని (సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్) నీటి మిశ్రమంలో 30 నిమిషాలు నానబెడితే మొలకలు మొలకెత్తుతాయి. మడి (తొట్టి) నిండా మొలకలు మొలకెత్తుతాయి.

కవచాన్ని స్తరీభవనం చేయడం (Stratification) స్థాయి/ అంతస్తులుగా వేరు చేసే నాటడం

బీజాలు గట్టిగా కవచాన్ని అంటుకొని ఉండేందుకు మరొక క్రమాన్ని పాశ్చాత్య దేశపు తోటమాలి అనుసరిస్తున్నాడు. అది బీజాలను మట్టి లేదా ఇసుక మధ్యలో పెట్టడమే ఈ క్రమపు విధానం (2.1 చిత్రం)



2.1



22

అనేక చెట్ల బీజాలు చెట్లలోనే బలీసి కొంతకాలం సుప్తావస్థలో ఉంటాయని మెనేజ్ చెప్పడమైనది.

## 2.1 ఏకకాలంలో బీజాలు శీఘ్రంగా మొలకెత్తడానికి అనుసరించు విధానం.

ఈ అవస్థలోనున్నప్పుడు బీజాలు కొన్ని రసాయన మార్పులకు లోనౌతాయి (కొన్ని రసాయనిక మార్పులను చెందుతాయి). ఈ రసాయనిక చర్య ముగిసేగాని మొలకలు మొలకెత్తవు. ఇటువంటి బీజాలను శీఘ్రంగా ఏక కాలంలో మొలకెత్తేట్టుగా చేయుటకు తడి లేదా మట్టి పొరలు మధ్యలో కొన్ని నెలల కాలం ఉంచుతారు. ఈ విధంగా నానబెట్టేటప్పుడు నీళ్లు మట్టి లేదా ఇసుక ద్వారా బాగా నీళ్లు కారేటట్టుగా ఏర్పాటు చేయాలి. బేరికాయ, చెట్టు బేరి లేదా ఊటి బేరికాయ మొదలైన వాటి బీజాలను ఈ రీతిలో పెంచుతారు. ఈ బీజాలను ఎండిన స్థితిలో సేకరించి ఉంటే వాటికి మొలకెత్తే శక్తి త్వరగా తగ్గి పోతుంది. కానీ వీటిని తడిమట్టి లేదా ఇసుక పొరలలో చేర్చిపెట్టే, ఈ మొలకెత్తే శక్తి తగ్గిపోదు. కాకపోతే వీటి మొలకలు మెత్తగా మృదువుగా ఉంటాయి. గులాబి మ్యాగ్నోలియా గ్రేవ్ ఫ్రూట్ (ద్రాక్షపండు) పర్సిమన్ (Persimmon), చెర్రీ (Cherry), ప్లమ్ (Plum), పీచు (Peach) మొదలైన సమ శోతోష్ణపు పళ్ల బీజాలను ఈ విధంగానే పెంచుతారు. ఈ క్రమాన్ని బీజాలు లభించగానే సాధ్యమైనంత త్వరగా అనుసరించాలి.

బీజాలను నాటడం మేలా ? నారులను గ్రహించడం మేలా ? అని ప్రశ్నించుకుంటే ?

అంతగా అనుభవం లేని కొత్త తోటమాలి బీజాలను నాటి, నారు తయారు చేయడం ప్రయాస / శ్రమతో కూడుకొన్న పని అని భావింపకోవచ్చు. విత్తనాలు నాటి నారును ఏర్పరచుకోవడం చాలా జాగ్రత్తతో, శ్రమతో కూడుకొన్న పనే కాని సులభతరమైన పని కాదు, కష్టసాధ్యమైన పని. మనమే నారును తయారు చేయడం (ఏర్పరచడం) చేత కొన్ని అనుకూలాలున్నాయి.

1. ఖర్చు తక్కువ, నారు వెల బీజాల వెలకన్న చాలా ఎక్కువ. 2. నారును మనమే ఏర్పరచే వాటికి ఎక్కువ ఆపాయం కలగకుండా ఎత్తి నాటుకోవచ్చును. అప్పుడు నారు పెరుగుదల కుంటువడదు. నిరాటంకంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మడినుంచి తీసికొని నాటుకోవచ్చును.
3. నార్లు మంచి జాతివే అని తెలుసుకోవడం కష్టం. మనమే బీజాలను విత్తనాలను నాటి నారు ఏర్పరచే మనకి సులభంగా దొరుకుతాయి. 4. ఏ తోటమాలి అయినా ఈ రోజు కాకపోతే రేపైనా నారునాటడం, విత్తు నుండి నారుని తయారు చేసే కౌశలాన్ని అలవర్చుకొని తీరాలి. ఒకవేళ మన తొలి అనుభవాలు చేదుగా ఉండి ఉండొచ్చు. అయితే ఈ చేదు అనుభవాల్లే భవిష్యత్తులో చక్కటి తోట పెంచడానికి మార్గదర్శి అని తోటమాలి గ్రహించాలి. అనుభవాలన్నీ సవ్యంగానే ఉంటాయని ఎప్పుడూ అనుకోకూడదు. కష్ట సుఖాలతో కూడుకున్నదే అనుభవం.

నారులను తయారు చేసే విధానం (నారును ఏర్పరచే పద్ధతి)

నారును 1. తట్ట (సమతలంలో) చల్లని సమ ప్రదేశములో కుండ, పెట్టి, మొదలైన వాటిలో పెంచ వచ్చును. 2. విత్తనాలు నాటడానికి సిద్ధం చేసిన మడి (పాదు)లలో పెంచవచ్చును. ఈ క్రమాల విషయాలు

మునుముందు వివరించ బడుతాయి. (చూడండి విత్తు నాటుట : కుండ కృషి).

## నాటేటప్పుడు విత్తనాలను ఏవిధంగా నాటాలి (చేర్చిపెట్టాలి)

సన్నని బీజాలను నాటేటప్పుడు వాటిని ఏ విధంగా నాటాలనే ప్రశ్న రాదు. ఎందుకంటే వాటిని ఒక రీతిలో నాటాలంటే కష్టసాధ్యం. కాని పెద్ద / లావు విత్తనాలు వేళ్లలో / చేతిలో పట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉండే విత్తనాలను మనకు కావాల్సిన విధంగా నాటుకోవచ్చు. బీజాలను సరిగ్గా నాటడంలో ఉద్దేశమేమిటంటే, నార్లు డౌంకు గొంకు లేకుండా సవ్యంగా పెరగాలి. వెనుకటి అధ్యాయంలో బీజపు బయటి నిర్మాణం వివరించడమైనది. బీజాల నిచ్చెనలలో (బీజాలలో) ఒక సూక్ష్మమైన రంధ్రముందని ముందే తెలుపడమైనది. ఈ బీజ రంధ్రం భూమిపైపు (నేలపైపు) ఉండేటట్టుగా విత్తనాలను పెడితే, అప్పుడు విత్తనాల మొలక రంధ్రాలు వడకుండా, డౌంకుపోకుండా మొలకలు నేరుగా మొలకెత్తుతాయి. కొబ్బరికాయను వక్కకి (త్రిప్పి) వెడల్పుయిన భాగాన్ని కొంచెం పైకి పెట్టి కాయను అర్థం (సగం) మూసి పెట్టాలి. చిత్రం 2.2.


2.2 కొబ్బరి కాయ విత్తనం కొంచెం ఏటవాలుగా వారి ఉండేటట్టు ఉండాలి.

## బీజాల మొలకల శక్తి (బీజాల మొలకెత్తే శక్తి) (Viability of seeds) (బీజ గర్భత్వం)

విత్తనాల మొలకెత్తే శక్తి ఒకేరకంగా ఉండదు. కొన్ని బలీసిన వెంటనే మొలకెత్తువు. (ఉదా : వేరుశనగ) మరికొన్ని కొంతకాలం సుప్తంగా ఉండి (dormant) ఆ తర్వాత మొలకెత్తుతాయి. కొన్ని చాలాకాలం (ద్వికాలం) సుప్తంగా ఉంటాయి. విత్తనాల మొలకెత్తే శక్తి త్వరగా తగ్గిపోవచ్చు లేదా చాలా సంవత్సరాలకాలం ఎక్కువగా క్రుంగకుండాను ఉండొచ్చు. విత్తనాలు 180 సంవత్సరాలకన్నను ఎక్కువకాలం తను మొలకెత్తే శక్తిని మిగుల్చు కోగలదనే విషయం నమ్ములేకపోతున్నాము. అయితే కొన్ని సంవత్సరాల క్రింద మంచూరియాలో ఒక ఎండిన నరోవరపు క్రింద భాగాన కమల పుష్ప జాతికి చెందిన కొన్ని విత్తనాలు దొరికినాయి. వరిక్ష చేసి చూడగా (చూస్తే) అవి సుమారు 850-1250 సంవత్సరాల క్రిందటి విత్తనాలని స్పష్టమైయ్యాయి. వాటిని నాటగా అందులో కొన్ని మొలకెత్తాయి. అనేక లేగ్యోములు (ద్విదళ జాతికి చెందినవి) లాటి చెట్లు (పాము - లాటి చెట్లు, ఆరటి చెట్లు) ఎక్కువ కాలం మొలకెత్తే శక్తిని మిగుల్చుకొంటాయి.

## విత్తనాల మొలకెత్తే శక్తిని పరీక్షించుట : (Seed Germination Test)

విత్తనాలు బాగున్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని పరీక్షించడానికి విత్తనాలను నీటిలో వేసేప్పుడు తేలే విత్తనాలు డౌన్లవి. క్రిందికి దిగిన విత్తనాలు గట్టివి. మంచివని కొందరంటారు. ఇది స్థూల పరీక్ష కాని అన్ని వేళల్లోనూ ఇది ఈ విధంగానే ఉండదు. నీటిలో మునిగిన విత్తనాలన్నీ మొలకెత్తే శక్తి గలవని చెప్పలేము. ఎందుకంటే అందులోనూ మొలకెత్తలేని బీజాలుంటాయి. అదేవిధంగా తేలే విత్తనాలలో మొలకెత్తే శక్తిగలవి ఉండడానికి అవకాశముంది. అంతేకాకుండా కొన్ని విత్తనాలు తేలికగా వుండి నీటిలో మునగవు. కొన్ని భారంగా వుంటే నీటిలో మునిగి పోతాయి. ఇవి మంచి విత్తనాలుకాకపోయినా తేలవు. అందుచేత ఈ తేలే పరీక్ష అంతగా



2.3

అనుసరించతగ్గ వద్దతి కాదు. దీన్ని కొంత వరకు మాత్రమే అదరించవచ్చు. నీటికి బదులుగా కొందరు ఉప్పు నీటిని ఉపయోగిస్తారు. ఈ క్రమాన్ని ఉప్పు నీళ్ల ఎన్నిక విధానము (Salt water selection) అని అంటారు. కొంచెం ఎక్కువగా ఉప్పుగా ఉండేటట్టుగా నీటిలో ఉప్పువేసి కలిపి అందులో ఈ విత్తనాలు అద్దుతారు (వేస్తారు). బాగా బలిసిన విత్తనాలే నీటిలో క్రిందకి దిగుతాయి. మిగిలినవి తేలుతాయి. ఈ క్రమాన్ని వరి మొదలైనవి నాటడానికి జపాన్‌లోనూ ఇటీవల కాలంలో మనదేశంలోనూ అనుసరిస్తున్నారు. ఇది తోటలో పెరిగే విత్తనాలకు అంతగా సరిపోదు.

మరి కొందరు విత్తనాల గుంపు నుండి కొన్ని విత్తనాలను మచ్చుకు (రకానికి లేదా మాదిరి) తీసికొని వాటిని వగలగొట్టి లేదా కత్తరించ్ రోపలి భాగాన్ని పరిశీలిస్తారు. డొక్లెగో లేకుండా, ఏకముఖంగా విత్తనం ఉంటే విత్తనం నాటడానికి (విత్తేందుకు) తగినదని నిర్ధారిస్తారు. ఇది కూడా అంత సరైన వద్దతి కాదు. అనుసరించ తగ్గ వద్దతి కాదు.

అయితే సరైన క్రమంలో మొలకెత్తే శక్తిని పరీక్షించడానికి ఈక్రింది విధంగా పరీక్షించవచ్చు. ఒత్తు కాగితం (Blotting paper) లేదా తడిపిన ఫ్లానెల్ (Flannel) లేదా తడిసిన మట్టి నిండిన బీజువు తట్ట లేదా మడిలోనూ (తడివేసిన మడి) బీజాలు విత్తనాల రాశుల నుండి మనసుకి తోచినట్టుగా (at random) నూరు విత్తనాలను తీసికోవాలి (ఏరకూడదు). నీటిని తడి ప్రదేశంలో కొంచెం కొంచెం (కొద్ది కొద్దిగా) (స్వల్ప దూరం) దూర దూరంగా ఉంచాలి. నేల ఎండకుండా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి (చిత్రం 2.3).

2.3 విత్తనాల మొలకెత్తే శక్తిని పరీక్షించే (మొలకెత్తించే పెట్టె) (Germination testing box) అంకురించ జేయడానికి ఏర్పరచిన పెట్టె. 1. నీటిని నిల్వే తట్ట (తడాకు) (Tray) 2. చిల్లులు తోకు (Perforated sheet) (చిల్లుల తగడు) నీటిపై ఉండేది. 3. ఒత్తే కాగితం (బ్లాటింగ్) నీటిని 10 భాగాలుగా విభజించాలి ఒక్కొక్క భాగంలోనూ 10 భాగాలుగా విభజించాలి. ఒక్కొక్క భాగంలోనూ 10 విత్తనాలనూ దీనిపై పెట్టాలి. ఒత్తే కాగితాన్ని చిల్లుల రేకుపై పెట్టే మూత 4. మూత మూయాలి, కోసిన కాగితము విత్తనాలకు మొలకెత్తడానికి కావల్సినంత తేమను ఇస్తుంది. నాటిన తర్వాత ప్రతినెలకు ఎన్ని విత్తనాలు మొలకెత్తినాయో లెక్కపెట్టి ఒక గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నూరు విత్తనాలలో ఎన్నెన్ని ఎన్ని దినాలలో మొలకెత్తుతాయి అనేది స్పష్టమవుతుంది.

రెండు, లేదా మూడోరోజు నుంచి ప్రతి నిత్యం ఎన్నెన్ని విత్తనాలు మొలకెత్తుతున్నాయో లెక్కపెట్టుకోవాలి. ఆ జాతికి తగిన మొలక అకాల పరిమితిలో (మొలకల కాలవట్టిని చూడండి) ఎంత మొలకెత్తు తుంది అని లెక్కపెడితే సుమారు ఎన్ని విత్తనాలు మొలకెత్తు తున్నాయనే విషయం తెలుస్తుంది. 100 విత్తనాలలో 80నుంచి 90కన్నా తక్కువగా మొలకెత్తితే విత్తనాలు సరైనవికావు. ఇటువంటి సరైనవికాని విత్తనాలను నేరుగా నేలలో నాటితే అనేక/చాలా చోట్ల ఖాళీ ఏర్పడుతుంది. నాటి పెంచే చెట్లైతే, ఈ విత్తనాలను పొట్టు తీసి, నారు చేసి, నాటి, మొలకెత్తించవచ్చు).

మొలకెత్తలేని ఎక్కువ ఖరీదైన విత్తనాలను కొంచెం కాలం వేడినీటిలో తడిపి, నాటితే అప్పుడు దానికి

మొలకెత్తే శక్తి సుమారు నూటికి 20% ఎక్కువయ్యే అవకాశముంది. ఉష్ణం, ఉప ఉష్ణ వలయం (Sub tropic)లో ఉండే మన దేశంలో సమ శీతోష్ణ వలయపు చెట్లు (Temperate region plants) కొన్ని సంవత్సరాలైన తర్వాత కొత్త విత్తనాలను అటువంటి చోట్ల నేలను దున్ని గుల్లగా చేసుకొని విత్తనాల పొట్టు తీసి నాటడం మంచిది. ఈ విత్తనాలను నాటడానికి నేలను బాగా దున్ని ఎరుపు వేసి చదును చేసుకొని పెట్టుకోవాలి.

విత్తనాల క్రమాన్ని గురించి ఇంకా ఎక్కువగా వివరాలను 'తోట పనులు' అనే అధ్యాయములో యివ్వడం జరిగింది.

## కొన్ని విత్తనాల జీవావధి (Longevity)

### సరాసరి (Average)

ఒక సంవత్సరం : ఆస్టర్ (Aster), డెల్ఫినియా (Delphinium), జర్బెర (Gerbera), లాంటాన, ఫ్లాక్స్ (Phlox), వయోల (Viola), వెల్లుల్లి (తెల్లపాయలు) బెండ, ఎర్రగెడ్డలు.

ఒకటి నుండి రెండు సంవత్సరాలివి : హిలియోట్రాప్ (Helio trope), వర్బిన (Verbena), వరోనిక (Veronica), వినక (Vinca).

రెండు సంవత్సరాల కాలం : అక్విలీజియా (Aquilegia), కోబియా (Cobaea), డైమోఫోతిక్ (Dimorphothecca), ఎకినోప్స్ (Echinops), ఇస్చోలెసియా (Eschscholzia), గైల్లార్డియా (Gaillardia), ఐరిస్ (Iris), కోషియా (Kochia), లిల్లీలు (Lillies), ప్యాన్సి (Pansy), స్టాక్ (Stock), స్వీట్ పీ (Sweet pea), తంబర్జియా (Thunbergia), గ్లోబ్ ఆర్టిచోక్ (Globe Artichoke) బెంగుళూరు మిరపకాయ ఖర్జూర జాతికి పువ్వుకాయ జాతికి చెందిన తర్స్ లీక్సు (Leeks).

రెండు నుండి మూడు సంవత్సరాలివి : అకిలియా (Achillea), అక్రోక్లినిం (Acroclinium), అజిరేటం (Ageratum), క్యాలిస్థెఫస్ (Callistephus) (జైనా ఆస్టర్ తోట ఆస్టరు) బెల్లిస్ (Bellis), కకేలియా (Cacalia), సెంటౌరియం (Centaurea), క్లార్కియా (Clarkia), కియోం (Cleome), హెలిక్రిసమ్ (Helichrysium), మైయోసోటిస్ (Myosotis), నెమీసియా (Nemesia), ప్లాటికాడన్ (Platycodon), స్కాబియోస (Scabiosa), స్టాటిస్ (Statice).

మూడు సంవత్సరాలివి : అలిసం (Alyssum), అంచాస (Anchusa), కంప్యానుల (Campanula), చామంతి ఐపోమియం (Ipomoea), నైజెల్లి (Nigella), సపోనేరియా (Saponaria), జినియా (Zinnia), అస్పరాగస్ (Asparagus), లీమ్స్ లిమా బీన్స్ (డబుల్ లీమ్స్) (Lima beans), బ్రోకోలి (Broccoli), క్యారట్ సూల్ కోల్ (గోసు గడ్డ) బరాజీ, స్పినేచ్ (Spinach).

మూడు నుండి నాలుగు సంవత్సరాలివి : అంటిర్రైనుం (Antirrhinum), క్యాలెండూల (Calendula), క్యాలియాప్పిన్

(Calliopsis), క్యాన (Canna), డయాంతస్ పింక్స్ గొడిటియా (Godetia), సూర్యకాంతి. హీలియాంతస్ (Helianthus), హాలిహాక్ (Hollyhock), మెసెంబ్రియాంతెయమ్ (Mesembryanthemum), మిగ్నోనెట్ (Mignonette), నాస్టర్షియమ్ (Nasturtium), పెంట్ స్టెమన్ (Pentstemon), పెటానియా (Petunia), పాపి (Poppy) పోర్చులకా (Portulaca).

నాలుగు సంవత్సరాలిని : ఆకోనిటం (Aconitum), లోబిలియా (Lobelia), మారిగోల్డ్ వెండు మల్లి (బంతి పువ్వు = Marigold) మ్యాథియోల (Mathiola), మిములస్ (Mimulus), పైరెత్రం (Pyrethrum), రుడ్ బెకియా (Rudbeckia), సాల్పిగ్లోసిస్ (Salpiglossis), బీట్ రూట్, బ్రసెల్స్ స్ప్రౌట్ క్యాబేజ్, కాలిఫ్లవర్, వంకాయ, గుమ్మడికాయ, ముల్లంగి, టమోటో, కర్ణూర, టర్నిప్.

ఐదు సంవత్సరాలకన్నా ఎక్కువ కాలానికి చెందినవి : కరణ కుండలాలు (చామ గడ్డ), డేలియా (Dahlia), జిప్సోఫైల (Gypsophila), లైనం (Linum), వాల్ ఫ్లవర్ (Wall flower), లెట్యూస్, దోసకాయ.

పైన పేర్కొన్న విత్తనాల జీవావధి సరాసరిగా ఉజ్జాయింపుగా లెక్కవేసి చెప్పినదే. దేశ, కాల పరిస్థితులు ఈ పై పేర్కొన్న క్రమాన్ని పాటు తగ్గులు చేస్తుంటాయి.

### విత్తనాలు సేకరించుట

సామాన్యంగా విత్తనాలను ఎక్కువ కాలం దాచి పెట్టరాదు (చేర్చి పెట్టకూడదు). పాత విత్తనాలకన్నా కొత్త విత్తనాలలో మొలకెత్తే శక్తి తగ్గిపోకుండా ఉండేటట్లుగా చూసుకోవాలి. స్థూలంగా విత్తనాలలో రెండు రకాలున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు - ఎండ బెట్టేవి. ఎండబెట్టకూడనివి. (ఎండబెట్టడానికి తగినవి, ఎండబెట్టడానికి వీలు లేనివి) ఉష్ణదేశపు అనేక విత్తనాలు, రెండవ వర్గానికి చెందినవి. ఇటువంటి వాటిని ముదిరిన కొంత కాలానికి విత్తనాన్ని నాటేయాలి. ఈ విత్తనాలను కొంతకాలం చేర్చిపెట్టవలసినప్పుడు కాలిన కట్ల బొగ్గు, కార్బన్ విత్తనాల పొట్టు, కొబ్బరికాయ, నారల ధూళి (బూడిద) రంపపు పొడి లేదా ఎండిన మట్టిలో ఉంచి చేర్చిపెట్టాలి. ఆహార ధాన్యాలు వచ్చు దినుసులు మొదటి గుంపుకు (మొదట రకానికి) చేరినవి. ఎండపెట్టబానికి వీలైనవి (ఎండ పెట్టాల్సినవి). వీటిని తేమ గాలి సోకకుండా బిగుతుగా (గట్టిగా) బిరడాను వేసి సీసాలోనో గట్టిగా గాలి దూరకుండా ఉండేటటువంటి మూతమూసిన టిన్నులలోనో చేర్చిపెట్టాలి. ఈ విత్తనాలకు నాల్గవకాల శత్రువులున్నారు : 1. అధికమైన ఎండ 2. బూజు, పురుగులు పట్టడం 3. గట్టి బెరడు లేదా మూత వేసిన సీసా లేదా టిన్నులలో చేర్చి పెట్టిన అందులో తేమ, బూజు అంటుకోవు. (తేమరారు బూజు వట్టుదు) చేర్చి పెట్టేటప్పుడు (దాచి పెట్టేటప్పుడు) పురుగుపట్టిన విత్తనాలను ఏరిపారేయాలి, విత్తనాలను చక్కగా పరిశీలించి, పరిశోధించి, ఎండలో ఎండపెట్టి చేర్చి పెట్టితే, పురుగుల విజృంభణ చాలావరకు తగ్గిపోతుంది. పురుగు లేదా రోగం వచ్చిన విత్తనాలు (రోగం రాకుండా చూడటం) లేకుండా చేయడానికి. ఈ సీసా/టిన్నులలో చేర్చి (దాచి) పెట్టడానికి, ముందుగానే శుభ్రపరచి, ఎండలో పెట్టి దాచి పెట్టాలి. టిన్ను మొదలైన వాటిని చల్లని స్థలాలలో,



ఎక్కువ వేడిరాని చోట పెట్టాలి.

కొందరు సీసా లేదా టిన్ముసు గాలిలో ఉండే తేమ కూడా లేకుండా బయటి (వెలుపలి) తేమ తగలకుండా కార్బియం క్లోరైడ్ (Calcium chloride) అనే వాటిని విత్తనాలపై వర్చి, విత్తనాల్ని చల్లే స్థలంలో వరిచి వాటిపైన కొంత ఎండిన మట్టిని వరిచి ఆ తర్వాత విత్తనాల్ని వాడుతారు. ఈ రసాయనికానికి తేమని పీల్చుకొనే శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. మూటలోనే విత్తనాల్ని చేర్చి కూడవెట్టాల్ని ఉంటే పురుగు పట్టుకుండా నాఫ్తలీన్ (Naphthalene) గురికలను ప్యారాడై క్లోరో బెన్సీన్ (Para dichloro benzene) (PDB) అనే మందు మేస్తారు.

విత్తనాలు ఏలయినంత చల్లగా (తేమగా) ఉండేటట్లు చూడాలి. పాశ్చాత్య దేశాలలో వీటిని రెస్టిజరేటరు (ఐస్ పెట్టి) లలో పెడుతుంటారు. రెస్టిజరేటర్ లో చేర్చి (దాచి) పెడితే విత్తనాలు ఎక్కువగా ఊపిరాడవల్సిన (శ్వాసించాల్సిన) అవసరం లేదు. ప్రాణ వాయువు (ఆక్సిజన్) ఆవశ్యకత చాలా తక్కువ, పురుగులు పట్టవు. ఎక్కువ తేమ అవదు (పట్టుదు).

కొన్ని విత్తనాలను తేమ ఉన్నట్టుగా నాటాల్సివస్తుంది. ఉదా : సపోట, చెట్టు సపోట, తియ్య బాదామి ఇటువంటివి, ఇటువంటి విత్తనాలు మొలకెత్తే శక్తి తగ్గకుండా తేమ/తడి ఆరకుండా ఉండటానికి వీలుగా రిస్టిజరేటర్ లో పెట్టుకోవానికి వీలుగా ఉపయోగకారిగా ఈ ఐస్ పెట్టెలుపయోగపడుతున్నాయి. విత్తనాలను మనమే తయారు చేసుకొనడమో లేదా కొనడమో (ఇతరుల నుండి గ్రహించడమో) ?

వచ్చుల చిన్న విత్తనాలు కాని, తీసేసిన విత్తనాలుకాని, ఉత్పన్నమైన విత్తనాలు కాని, ఏదైనా పెరిగడి క్రమం, శ్రమం, ఖర్చు ఒకటే అయితే తీసేసిన విత్తనాలను నాటితే ఈ శ్రమ, ఖర్చు వ్యర్థం. ఉత్తమమైన విత్తనాలను నాటితే సార్థకత చేకూరుతుంది. పెరిగే క్రమంలో ఎక్కడైనా హెచ్చుతగ్గులైతే దాన్ని సరిచేసుకోవచ్చు. అయితే ఏత్తే (నాటి) విత్తనాల విషయంలో కృశించడం (ఎండిపోవడం) కనిపిస్తే కావల్సిన జాగ్రత్తలు వహించకుండా ఉంటే, అప్పుడు వీటిని ఇంక సరిచేసుకోవడం వీలుకాదు. దూర దృష్టితో లాభం ఫల దృష్టితో ఉత్పన్న బీజం (విత్తనమే) చెత్తైన విత్తనాలు.

నాటిన విత్తనాలు మొలకెత్తితే చాలదు. అవి రోగరహితంగా ఉండాలి, శుభ్రంగా, శుచిగా ఉండాలి. (అంటే ఇటువంటి జాతి విత్తనాలలో ఇతర సస్యాల విత్తనాలు , చెత్తా చెదారం లేకుండా శుభ్రమైన మంచి విత్తనాలు లేదా మంచి జాతికి చెందినవై యుండాలి.) శుభ్రమైన మేలు జాతికి చెందినవై, మంచివై పుద్గించే గుణాలున్న (లక్షణాలున్న) విత్తనాలు పెంపొందించే జాతికి చెందినవిగా ఉండాలి (Pure strain) లేదంటే, ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువ వంటను ఇచ్చే అనేక లక్షణాలను పొందియున్న మిశ్ర విత్తనాలు (సంకర విత్తనాలు) (Hybrids శక్తివంతమైన విత్తనాలు) వచ్చినాయి (వస్తున్నాయి). ఈ రకపు సంకర విత్తనాలను మనమే మన తోటలోనే తయారు చేసుకోవడం కష్టతరం. సంకర బొన్న, సజ్జ, మొక్క బొన్న కాకుండా, సంకర ఎర్రగడ్డ, టామోటో, పుష్పాలు మొదలైనవి వస్తున్నాయి. మునుముందు ఇంకా అనేకమైన ఎక్కువశక్తివంతమైన, ఫలవంతమైన మొలకలు మొలకెత్తుతాయి. వీటిని పెంచడానికి మనము ప్రతిసారి సంకరం చేసిన విత్తనాలను

తీసికోవాలి. మనతోటలోనే తయారు చేసుకొంటే ఆ తర్వాత వచ్చే మొక్కలు సంకర జాతికి చెందుతాయి (కులం) (జాతి చెడుతుంది). ఇలాగని ఆ క్షణం మనం పెంచే ప్రతి ఒక మొలకే విత్తనాలన్నీ కొనుక్కోవాలని కాదు. కొన్ని విత్తనాలను మనమే తయారు చేసుకోవచ్చును. ఈ విధంగా సొంతంగా సంకర బీజాలను తయారు చేసుకోనేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త వహించాలి. మొదట మనకు నచ్చిన లక్షణాలున్న చెట్లను (మొక్కలను) ముందరగానే విత్తనాల కొరకు వదలడానికి ఎన్నిక చేసుకొని పెట్టుకోవాలి.

రెండోది ఈ మొక్కల మట్టు ప్రక్కల లేదా మధ్య వేరే ఏ జాతి (అవగుణ మొక్కలు) మొక్కలుంటే వాటిని పెరగనియకుండా ఎప్పటికప్పుడు వాటిని ఏరిపారేయాలి. ఈ పనిని రోగింగ్ (Rogueing) (చెత్త చేదారాలను తీసేది) అని వ్యవహరిస్తారు మూడోది విత్తనాలు శుభ్రంగా ఉండడానికి మొక్కలకు సరైన పాదుచేసి అందు చెల్లా చేదారం లేకుండా చేసి చదునుగా పెట్టాలి. నాల్గోది ఈ విత్తనాల మొక్కలను ఎక్కువ నమ్మదీగా అడ్డులేకుండా మొక్క చిగురించినప్పటి నుండి స్వేచ్ఛగా పెరగడానికి మొక్కకి మొక్కకి మధ్య కొంత స్థలాన్ని వదిలి మొక్కల్ని / విత్తనాల్ని చల్లి పెంచాలి. ఐదోది ఈ మొక్కలకి రోగాలు, కీటకాలు (పురుగులు) పట్టకుండా ఉండేటట్టుగా అప్పుడప్పుడు ఎరువు, మందులను చల్లి జాగ్రత్తగా కాపాడుతూ ఉండాలి.

ఆరవది బలీసిన విత్తనాల్నే ఏరి, కోసి, జల్లించి ఒక కొలతలో గ్రహించి, ఎండబెట్టి, చదునైన భరణీలలో / సిసాలలో / టిన్నులలో వేర్చి పెట్టాలి. ఈ జాగ్రత్తల క్రమాన్ని అనుసరించి సామాన్యమైన అనేక విధాల / రకాల మొక్కల విత్తనాలను మనమే తయారు చేసుకోవచ్చును. మిగిలిన జాతి మొక్కల విత్తనాలను ప్రభుత్వ వ్యవసాయ శాఖ, వ్యాపారస్థుల ద్వారా, నేషనల్ సీడ్స్ కార్పొరేషన్ (National Seeds Corporation) మొదలైన సంస్థల నుండి తెప్పించుకోవచ్చు.

### విత్తనాలకి మందులు ఉపచారాలు/పరిష్కారాలు (Seed Treatment)


ఎన్నో సస్య రోగాలు విత్తనాల ద్వారానే అంటుకొంటాయి. వీటిని బీజదారక రోగాలు (Seeds - Borne diseases) అని అంటారు. ఆకు క్యాబేజీ కాటుక తెగులు (Black smut) మొక్కజొన్న, కాటుక, మొక్కలు, తీగలు ఒకదాని నుండి ఇంకొక దానికి అంటించేవి, ఖర్జూర ఆకుపై వచ్చేడి ఆంథ్రాక్నోస్, (వర్ణ హీనత - Anthracnose) లేత మొక్కలకి వచ్చే ఆర్థ్రహరాణి (damping off) కుళ్ళు, మొదలైనవన్నీ విత్తనాలకొచ్చే రోగాలు, ఈ రోగాల అంటు లేదా రోగాణువులు విత్తనాల కవచంపైన లేదా లోపలో ఉంటాయి. మొలకెత్తినప్పుడు ఈ రోగాలు చురుకైన లేత మొక్కలలో ఎక్కువగా రోగాలను కలిగిస్తాయి. ఈ కారణం చేత మొక్కలు మరణించి గుల్ల ఏర్పడుతుంది. లేదా భూమిలో ఆక్కడక్కడ ఖాళీ ఏర్పడుతుంది. కొన్ని మొక్కలలో ఈ రోగం వెరిగి మొక్కలో చిలికెత్తడంబులు లేదా మొగ్గ పువ్వుగా మారేటప్పుడు ఇవి బయటపడ్తాయి. ఈ రోగాణువుల విత్తనాలు రోగపు తల్లి చెట్టునుండి ఇంకేరితిలోనైనా వేరవచ్చును.

ఈ విత్తనాల ద్వారా వచ్చే రోగాలు అపడం చాలా సులభం. విత్తనాన్ని నాటడానికి ముందు విత్తనాలను కొన్ని రసాయనిక మందులను కలిపి, అందులో విత్తనాలను వేస్తే ఈ రోగాణువులు చస్తాయి. ఈ రసాయనికాలు


శిలీంధ్ర నిరోధకం శిలీంధ్ర హరణులు (Fungicides) శిలీంధ్రాల్ని నాశనం చేసేంతవరకు పాదరసం మొదలైన సంయుక్త పదార్థాలు (Mercury compounds) కొన్ని ఇక్కడ తెలుపబడినాయి.

1. పాదరసపు బైక్లోరైడు (Bichloride of mercury) ఒక లీటరు నీటిలో ఒక గ్రాము మందును (ఔషధాన్ని) కలిపి విత్తనాలను, 8 నుండి 15 నిమిషాలు అద్ది తీయాలి. టొమోటో, మిరపకాయ, వంకాయ విత్తనాలను 8 నిమిషాలు అంటుకట్టే తీగలకు ఖర్చూరం, దోసకాయ మొదలైన విత్తనాలను 10 నిమిషాలు, క్యాబేజీ, కాలిఫ్లవర్ ఇతర జాతికి చెందిన క్యాబేజీ రకాలు విత్తనాలను 15 నిమిషాలు అద్ది ఉంచాలి. ఈ విధంగా అద్ది (నాన్ని) బయటికి తీసిన తర్వాత విత్తనాలను నీటిలో జాడించాలి. ఈ రసాయనికాలు చాలా చురుకైన పదార్థాలు. అందుచేత వీటిని రోపాన్ని పాత్రలకు బదులుగా గాజు పాత్ర లేదా కుండ లేదా పింగాణి పాత్రలో కలపాలి. ఈ పదార్థాలు వివహరితమైనవి అందుచేత చాలా జాగ్రత్త వహించి పై వస్తులు నిర్వహించాలి. పని పూర్తయిన వెంటనే సబ్బుతో శుభ్రంగా రుద్ది చేయి కడుక్కోవాలి.
2. మైలు తుత్తం (Copper Sulphate) ఒక గ్యాలన్ (సుమారు 4½ లీటరు) నీటిలో 1 నుంచి 2 ఔన్సులు (సుమారు 30 నుండి 60 గ్రాములు) మైలుతుత్తంను కలిపి పెట్టాలి. అందులో విత్తనాలను తడపాలి. ఈ విధంగా తడిపిన విత్తనాలను మళ్ళీ జల్లించాలి. ఎండబెట్టి ఆ తర్వాత నాటాలి.
3. పారాల్డిస్టైడ్ ఒక గ్యాలన్ (సుమారు 4½ లీటరు) నీటికి ½ నుండి 1/4 ఔన్సులంత (15 నుంచి 20cc) పార్బులిన్ (పారాల్డిస్టైడ్ - శే 40 బలం (శక్తి గలది) పోసి విత్తనాలను గుడ్డ సంచిలో చుట్టి సున్నపు తెటలోనో (1 గ్యాలన్ 1టికి 1½ ఔన్సుల సున్నం వేసి చేసిన నీటి మిశ్రమం) జాడించాలి.
4. తామ్రపు ఆక్సైడ్ (Oxide of Copper) (కొంతపాడి) పస్యం కుళ్ళినప్పుడు లేదా షీజింగ్ రోగానికి సిద్ధపడం. 1 పొండు (సుమారు 450 గ్రాములు) విత్తనాలకి ఒక టీ స్పూనంత ఈ పాడిని కుండ లేదా డబ్బారో కలిపి, దాని మూత మూసి పాడి విత్తనాలపై వ్యాపించేటట్టుగా / విస్తరించేటట్టుగా కొంతకాలం / కొద్ది కాలం బాగా కులకాలి/కలియపెట్టాలి.
5. తామ్రపు కార్బోనేట్ / కార్బో కార్బోనేట్ (Copper Carbonate) దీన్ని కూడా పస్యం (మొక్క) కుళ్ళుకుండా నివారించడానికి ఉపయోగించ వచ్చు. దీన్ని చాలా తక్కువ ప్రమాణంలో వేయాలి. (1 లీటరు విత్తనాలకి 2.3 గ్రాముల ఔషధం) ఈ మిశ్రమాన్ని ఎక్కువ ప్రమాణంలో వేస్తే మొక్కలకి హాని కలుగుతుంది.


ఇవి కాకుండా సెరసాన్, క్యాప్టాన్, సెమిసాన్ మొదలైన అనేక కలపని పదార్థాలున్నాయి. వీటిని కొనేటప్పుడు ఈ రసాయనిక పదార్థాలని ఏ ప్రమాణంలో ఏ విధంగా కలిపి మిశ్రమాలగా చేసుకోవాలనే సూచనల వలెన్నీ గ్రహించి ఆ సూచనలను ఖచ్చితంగా అనుసరిస్తే చాలా ఉపయోగకరంగా వుంటుంది. (ఎక్కువ వివరాలకు - సస్యరక్షణ) మొక్క కుళ్ళడం లేదా వాడి నాశనమయ్యే (Damping off) రోగం సామాన్యంగా ఎక్కువగా ఏర్పడేది. ఎప్పుడంటే బీజాలను ఎక్కువ వత్తుగా నాటినప్పుడు, కాపు (తావం) ఎక్కువగా మున్నప్పుడు (ఎక్కువ ఎండ కాసి, వర్షం కురిసినప్పుడు) నీరునిలిచే స్థలాలలో విత్తనాన్ని నాటినప్పుడు. ఈ పరిస్థితి రాకుండా సరైన



2.4



2.5



2.6

కాలంలో విత్తనాలను నాటినప్పుడు క్షీణరోగం కొంతలో కొంత తగ్గుతుంది.

### కొన్ని విశేష విత్తనాలు నాటే క్రమాలు

ఫెర్న్స్ (Ferns) మొక్కల బీజ కణాలను (Spores సిద్ధ బీజాలు) నాటుట. ఫెర్న్స్ గుర్తు పువ్వు జాతికి చెందిన మొక్కలు. (వీటి పువ్వు గుప్తం) వీటి బీజకణాలు (సిద్ధ బీజాలు) చాలా సూక్ష్మమైనవి. ధూళిలాగ, ఇవి చిట్టడానికి ముందే నీటిని ధరించిన ఆకు గరికలను చేర్చిపెట్టుకోవాలి. (చిత్రం 2.4).

2.4 ఫెర్న్స్ ఆకులపైన సిద్ధ బీజాలు (Spores) ఏ విధంగా ఉన్నాయో అనే విషయాన్ని పై చిత్రంలో చూడండి. ఇందులో కణాలు ఆకు అంచు నుంచి కొద్దిగా లోపలికి జతగా ఉన్నాయి. క్రింది చిత్రంలో ఆకు అంచులో కణా కోశాలున్నాయి. ఈ సిద్ధ బీజాలను సూక్ష్మజీవి రహితం చేసి సారవంతమైన (sterilized) మట్టిని నింపిన విత్తనాలను తట్టలలో చల్లాలి. సూక్ష్మ క్రిములను నాశనం చేయడానికి ఉడక / మరిగే నీటిని తట్టలో మట్టిపై పోయ్యాలి. ఈ విధంగా శుభ్రంచేసిన మట్టిని ఎండబానికి వదలిపెట్టాలి.

తేమ లేకుండా అరి బాగా ఎండిన తర్వాత పై పొరని కొద్దిగా కెలికే (కదిలించి) చదునుచేసి కొద్దిగా అదిమి దానిపై ఫెర్న్స్ సిద్ధ బీజాలను చల్లాలి. ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ఈ విత్తనాల తట్టను నీళ్ళున్న ఇంకోక తట్టపైన ఉంచాలి. విత్తనం తట్టలో మట్టి క్రిందనున్న నీటిని ఎంత పీల్చుకోవచ్చో అంతమాత్రమే పీల్చుకుంటుంది. ఎక్కువ తడి అప్పుడు ఎక్కువ తేమ ఈ విత్తనాలకి హానికరం. కాబట్టి విత్తనాల తట్టకి పైనుంచి నీళ్ళు చిలకరించే బదులు క్రిందనుంచి నీటిని పీల్చుకొనే క్రమాన్ని అనుసరించాలి.

ఈ విధంగా బీజకణాల్ని (సిద్ధ బీజాలను) చల్లిన తర్వాత తట్టలోని మట్టితేమ ఆరకుండా తట్టపైన ఒక గాజుమూత మూయాలి. దానిపైన చీకటికోసం పాతబడిన పత్రికను కప్పాలి. అప్పుడప్పుడు తట్టలోని నీళ్ళు తక్కువైన వెంటనే తగిన నీటిని వేస్తూండాలి. (తగిన నీటితో నింపాలి). విత్తనాలను గరి ఆకునుంచి చిలకరించడానికి (చల్లడానికి) బదులు ఆకును త్రుంచి ముక్కలు చేసి ఈ ముక్కలనే విత్తనాల తట్టలోని మట్టిపైన ఉంచాలి (పెట్టాలి). అప్పుడు అవి చిట్టి బీజాలను వెదజల్లుతాయి. చిత్రం 2.5, 2.6.

2.5 ఫెర్న్స్ విత్తనాలను నాటే విధానము (రీతి). నీటిపైన ఒక కుండ పెట్టబడింది. కుండ వలుచని (సన్నని) జల్లెడ పెట్టిన మట్టితో నింపబడింది. దానిపైన గాజు మూత మూయబడింది. కణకోశాలు చిట్టి అవే అక్కడ నాటుకొంటాయి.

2.6 విత్తనాలను చల్లి, ధూళి బీజాలను జల్లెడ పెట్టేట్టుగా చిలకరించాలి.

విత్తనాలను చిలకరించిన లేదా ఆకు ముక్కలను పెట్టిన తర్వాత సిద్ధ బీజాలను మట్టితో మూయరాదు.

నీటి మొక్కలను నాటే విధానము :

కమల, నల్ల తామర (రాత్రి రాణి) విక్టోరియా రెజినా (Victoria-regina) మొదలైన నీటి మొక్కల విత్తనాలను నాటడానికి బంకమట్టి నింపిన ముక్కలను లోతులేని నీటిలో ముంచాలి. విత్తనాలమట్టి, నీటిమట్టి

సమానంగా ఉండేటట్లు ఈ కుండలను ఇటుకలపైన పెట్టాలి (కూర్చి పెట్టాలి). ఈ విధంగా చేస్తే విత్తనాలకు సూర్యరశ్మి తగ్గలడానికి (పోకడానికి) అవకాశం ఉంటుంది. దీనికి కారణం ఈ విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి వేడిమి, (సూర్య రశ్మి) అవసరం.

### అబీజ మొక్కలభివృద్ధి (Vegetative Propagation) శాఖీయ వ్యాప్తి

మొక్కలను విత్తనాల ద్వారా మాత్రమే కాకుండా వేరు, కాండం, మొగ్గ, ఆకు మొదలైన అబీజ భాగాల ద్వారాను వ్యాపింప చేసుకోవచ్చును. ఈ విధమైన మొక్కల వ్యాప్తిని అబీజ మొక్కల అభివృద్ధి (శాఖీయ వ్యాప్తి) సస్యాంగ సంతానోత్పత్తి, అలైంగిక సంతానోత్పత్తి అని (Asexual reproduction) వ్యవహరిస్తారు.

ముందు తెలిపినట్లుగా, విత్తనం స్త్రీ పురుష సంవర్గం ద్వారా వచ్చింది. అందుచేత వాటినుండి వచ్చిన మొక్కల గుణ లక్షణాలు తల్లి దండ్రులయొక్క గుణాలను పోలవచ్చు. పోలకుండాను ఉండొచ్చు లేదా గుణ అవగూలను రెండింటిని పొంది యుండ వచ్చును (పోలుండవచ్చు) విత్తనం నుండి వచ్చిన మొక్కల గుణ లక్షణాలు ఫలాన్నిచ్చేంత వరకు నిశ్చయిత లేదు. (ఖచ్చితంగా చెప్పలేము). ఉదా : మామిడి తల్లిపెట్టు మామిడి వండు చాలా మంచి గుణాలున్న మంచి చెట్టై ఉండొచ్చు. అయితే వాటి దింక ద్వారా పెంచిన చెట్టు ఇచ్చే వండ్లలో ఈ సుగుణం మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయా? లేదా అని తెలుసుకోడానికి ఆ చెట్టు యొక్క వల్లుకోసం పలు సంవత్సరాలు వేచి ఉండాలి. అయితే అబీజ భాగాల ద్వారా కాండం, రెమ్మ మొగ్గ మొదలైన వాటి ద్వారా పెంచిన మొక్క అన్నివిధాల తల్లి యొక్క గుణలక్షణాల్ని పొందే ఉంటుంది. దాని వండు కూడా ఖచ్చితంగా తల్లి యొక్క వండులాగే ఉంటుంది.

అందుచేత ఒక తీగ లేదా ఒక మొక్క గుణశుద్ధమైందిగా ఉంచుకోవాలంటే, దాన్ని అబీజ భాగాల ద్వారానే పెంచుకోవాల్సి వస్తుంది. అబీజ సస్యాభివృద్ధి క్రమం చాలాకాలం క్రింద అనేక శతాబ్దాల నుంచి తోటమాలి అనుసరిస్తున్న క్రమం. దీనికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి.

1. కొన్ని సస్యాలు బీజాలను ఇవ్వవు. అరటి, అబీజ (ద్రాక్ష (Seedless grapes) అబీజ కమలాపండు (Seedless Orange) ఇత్యాదివి. ఇటువంటి వాటిని వృద్ధి చేసుకోవడానికి అబీజ భాగాల ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది.
2. అనేక రకాల ఉత్పన్న ఫలాల చెట్టును మిగుల్చుకొనడానికి కాపాడుకోవడానికి ఇదొక్కటే క్రమం. ఇటువంటి వాటిని బీజాలద్వారా పెంచితే అనేక అవలక్షణాలు, అవగూలు కనపడుతూవుంటాయి (వస్తాయి).
3. అబీజ భాగాల ద్వారా పెంచిన అనేక మొక్కలు బాగా పెరగడమే కాకుండా త్వరగా ఫలాన్ని ఇస్తాయి. ఉదా: అంటుకట్టిన మామిడి, సపోట మొదలగునవి. 2-3 సంవత్సరాలకు ముందుగానే ఫలాన్ని ఇవ్వడానికి ప్రారంభిస్తాయి.

బంగాళాదుంప, జరీనియం (Strawberry fruit) ఇటువంటి వాటి విషయంలో ఎక్కువగా అన్వయించుకోవచ్చు. చెట్ల బీజాల ద్వారానే పెరిగినవాటిలో ఫలం, వండ్లు చాలా నిదానంగా వస్తాయి. ఉదా :

అమాకిల్స్ గడ్డ దుంప ఎండసి ఒక నెలలో పువ్వు పుష్పిస్తుంది. అదే బీజం నుండి వచ్చిన మొలకెత్తిన మొక్క యొక్క పువ్వు పుష్పించడానికి 2-3 సంవత్సరములు కాలం కావల్సివస్తుంది.

4. కొన్ని సందర్భాలలో అబీజాల ద్వారా సస్యాల వృద్ధిచేసుకొనే క్రమం తక్కువ ఖర్చుతో కూడినది. వీటి బీజాలు ఎక్కువ ధర.

5. కొన్ని మొక్కలలో ఈ క్రమం, బీజాల ద్వారా పెంపడంకన్నా సులభం. ఉదా : బోగ్వలెలా (గడ్డ బోగొనియ) దీని బీజాలు చాలా సన్నని ధూళిలాగ వుంటాయి. ఈ విత్తనాలను గ్రుచ్చి నాటడానికి ఎక్కువ వరిశ్రమ, హెచ్చరిక (జాగరూకత) కావాలి. గడ్డ దుంప ద్వారా పెరగడం చాలా సులభం.


### అబీజ సస్యోత్పాదనకు కావల్సిన అనుకూల పరిస్థితి (Environmental Conditions)

ఈ క్రియ సరిగా జరిగేందుకు, లేదా కాండం పెరగడానికి అనుకూల పరిస్థితులను కల్పించినంత మాత్రాన అబీజ సస్యోత్పాదన జయప్రదమవ్వదు. వేరు మొలకలు (మొక్క), కాండపు క్రింది భాగాలు, కాండపు మొక్కలు, వేరు చిగురించడానికి చాలినంత ఉష్ణముండాలి. దీనికోసం క్రింద నుంచి కాడనివ్వడానికి మధ్యమపు (మధ్య ప్రదేశం, మధ్య క్షేత్రం Medium) క్రింది భాగానికి కొత్త గుర్రపు కొత్త లద్దిని వేయాలి. పై శాఖలు వ్యాప్తి చెందడానికి (పెరగడానికి) ఈ కారణం చేతనే వీటిని గాజా ఇచ్చులో పెడుతుంటారు.



ఈ అబీజభాగాలు, బలిసినై యుండుటచేత, బీజాలకన్నా ఎక్కువగా శ్వాసిస్తాయి (ఊపిరాడుతాయి). అందుచేత దీనికి ఎక్కువ ఆక్సిజన్ (వాయువు) అవసరం. అదే విధంగా ఈ బాగాల నుండి, అందులోనూ ఆకుభాగం నుంచి ఎక్కువ (చాలా) నీళ్ళు ఆవిరి రూపంలో బయటెళ్ళుతుంది. భాష్ప విసర్జన (Transpiration భాష్పేత్యేకం) ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది. లేదా అంగాంశం వృద్ధి ఆగుట చేత వృద్ధి చెందటం చేత ద్యుతి సంశ్లేషణక్రియ (మొదటి అధ్యాయం సస్యక్రియను చూడండి) పచ్చని భాగంలో జరిగే సంయోగక్రియ జరగవల్సి ఉండటం చేత, ఈ పని బీజాలకన్నా ఎక్కువ నీరు కావల్సివస్తుంది. అందుచేత వేరు లేదా కాండం లేదా ఆకుల మొక్కలను నాటి సస్యభివృద్ధిని జయప్రదంగా నడపడానికి వీటిని నాటి నేల (క్షేత్రం) మధ్య చాలినంత జాగా వుండాలి. గాలి ధారాళంగా వీచదు, చాలినంత తేమ నిలువకోలేనటువంటిదై ఉండాలి.

ఇది బయటి పరిస్థితి సంబంధించిన విషయం. ఈ అబీజ భాగాలు, వేరు, కాండాలను పెంచి, సస్యాలనుటకు ఈ భాగాలు, లోపలి పరిస్థితి కూడా సూక్ష్మమై యుండాలి. ఈ భాగాలు చాలినంత బలిసి ఉండాలి. లేత లేదా ఎక్కువ బలిసిన భాగాలు సస్యోత్పాదనకు పనికిరాదు. అందులో కొన్ని మొక్కలు కొంతకాలం నువ్వు (గుప్తంగా) ఉంటాయి. ఈ భాగాలలో అవి చిగురు, వేరు మొలకెత్తే కాండం, ఆకుల, క్రింది శ్రావి, స్వతంత్రంగా తమ ఆహారాన్ని తామే పొందే శక్తిని సంపాదించేంత వరకు కావల్సిన అవారం ఉండాలి. లేత లేదా బలిసిన కొమ్ము భాగాలలో కావలసినంత అవారం ఉండదు.





2.7



2.8



## అభీజ సస్యోత్పాదన విధానాలు (Vegetative Propagation Methods)

స్థూలంగా ఈ విధానాలు రెండు గ్రూపులుగా విభజించుకోవచ్చు. 1. అభీజ భాగం తనదైన స్వంత వేరులను పెంచుకునేట్టు అనుసరించే విధానాలు వేరు వికసించజేసే క్రమాలు 2. అభీజ భాగాన్ని వేరుండే ఇంకొక సస్యం (మొక్కపై) కూర్చోబెట్టి (చేర్చి) పెంచే విధానం అంటుగట్టే పద్ధతి.

వేరును వికసించజేసే విధానాలు : ఇందులో రెండు రీతులు ఉన్నాయి. 1. తల్లి మొక్కకి చేరినట్టుగా, వేరున్నప్పుడే మొక్క యొక్క ఒక భాగం నుంచి వేళ్ళను వచ్చేట్టుగా వేరు చేయడం (ఉత్పత్తి చేయడం).

a. సకరు (Suckers పిలక మొక్క) (వేరు పిలక మొక్క లేదా వేరు పిలక) ద్వారా, b. తీగ లేదా పండిన కాండం లేదా లతలు (Runners) c. మట్టి కట్టే వేరు ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా లేయర్ (Layer) చేయడం ద్వారా (లేయరేజ్ layerage).

1a. సకరు ద్వారా వేరు ఉత్పత్తి చేయడం :


అరటి, అనానస్ (Ananas) కొన్ని నిమ్మ జాతులు సపోటా, ఎర్ర రసవూరి (Red Raspberry) మొదలైన వానిని వేరు మొక్క లేదా పిలకలు నాటి వేరు ఉత్పత్తి చేస్తారు. మొక్కలు కొన్ని జాతి మొక్కల క్రింద భాగంలో వేర్లు (వేళ్ళు) చుట్టూ వ్యాపిస్తాయి. ఈ వేరు మొక్క లేదా పిలకలను సకరు (Sucker) అనే సామాన్య కుండ ద్వారా చట్టతారు. వేరు నుండి మొలకలు బయలుదేరితే వేరు సకరు (Root Sucker) కాండం నుంచి బయలుదేరితే కాండ సకరు (Stem sucker) అని వ్యవహరిస్తారు. వేరు మొలకలు వేరు మొక్క అని రక్షం లేదా అసాధారణ (Adventitious) వేరు మొగ్గలనున్న మొగ్గలనుంచే వేర్లు బయలుదేరి, వ్యాపిస్తాయి. ఉదా : అరటి, అనానస్ చిత్రం 2.7, 2.8.

2.7 అనానస్ (పైనాపిల్) 1. పిలకలు (Slips) ఇవి ఆఫ్ సెట్ అయిననూ స్ప్లెష్ అనే పిలవడం వాడుక. అనానస్ నుండి అనేక భాగాలను నాటి సస్యోత్పాదన చేసుకోవచ్చు. అవి ఏవంటే 2. చెట్టు కాండం 3. మధ్యనున్న పిలకమొక్క (Sucker సకర్) 4. ప్రక్కనుండి పిలకమొక్క 5. పండు క్రింది భాగం నుండి వచ్చే పిలక (స్లెప్) 6. అనానస్ పండు 7. పై నుండే (నెత్తిపై) పిలక.

2.8 చిత్రం.

2.8 అరటి సస్యోత్పాదన 1. క్రింది భాగం (కాండం) నుండి మొగ్గ చిగురించేది. ఈ మొగ్గ నుండి రెండు విధాల సకరులు బయలుదేరుతాయి. 2. దూబాకుడి నాటారాదు. ఫలశక్తి దీనికి తక్కువ 3. శక్తిగల సకరుల వంటి వాటినే నాటాలి.

నేలలోవలీకి లేదా నేల సమమట్టాన్ని ఉండవచ్చు. అరటి పిలకలు నేలలోవలీ నుంచి వస్తాయి. ఈతలు మొదలైనవి నేలమట్టానికే సమ మట్టంగా (horizontal - సమాంతరంగా) ఉండే వేళ్ళ ద్వారానే వస్తాయి. (చిత్రం 2.9) ఎర్ర రసవరి మొదలైన కొన్ని మొక్కలలో ఇటువంటి వేరు మొక్కలు సామాన్యమైన పాత



2.9



2.10

కాండాలకు బదులుగా కొత్త కాండాలను (వీటిని నామట అని అంటారు - Canes) త్రోస్తాయి. ఈ మొక్క స్వభావాన్ని తెలిసికోవచ్చును.

2.9 కొన్ని చెట్ల మొక్కలు వేరు నుంచి సకరులు పుడతాయి. వీటిని వేరుచేసి పూడ్చాలి.

వేరు మొక్కలు (వేరు పీలకలు) బయటికి రావాలంటే తలపైనున్న విత్తనాలను త్రోసి రావాలి, ఈ విధంగా త్రోసి పోరినప్పుడు వేరులో నున్న అసాధరణ మొగ్గలు చురుకెత్తి వాటి నుండి వేరు పీలకలు బయటికొస్తాయి. కొన్ని సందర్భాలలో ఈ వేరు పీలకల ఉత్పత్తి శక్తి అవగణనగా ఉండటం సంభవిస్తుంది. ఉత్తమ జాతి యొక్క పీలకలు, అంటుగట్టిన మొక్కలలో ఇటువంటి వేరు పీలకలు (సకరులు) పెరగకుండా అప్పుడప్పుడు పెరికివస్తుంటారు. ఈ విధంగా చేయకుండా ఉండే నిష్పలమైపోతుంది. అంటు గట్టిన మొక్కలకు ఈ హెచ్చరిక చాలా ముఖ్యమైంది.

పీలకలు వెనుక చెప్పినట్లుగానే ప్రకాండపు క్రింది భాగం నుండి వచ్చేటటు వంటి మొక్కలు - ఆరటి, అనానస్ రొట్టె పండు (Bread fruit) మొదలైన వాటిల్లో. ఈ పీలకలకు కొంచెం వేరు ఉంటుంది. వీటిని తల్లి మొక్క నుండి వేరుచేసి, కొత్త మొక్కగా పెంచవచ్చును. పీలకలు ఎక్కువ సంఖ్య మొలవడానికి ప్రకాండపు తల భాగం కత్తిరించాలి. ఈ కత్తిరికను పోలార్డింగ్ (Pollarding) అని వ్యవహరిస్తారు. కొన్ని చెట్లను క్రింది భాగపు సమీపాన్నే పోలార్డ్ చేస్తే (కత్తిరిస్తే) క్రింది భాగపు చుట్టూనూ అనేక పీలకలు (కందలు) బయలుదేరుతాయి. వీటిని క్రింది భాగం నుండి ప్రత్యేకించి వేరుచేసి వేరు చెట్లుగా (మొక్కలుగా) పెంచుతారు. ఇటువంటి పీలకలలో వేరును వేరుచేయడానికి, వీటిని తల్లి చెట్టు (మొక్క) క్రింది భాగం నుండి కత్తిరి ద్వారానో మచ్చిక ద్వారానో కొంచెం కత్తిరించి, వేరుచేసి ఆ భాగానికి కొంచెం గట్టి మట్టిని మట్టి బ్యాండ్ చేసి ఆ భాగపుతేమ ఆరకుండా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి.

**1b. తల్లి తీగ (Runner) నేలతీగ (Stolon)** వేరును వేరు చేయడం : చిలకడ దుంప, స్ట్రాబెరీ పండు, గరిక మొదలైన వాటిల్లో తీగ నేలమీద ప్రాకి విస్తరించుకొని పోతుంటే తీగ కణుపుల నుండి వేరులు బయలుదేరి తీగని నేలలో దాచినట్లుగా మట్టుకుంటాయి. ఈ విధంగా వేరు బయలుదేరి నేలకంటుకొన్న ప్రతి మొక్క కాండపు / కణుపు మొక్కలను వేరుచేసి కొత్త మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు (చిత్రం 2.10). తీగ వేరును వదిలి, నేలకి అంటుకోవడానికి మొదలుపెట్టగానే వీటిని వేరుచేసి పెంచుకోవచ్చు.

2.10 విడదీసి నాటుకో తగిన నేల తీగ (రన్నరు)

కాని అది అంత మంచి క్రమంకాదు. ఇటువంటి వేరును వదలిన (వేరుచెప్పిన) భాగాలు సొంతంగా పెరగడానికి కొంతకాలం కావల్సి వస్తుంది. అంతవరకు, అవి తల్లి మొక్క నుంచి పోషణను పొందుతూ ఉంటాయి. సొంతంగా పెరిగే సామర్థ్యం పొందిన తర్వాత కాండపు / కణుపు మచ్చిక తీగ ఓడించి ఎండుతుంది. ఈ సామర్థ్యం పొందిన భాగాల్ని వేరుచేసి, అభివృద్ధి చేసుకోవడం సరైన పద్ధతి. మంచి శ్రమ కూడా. కొన్ని మొక్కలలో కాండపు క్రింది భాగం నుండి కవలలు పిలి నేలలోనెల వారి అడుగున వ్యాపించి, తల్లి మొక్కకు

కొంచెం దూరంలో పైకిలేచి నేల బయటికి వస్తుంది. తర్వాత అది స్వతంత్రంగా పెరుగుతుంది. దీన్ని తీగ లేదా స్టోలన్ (Stolon) అని వ్యవహరిస్తారు. దీనిని దంటు, ఆరో రూట్ (Arrow root) కొన్ని జాతి ముల్లెలు, ట్రెసిన, టీకోమగ్లాండి ఫ్లోరా మొదలైన వాటిల్లో చూడొచ్చును. దీనిని ప్రత్యేకంగా వేరుచేసి, వేరే మొక్కగా పెంచుకోవచ్చు.


### 1c. లేయర్ చేయడం (Layering) లేయరింగ్:

తల్లి మొక్కకు వేరినట్టుగానే కాండాల నుంచి పుట్టికట్టి వేరును విడిపించే (వేరుచేసే) క్రమానికి లేయరింగ్ అని, ఈ విధంగా వేరుచేసిన (విడిపించిన) కాండాన్ని లేయర్ అని వ్యవహరిస్తారు. కాండాన్ని ముక్కగా చేసి, కాండపు ముక్కలను (Cuttings కటింగ్స్) నాటి వేళ్ళను, విడిపించే క్రమంలో జయప్రదంగానే జరుగుతుందని చెప్పలేము. వేరు బయలుదేరే సమయానికి, మొక్క ఎండిపోవడం కూడా జరుగుతుంటుంది. కాని లేయరింగ్లో తల్లి యొక్క, తోడ్పాటు ఉండటంతో కాండభాగం ఎండకుండానే వేరు బయలుదేరుతుంది. ఎక్కువ శాతం నిశ్చితం ఖచ్చితం - ఏళ్ల యొక్క, వేరు కొత్తగా చెత్తపట్టినప్పుడు చే చిక్కేంతవరకు తండ్రి ఆశ్రయం, తోడ్పాటు పొందేట్టుగా ఇతర భాగల సహాయం పొందుతుంది.

గాలి/వాయువు సగం నిష్క నివ్వాలిలో నాటి పెంచేటప్పుడు ఇచ్చేంత గమనం లేయర్ వేసేటప్పుడు అవసరం లేదు. కాని ఈరీతి సస్పాభివృద్ధి క్రమం నిదానమవుతుంది. కొన్ని సందర్భాలలో ఇది కంటికి కనిపించే పని. అందులోనూ పైకి ఎత్తుగానున్న ప్రదేశాలలో పెరిగే మొక్కలలో చెట్లు, చేమలలో లేయర్ను అంటుకట్టినప్పుడక్కడ తల్లి మొక్క అడ్డువస్తుంది. తల్లి మొక్క నుండి కొన్ని రెమ్మలను మాత్రం లేయర్ వేయవచ్చును. చిన్నతోటమాలికి ఏలాస విస్తారిత తోటమాలలకు (Amateur gardeners) ఈ క్రమం అనుకూలం.

సామాన్యంగా వసంత కాలము (ఫిబ్రవరి - ఏప్రిల్) తయారు చేయడానికి సరైనకాలం. ఈ కాలంలోనే మొక్కలు, చెట్లు, పువ్వులు, చురుకుగా చిగురిస్తాయి పెరుగుతాయి. ఈ కాలానికి ముందుగానే తయారుచేస్తే లేయర్ కోసం గాడి చేసిన జాగాలో ఈ మొక్క రసం కారి మొక్క శక్తి తగ్గొచ్చు. గట్టి మట్టిగా పెరిగే స్వభావమున్న మొక్కలకు శరత్కాలంలో (ఆగష్టు - అక్టోబరు) లేయరు చేయవచ్చును. ఎక్కువ సంఖ్యలో లేయర్లు చేయాలి వుంటే వేసవి కాలం సరైంది. అప్పుడే చెట్లలో అనేక కొత్తగా మొలకెత్తే మృదువైన రెమ్మలుంటాయి. వీటిని వంపడానికి నేలకంటుకొనేటట్టు చేయడం చాలా సులభం. లేయరు చేయడంలోనే అనేక క్రమాలున్నాయి.


1. సామాన్య లేదా సరళ లేయరు చేయడం (Simple layering) రెమ్మలను నేలకి వంచి చివరన మాత్రం వదిలి దానిపైన 8 నుంచి 15 సెం.మీ. ఎత్తు మట్టిని పెల్చేడమే. ఈ క్రమం కొత్త చిగుర్లు చిగురించడానికి ముందే వసంత కాలపు ప్రారంభకాలంలో చేపట్టాలి. పొతిపెట్టే కాండపు భాగాన్ని సరళి చేసియో, కత్తిరించో, లేదా త్రిప్పో, ఖెరడును తీసి గాటుచేసి గాయపరుస్తారు. ఈ విధంగా చేస్తే గాయపు (వుండు) పై భాగానికి క్రింది భాగం నుండి ఆహారం వెళ్ళడానికి అడ్డువుతుంది. అలాగే పై భాగాన్ని ఆకులలో తయారుచేసే ఆహారం



2.11A



2.11B



2.11C

క్రిందికి దిగుటకు అడ్డమవుతుంది. అందుచేత గాయమైనచోట ఆహార సేకరణమవుతుంది. ఎక్కువ పోషక పదార్థం ఉండటం చేత ఈ భాగం మరుకుగా చిగురించి వేళ్ళను పైకి తోస్తాయి.

మొక్కలలో సస్యక్రియలను మరుకెత్తించే చోదకాలు తయారవుతుంటాయి. ఈ చోదక వస్తువును హార్మోన్ (Hormone) అని పిలుస్తారు. రెమ్మలను గాటు ద్వారా గాయపరచినప్పుడు ఈ హార్మోనులు సస్యపు పై భాగానికి పోవుటకు అడ్డాయి గాయపు భాగంలో కేంద్రీకృతమవుతాయి. ఇందుచేత ఈ గాయమైన భాగం మరింత మరుకై వేరును త్రోయుటకు ఉత్తేజం పొందుతుంది.

లేయరు వేసిన ఎన్ని రోజుల తర్వాతలేయరును తల్లి మొక్క నుండి వేరు చేసి, స్వతంత్ర మొక్కగా పెంచవచ్చనేది లేయరు వేసిన కాలం సస్యపు జాతి స్వభావాలకి అనుగుణంగా ఉంటుంది. కొన్ని మొక్కల్ని 2-3 నెలల్లోనే వేరుచేయవచ్చు. మరికొన్నింటిలో లేయర్ వేరు స్వతంత్ర జీవనాన్ని నడవడానికి ఒక సంవత్సర కాలమే కావల్సి రావచ్చును.


లేయరు వేయుటకు బలీసిన, దట్టమైన రెమ్మల్నే పరిగ్రహించాలి. వంచే స్థలంలో నేలవైపు ఆకు మొగ్గకు కొంచెం పైన 2½ సెం.మీ. అంత వచ్చునైన రెమ్మని చాకుతో లావుగా ఉన్న భాగాన్ని అడ్డానికి సరిగా చీల్చాలి. ఈ విధంగా చేసేటప్పుడు నాలుక వంటి ఒక చీలిక వస్తుంది. చీలిక తుదిలో (చివరలో) ఒక ఆకు మొగ్గ (Leaf bud) ఉంటుంది. ఈ చీలిక నోరు తెరచి ఉండేటట్టుగా చీలిక మధ్య ఒక నిప్పుకర్ర ముక్కనో లాదైన ఇనుక కణాలనో లేదా సన్నని రాయిని చిక్కించాలి. ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత రెమ్మ నేలకు అంటుకునే చోట మట్టిని తోడి గుంటచేసి రెమ్మ యొక్క చీలిక భాగాన్ని పెట్టి త్రవ్విన మట్టిని దీనిపైన పరచాలి. వేరును వేరుచేసి చోట కొంచెం తోలుని ఒలిచి గాటు వేయాలి. మట్టి రెమ్మపైకి తగలకుండా ఉండేటట్టుగా (తగలంతగా) ఉండాలి. ఈ విధంగా లేయరు వేసిన చోట మట్టిని తేమలో నుంచి తేమ అరకుండా ఉండేటట్టు నీడను ఏర్పరచాలి. (చిత్రం 2.11. A-C.).

చిత్రం : 2.11 A వేరును వేరు చేయడం (విడిపించడం) లేయర్ తయారు చేయడం ఇక్కడ సరళక్రమాన్ని చూపించబడింది. 1. రెమ్మను కొంచెం చీల్చి నోరు తెరచినట్టుగా ఒక సన్నని రాయి పెట్టి కట్టి (జోడించి) రెమ్మ (గుచ్చి) ఏస్తారంగా పరచాలి. 2. మన్ను వరచి మెల్లారి.


2.11 B. రెమ్మ ఊరడానికి మట్టిని వరచి రెమ్మ హారంలాగా వంచి రాయొకటితో లేదా ఇటుకతో పెద్దారి.

2.11 C లేయరును కుండకి బదులుగా మట్టి నింపిన మట్టిలో నాటవచ్చు (గుచ్చి పెట్టవచ్చు). రెమ్మ చివర అందకుండా దానికి కర్ర కట్టడమయినది.

కొన్ని చెట్లు వృక్షాలలో రెమ్మలను నేల క్రిందికి వంచడం చాలా కష్టం. గాయపరచి వెదురు ద్వారా దూర్చి, ఆ తర్వాత ఆ వెదురుకు ఇనుక మిశ్రమైన ఒండ్రుమన్ను మిశ్రమాన్ని నింపి తేముండేట్టు చూడాలి. మిశ్రమం జారకుండా ఉండేటట్టు వెదురు గొట్టం పైకి పెట్టి కట్టాలి (చిత్రం 2.12 a-b).



2.12a




2.12b



2.13




2.14



2.14






2.15



2.16



2.17

2.12 a. రెమ్మ వంచలేకుండా ఉన్నప్పుడూ ఒక వెదురు కర్ర పైభాగాన్ని రంధ్రం (చిల్లు) చేసి 1. మట్టి నింపి లేయర్ విడగొట్ట వచ్చును 2. రెమ్మ.

2.12 b. కుండకు బదులుగా డౌలైన వెదురును లేయర్ వేయడానికి చిల్లు తయారు చేసుకోవచ్చును.

కుండలలో వేరును విడగొట్టవచ్చును. దీనికోసం కుండలకి చిల్లుచేసి, వేరు విడిచినచోట నిలుపాల్సి వస్తుంది. లేయర్ వేసి పందిరను కట్టి దానిపై కుండల్ని జోడించి మట్టి మిశ్రమాన్ని నింపి రెమ్మలను సిద్ధపరచి వీటిలో వంచాలి చిత్రం 2.13.

2.13 సైనున్న రెమ్మలను లేయర్ వేయడానికి కాలీపాది కట్టి దానిపైన కుండను కూర్చుండ పెట్టి రెమ్మను వంచాలి.

వేరు వదలిన లేయర్లను తల్లి చెట్టు నుంచి ప్రత్యేకింప వేయడానికి ఈ ఏర్పాటు క్రియ. స్టాయి, స్టాయిలుగా (Stages) నడిపించాలి. మొదట తల్లి మొక్క దగ్గర ఉండే రెమ్మ భాగం మీద ఒక గాటు (కొద్దిగా చెక్కాలి). ప్రతిరోజు ఈ గాటును (చెక్కిన భాగాన్ని) కొద్ది కొద్దిగా చేరుస్తూ రాలి. ఆ తర్వాత మట్టి కుండ ఉండే చోట వేరు వచ్చి లేయర్లను వేరుచేసి (విడదీసి) నేలపైనో, కుండలలోనో, పున్నచోటనే ఆ మొక్కని కొంతకాలం నీడలో ఉంచడమే ఈ క్రమం. (చిత్రం 2.14 a-b).

2.14 లేయర్ వేరు విడిచి (వికసింపి) తల్లి మొక్క నుండి వేరు వేయడానికి మొదట a. V ఆకారంలో గాటును చేయాలి. b. చేసి కొన్ని రోజులైన తర్వాత ప్రత్యేకించి వేరు చేయాలి.

వసంత కాలంలో లేయరు వేసిన రెమ్మలు శరల్కాలానికి వేరు చేయుటకు సిద్ధమవుతాయి. కొన్ని జాతి మొక్కలలో ఈ విధంగా చేయుటకు ఇంకా ఎక్కువ కాలం పడుతుంది. ఈ విధమైన లేయర్ వేయుటలో మొక్క జాతినిబట్టి ఋతు గుణానికి అనుగుణంగా కొద్దో గొప్పో మార్పులను చేసుకోవాలి.

రెమ్మ గట్టిగా ఉండే దాన్ని వంచుటకు బదులుగా మొక్కగా విరగగొట్టి కుండ ద్వారా లోపలికి దారి (వాడబానికి వీలుగా) చేసి, దూర్చి మట్టిని కట్టి లేయరును వేయాలి (చిత్రం 2.15) లేదా పొడవైన వెదురు బొంగును గుల్లి చేసి రెమ్మపైన బొంగులు (వెదురు గొట్టాలు) చిల్లు (రంధ్రం) చేసి రెమ్మకు ఆ రంధ్రం ద్వారా దారి చేసి, మట్టి మిశ్రమాన్ని నింపాలి.

21.15 a. విరగగొట్టిన కుండ ద్వారా రెమ్మకు దారి చేసి వేరును విడగొట్టవచ్చును. b. రెండు వైపుల చీలిక (Slit) ఉంటే కుండలను చుట్టుకొని వెచ్చెట్టు వేయాలి.

మరొక సులభక్రమం. లేయరు వేసేచోట రెండు వరుసల పెంకులను జారకుండా ఉండేటట్టుగా నారుతోనో, ఎండినగడ్డితోనో కట్టాలి. ఈ అన్ని క్రమాలలోనూ వేరు విడదీసి మట్టిని తేమలో ఉండేటట్టు పెట్టాలి. (చిత్రం 2.16).

2.16 నాటు పెంకులను రెండు చేర్చి దిగించి మధ్య మట్టినినింపి (వంచలేనటువంటి) సుమారుగా వేరుగా

పెరుగుమండే దానిని. రెమ్మ నుంచి వేరును విడగొట్టడం.

ప్లాన్స్ మొదలైన కొన్ని దేశాలలో లేయరు వేయడానికి ప్రత్యేకమైన కుండలను తయారుచేసుకుంటారు. వీటిని లేయర్ కుండీల (Layering pots)ని అని అంటారు. (2.17 చిత్రం).

2.17 పాశ్చాత్య దేశాలలో లేయర్ వేయడానికి ప్రత్యేకమైన విధానం (చీలికున్న) కుండీలను తయారు చేయిస్తారు. ఇక్కడ 2 విధాలైన అటువంటి విధేయియులు ప్రత్యేకంగా చేయించే కుండీలను చూపడమైంది.


ఈ కుండీలో కుండీ ప్రక్కన ఒక రంధ్రం ఉంటుంది. దీనిద్వారా కాన్ఫేషన్ (carnation) మొదలైన మృదు కాండపు రెమ్మలను దూర్చి మట్టిని కట్టారు. కొన్ని కుండీలలో ఈ రంధ్రం కుండీ అంచు క్రింద చీలికగా ఉంటుంది. ఈ చీలిక రంధ్రంలో రెమ్మను దూర్చి లేయరు వేస్తారు.

చివరి (కొన) లేయర్ క్రమం (Tip layer)

పైన వివరించిన లేయర్ క్రమం (సరళ లేయరు క్రమం). రెమ్మ యొక్క చివరను అలాగే ఉంచి చివరకు కొంచెం దూరంలో గాయపరచి లేయర్ వేస్తారు. అయితే చివర కొన లేయర్ క్రమం చివరనున్న పత్రాన్ని మూస్తారు. రెమ్మ కొనలను నేలకి వంచి దాని పైన 5-8 సెం.మీ. లావుగా (మందంగా) మట్టిని పరచి రెమ్మ కదలకుండా, దోళుకుండా కొంచెం సడలిస్తారు. కొంచెం దాచి పెట్టారు. ఈ విధంగా దాచి పెట్టిన భాగం కొంచెం కొద్ది కాలానికే పాడై, సారం నిండుకొంటుంది. దీని వేత అసామాన్య (Adventitious) వేళ్లు/వేళ్ల 2-3 వారాలలో బయలుదేరుతాయి. ఆ తర్వాత లేయర్ను త్రవ్వి తీసి తల్లి మొక్క నుంచి వేరుచేసి, నాటవచ్చును. ఈ విధంగా చేసేటప్పుడు లేయర్ కొనపైకి వచ్చేటట్టుగా నాచాలి. ఎందుకంటే ఈ కొనలోని చివరి మొగ్గనుంచే కాండపు భాగం పెరిగేది. ఎక్కువ సంఖ్యలో లేయర్ వేయడానికి ప్రక్కనే కొంచెం దూరంలో ఒక గుంట త్రవ్వి రెమ్మ కొనలను దీనిలో దించి మట్టిని వేరుస్తారు. ఈ విధంగా మొక్కలలో కాండపు మొన/కొన నుంచీ అనుకూల పరిస్థితి ఉంటే రెమ్మ భాగం బలీనుంటే కొత్త రెమ్మ చీలికలేకుండా వేళ్ళు వస్తాయి. (చిత్రం 2.18 a-b).

2.18 రెమ్మల కొనలను మాత్రం మొలకెత్తించి (కొన్ని చెట్లలో) వేరు విడిపిస్తారు. A. ఎడమ వైపు ఆరు కొనలు వంపబడినాయి. B. కుడవైపు వేరును విడిపిస్తూ ఉండడాన్ని చూడొచ్చు (Tip layering).

సహజాలో పరివక్షం చెందడానికి తల్లి మొక్కలను (స్టాకులను) తయారు చేసుకోడానికి ఈ కొన లేయర్ క్రమాన్ని కొద్దిగా మార్చుకొంటారు. తల్లి మొక్కను నేరుగా పాడగడానికి బదులుగా కొంచెం ఏటవాలుగా నాటతారు. ఇవి భూమిలోపల స్థాపితమై (భూమిలోపలికి వెళ్లి) పెరిగిన తర్వాత వీటినుండి బయలుదేరిన రెమ్మలను నేల మట్టానికి సమాంతరంగా వంచి మట్టిని పరుస్తారు. ఈ విధంగా విభజించి నేలకుంటున్న భాగాలు పాడవుగా పెరుగుతాయి (దీర్ఘవృద్ధి) (Elongate) వేళ్ళు చిగురుస్తాయి. వేళ్ళు చిగురుంచిన రెమ్మలను తల్లి మొక్కనుంచి వేరుచేసి (విడదీసి) బలవంతంగా పరివక్షం చెందడానికి అనుకూలమైన స్టాకులను తయారు చేసుకుంటారు.




A




B

2.18




a



b

2.19



2.20

సింకోన (Cinchona - మలేరియా రోగానికి దీని చెక్క సిద్ధావధం). వీటి చెట్లను పెంచడానికి వేరు విడదీసి పద్ధతిలో ఇంకొక మార్పును చేస్తారు. సింకోన చెట్టును నేలమట్టానికి కొంచెం ముందుగా వడిలో కత్తిరించి వేసిన తర్వాత దాని క్రింది భాగం నుండి అనేక లేత రెమ్మలు పెరుగుతాయి. ఈ రెమ్మలను విభజించి మట్టిని పేరుస్తారు. అప్పుడు ఒక్కొక్క రెమ్మలోను వేరు చిగుర్ని స్వతంత్ర సస్యమౌతుంది. వీటిని తల్లి మొక్క నుంచి విడదీసి వేరే చోట పూడ్చాలి (చిత్రం 2.19 a - b).

చిత్రం 2.19 a - b అడిస్టావన (దిబ్బ) లేయరింగ్ (Mound layering) a. మొక్కను చుక్కలు పెట్టిన చోట కత్తిరించి b. గుట్టపైన దిబ్బలాగా వేసి కొన్ని వారాల తర్వాత మొక్కలు వేరుతో చేర్చి నాటవలయును.


### సంకీర్ణ లేయర్లు (Compound Layers)

సరళ లేయర్లలో రెమ్మ యొక్క ఒక భాగాన్ని పూడ్చి, వేరు విడదీస్తారు. ఈ క్రమంలో ఒక రెమ్మ నుంచి ఒక లేయరు మాత్రమే లభ్యమవుతుంది. అయితే ఒక రెమ్మ నుంచి ఎక్కువ లేయర్లను పొందడానికి తయారు చేసుకోవడానికి కొన్ని మొక్కల జాతులలో సాధ్యమవుతుంది. ఈ క్రమాన్ని సంకీర్ణ (సంశ్లిష్ట) లేయర్ క్రమమని అంటారు. ఈ క్రమాన్ని అనుసరించడానికి పాడవైన ఒక రెమ్మను ఎన్నుకొంటారు. దాన్ని అక్కడికక్కడే సరళ లేయర్ క్రమం - పద్ధతిలో గాయ (గాటు) వరుస్తారు. ఈ గాయవరచిన భాగాలను నేటికే అంటుగట్టి గాటులపైన మట్టిని పేరుస్తారు. ఈ విధంగా చేసినప్పుడు రెమ్మ యొక్క కొన్ని భాగాలు నేలపైన ఉంటాయి. గాయమైన భాగాలు బాగా వేళ్లను చిగురించిన తర్వాత నేలపై ఉన్న భాగాలను అంచలంచలుగా అంటుగట్టి ప్రత్యేకమైనదిగా వేరు చేస్తారు (వరుస్తారు). ఈ విధంగా విడదీసేటప్పుడు ప్రతియొక్క లేయరులోనూ తల్లిమొక్క యొక్క వైపున్న వేరు, వివర వైపున కాండపు మొగ్గ ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. ఈ విధంగా వల లేయర్లను ఒకే రెమ్మ నుంచి తయారు చేసుకొనే క్రమానికి సర్పెంటిన్ (Serpentine layer) లేయర్ అని వ్యవహరిస్తారు. (చిత్రం 2.20)

2.20 ఒకే రెమ్మను 3-4 చోట్ల పూడ్చి (నాటి) లేయర్ వేయుదురు. దీన్ని సర్పెంటిన్ లేయరింగ్ (సంకీర్ణ లేయర్) అంటారు.

సామాన్యంగా ఈ రకపు సంకీర్ణ లేయర్లు చలికాలపు చివరలోనో, వసంతకాలపు ప్రారంభంలోనో వేస్తారు. లేదా అన్ని భాగాలలోనూ వేళ్లను చిగురించడానికోసం ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు వదలి వేస్తారు. కొన్ని జాతుల పందిరి ద్రాక్ష (పన్నిరు ద్రాక్ష)లో ఈ క్రమాన్ని అనుసరిస్తారు. ఈ సంకీర్ణ లేయర్ క్రమంలో తయారైన లేయర్లు సరళ క్రమపు లేయర్ల వలె గట్టిగా ఉండవు. అందుచేత ఈ లేయర్లను తల్లి మొక్క నుండి విడదీసిన తర్వాత మొక్కలను (Cuttings - పైన చూడండి) పెంచే రీతిలోనే పెంచాలి.

సామాన్య మొక్కకి, ఈ లేయర్ మొక్కకి ఉండే భేదం ఇంతే. పూడ్చేటప్పుడు మొక్కలో వేరు ఉండదు. అయితే ఈ లేయర్లో కొద్దిగా వేరుంటుంది.



2-21

కందకం లేదా సంకీర్ణ సంతత లేయర్లు (Trench or Continuous layers) (2.21 a - d).

2.21 కందకపు లేయరింగ్ (Trench layering). a. దానికోసమే పెరిగిన చెట్టును b. ప్రక్కనున్న కందకం తోడి (త్రవ్వి) పొదని మట్టిని పేర్చాలి. కొన్ని నెలల తర్వాత, పూడ్చిన భాగాల నుంచి మొక్కలు చిగురిస్తాయి. c. ఆ తర్వాత మట్టిని తీసి d. వేరుతో మొక్కలను విడదీయాలి.

సంకీర్ణ లేయర్ వేయటంలో పొడవైన రెమ్మను అక్కడికక్కడే పొదని మట్టిని పేరుస్తారు. అయితే కందక క్రమంలో రెమ్మను పూర్తిగా మట్టిలో పూడుస్తారు. సపోట వేరు (చెట్టు సపోట, పాల సపోట) ప్లమ్ (Plum) మొదలగు చెట్ల ఉత్పాదనలో ఆచరిస్తారు. ఈ క్రమంలో రెమ్మకు బదులు ముఖ్య కాండాన్నే లేయరు వేయడానికి వంతుతూ ఉంటారు. ఈ విధంగా దీన్ని పూడ్చినప్పుడు (పొతినప్పుడు) పార్శ్వ మొగ్గ (lateral buds) నుంచి కాండమూ, ఈ మొగ్గల క్రింద భాగం నుంచి వేరునూ బయలుదేరుతాయి (చిగురిస్తాయి). ఈ విధంగా లేయరు క్రమాన్ని అనుసరించడానికి ఈ చెట్లను నిలిపి (నేరుగా) పెంచడానికి బదులు అడ్డంగా పెరిగేటట్లు చేస్తారు. తీగలైతే ముఖ్య కాండాన్ని వంచి లేయరు వేయాలి. ఈ కందకం లేదా సంతతి లేయర్ క్రమంలో మూడు విధానాలు :

1. కాండం లేదా రెమ్మను కందకంలో పెట్టడం. పార్శ్వ మొగ్గల నుండి చీలికలు చీలుతాయి. వీటిని సుమారు అర్థ (సగం) అడుగు పొడవుగా పెరిగినప్పుడు కాండాన్ని వంచి, కందకంలో (గుంటలో) దింపి 12 సెం.మీ. మందానికి (లావుగా) మట్టిని రెమ్మపైన పేరుస్తారు. చీలికలు క్రింద భాగంలో చిగురుస్తాయి.
2. కాండాన్ని కందకంలో పడుకోబెట్టి, దానిపైన 2½ సెం.మీ. మందానికి మట్టి పొరలను వరచాలి. కొత్త రెమ్మ, కాండాలను ఈ పొరలను త్రోసుకొని పైకి వస్తాయి. ఈ ఉప కాండాలు పొడవుగా అయినంతనే సుమారు 12-5 సెం.మీ. మందానికి (లావుగా) మట్టిని పేరుస్తూ ఉంటే ఈ కాండాల క్రింద పొడవుగా వేరు చిగురిస్తుంది.
3. కాండాన్ని 7 సెం.మీ. మందం మట్టితో మూయాలి. కాండం నుంచి చీలికలు చీలి పైకి వస్తాయి. పై భాగం నుంచి వేరు క్రిందికి దిగుతూ ఉంటుంది.

ఈ రకమైన క్రమాన్ని హైడ్రాంజియ (Hydrangea), డయాంథస్, సీడం (Sedum) మొదలైన చెట్లు అభివృద్ధికి అనుసరిస్తారు. దిబ్బ (గుట్ట) లేదా వేరు మొలకెత్తే లేయర్ క్రమం (Mound or stool layers) ఈ క్రమంలో తల్లి మొక్కను సుమారు 1 మీ. అంతరం ఉన్న వరుసలలో మొక్కకి మొక్కకి ½ మీ. దూరం తర్వాత (నాటిన తర్వాత) కొత్త చిగురు చిగురించడానికి ముందే పై భాగం చీలుస్తారు. పై భాగం (నెత్తి భాగం కత్తిరిస్తారు) ఒక ఋతుకాలం పెరుగుటకు వదిలిపెట్టి ఆ సంవత్సరపు చలికాలంలో పెరిగిన భాగాలన్నింటినీ 5 సెం.మీ. పైకి (ఎత్తుగా) ఉండేటట్లు కత్తిరిస్తారు. ఈ విధంగా చేసినపుడు క్రింది భాగం నుండి అనేక మొక్కలు బయలుదేరుతాయి. ఈ క్రమాన్ని సపోడా క్వీన్స్ (Quince) అనే పండు మొక్కలను ఉత్పాదనలో అనుసరిస్తారు.

సపోబాలు ఈ మొలకలను పెరిగిడి ప్రథమ కాలంలో ఆలాగే వదిలివేసి, అది 15 సెం.మీ. పొడవుగా అయినప్పుడు వాటిపైన 12-15 సెం.మీ. మందంతో మట్టి దిబ్బలను ఏర్పరుస్తారు. ఈ విధంగా చేయడానికి మట్టిని మొదట మొక్కకి మొక్కకి మధ్య భాగానికి పోస్తారు. అప్పుడు లోవలున్న మొలకలు బయటికి వంగుతాయి. ఆ తర్వాత మధ్య నుంచి బయటికి క్రమేణా మట్టిని వెదజల్లుతూ వస్తారు. మొక్కలు దగ్గర దగ్గరగా ఉండకుండా ఉండేటట్లు చూసుకొంటారు. కొంత కాలమైన తర్వాత ఈ మొలకలు వేరును వదులుతాయి. ఫ్లవేరిలో ఈ క్రమంలో కొంత వ్యత్యాసం చేస్తారు. కొత్త మొలకలు వచ్చుటకు ముందునే మట్టి దిబ్బని పేరుస్తారు. ఈ క్రమంలో మొలకల సంఖ్య తక్కువ అవుతుంది. అయితే ఈ మొలకలలో చక్కగా బలమైన (శక్తివంతమైన) వేరు ఏగురిస్తుంది.

వసంతకాలపు అదిలో దిబ్బని పేరేస్తే అదే సంవత్సరపు చలికాలపు ఆరంభంలో అవి వేళ్లనిస్తాయి. అప్పుడు వాటిని ప్రత్యేకించి నర్సరీలో 15 సెం.మీ. దూరానికి నాటుతారు. ఇంకో సంవత్సరము వేసవి కాలంలో ఈ కొత్త మొక్కలు పిలకలను వేస్తాయి. ఒక సంవత్సరం వదిలి ఈ మొక్కలకి అంటుగట్టువచ్చు. వామంతి (పర దేశపు వామంతి) దిబ్బ లేయర్ క్రమానికి చాలా అనుకూలమైనది. ఈ వామంతి వాస్తవంగానే వేరు మొక్కల్ని (Suckers) ఇచ్చే స్వభావం గలది. దీన్ని ప్రత్యేకించి బెరుడునే నాటవచ్చును. ద్విప ద్రాక్ష (Currant - గింజలు, ఏత్రవాలు) తడి ఎండిన ద్రాక్ష చేసే జాతిది. గోస్ బెర్రీ (Goose berry) మొదలైన వాటిని ముక్కలు చేసి, పెంచడం చాలా కష్టం. అయితే వీటిని దిబ్బ లేయర్ క్రమం ద్వారా ఉత్పాదన (ప్రద్ది) చేసుకోవచ్చు. ఈ క్రమానికి ఎక్కువ శ్రమగాని, ఖర్చుగాని ఉండదు.

### ఎయిర్ లేయర్ లేక గూటి వేసేది (Air layering or Gooty)


ఇంతవరకు రెమ్మలను నేలలోవలో, మట్టిలోవలో పాతివేరు విడదీసే లేయర్ క్రమాన్ని వివరించడమైంది. లేయర్లను వేయడానికి రెమ్మలను నేలకుగాని, కుండీ మొదలైన వాటిల్లోగాని విభజింప వలసిన అవసరం లేదు. గాలిలోనే నేలపైన (బయలు) వేరును విడదీసే క్రమం ఇండియా, చైనా దేశాలలో చాలా కాలం నుండి అనుసరిస్తున్న క్రమం. దీన్ని పశ్చిమాది దేశాలలో వాయువు లేయర్ (ఎయిర్ లేయర్, Air layer) అని వ్యవహరిస్తారు. మనలో ఈ క్రమాన్ని గూటి (Gooty) వేసేది అని అంటారు. దీన్నే మర్కెట్ బేట్ అని కూడా వ్యవహరిస్తారు. ముక్క చేసి వేరు విడచేయడం (విడగొట్టడం) లేదా ఇతర సస్యోత్పాదన క్రమాలు కష్టంగా ఉండి సందర్భంలో ఈ క్రమాన్ని అవరిస్తారు. ఇటీవల స్టాప్ కో డాడు వచ్చిన తర్వాత ఈ గూటి క్రమం మరింత సులభమైంది, మరింత జయప్రదమైంది.

మన దేశంలో గూటి చేసే క్రమం ఈ విధంగా ఉంటుంది. లేతది, చాలా వయస్సైనది కానిది  $\frac{1}{2}$  - 2 సెం.మీ. మందమున్న సరిగ్గా బలసిన రెమ్మలను ఎన్నుకోవాలి. ఈ రెమ్మలు చురుకుగా పెరుగుతూండాలి. ఎక్కువ వేడలైన ఆకులలో కూడి ఉండాలి. ఈ విధంగా వేరుంటే అప్పుడు ఆ ఆకులలో తయారైన ఆహారం పెరిగే వేరు కొరకు ఉండుతుంది (పెరిగిడి వేరుకు ఇస్తుంది). ఈవిధంగా యివ్వడానికి ఆకులలో తయారైన






2.22



2.23



2.24

అచారం క్రింద దిగిపోకుండా అడ్డుపెట్టుడానికి లేయర్ల కట్టు (గూటి వేసే) చోట సరళ లేయర్లలో వేసేట్టుగానే దీన్ని గాయపరచాలి. అప్పుడు ప్లేయసు (అచార నాళం మొదటి అధ్యాయం చూడండి) కత్తిరించి, వాటి ద్వారా అచారం దిగకుండా గాయపరచిన చోట చేరుకుంటుంది. ఇది వేరును త్రోయుటకు ప్రయోజన మవ్వడమే కాకుండా ఇదేవిధంగా ఇలాగే త్రోసిన వేరు పెరుగుటకు ఎక్కువ (వృద్ధి) అవ్వడానికి సహాయమవుతుంది. లేయర్ వేసే చోట, చీలిక నోరు, తెరచి ఉండేటట్టుగా సరళ లేయర్ క్రమంలానే, ఒక రాయి లేదా ఇసుక రేణువులు, లేదా నిప్పు కర్ర ముక్కని పెట్టాలి. ఉంగరంగా మట్టి (ఉండగా) గాయపరచవచ్చు (2.22 A & B) ఈ గాయము చుట్టూ కొంచెం జిగురు ఉండే మట్టిని (బీడి మిశ్రమ మట్టి) ఒత్తి మట్టి జారకుండా అరటి పట్టనో, గోనె తాటినో, మాస్ (Moss) నో కట్టాలి.



2.22 గూటు వేయడం లేదా కట్టేది. A. రెమ్మను కోసి పెట్టుకోవాలి. B కోసిన భాగపుపైన సరైన మిశ్రమాన్ని ఒత్తి గోనె పట్టతో మూసి, చుట్టూ దారంతో బిగించాలి. దీనికి అప్పుడప్పుడు చేత్తో నీటిని చల్లుతూ ఉండాలి.

ఈ కట్టును గోనె దారంతో బిగించాలి (కట్టాలి). ఈ మట్టి కట్టు (గూటి) ఎల్లప్పుడూ తేమతో (తడితో నే) ఉండడానికి ఒక కుండనో, లేదా టిన్నని రెమ్మపై భాగానికి కట్టాలి. (చిత్రం 2.23).

2.23 గూటికి అప్పుడప్పుడు నీటిని చల్లే శ్రమని తప్పించి మూడు ఉపాయాలు చూపడమైంది. a. పై రెమ్మకి కుండ కట్టి నీరు నింపి, దాని నుంచి తాడు బత్తిని గూటి చుట్టూ కడితే, బత్తి ద్వారా నీరు బొట్టు బొట్టుగా (చిలకరిస్తూ) వడుతుంది. b. కుండ బదులు పాత టిన్ను పెట్ట వచ్చును. c. నీరు నింపిన సీసాని గూటి పైన బోర్లించి ఎక్కువ వడకుండా అడ్డువేయవచ్చును. గూటి తేమ అరకుండా ఉండేట్టుగా సీసాలోని నీరు క్రిందికి దిగుతుంది.

సామాన్యంగా గూటీలను చెట్టులో వేయడం చేత రెమ్మలు కుండ యొక్క బరువును భరించలేవు. కుండ పొది రంధ్రం (drainage hole) ద్వారా ఒక కొబ్బరి మొలకను (నారును) దూర్చి ఒక చివరను ముడి వేసి, ఇంకొక చివరను లాగినప్పుడు ఈ ముడి కుండ రంధ్రాన్ని బిరదాలాగా మూస్తారు. ముడివేయని కొనను గూటి చుట్టూ గట్టిగా రెండు మూడు చుట్టు మట్టి గట్టిగా కట్టాలి. కుండకి అప్పుడప్పుడూ నీరు చిలకరిస్తుండాలి (నీరు వేయాలి). ఈ నీరు తాడును తడిసి, బొట్టు, బొట్టుగా గూటీలోపల వడి గూటి మన్ను కట్టు చాలినంత తేమతో ఉంటుంది. మూడు లేదా నాల్గు నెలలలో లేతవేళ్ళు చిగురుస్తాయి. అప్పుడు గూటిని తల్లి మొక్క నుండి వేరు (విడదీసి) వేయాలి. ఈ విధంగా విడదీసేటప్పుడు సరళ లేయర్లలాగే అంటును కొంచెం కొంచెం త్రవ్వతూ (గుంటవేస్తూ) ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపి ప్రత్యేక గుంటలు వేయాలి.

ఈ గూటీలను వానకాలంలో లేదా చెట్లు చిగురించే కాలంలో వేయాలి. ఈ గూటీ క్రియలో కొద్దో గొప్పో మార్పులను ప్రగతి శీలుడైన తోటమాలి చేసుకుంటూనే ఉంటాడు. ఒక తేలికైన టిన్ను ముక్కను బుద్ధిమంతుని ఆకారంలో (పుస్తకం తెరచి చదివే ఆకారంలో) ముడిచి గూటికి నీటిని దింపడానికి తగిలిస్తారు. మరి కొందరు ఒక సీసాలో నీరు నింపి బిరదాను వేసి బిరదాలో ఒక సన్నని రంధ్రం వేసి, సీసా పైభాగాన్ని



గూటి మట్టి కట్టలో చిక్కిస్తారు. ఈ రంధ్రం ద్వారా వీరు వడుతూ (బొట్టుగా) ఉంటుంది. మట్టి కట్టను తేమగా ఉంచుతుంది. (2.23 చిత్రం).


కొన్ని దేశాలలో దీని కోనమే జింక్ స్లేట్లను (స్లేటు) రెండు రెండు ముక్కలు (భాగాలు) చేసి వాటికి కీళ్లు వేసి అమ్ముతారు. వీటిని గూటి వేసి రెమ్మపైన పెట్టి రెండు భాగాలను వేర్చి దానిలోపల మట్టిని నింపుతారు (చిత్రం 2.24).

2.24 గూటి వేసి రోపాపు శంఖు ఇందులో కీళ్లు ఉండే రెండు భాగాలు ఉన్నాయి. ముక్కల మధ్య సరైన మిశ్రమాన్ని నింపి ముక్కలను వేర్చి, నరికి వేయాలి. ఇది పాశ్చాత్య దేశాలలో వాడుకలో ఉంది.

ఇటీవల ఈ గూటి వనులను ఇంకా సులభంగా చేసుకొంటున్నారు. గుంజా, గోన సంచీల లాటికి బదులుగా మట్టి కట్టను తడిచేసి దాన్ని ఫ్లాస్టిక్ కవరుతో కాడలకు మట్టి కడతారు. ఎక్కువ తేమ ఉండకుండా ఉండేటట్లు మట్టిని పిండి కడతారు. ఫ్లాస్టిక్ కవర్ మట్టి కట్టిన తేమని చాలా కాలం ఉంచుతుంది. కాబట్టి ఈ గూటి కట్టిన తర్వాత నీటి కొరకు ఏర్పాటు వ్యవస్థ చేయాల్సిన పనిలేదు. ఫ్లాస్టిక్ ద్వారా వేళ్లు శ్వాసించకలిగినందున వేళ్లు పెరగడానికి అడ్డు ఉండదు. ఫ్లాస్టిక్ కాడలను (షీట్స్) మట్టి కట్టల చుట్టూ బిగుతుగా కట్టి క్రింది భాగాన్ని పై భాగాన్ని గాలి దూరకుండా ఉండేటట్లు, వర్షపు నీరు దిగకుండా ఉండేటట్లు చుట్టూ దారపు ఉండతోనో, టేపుతోనో దిగించివేస్తే వేరు చిగురించే వరకు గూటికి నీటిని వేయాల్సిన అవసరం రాదు. టేపును క్రింది నుంచి పైకి చుట్టాలి. అప్పుడు వర్షపు నీరు లోపలికి దిగదు (చిత్రం 2.25, 1-6).

2.25 పాలిథిన్ (ఫ్లాస్టిక్) కాగితం లేదా కాడలతో గూటి కట్టి వనులు, చాలా సులభమైనవి. ఈ ఫ్లాస్టిక్ కాడ (కాగితం) మూసిన గూటిలకు అప్పుడప్పుడు నీరు చల్లాల్సిన అవసరం లేదు. లోపలి తేమ చాలాకాలం, వేరు వచ్చేంతవరకు ఉంటుంది. ఫ్లాస్టిక్ గూటి అంచులు (వరుసలు) 1. ఒక సంవత్సరపు రెమ్మ, 2. దీన్ని చీల్చి మొలకెత్తించి చీల్చినది, 3. రెమ్మపైన ఫ్లాస్టిక్ గొట్టం (Sleeve) చూపబడింది. 4. గొట్టపు పై భాగాన్ని అంటు టేపు ద్వారా గట్టిగా (బిగుతుగా) చుట్టాలి. 5. గొట్టానికి తేమ నిలుపుకొనే మట్టి మిశ్రమాన్ని లేదా మాస్ను (Moss) తేమ చేసి నింపాలి. మొదట బాగా నీరు వేసి చేతిలో పట్టుకొంటే అధికమైన (ఎక్కువైన) నీరు పోయి చాలినంత తేమ నిలుస్తుంది. మిశ్రమాన్ని నింపిన తర్వాత ఒక కర్రతో గుచ్చి అదమాలి. 6. ఆ తర్వాత గొట్టం పైనున్న నోటిని టేపుతో కట్టాలి. టేపును క్రిందనుంచి పైకి చుడితే వర్షపు నీరు దిగదు. గూటిని వేరువచ్చేంతవరకు (నీరు వేయకుండా) వదలి వేయాలి. గూటి రెమ్మను ఒక కడ్డి కట్టి (కర్ర కట్టి) నిలబెట్టాలి.

గూటి క్రమాన్ని బోగైన్ విలా (Bougainvillea), క్రోటన్, హైబిస్కస్ (మందార) (Hibiscus), డ్రైసిన (Dracaena) కలుపులు మొదలైన అలంకారపు మొక్కల ఉత్పాదన కొరకు అనుసరిస్తారు. ఇటీవల పెద్ద పెళ్లు మొక్కల ఉత్పాదనకీ కూడా ఈ క్రమాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఉదా : జీడివప్పు. గూటి వేసి రెమ్మలను చీల్చి గాయవరదానికి బదులు మరొక క్రమముంది. తామ్ర కడ్డిని (Copper) గూటి వేసి స్థలంలో దిగించాలి. ఈ విధంగా దిగించినప్పుడు మొక్కరసపు చలనానికి అడ్డువచ్చి కడ్డి మట్టిని పై భాగం నుంచి వేళ్లు రావడం మొదలు



a



b



c<sub>1</sub>




c<sub>2</sub>




d

2.26



a



b

2.27 80A

పెద్దాయి.

ఈ గూటి లేయరు క్రమంలో ఎక్కువ జయప్రదం కావడానికి గాయవరచిన భాగానికి వోడక హార్మోన్లు (Hormones) లేవుతారు. ఈ విధంగా చేయడం చేత సులభంగా వేళ్ళు రాని మొక్క చెట్లకూ గూటి వేసి లేయర్ క్రమం ద్వారా మొక్కల్ని ఉత్పాదించుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది.

తల్లి మొక్క నుండి విడదీసిన గూటిలను, కొంతకాలం నీడలో తేమతో పెట్టించి అది కుదురుకొన్న తర్వాత పాతాలి. గూటి కట్టిననూ బాగా వేరురాని గూటిలను సస్యోత్పాదన అయ్యేట్టుగా నాటవచ్చును.

తల్లి మొక్క నుంచి విడదీసిన తర్వాత నడిపెడి సస్య ఉత్పాదన క్రమాలు :

కొన్ని మొక్కలలో సస్య భాగాలు సులభంగానే తల్లి మొక్క నుంచి వేరు చేయవచ్చు. ఉదా :- బల్బులు బల్బులు కారములు (Corms) కందిము కారంబీన్స్ (Cormlets) (Cormels) ఇత్యాదివి (చూడండి మొదటి అధ్యాయము). కొన్ని మొక్కల వేరు సులభంగా వేరవుతుంది. మొక్క భాగాలు సులభంగా ప్రత్యేకమవడానికి తగిన మొక్కలలో కొన్ని ఇవి. తెల్ల గడ్డలు (తెల్లగడ్డ మొక్క) గ్లాడియాలస్ (gladiolus) కారం లిట్టులు లేదా గడ్డ మొలకలు సుగంధరాజం మొలక గడ్డలు భూతాటి (బల్బులు - bulbs) చిత్రం (2.26 a-d).

2.26 (a - d) అనేక మొక్కల్ని వింగడించి సస్యోత్పాదనని చేసుకోవచ్చు. a. అంచును కత్తిరించి అక్కడక్కడే వేరు పెరిగే సస్యోన్ని (గీత ద్వారా సూచించిన భాగం) కత్తిరించి ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు. b. తెల్ల గడ్డ, సుగంధ రాజం మొదలైన చిగురించే మొక్కలను విడదీసి పాతాలి. c. ఆకిమినిస్ మొదలైన గడ్డలను కత్తిరించి నాటాలి. c<sub>1</sub>, c<sub>2</sub> రెండు రకాల ఆకిమినిస్ d. రైసోములను అక్కడిక్కడే కత్తిరించి విభజించుకోవచ్చు.

బల్బులు ద్వారా సస్యోత్పాదన :

బంగాళా దుంప, ఎర్రగడ్డలు (ఉల్లిపాయలు) చిలకడ దుంప, ముల్లంగి, వెల్లుల్లి పాయ (తెల్ల గడ్డలు) మొదలైన వాటి ఉచ్చిన భాగాలన్నిటిని మనం సామాన్యంగా, గడ్డలు అనుకొంటాం. అయితే సస్య శాస్త్ర ప్రకారం ఇవన్నీ ఒకే రకానికి చెందినవి కావు. వీటిలో కొన్ని ఉచ్చిన వేళ్ళు చిలకడ దుంప (గిణును దుంప) ఇత్యాదివి మరికొన్ని ఉచ్చిన పొర లేదా రేకులు (ఎర్రగడ్డలు, అమరల్లిస్) ఈ విధంగా ఉచ్చిన పొర లేదా రేకులనే సస్య శాస్త్రంలో "లకునం" లేదా "బల్బు" (bulb) అని అంటారు. ఎర్రగడ్డను సైమంచి నిలువుగా చీల్చి (vertical cut) చేస్తే బల్బు నిర్మాణం స్పష్టమవుతుంది. (చూడండి సస్య నిర్మాణం) బల్బులు ఉచ్చిన కాండాలు బాగా రూపాంతర మవుతుంటాయి. ఈ కాండము నుంచి బయటికి (వెలువలకి) వచ్చిన ఆకు కవచాలు ఉచ్చి ఉంటాయి. ఎర్ర గడ్డలలో ఇదే తీనే భాగం. ఈ కవచాలు మధ్యన ఒక అక్షం చుట్టూ పొరలు పొరలుగా అత్తుకొని పెరుగుతాయి. (ఎర్రగడ్డలో ఉండేటట్టుగా) లేదా ఈ పొరలు వేరు వేరుగా (విడి విడిగా) ఉండొచ్చు. (లిల్లిలో వలె) తొట్టినంటి కాండపు క్రింది నుంచి వేళ్ళు ఉచ్చి పొరల మధ్య నుంచి కొత్త కాండాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ కాండాలు మరొక బల్బుగా పెరగటము కద్దు. ఆ విధంగా పెరిగిన బల్బులను తల్లి బల్బునుంచి విడదీసి

స్వతంత్ర మొక్కగా పెంచుతారు. చిత్రం 2.27 (a - b).

2.27 a - b లిల్లి బల్బుని (లకున) ముక్కలుగా విభజించ వచ్చు (విభజించాలి). పాత పువ్వు యొక్క కాడ గూటిని చూపడమైంది.

అంటే పైన తెలిపినట్టుగా బల్బులో ముఖ్యంగా రెండు రకాలు. మొదటి రకంలో ఆకు మొగ్గ పారలు (కవచాలు) కండతో నిండి ఉచ్చి పారలు పారలుగా అత్తుకొని పెరిగి ఉల్లిపాయలు, తెల్ల పాయలు నార్సిస్ (Narcissus) హయాసింత్ (Hyacinth) ట్యూలిప్ (Tulip) అమర లిల్లిస్ (Amaryllies) మొదలైన బల్బులు ఇటువంటి వాటిని పారలు బల్బు కవచ బల్బులు (అచ్చాదన) ఒర బల్బు (Sheath) లేదా టూనికేట్ (Tunicate bulb) బల్బు అని అంటారు.


రెండో రకంలో ఈ మొగ్గ యొక్క కవచాలు ఒకదానికి ఒకటి అత్తుకొని ఉండవు. ప్రత్యేకంగా ఉబ్బుకొని పెరుగుతుంది. వీటిని స్కేలి బల్బు (Scaly bulb) అని అంటారు. కొన్ని రకాల లిల్లిలు ఈ రకానికి చెందినవి. ఈ రకం అపరూపమైంది.

ఈ బల్బులను విడదీసి స్వతంత్రంగా పెంచుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రతి మొక్క యొక్క కాండపు రూపాంతరాన్ని పొందిన కాండం కొన్ని బల్బులలో ముక్కల మధ్య లేదా పారల మధ్య అక్షంలో పెరిగి మొన ఉంటుంది. అనుకూల పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు (కలిగినప్పుడు) ఈ మొన విశేషించి పై నుంచి ఆకు కాండాలను క్రింది నుంచి వేళ్లను త్రోసి స్వతంత్ర మొక్కగా పెరుగుట కలదు. ఎక్కవ ముక్కలు లేని బల్బులను వృద్ధి వరకు కోడానికి, కాండాన్ని కత్తిరించి వేరు వేరుగా నాటుతారు. ఈ సప్త మొనలు వికసించేట్టుగా అనుకూల స్థితిని కల్పిస్తారు.


**బల్బులు (Bulbs)**

లిల్లి గుంపుకు చేరిన మొక్కలలో (liliaceae) బల్బు క్రింద నుంచి సన్నని బల్బులు బయలుదేరుతాయి. వీటి బల్బు పిలకలు లేదా 'బల్బిల్' అంటారు. వీటిని విడదీసి వేరు చేసి స్వతంత్రంగా పెంచవచ్చు. అయితే ఈ బల్బుల నుంచి పువ్వుం పుష్పించడానికి ఎక్కువ కాలం పడుతుంది. కొన్ని మొక్కలలో బల్బుల సంఖ్య పెంచుకోవడానికి తల్లి బల్బులు తట్టలాగా పైకి ఉండేట్టుగా పాతుతారు. ఇంకా ఈ తల్లి బల్బు పుష్పాన్ని అంటుకట్టడానికి వదలరు. అవిధంగా చేసినప్పుడు పువ్వుం, కాయ, బీజం ఉత్పత్తికి వెళ్ళి పోషకాలు బల్బు పిలకల ఉత్పత్తికి ఉపయోగపడతాయి. సామాన్యంగా బల్బులు వేరే చోట నాటి, స్వతంత్రంగా పెరిగిన తర్వాత ఉచ్చిన లావు బల్బులవుతాయి. అయితే గుత్తులు గుత్తులు ఉల్లిపాయలు (multiplier onions) తెల్లపాయలతో బల్బులు చేరేడి దారికుండానే తల్లిబల్బు దగ్గర లావు కావడానికి సాధ్యం కాదు.

సామాన్యంగా బల్బులు బలిసిన తర్వాత కొంత కాలం కందగడ్డలాగ సుప్తావస్థలోనే ఉంటాయి. ఈ అవస్థలో ఉండేటప్పుడు దాని నుంచి కొత్త మొక్కలు పెరగవు. అందుచేత ఈ బల్బులను వాటి సుప్తావస్థ గడిచిన తర్వాత పెంచాలి. ట్యూలిప్పు, నాసిస్, మొదలైన వాటిల్లో ఇది చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది. మన రాజ్యంలో (దేశంలో) వీటిని పెంచడానికి కష్టమవుదానికి కారణం మన వాతావరణం. ఈ బల్బుల సుప్తావస్థకి అవకాశం




2.28



82A

2.30





२.२५

82B

ఇవ్వకుండా ఉండటం చేత చలి దేశాలలో అనుకూలమైన వాతావరణం (గాలి) ఉంటుంది. మన దేశంలో ఇది ఉండదు.

భూ మొగలి, సీమ భూ మొగలి (సైసల్ - sisal అనే మొగలి) వీటిల్లో ఇంకొక రకపు బల్బులు పెరుగుతాయి. వీటి మధ్య అక్షనుంచి అనే బల్బు పిలకలు (మొలకలు) విత్తనాలు వంటి తుట్టును కలిగింటాయి. వీటిని బీజంవలె నాటి వాటి సంఖ్యను హెచ్చించుకుంటూ ఉంటారు. ఈ మొక్కలలో నిజమైన విత్తనం - లైంగిక సంపర్కం నుంచి కలిగే విత్తనాలు ఉండవు. (చిత్రం - 2.28)

2.28 సీమ కత్తాళ (ఒక రకపు చేదు రకానిచ్చే వనస్పతి) (సైసల్) బల్బులు విభజించి పాతే మొక్కలను వృద్ధి చేసుకోవచ్చును.

బల్బుల ద్వారా సస్యోత్పాదన పెంచుకోవడానికి, వృద్ధి చేసుకోవడానికి, సమగాత్రీ బల్బులను తయారు చేసుకోవడానికి ఒక ఉపాయముంది. తల్లి గడ్డ (తల్లి మొక్క) పుష్పించిన తర్వాత, గడ్డ పైభాగపు తట్టువంటి భాగాన్ని (ఇదే నిజమైన కాండం) రోవలి భాగంలో గుంట వడేటట్టు కత్తిరించాలి. కత్తిరించేటప్పుడు కొంచెం అడ్డదిడ్డంగా గాటు చేయాలి. ఈ విధంగా చేసేటప్పుడు మొలకెత్తే మొనలకి దెబ్బ తగలుతుంది. ఈ విధంగా గాయవరచే తట్టు గాలి వచ్చే చోట ఉష్ణోగ్రత 32° C కంటే ఎక్కువ కాకుండా 21° C కంటే తక్కువ కాకుండా కొంత కాలం ఉంచాలి. సాధారణంగా మనం గడ్డలను కొంత కాలమైన తర్వాత పాతాలి ఆ తర్వాత, ఈ గాటుల నుంచి కొత్త కొత్త బల్బులు మొలకెత్తుతాయి. ఇవి కొద్దిగా పెరిగిన తర్వాత, తల్లి బల్బునుంచి విడదీసి ప్రత్యేక మొక్కగా నాటాలి. అమెరికాలో ఇంకొక క్రమాన్ని అనుసరిస్తారు. దీన్ని చిత్రం 2.29 లో చూపబడింది.

2.29 అమెరికాలోని లతునాలను నాల్గు మొక్కలు చేసి (నిలుపుగా), ఇంకొక్క పొరను కొంచెం పైకి ఉండేటట్టుగా, పాతితే కొన్ని వారాలైన తర్వాత క్రింద నుంచి మొలకలు (పిలకలు) చిగురించడం చూడవచ్చును. ఆ తర్వాత వేరు చెట్టువుతుంది. కొన్ని నెలల తర్వాత వేరు - ఆకు పెరిగి ప్రత్యేకమైన మొక్కగా మారుతుంది.

కారముల ద్వారా సస్యోత్పాదన :

ఉల్లి పాయలు, తెల్ల గడ్డలు (వెల్లల్లి) మొదలైన బల్బులు ఉబ్బి ఆకు లేదా ఆకు మొగ్గల కవచాలు పరివరణ రూపాలైతే (క్రింద వేరు నందు వేరు వెనుకకు చూడండి - వేర్ల పిలకలు మొలవడము). (కారములు - Corms) ఉబ్బి కాండపు రూపాంతరం (modified stem) వీటిని సాంద్ర లేదా గట్టి బల్బులు (solid bulbs) అని వ్యవహరిస్తారు. అయితే బల్బులు, కారముల నిర్మాణం వేరు వేరైనందున వీటిని అలాగే వ్యవహరించడం మంచిది కాదు. పిలకల (కందల) చుట్టూ సన్న నన్ను చిన్న పిలకలు (కందల) చుట్టూ సన్న నన్ను చిన్న పిలకలు గ్లాడియోల్స్ మొదలైన జాతులలో పెరుగుతాయి. వీటిని కార్మెట్ (cormlet) కార్మెల్ (cormel) లేదా స్పాన్స్ (spawns) అని అంటారు (2.30 చిత్రం).

2.30 గ్లాడియోల్స్ కారము a. కొత్త కార్మెట్ దీనిని పాతితే ఒకటో రెండో కొత్త మొక్కలొస్తాయి. b. కారముల

చుట్టూ కాడల లాగా లేదా గింజలులాగే సన్నని చిన్న పిలకల కారములు (వీటిని కార్మలెట్ లేదా కార్మెల్ Cormel అంటారు) ఉంటాయి. వీటిని వగల కొడితే కొత్త మొక్క కొత్త కారము దొరుకుతాయి. 2 సంవత్సరాలలో ఇవి పుష్పిస్తాయి. c. పాత కారము (తీసి వేయాలి). d. వేర్లు.

ఈ పిలక మొలకలను తల్లి మొలక నుంచి విడదీసి వేరేవోట పాతి, మొదటి సంవత్సరం దాని గాత్రాన్ని వృద్ధి చేసుకొంటారు. ఆ తర్వాత (రెండవ) సంవత్సరం పెద్దదైన పిలకలను నాటితే ఇవి పుష్పలను అంటుకొంటాయి (అత్త కొంటాయి). పిలకలు పెద్దవైతే వాటి పైభాగం బిసీ (కండబట్టి) పుష్టిగా ఉంటుంది. ఇటువంటి మొలకలను (కందలను) శిఖరాగ్ర పిలకలు (అగ్ర పిలకలు - అగ్ర మొలకలు) (High Crown Corm) అని అంటారు.

తల్లి మొలకను నాటితే దీనిపైన మరొక పిలక మొలకెత్తుతుంది. తల్లి మొలక శిథిలమవుతుంది. ఈ కొత్త మొలకల పై భాగం (నెత్తి) చప్పటిగా ఉంటుంది. లేదా గుంట వడుతుంది. ఇటువంటి వాటిని అధోగ్ర పిలక (low crown corm) అని అంటారు. శిఖరాగ్ర నిండి ఉండటం చేత అగ్ర పిలకలకు ఎక్కువ గిరాకీ. ఈ పిలకలకి, అధోగ్ర పిలకలకి భేదం లేదు.

కలేడియం (Caladium) రంగు రంగు ఆకు పిలకల పై భాగంలో మొలకలు లేదా పిలకలు బయలు దేరుతాయి. మొలకలను లోపల ముక్కలుగా విభజించియో, పిలకలను, తల్లి మొలకలనుంచి వేరు చేసియో పాతి, స్వతంత్ర మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు. మొగలి దంటులను ఈ విధంగానే వృద్ధి చేస్తుంటారు.

గ్లాడియోల్స్, పిలకలను వేసే ఇతర మొక్కల్లో సస్యోత్పాదన వృద్ధి పరచుకోడానికి ఒక ఉపాయముంది. ఈ పిలకల పైభాగంలో మొలకలు చిగురిస్తాయి. (మొలకెత్తుతాయి అని ముందే చెప్పడమైంది). ఈ మొలకలను పుష్పించిన తర్వాత, పెరిగి బిసీన తర్వాత బయటికి తీస్తారు. సుస్తావస్థలో (సుమారు 3 - 4 నెలలు) అయిన తర్వాత ఒక్కొక్క పిలకే ఉండేటట్టుగా ముక్కలు చేసి నాటాలి. ఈ మొక్కల నుంచి కొత్త మొలకలు చేసి నాటిలి. ఈ ముక్కల నుంచి కొత్త మొలకలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. కొత్త జాతి మొలకలను త్వరగా వృద్ధి చేసుకోవడానికి ఈ ఉపాయాన్ని అనుసరిస్తారు.

**విభజన : వింగడింపు (Division) ద్వారా సస్యోత్పాదన**


పై వివరించిన సస్యోత్పాదన క్రమంలో బల్బుల ద్వారా, మొలకల ద్వారా పిల్ల బల్బులను పిలకలను సులభంగా ప్రత్యేక మొక్కలుగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ మొక్కల భాగాలు నాటిటప్పుడు వేళ్ళు కానియండి కాండాలే కానియండి స్పష్టంగా కనిపించవు. వీటిని నాటి పెరిగిన తర్వాత అది స్పష్టమవుతాయి. అయితే మైకల్ మసీ డేసీ (Michaelmas Daisy), నిత్య ఆస్థరు (Perennial aster), జెర్బెర (Gerbera) మొదలైన మొక్కలలో వేర్లు బొంతలాగ ఉండటమేకాక, కాండాలూ బొంతలాగే నేలనుండి పైకి వస్తాయి. ఇటువంటి వాటిని కొంచెం వేరుకు తగిలున్నట్టుగానే కొంచెం కాండం ఉండేటట్టుగానే వాకుతోనో వేళ్ళతోనో విభజన లేక వింగడించి వేరు వేరుగా మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చును. (చిత్రం : 2.31 & 2.32).



2.31



2.32



2. 33

2.31 బర్బర్ మైకెల్ మేన్డెస్ మొదలైన వాటిని వేళ్ళ ద్వారానే సులభంగానే విభజించవచ్చును. లేదా పోర్చుగి దూర్బి వంటి విభజించుకోవచ్చును. ఏసిసియు మొక్క యొక్క అఫ్సెట్టును వేరు అంటుకొన్న (అంటుగట్టిన) తర్వాత విడదీయ వచ్చును (2.35 b).

2.32 కొన్నింటిని వేళ్ళ దొంతర్లుగా పెరిగి వుండటం చేత రెండు పోర్చులను దూర్బి, వంచి విభజించాలి.

దేలియ (Dahlia) మొదలైన ఉబ్బు వేళ్ళంటే ముక్కలలో వేర్ల గడ్డలు గుత్తులుగా ఉంటాయి. వీటిని ప్రతి గడ్డకూ కొంచెం కాండ భాగం ఉండేటట్టుగా కత్తిరించి, పాతి ప్రత్యేక మొక్కలుగా పెంచి, సస్యోత్పాదన చేసుకోవచ్చును (2.33).

2.33 చిత్రం : దేలియన మొక్క, గుత్తి గడ్డ, వీటిని వేరు చేసి ప్రత్యేకమైన కొత్త మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చును. ఎడమ వైపు విభజించడం తప్పు. పాత కాండపు భాగం ఉండేటట్టుగా కుడివైపు ఉండేటట్టుగా కత్తిరించాలి. క్రింద ఒక్కొక్క గడ్డకూ కొంచెం (కొద్ది) భాగం కాండముండేటట్టు (A) కత్తిరించిన గడ్డలను చూపడమైనది.

అదేవిధముగా కొన్ని మొక్కలలో వేరు నుంచి బయలుదేరిన సకరులను (Suckers) ఈ విధంగానే విభజించుకోవచ్చును. ఈ విధమైన సస్యోత్పాదన క్రమానికే విభజన వింగడింపు (Division) అని అంటారు. ఈ విధంగా విభజించడానికి అనుకూలమైన నస్య భాగాలు క్రింద పేర్కొనబడినవి.

1. గుప్తకాండాలు - రైసోములు (Rhizomes).
2. మొక్క అగ్రభాగం (Crown).
3. అఫ్సెట్టులు, పిల్ల మొక్కలు (Offsets) లేదా పిలకలు
4. గడలు (Tubers).

రైసోములు ద్వారా వింగడించడం

అల్లం, వసుపు, ఎలకులు ఐరిస్ (German Iris), వెడరు, అరటి, క్యాన (Canna), అస్పారాగస్ (Asparagus), ఫైసాలీస్ (Physalis), చీనాదీప (Chinese Lantern) - మొదలైన మొక్కలకు నేలకి కొంచెం క్రింద కాండ భాగం గడ్డ కడుతుంది. ఇటువంటి నేల కాండాలను గుప్తకాండం అని వ్యవహరిస్తారు. ఎందుకంటే సామాన్యంగా మొక్కలలో కాండాలు నిలువుగా నేలపైన పెరుగుతాయి. కాని పైన పేర్కొన్న మొక్కలలో ఈ కాండాలు అడుగున నేలలోవల ఉబ్బుకొంటూ పెరుగుట చేత ఇవి గుప్త లేదా నేల కాండాలు అవుతాయి. వీటి కణుపు నుండి కాండాలూ, క్రింద నుంచి వేళ్ళు, పెరుగుతూ ఈ నేలకాండాలు వికసించి ప్రకాశిస్తాయి. ఈ గుప్త కాండాలను కొంచెం కొంచెం కాండము, ఉండేటట్టుగా ముక్క చేసి ప్రత్యేక మొక్కలుగా చేయవచ్చును (చిత్రం 2.34) రైసోము. లేదా గుప్త కాండాలను వృద్ధి చేసుకోడానికి పుష్పించడానికి విడువరాదు. లేదా దాన్ని పుష్ప బీజం అంటుకోకుండా ఎండిన వెంటనే కోసి (పీకి) వేస్తూండాలి. అప్పుడు బీజాలు ఉత్పత్తికి వెళ్ళేడి సోషకాలను రైసోము పెరుగుదలకి మార్గమవుతుంది. బాగా ఎరువు చేసి సోషకాలను అందించడం ద్వారా ఈ గుప్త కాండాలు

బాగా ఎక్కువగా పెరుగుతాయి. (2.34 చిత్రం).



2.34 వసువు గడ్డలు రెండు రకాలు. ఎడమవైపు అనేక తల్లి గడ్డలున్నాయి. కుడివైపు ఒక తల్లి గడ్డ, కొన్ని పిల్ల గడ్డలు లేదా ప్రళుప వంటివేళ్ళు పెరుగుతున్నవి. వీటిని ఎక్కువ విభజించాలనేది నల్ల గీతల ద్వారా సూచించడమైనది.

2. శిఖరాగ్ర విభజన (శిఖరాగ్ర లేదా నెత్తి) (Crown division) సామాన్యంగా నేల సమ మట్టం నుంచి కొత్త కాండాలు బయటకొచ్చే సస్య భాగాన్ని నెత్తి (Crown) శిరస్సు, అని అంటారు. కానీ బహువార్షిక పువ్వుల మొక్కలలో ఈ భాగం ద్వారానే కొత్త ప్రకాండం పెరుగుతుంది. ఈ ప్రకాండాలు పుష్పించి ఎండిన తర్వాత (మరణించిన తర్వాత) దాని క్రింది భాగం నుండి మరి కొన్ని కొత్త ప్రకాండాలు మరు సంవత్సరం పెరుగుతాయి. మైకల్ యస్ టేసి హెమెరోక్యాలిస్ డేలీరి (Hemerocallis day lily) కొన్ని పామ్స్ (ట్రాబి చెట్లు) సాక్స్ (సెజా (Saxifrage) కొన్ని మేడన్ హేర్ ఫర్నల, కొన్ని ప్రీముల (Primula) కొరియాస్ (Coreopsis) రెడ్ బెకియ (Rudbeckia) అకలియ (Achillea) కంపాన్యుల (Campanula) జెర్బెరా (Gerbera) రాస్, క్యూలన్ ఏకీ సాన్స్, సాలి డాగో (Solidago) కొన్ని చామంతులు, నైమోలెట్ మొదలైన వాటిల్లో నెత్తిని (అగ్రభాగాన్ని) కత్తిరించి విభజన చేసి ప్రత్యేకమైన మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చును. ఈ విధంగా చేయడానికి నరైన కాలం వసంత కాలం. సామాన్యంగా ఈ కాలంలో కొత్త ప్రకాండాలు బయటికి తొంగి చూస్తుంటాయి. ఇవి ఒకటి రెండు అంగుళాలు పెరిగిన తర్వాత అగ్రభాగాన్ని (నెత్తిని) విభజించటం మంచిది. ఈ రకపు అనేక మొక్కలు నాటిన 2-3 సంవత్సరాలైన తర్వాత విభజనకి సిద్ధమవుతాయి.


కొన్ని అల్పిడ్డులు వెదురు (బొంగు) జాతుల మొక్కలను ఈ విధంగా విభజించియే సస్యోత్పాదన చేసుకోవాలి. దీనికి కారణం ఇవి విత్తనాలను ఇవ్వవు. కాబట్టి ఈ రీతిలోనే వీటిని పెంపొందించుకోవాలి. ప్రళుపను విడిపించి ఫోర్నలతో అగ్రభాగాన్ని రెండు, మూడు, భాగాలుగా చేసియో, కోసియో, కత్తిరించియో మొక్కలను విభజించాలి. ఒక జాతి పాచి, (వప్రావర్) ఓరియంటల్ జెప్పీఫైల (Gypsophila) యూస్ (Anchusa) వీటి వేళ్ళ లోతుగా ఉండటం చేత వీటి అగ్ర (నెత్తి) భాగాన్ని విభజించడానికి వీటిని లోతుగా మొలకెత్తించి ఆ తర్వాత విడదీయాల్సి ఉంటుంది.

డెల్ఫినియం (Delphinium) పెరినియల్ లార్క్స్ పూర్ మొదలైన వాటిల్లో కొత్త ప్రకాండాలు ఎక్కువగా ఉండక పోవునంత వీటిని విభజించాలి. మొక్కల్ని విభజించేటప్పుడు గాయాలవుతాయి. వీటి మూలంగా రోగాలు మొదలైనవి లోపలికి వేరకుండా ఉండేటట్టు ఈ గాయాలపై మంచిదైన గంధకపు పొడి లేదా శిలింబ్రాహరి పొడి చల్లాలి.

విభజనకు ఎక్కువగా మొక్కలు దొరకాలంటే కొంత కాలానికి ముందే క్రింది భాగానికి, కొద్దిగా మట్టిని అంటించి (ఆత్మకొనేట్టు) పెట్టాలి. లేదా అగ్రభాగాన్నంతటినీ మొలకెత్తించి కొంత లోతుకి పాత వచ్చును. ఈ విధంగా చేస్తే, ఎక్కువగా బయటి ప్రకాండాలు వస్తాయి. సేంట్ పాలియ (ఆఫ్రికన్ వయోలెట్ - Saint paulia of African Violet) స్ప్రాబరి పచ్చ చెట్లలో అగ్ర భాగం (నెత్తి నుంచి) వేరు వేరు ఆకులు వర్తూలాలుగా



2.34




2.356





236a



86B

(Rosette of leaves) పెరుగుతాయి (వస్తాయి). ఈ వర్తులాలను వేరు కొంచెం ఉండేటట్లుగా జాగ్రత్తగా కత్తిరించి వింగడించి ప్రత్యేక మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చును.

b. ఆఫ్ సెట్స్ (Offsets) (చూడండి సస్య నిర్మాణం) అనానస్ (2.35 a) ఎలే విరియ (ఒక రకపు చెట్టు వనస్పతి Echiverea) సీమ వనస్పతి ఎ పి సీయు (2.35 b) మొదలైనవి ఆఫ్ సెట్స్ లేదా పిలక మొక్కలను త్రోస్తాయి. వీటిని తల్లి మొక్క నుంచి ప్రత్యేకించి వేరే మొక్కలుగా మొలకెత్తించ వచ్చును.

స్ట్రాబరి హరియాళ గడ్డి, ఒంటి వెలగ మొదలైన వాటిలో తీగను కోస్తే, క్రింద భాగాన అక్కడికక్కడే వేళ్ళు వస్తాయి (చిగురుస్తాయి). కణుపు నుంచి ప్రకాండాన్ని బయటికి త్రోస్తాయి. వీటిని కత్తిరించి వేరే మొక్కలుగా వృద్ధి చేసుకోవచ్చును.

లకునాలు (bulbs) కారముు విభజనలు (మునుపే) పెనుకనే వివరించడమైంది. ట్యూబర్లు కలేడియ (Caladium) బంగాళా దుంప జెరుసేలం ఆర్టిచోక్ (Jerusalem artichoke) మొదలైన ట్యూబర్లు (చూడండి సస్య శాస్త్రం) విభజన కత్తిరి నుంచి (చిత్రం 236 a & b) ఈ ట్యూబర్లు పైన అక్కడికక్కడే పిలక లేదా మొగ్గలు ఉంటాయి. బంగాళా దుంపలలో ఈ కణుపులు ఒక కొనలో (చివర్లో) ఎక్కువ (Bud end) ఇంకోక దాంట్లో విరళం (Butt end) ఈ ట్యూబర్లు ఒక్కొక్క మొక్కలోనూ ఒక్కొక్క పిలక (మొలక) ఉండేటట్లుగా కత్తిరించి, నాటితే, ఒక్కొక్క ముక్క మొక్క పెరుగుతుంది.

2.35 a అనానస్ ఆఫ్ సెట్టులను వింగడించి మొక్కను వృద్ధి చేసుకొనే పద్ధతి.

2.35 b. ఏపీసీయు ఆఫ్ సెట్టుల గీత గీసిన చోట కత్తిరించి పాతాలి.


2.36 a. బంగాళా దుంప ఒక్కొక్క దాంట్లోనూ మొలకలు ఉండేటట్లుగా ముక్కలుగా విభజించుకోవాలి.

2.36 b. కెలేడియ గడ్డను నల్లటి గీత నుంచి సూచించినట్లుగా విభజించాలి.

ఈ ట్యూబర్ మొక్కలను పాతడానికి కొన్ని దినాలకు ముందే పచ్చనైనదాన్ని వాకులో ముక్క చేయాలి. కత్తిరించిన తర్వాత కత్తిరించడం ద్వారా ఏర్పడిన గాయాన్ని సమమైన గంధకపు పొడితోనో, శిలీంధ్రహరితోనో ఉపవరించాలి. (గంధకం) శిలీంధ్రహరిలో పూసి గాయాన్ని మాన్పాలి. ఆ తర్వాత వాటిని గాలి తేమ ఎక్కువగా లేని చోటున ఉంచాలి. 2-3 దినాలలో కత్తిరించడం ద్వారా ఏర్పడిన గాయం మాని అంటుకడుతుంది. ఈ అట్టు ముక్కలను రోనాణువుల నుండి కాపాడుతుంది. ముక్కలను నాటిన తర్వాత కుట్టిపోవును.

కెలోడియం ట్యూబరును ఒక మొక్కకు రెండు పిలకలు ఉండేటట్లుగా ముక్కను చేయాలి. వీటిని 7-10 సెం.మీ. లోతుకి పాతాలి. ఆకిమెనినిలో (Achimenes) విభజించే భాగం ట్యూబర్లాగుండే నైసోము. ఇది ఎర వంటి పురుగులాగో, శంఖులాగో ఉంటుంది. వీటిని విరిచి విభజించి, పాత కొత్త మొక్కలను ఉల్పాదన చేసుకోవచ్చును.

ట్యూబరస్ బెగోనియ (Tuberous Begonia) గ్లాక్సియలో ట్యూబర్లాగే ఉండే ఎ. వేళ్ళు (వేర్లు)



2.37



2.38

వీటిల్లో కాండం వైపు కొన్ని మొలకలుంటాయి. వీటిని పిలకలుండేటట్లుగానే ముక్కలు చేసి ఆ ముక్కల ద్వారా సస్యోత్పాదన చేసుకోవచ్చును. కాని ఈ ముక్కలు త్వరగా కుళ్ళి పోతాయి. కాబట్టి వీటిని కత్తిరించే చాకును మేథిలేటిడ్ ఫిరిట్ లో అద్దెయ్యి, శీలీంధ్ర హరిత పొడి చల్లియ్యా క్రిములు లేకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ముక్కలను కత్తిరించిన వెంటనే శీలీంధ్ర హరిత ద్వారా ఉపవరించాలి. కొద్దిగా అంటుకట్టుకోడానికి నీలుగా వదిలి అనంతరం కొంచెం తేమ ఇసుక మిశ్రమాలో పిలకలను పాతి పెట్టాలి. ఆ తర్వాత కుండీలో పాతాలి. డేలీయా కూడా బ్యూటరువలె ఉండే వేరు. దీన్ని విభజనని మొకనే తెలపడమైంది. బ్యూటరులు ఎల్లప్పుడూ గుండ్రంగా ఉండవు. అవి పొడవుగానూ ఉండవచ్చును. డేలీయాలో ఉండేటట్టు. (చిత్రం 2.38).

2.37 బంగాళా దుంపలు కన్నులుండేటట్టు (పిలకలు) ముక్కలు చేయాలి. మొదట ఇసుకలో పాతి, పిలక మొలకెత్తిన తర్వాత, శుభ్రమైన చాకుతో ముక్కలు చేసి శీలీంధ్ర హరితాన్ని రాసి పూసి ఒకటి రెండు రోజులు ఎండబెట్టి, పాతాలి.

2.38 డేలీయాల్లో ఉండే పొడవైన బ్యూటరులు

**ముక్క చేయడం, ముక్క విభజ్యకాలు (విభజనలు) (Cuttings cuttage)**

అనేక రకాల మొక్కలను వేరు, రెమ్మ, ఆకు మొదలైన సస్య భాగాలను ముక్కలు చేసి, నాటి సస్యోత్పాదన చేసుకోవచ్చును. ఈ వద్దలి కొన్ని మొక్కలలో సులభము, శ్రీమ్రము, తక్కువ ఖర్చు అగుట చేత ఈ సస్యోత్పాదనే క్రమంగా ఎక్కువ వాడుకలో ఉన్నది.

ముక్కలలో రకాలు 1. వేరు నుంచి కత్తిరించే వేరు ముక్కలు (Root cuttings) ఉదా : బ్రెడ్ ఫ్రూట్ (Bread Fruit) కాండం నుంచి కత్తిరించే కాండపు ముక్కలు (Stem cuttings) వీటిల్లో రెండు విధానాలు పెరుగుచున్న కాండం వీటిల్లో రెండు విధానాలు (i) పెరుగుచున్న కాండం వీటిల్లో కొన్ని కాండాలు వృదుకండతో కూడుకొని ఉండేవి ముక్కలు (Soft wood cuttings) ఉదా : పూషియ (Fuschia) కొలియస్ (coleus) కొన్ని గట్టి కాండపు ముక్కలు (Hardwood cuttings) ఉదా : గులాబీ, క్రోటన్. (ii) బలిసిన కాండం. (a) పొడవైన ముక్కలను చేసి, పెంచెడి పాయిన్ సెటియ (Poinsettia) మొదలైనవి. (b) పొట్టి (చల్ల) ముక్కలను చేసి పెంచెడి ముక్కలు.

3. ఆకు నుంచి కత్తిరించే ఆకు ముక్కలు ఇందులోనూ కొన్ని రకాలున్నాయి. అవి ఎక్కివీరియ (Echeveria) సెంట్ పాటియ (Saint paulia) మొదలైన వానివలె పూర్ణాకును నాటగినది. (b) రెక్స్ బిగోనియ (Rex Begonia) మొదలైన వానివలె ఆకులను ముక్కలు చేసి ముక్కల్ని నాటుతారు. కొన్ని రకాల లీగ్లెవలె ఆకు పొడుగు (Scales) పాలుమలను తీసి నాటుతారు (నాటదగినవి).

**ముక్కలు వేరు చిగురించడానికి (రావడానికి) అనుకూల పరిస్థితి :**

బీజాలు బాగా పెరిగి దట్టమైన మొక్కగా పెరగడానికి కొన్ని అనుకూల పరిస్థితులు ఏ విధంగా


అవసరమో, అదే విధంగా ముక్కలను నాటితే వేరు రావడానికి కొన్ని అనుకూల పరిస్థితులు అత్యవసరం.

1. ముక్కలు సరిగా బలిసిన లేదా పెరుగడానికి వీలయినటువంటిదై యుండాలి. దృఢంగా ఆరోగ్యంగా ఉండి, చాలినంతగా బలిసి యుండాలి. నీళ్ళు నిండుకొని యుండరాదు. బోగ్సేవీలియ మొదలైన వాటిల్లో కొన్ని రసముతో నిండిన రెమ్మలు బయలుదేరుతాయి. వీటిని నీరు రెమ్మలు (Water shoots) అని అంటారు. ఇటువంటివి ముక్కలు చేయడానికి తగినవి.
2. వేరును దింపి, మొలకెత్తించే పద్ధతి గాలి బాగా లేనటువంటి షేత్రం, వస్తు మధ్యవస్తు (Medium) ఇసుక, మట్టి మిశ్రమం వర్మిక్యులైటా (Vermiculite) పీట్ (peat) మొదలైన వస్తువులను ముక్కలను పాతడానికి చూసి ఏరుకోవాలి.
3. సామాన్యంగా మొక్క వేసేటప్పుడు మధ్యమస్తు ఆ మొక్క కాడ నుంచి ఉండి ఉండాలి లేదా ఆ స్థలానికి కొద్దిగా ఉష్ణాన్ని కలిగించాలి.
4. మొక్కను నాటి స్థలంలో గాలి అడ్డంగా వీచకూడదు. గాలి తగిలే వ్యవస్థని (పద్ధతిని) ఏర్పాటు చేయాలి. గాలి అడ్డంగా వీచకూడదు. గాలి తేమతో కూడి ఉండాలి (గాలిలో తేముండాలి) ఉష్ణదేశాలలో అందులోనూ సముద్రతీర ప్రదేశాలలో మన కేరళ, మద్రాసు, బొంబాయి, కలకత్తా తిరువనంతపురం మొదలైన చోట్ల, వాయుపురో తేమ శాతం ఎక్కువ. తేమ జతకి గాలి వేడిగా ఉండటం చేత ఈ స్థలాలు మొక్కలకి వేడి ఇల్లు వలె (Hot house) ఉంటాయి. శీఘ్రంగా వేగ్నస్తాయి. ఈ తేమ శాఖం (humid heat) ఉండేటట్టు ఏర్పరస్తే, ఇతర స్థలాల్లోనూ మొక్కలకు త్వరగా వేర్లు వస్తాయి (మొలకెత్తుతాయి).


**పనిముట్లు :** మొక్కలు చేయడానికి మంచి సాధనాలు, సమర్థవంతమైన కత్తిరిని తీసికొచ్చి పెట్టుకొని ఉండాలి. ఈ హత్యరులు (పనిముట్లు) చాలాకాలం వుండి శ్రుప్పు పట్టకుండా ఎక్కువకాలం వాడుకకు ఉపయోగ పడాలి. కాబట్టి అప్పుడప్పుడు కొత్తదనాన్ని ఆపేక్షిస్తుంది (మాలీసు). కాబట్టి మాలీసు కొంత దుబారా అయితే కూడా మాలీసు కత్తిర్లు తయారుచేసే వారి దగ్గర చేయించడం మంచిది. వాకు చిన్నది లేదా పెద్దది అయినా పడునైన వాకులనే ఉంచుకోవాలి. గ్రహించు తోటమాలీ మొక్కలు పిలకలు చేయడానికి పెంచేటటువంటి వాకు (బడ్డింగ్ వాకు Budding knife) ముక్కలను కత్తిరించడానికి అనుకూలమైంది. చావంతి, టెలియ, మొదలైన వృద్ధు కాండాలను ముక్కలు చేయడానికి ఉపయోగపడే కత్తిరిని ఉపయోగించుకోవచ్చును.

సెకాచర్ (Secateur) సెకెటర్ అని తప్పుగా వ్యవహరించడం వాడకంలో ఉంది. సమరగత్తరి, వదునైన కత్తిర్లను దారు (నారు) ఎక్కువగా నున్న చెట్లు లేదా పొదలు (shrub) రెమ్మలు కత్తిరించడానికి, ముక్కలు చేయడానికి, వాకు కంటే సెకాచర్ ఎక్కువ అనుకూలంగా వుంటుంది. అందు త్వరగా సమసిపోకుండా, ఎల్లప్పుడు పదునుగా ఉండేటటువంటి కత్తిర ద్వారా పనులు త్వరితంగా సమర్థవంతంగా చేసికోవచ్చును.


ఉపకరణాలు పదునుగా ఉండాలని చెప్పడమైనది. దీనికి కారణం ఆ విధంగా ఉండినప్పుడు కత్తిరింపు



2.39



2.40



2.41

స్పష్టంగా సరిగ్గా వస్తుంది (clean cut) లేకపోతే కత్తిరింపు ఎగుడు దిగుడుగా వంకర టింకరగా చిందర పందరగా (ragged) ఉంటుంది. రాగాలుపులు లోపలికి దూరడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. అంటుముక్కలను పాతడానికి బాగున్న గుంటని వదునుగా తవ్విపెట్టుకొని ఉండాలి. వివిధ పరిమాణాలలో వదునుగా నుండేకూలం(వంటి) పనిముట్లను పెట్టుకొని ఉండాలి. లోటకు ఉపయోగపడే ఉపకరణాలు - వివిధ పనిముట్లు కూలాల వంటివి). కూలపు మొనతో ముక్కను చాల మొనదేలి నట్టుగా కోయరాదు. ఈ విధంగా చేస్తే, ముక్కను పాతిన తర్వాత ముక్క యొక్క క్రిందిభాగంలో ఖాళీ ఏర్పడుతుంది. మట్టికణాలు సంవర్షం తప్ప లేమ అంటకుండా అంటుమొక్క ఎండిపోతుంది.

అంటు మొక్కలను (ముక్కలను) పెంచే గుడారాలు. (Propagating Frames)

అంటు మొక్కలను పాతి వేరు చేయడానికి అవసరమైన ఉష్ణం వేడి గాలిని లభింపజేయు చేయడానికి కొన్ని చౌకట్టులు లేదా గుడారాలు వల్లిమాది దేశాలలో తయారు చేసుకొంటారు. (చిత్రం 2.39).


2.39 చిత్రం.

2.39 మొక్కలకు (అంటుగట్టిన) వేరు రావడానికి కొన్నిరకాల గుడారాలను ఏర్పరుస్తారు. ఈ గుడారం బట్టతో మూయబడిన (cloth house) ఇల్లు.


ఈ గుడారాలలో గాలి వలించడానికి బదులు ఒకచోటవేరి బంధించేస్తుంది (Closed atmosphere). ఈ విధంగా చేర్చిపెట్టిన గాలి అంటు మొక్కల (ముక్కలు)కు వేరు రావడానికి (పెరగడానికి) చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. గాలి వస్తూంటే మొక్కలలోని తేమ ఆరిపోతుంది. ఈ గుడారాలలో ఆ విధంగా జరగదు, మొక్కలు నిండుకొని బ్రతుకుతాయి. లేదా ఎక్కువ వేడిని కలిగించడానికి క్రింది భాగాన గుడ్డపు లద్ది మొదలైన పకువారుల ఎరువులను, లేదా సన్నని చిరుదిపాన్ని, విద్యుత్ బల్బునో లేదా విద్యుత్ తీగనో, ఈ గుడారాలలో జతచేసి పెడతారు. (2.40 చిత్రం).

2.40 చేకట్టును పాతి, దానిపైన గాజు వాకిళ్ళను బోడిస్తారు. ఈ చేకట్టులలో క్రింద వేడిని అందచేసే ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చును.



మనది ఉష్ణదేశమైనందున చలికాలంలో తప్ప - మిగిలిన కాలాలలో కావల్సినంత ఉష్ణముండుట చేత ఈ వ్యవస్థ ఎక్కువగా అవసరం లేదు. లద్ది వేడికాని లేదా 15-25 వోల్టల విద్యుత్ బల్బు కాని చాలు. అంటు మొక్కలను ముక్కలను నాటిడి మట్టి ఇసుక ఇల్వ్యాది మధ్య వస్తువుల వేడి వాయువు వేడికన్నా (ఉష్ణంకన్నా) 2 - 3° C ఎక్కువ. కాచిన (కాల్చిన) లద్ది లేదా బల్బుతో అది కలిగింవాలి. వాయువుకన్నా మధ్యవస్తువు కాడ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటే చిగురు చిగిరించడానికి వేరు పెరగడానికి ఎక్కువ అనుకూలంగా ఉంటుంది. కాడ లేకపోతే, అంటు మొక్క (ముక్క) చిగురించి, వేరు రావడానికి కావల్సిన సౌషకాలు చిగురు వైపు వెళ్లి (సాగి) వేరు రావడానికి అననుకూలమవుతుంది. (చిత్రం 2.41).



2.42



2.43



2.44



2.41. 1- 3 2.40 చిత్రంలో చూపబడిన గుడారాల వంటి వాటిని చేకట్టున (చదరంలో) నిలుపుగా వీల్చి 1. ఇది వక్క, గుడారం చాలా కాలం జీవించడానికి తగినది. దీనిచేకట్టుని (చదరాన్ని) గట్టిగా వంచి క్రిందిపాయపైన కడతారు. ఇది వేడి గుడారం లేదా పాతి లేదా చాకట్టైన గుడారం. 2. ఇది తాత్కాలిక వేడి (ఉష్ణ) గుడారం. 3. ఇది తాత్కాలిక గుడారం (క్రింద వేడి లేనిది. e. నేల. c, దిరుసుతనం వేత కుప్పెడి ఎరువు. లేదా గుడ్డపు ఎరువు (లద్ది). b. మట్టి మిశ్రమం - అంటు మొక్కల్ని పాతడానికి a. గాజు మూత.

రక రకాలైన మొక్క ముక్కల్ని పెంచేది గుడారాలను చిత్రం - 2.42, 2.43, 2.44లో చూపడమయినది.

2.42 మరొక రకపు గుడారం చెక్కపెట్టె చుట్టూ, గాజు గోడలు పైన కూడా గాజు.

2.43 గాజు గుడారం


2.44 తాత్కాలికంగా మొక్కలను కాపాడే లేదా పాదులపైన ఉంచే క్లోఫీలు - గాజువి. కడ్డలను పాదులలో పాతి వీటిని వాటిపైన పెట్టవచ్చును.

ఈ గుడారాలను గ్రహించడానికి లేదా చేయడానికి కొంత డబ్బు ఖర్చవుతుంది. కాని ఈ గుడారపు కొన్ని అనుకూలాలను ఎక్కువ ఖర్చు లేకుండానే పొందడానికి (చేసుకోవడానికి) చాక ఉపాయాలున్నాయి. వీటిల్లో అన్నింటికంటే చాల సులభమైంది ప్లాస్టిక్ డేరాలు (Plastic tents). ఒక ప్లాస్టిక్ షీట్ని, ముక్కలని నిలుపుగా ఉండే పెట్టి, లేదా కుండపై కప్పండి ఒక మార్గం. ముక్కలకి, ప్లాస్టిక్ షీట్ని మధ్య కావల్సినంత స్థలముండేట్టు. 4-6 కడ్డలినో, ఇనుప కమ్మలను (ఇనుప కర్రలనో) పాతి, ప్లాస్టిక్ షీట్ని డేరాలాగ కప్పాలి. (చిత్రం 2.45) ప్లాస్టిక్ షీట్, రోపలి తేమను అరనివ్వదు.


2.45. చిత్రం ప్లాస్టిక్ (పాలిథిన్) సంచీని, వరిచి నిలిచేట్టుగా కర్రలను పైన కప్పి, సంచీ క్రిందిభాగాన్ని కుండి క్రింద చిక్కించాలి. చాల వరిమాణాలలో చేసుకోతగ్గ సులభమైన గుడారం.

బయట నుంచి గాలి దూరడానికి అవకాశమివ్వదు. కాని మొక్కల ఉపరితలడానికి కావల్సిన (ప్రాణవాయు) వాయువు ఈ షీట్ ద్వారా రోపలకి చేరి ఉంటుంది. కొంతవరకే రోపలి వేడిని కాపాడుతుంది. బయట కంటే డేరాలోని (రోపలి) వేడిమి, కుండి లేదా పెట్టెను, నాల్గవైపుల బాగా ప్లాస్టిక్తో కప్పితే, కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితి చేకట్టు గుడారాలంత సమర్థవంతంగా ఉండకపోయినా, సుమారుగా అంటు ముక్కలలో వేరు.రావడానికి అనుకూలంగానే ఉంటుంది.


మరొక సులభక్రమం. వెడల్పు వోరున్న గాజు జాడి గంట పాత్ర (Bell jar) లేదా పెద్ద వోరున్న చిమినీ లేదా. మస్టర్ బట్టతో గుడారాలను అంటు మొక్కలపైన బిగించాలి. గాజు వెలుతుర్ని ఇస్తుంది - రోపలి తేమను మిగులుస్తుంది. రోపలిగాలిని వట్టి చేస్తుంది (బంధిస్తుంది). ఇది అంటుమొక్కలలో వేరు రావడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది (చిత్రాలు 2.45 నుంచి 2.48).




2.45




2.46 A



2.46 B



Q.47a



Q.47b

91B

2.46. A. గంటాగుడారం, తెల్లబట్ట నంచి కప్ప పైన కట్టబడింది.

2.46. B. గాజాగంటా పాత్రం, దీన్ని గుడారంగా మలచిన రీతి చిత్రంలో చూపబడింది.

2.47a. కిరసనాయర్ దీపపు చిమ్మినీని గుడారంగా ఏర్పరచడం, పైన ఒక సన్నని గాజాను కప్పాలి.

2.47 b. పెడల్లు నోరున్న గాజా జాడిని అంటుమొక్కల పైన బోగ్గించాలి.

ఫ్లోయిక్ షీటును కానీ, గాజాను కానీ, ఎదైనా సరే మూసిన దాన్ని అప్పుడప్పుడు కొత్తగాలి, రోపలికి వెళ్ళేటట్టుగా వీటిని కొంచెం సందుచేసి (సన్నని చిల్లచేసి) ఉంచాలి. ఇవతలివైపు పెంచే గుడారాలలో కొందరు ట్యూబ్ లైట్ (Tube light) జోడిస్తూ ఉంటారు. కొన్ని జాతుల పెట్ల మొక్కలకి పగటి వెలుగే కాక (సూర్యరశ్మికాక) సాయంకాలం, రాత్రులలో కూడ వెలుతురు పుండేటట్టు చేస్తే, అవి త్వరగా వేరు రావడానికి సహాయ పడతాయి. ఎక్కువ వెలుతురుంటే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ఎక్కువ కాలం జరిగి, ఎక్కువ ఆహారం తయారై, మొలకెత్తడానికి వేరులకి పోషకపదార్థాల్ని అందజేస్తాయి. అంతే కాకుండా ఈ ఎక్కువైన వెలుగు కొన్ని రోగ కారక శిలీంధ్రాలు వృద్ధికాకుండా (ఎక్కువ కాకుండా) ఉండేటట్టు చేస్తుంది.

మొక్కల మొక్కలను నాటిన మధ్య వస్తువులోనూ మొక్కల చుట్టూ ఉండే వాయువులోనూ ఏదైనా సరే, చాలినంత తేమంటే మొక్కలు వాడకుండా, సోలిపోకుండా, బాగా వేరుపెరగడానికి అనుకూలమవుతుంది. ఈ రీతిలో తేమ ఉండేటట్టుగా, అప్పుడప్పుడు మొక్కలపై నీళ్ళ తుంపర్లు పడేటట్టుగా కొందరు ససోయాదకలు (nursery men) పోష వ్యవస్థను చేస్తూంటారు. పెద్దగాజా ఇళ్ళను కట్టి, వాటిళ్ళలో అప్పుడప్పుడు తుంపర్లు (నీటి) పడేటట్టుగా, విద్యుత్ చేతి ఉపకరణాల్ని జోడిస్తారు. వీటిళ్ళలో ముఖ్యమైన భాగం విద్యుత్ పత్రం (Electric leaf) దీని 1 శరీరపు భాగం ఎండినప్పుడు విద్యుత్ ప్రవాహం పారి, తుంపర్లు చల్లై యంత్రాలను (Mist spraying machines) నడపంచి, నీళ్ళు చిలకరించేటట్టు చేస్తారు. ఈ పత్రాలపైన చాలినంత తుంపర్లు పడినవెంటే విద్యుత్ ప్రవాహం నిలిచి యంత్రం ఆగిపోతుంది.

ఇంకొక వ్యవస్థలో నియమితకాలానికి నడిచేటట్టుగా సింపరణా యంత్రాలను విద్యుత్ యంత్రాలలో జోడించి పెడుతుంటారు. ఈ విధంగా తుంపర్లు పడుతున్న చోట నాటిన మొక్కల మొక్కలలో అనేక వేర్లు వస్తాయి. ఫ్లోయిక్ దారంలో అప్పుడప్పుడు నీటిని నింపుతూ ఉంటే పై వివరించిన వ్యవస్థని కొంచెం మాత్రమే అనుసరించవచ్చు. వేరును విడదీయడానికి గుడారాలలో క్రింది భాగాన్ని వేడిచేస్తే, వేరు విడదీయడమనేది ఎక్కువ పరిణామకారని వెనక్ చెప్పడమయింది. మొక్కలకి క్రింది భాగాన్ని వేడితో పై గాలికి కొంచెం వేడి కొంచెంగా కలిగిస్తాయి. ఆకు, మొగ్గ లెక్కపై వేరు వచ్చే భాగానికి ఎక్కువ పోషణం దొరకకుండా పోతుంది. అందువల్ల, ఈ గుడారాలలో రోపల వేడిని ఏర్పాటును చేయడం ఉత్తమమైంది. వేరు విడదీయడంలో కాండ భాగాన్ని వృద్ధికన్నా వేగ వృద్ధి ముఖ్యమైంది.

## ముక్కలు నాటే మధ్యాసన్నపులు ( మీడియం - Medium )

ముక్కల్ని నాటడానికి కొన్ని రకాల మధ్య వస్తువులు పెడతారు. ఏదైనా వస్తువైనా, ముక్కలు వీటిల్లోలో వేరు రావడానికి, వాటికి కొన్ని గుణాలుండాలి. వాటికణాల మధ్య వాయువు బాగుగా సోకితట్టు కణాల మధ్యాంతరం (Pot space - చూడండి తోటమట్టి) పెద్దదిగా ఉండాలి. ఇలాగుంటే వాయువు ఏమమండటమే కాకుండా, నీటిని కూడా బాగా లాగుతుంది. వేళ్ళు చిగురించి నిస్సరించడానికి మధ్య వస్తువు చాలినంత సులభంగా నడలించేటట్టు ఉండాలి. త్వరగా ఎండిపోయే వస్తువు ఈ పనికి, అప్రయోజనం ఆవుతుంది. ఈ వస్తువు ద్వారా త్వరగా ఎండి పోకుండా నీటిని వట్టిపెట్టుకొనే జల ప్రవాహానికి జల గ్రహీత (Water holding capacity) ఉండాలి. ఈ వస్తువులలో రోగకారక క్రిములు ఉండరాదు.

అనేక రకాల మొక్కల ముక్కల ద్వారం నుంచి వేరును విడదీయడానికి స్వచ్ఛమైన మొన తేలిన కణాలున్న లాపైన తెల్లని ఇసుక, ఉప్పు రకపు ఇసుకలో సస్యపోషకాలు ఉండకపోవడం చేత, ఒకవేళ ఉన్ననూ చాలా కొద్దిగానే ఉంటుంది. మొక్కల ముక్కల వేరు రాగానే వాటిని సస్యపోషకాలున్న మట్టిలో వర్గాలుగా చేసి పాతిపెట్టాలి.

పాశ్చాత్య దేశాలలో అంటుమొక్కల ముక్కలను పెంచడానికి పీట్ (Peat) అనే వస్తువును ఉపయోగిస్తారు. ఇది పాచి గుంటలలో కుళ్ళి, ఇంధనంగా మారి (కార్బన్ గా మారి) శ్రేష్ఠమై కట్టలులాగ కాలడానికి యోగ్యమైందిగా) నిక్షేపమవుతుంది. దీన్ని 'సప్యంగార' అని అంటారు. దీన్ని పాతి తోట పనికొచ్చే పీట్ (Horticultural peat) అనే పేరుతో అమ్ముతుంటారు. దీన్ని సమమైన ఇసుకతో మిశ్రమం చేసి మొక్కల మధ్య వస్తువు లేదా మీడియంగా ఉపయోగిస్తారు. కాని ఈ వస్తువు మనదేశంలో దొరకదు. మాగిన పాత ఆకులపాడి (old leaf mould) లో పీటిలోని కొన్ని సదృశాలున్నాయి. వీటిని ఇసుకతో కలుపుకొని, మొక్కల మీడియంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. కాని ఈ ఆకు పాడిలో రోగ కారక క్రిములు ఉండొచ్చు కాబట్టి, దీన్ని క్రిమి శుద్ధం (శుభ్రపరచి) తర్వాతనే ఇసుకతో కలిపి ఉపయోగించుకోవడం మంచిది. ఇంకో ఒక మీడియం, వర్మిక్యులైట్ (Vermiculite) ఇది (అభ్రకం) కాకిబంగారం (Mica) తో కూడిన ఖనిజం. ఈ ఖనిజం మన దేశంలో 'తుమ్మకూరు' జిల్లాలో లభ్యమవుతుంది. ఈ ఖనిజాన్ని కాలినప్పుడు ఇది పొరలు, పొరలుగా చీలుతుంది. పిండితే లేదా నొక్కితే పాడవవుతుంది. ఈ వస్తువులో రోగ గుణము ఉండనే ఉండదు. అందుచేత దీని సహాయంతో మొలకెత్తించిన మొక్కలకు గాని, అందులో నానబెట్టిన మొక్కల ముక్కలకుగాని, రోగాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా తక్కువ. ఈ వర్మిక్యులైట్ (Vermiculite) పాడిలో అంటుగట్టాల్సిన మొక్కలకు బాగా వేర్లు మొలకెత్తుతాయి. దీనికి కారణం దీని జలగ్రహణ శక్తి చాలా తక్కువ, అయినా కూడా నీటిని గ్రహిస్తుంది, గాలి బాగా పారుతుంది, (గాలి బాగా వస్తుంది). దీన్ని ఇటీవల కొందరు నర్సరీ వాళ్ళు పొట్లం కట్టి అమ్ముతున్నారు.

ఇవేవీ లేకపోతే, గూడు మట్టిలోనే మొక్కల ముక్కలను నాటాల్సివస్తుంది. వేరు వచ్చిన కొంతకాలానికి నిలబెట్టాల్సిన అంటు మొక్కల ముక్కలకి ఇది సరైనదే. దీనికి కారణం, ఇందులో మొక్కల ముక్కలు (పిలకలు)

పెరగడానికి కావల్సినంత పోషకాలుంటాయి. ఇసుక, వర్మిక్యులైటు మొదలైనవాటిల్లో వేరు రావడంతోనే పిలకలను విభజించాలి. ఎందుకంటే ఇకముందు బాగా పెరగడానికి కావల్సిన పోషకాలు వీటిల్లో ఉండవు. సామాన్యంగా వేరును నిడదీయడానికి, పొందే మీడియం వేయడం అనేది వాటిల్లో ఉంటే సస్య పోషకాల కోసం కాదు. వాటిలో వేరు రావడానికి (పెరగడానికి) ఉండే సౌలభ్యం కోసం వేరు వచ్చేంత వరకు పిలకలలో తేల్చిపెట్టిన పోషకాలే చాలు. మీడియం లేదా మధ్య వస్తువు వేరు వచ్చే (వేరు పెరగే) క్షేత్రం మాత్రమే. ఒక వేళ వేరు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎక్కువ కాలం అక్కడే పెంచాల్సి వస్తే, గోడ మట్టినే ఈ మీడియంగా చేయాల్సిన సందర్భాలలో గోడ మట్టిలో ఉండే రోగకారక క్రిములను నాశనం చేయడానికి ఈ మట్టిని క్రిమి శుద్ధి చేయాలి. (Soil sterilisation) (చూడండి మట్టిలోని క్రిమి శుద్ధీకరణం).

### పిలక ముక్కల (పిలక) పరిష్కరణ లేదా ఉపచారం (Treatment of cuttings)

పిలకల నుండి త్వరగా, చక్కగా వేరు రావడానికి (వేరు పెరగడానికి) కొన్ని పరిష్కార క్రమాలున్నాయి. వీటిల్లో ముఖ్యమైనవి రెండు. 1. యాంత్రిక క్రమం (mechanical) 2. రసాయనిక క్రమం (chemical).


యాంత్రిక పరిష్కరణ క్రమం. ఈ క్రమపు ఉద్దేశ్యం పిలకలు రోపలి నిర్మాణంలో కొన్ని మార్పు చెందేటట్లుగా చేయడం. ఆ క్రమాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

a. పిలకలకు నాటేటప్పుడు వాటిల్లో ఆకులు, దాని జతకి షుమారుగా కండవట్టి బలిపిన కొద్దిగా రోపలి ప్లెక్సు భాగం ఉండే పిలకలనే పాలాలి, పిలకలలో ఆకులుంటే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ద్వారా ఆహారం తయారై, ఈ ఆహారం వేరు వచ్చే (పెరగే) భాగానికి అందవేస్తుంది. లేదా ఆకులలో 'ఆక్సిన్' (auxin) అనే వృద్ధికారక వస్తువులుంటాయి. ఇవి కూడా వేరు పెరగే స్థలానికి పాగి వేరు పెరగడానికి సహాయ పడుతుంది.


అకులకూ - వేరు రావడానికి, ఉండే సంబంధం ఈ క్రింది ఉదాహరణల ద్వారా స్పష్టమవుతుంది.

1. నిమ్మ జాతికి చెందిన (జంజీర ఫలపు) పిలకలలో (ముక్కలలో) ఆకుల మొన అర్థం (సగం) తీసివేస్తే, ఆ పిలకలలో వేరు నిదానంగా వస్తుంది (పెరుగుతుంది).
2. పిలకల ఒక ప్రక్కన మాత్రమే ఆకు నుంచి - ఇతర చోట్ల ఉన్న ఆకులను త్రుంచి వేసి, నాటితే ఆకున్న ప్రక్కనే, వేర్లు చిగురించడం మొదలు పెడతాయి.
3. గుండ్రంగా ఉండే ఆకులనే మిగిల్చిన పిలకలలో అయితే ఆకు విస్తరణ ఉండేటట్లు ఆకులను కత్తిరించిన ముక్కలకన్నా ఎక్కువ వేరు పెరుగుతుంది.
4. ఆకులున్న ముక్కలను చీకట్లో పెంచితే, వేరు బాగా పెరగదు. దీనికి కారణం ఆకులున్నమా సూర్యరశ్మి పడకుండా కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరగకుండా, ఆహారం తయారవ్వదు. వేరు పెరగడానికి కావల్సిన ఆహారం ఉండదు.

b. కొన్ని మొలకలలో వేరు రావడం మొలకల క్రింద కత్తిరించిన (bottom cut) రీతిని అనుసరించి యుంటుంది.



2.48a



2.48b

2.49

94A

కొన్ని చెట్లలో మొక్కల క్రింద మొగ్గ ఉండేటట్టు అంటుగడితే వేరు బాగా పెరుగుతుంది. మరి కొన్నిచెట్లలో కణుపుల మధ్య భాగాన్ని (కణుపు మధ్య Internode) ఉండేటట్టు అంటు గట్టడం మంచిది. ఇంకా కొన్ని చెట్లలో (మొక్కలలో) కణుపు క్రింద అంటుగట్టడం మేలు. దీన్ని అనుభవం ద్వారా, వరిశల ద్వారా తెలుసుకొని ప్రజాతికి ఏ రకం మేలు అనేది నిర్ధారించుకోవాలి. (2.48 a చిత్రం).

2.48 a వివిధ రకాల మొక్కలు (పీలకలు) a. సామాన్యమైన మొక్క, b. అడుగున క్రింది భాగముండే మొక్క (ఇందులో కొంచెం లోవలీ చెట్టు అంటుకొని ఉంటుంది). c. అడుగున క్రింది భాగం ఉండేటట్టు మొక్కలు కత్తిరించే రీతి.

c. కొన్ని మొక్కల క్రింది భాగాన్ని గాయపరచడం ద్వారా వేరు ఎక్కువ మొలకెత్తుతుంది. రెమ్మల చిప్ప బలవడం, లోవలీ చెట్టును మొక్కలు మొక్కలు చేయడం. చిప్పను ఒకటి రెండు వోళ్ళ వీల్చడం ఇవే కొన్ని రకాల గాయపరచే రీతులు. మామిడి, సపోటా, మొదలైన వాటి మొక్కలకు సులభంగా వేరురారు. దీనికోసం వీటి మొక్కల క్రింద భాగాన్ని ఒక వలచని వట్టెను చిప్ప చుట్టూ చుడతారు. సింకోన మొక్కకి కూడా ఇలాగే చేస్తారు.

రసాయనిక పరిష్కార క్రమం :

అనేక రకాల మొక్కలు శర (alkaline) లేదా తటస్థ (neutral) మీడియంకన్నా కొద్దిగా పులుపున్న మీడియంలోనే (acidic medium) బాగా వేర్లు మొలకెత్తుతాయి. అందుచేత ప్రాచీనకాలపు తోటమాలలు (పాశ్చాత్య దేశస్థులు) మొక్కను నాటి మీడియమునకు వినిగర్ (Vinegar) ద్రాశరసం, సపోట మధ్యం వీటి నుంచి తీసిన పుల్ల రసాన్ని కలిపిన వీటిని వేస్తుండేవారు. ఇటీవల కాలంలో నీటిని పులుపు చేయడానికి గ్లేసియర్ ఆసెటిక్ ఆసిడ్ (Glacial acetic acid)ను (4½ లీటరుకు 10 బొట్లు) వేసి మొక్కపాతే మీడియంలో పోస్తారు.

మరికొందరు సుమారు 2 కిరోసెన్ టీన్ నీటికి ఒక టెన్సు పొటాషియం పర్మాంగనేట్ (Potassium permanganate) రాళ్ళ మొక్కల్ని వేసి మొక్కల క్రింది భాగాలను ఈ నీటిలో 12 గంటల కాలం అద్దుతారు. లేదా మొక్కలు ఊరే (నావే) ఇసుకకు ఒక గ్యాలన్ (4½ లీటర్లు) నీటిలో ఒక టెన్సు ఇదే వస్తువును కలిపి అంటిస్తారు. దీని నుంచి వేరు పెరగడానికి వీలవుతుంది.

ఇటీవల వేరు వచ్చేటట్టు చేయడానికి అనేక రకాల వేరు వృద్ధికారక (Root forming substances) వస్తువులను కనిపెట్టినారు. వీటిలో కొన్ని : ఇండోల్ బుటిరిక్ ఆసిడ్ (Indole Butyric Acid (IBA)), ఇండోల్ ఆసెటిక్ ఆసిడ్ (3 - Indolacetic Acid beta indolacetic acid (IAA)), ఫెనిల్ ప్రాసియోనిక్ ఆసిడ్ (Phenyl Acetic Acid) నెఫ్థల్ ఆసెటిక్ ఆసిడ్ (Naphthalene Acetic Acid (NAA)) నాప్తలీన్ ఆసెటిక్ ఆసిడ్ ఇవి కాకుండా వేరు పెరగడానికి (మొలకెత్తడానికి) మొదటి రెండు వస్తువులు (పదార్థాలు) ఎక్కువ పరిణామకారిగా ఉన్నట్టు తెలియవస్తోంది (స్పష్టమవుతోంది). ఈ రకపు వేరు వృద్ధికారక వస్తువులు కలిగిన ఎన్నో రసాయనిక పదార్థాలు (రసాయనికాలు) వివిధ కంపెనీ పేర్లతో అమ్మకానికి వచ్చాయి (వస్తున్నాయి). ఉదా : సెరెడిక్స్ (Seradix), హార్మోమాన్ (Hortmone), రూటోన్ (Rootone) ఇలాగివి. ఇవి కొన్ని ద్రవరూపంలోనూ కొన్ని



పాడి రూపంలోనూ ఉంటాయి. ద్రవరూపంలో ఉండే కొన్ని బొట్ల ద్రవాన్ని సరైన ప్రమాణపు నీటిలో వేయాలి. బాగా కలపాలి. ఈ ద్రవాన్ని పీల్చికోనేటట్లు ముక్కలను కొంత కాలం అందులో అద్ది ఆ తర్వాత నాటాలి. పాడిగా ఉంటే ముక్క, క్రింది భాగాన్ని తడిచేసి పాడిలో అద్ది ఎక్కువ పాడిని వేసిన తర్వాత పాతాలి. పాడిలో శక్తి 8-10 నెలల వరకు, కంపెనీ వారిద్వైతే ఆ కంపెనీ హ్యాండ్లలో లేదా సీసాలలో ఏ యేజాతి ముక్కలను ఏయే విధంగా పరిష్కరించుకోవాలనే విషయాలను తెలిపే పత్రాలుంటాయి. ఈ సూచనలను తు.చ. తప్పకుండా అనుసరిస్తే, ముక్కలలో వేరు రావడం ఎక్కువ జయప్రదంగా జరుగుతుంది. కాని ఈ వృద్ధికారక విషయాలలో ఒక హెచ్చరిక. ఇవి ముక్కనుంచి వేరు వచ్చే జాతులలో ముక్క త్వరగా ఎక్కువగా వేరు పెరగడానికి సహాయ పడుతాయే తప్ప, వేరురాని (మొలకెత్తని) జాతుల నుంచి వేరు వచ్చేటట్లు చేయడానికి ఉపయోగపడవు. లేదా ఈ వృద్ధికారకాలు వేసినంతమాత్రాన ముక్కలకు బాగా వేరురాదు. దానికి తోడు ఇతర అనుకూల పరిస్థితులను కల్పించకపోతే వాటిని 50% బలపు మధ్య రసంలో కరిగించి పెట్టుకోవాలి. ముక్కలను క్షణ కాలం ఇందులో అద్ది పాతడం పరిణామకారి అని అంటారు కానీ ఎక్కువ లాభముండదు.


**ముక్కలను నాటుట :**

ముక్కల నుంచి సస్యోత్పాదనను జయప్రదంగా చేసుకోవడానికి వాటిని పెంచే విధానం, పరిష్కారాలు, వీటిని నాటే మీడియం ఎంత ముఖ్యమోవాటిని నాటే క్రియ కూడా అంత ముఖ్యమైంది. వాటిని సరిగ్గా నాటకపోయినట్లైతే ఇతర జాగ్రత్తలన్నీ వ్యర్థమవుతాయి.


రెమ్మ మొదలైన వాటిని ముక్క చేసేటప్పుడు వాటికి గాయమవుతుండా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. ఈ గాయం మన శరీరంపై అయ్యేటటువంటివే. మనలో రక్తం గడ్డకట్టి గాయాన్ని మూసే లోపలి నుంచి గాయానికి అట్ట కట్టినట్టుగానే ఈ ముక్క కోసిన భాగపు మట్టా లేదా గాయం మీద సవ్యరసం బెండులాగ, పెచ్చుగట్టుతుంది. ఈ పెచ్చును జడ్డు లేదా క్యాలస్ (Callus) అంటారు. (2.48 b) వాలినంత వేడిమి, తేమ ఉంటే ఈ క్యాలస్ లో వేళ్లు చిగురుస్తాయి. కొన్ని సమయాల్లో కొన్ని ముక్కలలో ఈ క్యాలస్ ను విపరీతంగా పెరిగి వేరు చిగురించడానికి కావాల్సిన అవారాన్ని ఈ క్యాలస్ లే గ్రహిస్తాయి. అటువంటి ముక్కలలో సులభంగా వేరు చిగురించదు. సామాన్యంగా పాతెడి మట్టి లేదా మీడియం వేడిమి ఎక్కువైతే లేదా మీడియం కణాలు మొరటుగా ఉంటే ఎక్కువగా గాలి వీచి ఉచిధంగా అవుతుంటుంది. ఇదే విధంగా అందులో అధిక క్యాలస్ ను బ్లెడుతో క్రిందనుంచి కోసి మధ్య నాటాలి.

2.48, b ముక్క కత్తిరింపు సైన జడ్డు (Callus) పెరుగుట వలన గాయాన్ని మూసుస్తుంది. అనంతరం వేళ్లు చిగురుస్తాయి.

ముక్కియినా వరే దాన్ని నాటేటప్పుడు ముక్క క్రింది భాగపు మట్టి కణాలలో దగ్గర సంవర్తాన్ని పొందేటట్టుగా చూసుకోవాలి. క్రింది భాగాన దుల్ల ఉండరాదు. ఈ విధంగా గుల్ల (బోలు) ఉంటే మట్టితో జల సంవర్తం లేకుండా గాలి వీచి ముక్క క్రింది భాగం ఎండిపోతుంది. అందుచేత పాతిన అన్ని భాగాలకు



2.50



2.51

మట్టి అంటుకునేటట్లు ఒక మొండి కర్రతో కలిపి నాటి చుట్టూ గుత్తుగా (గోపురంగా / గుంపుగా) మట్టిని ముక్కవైపు జరపాలి (త్రోయాలి). కొందరు మొనదేలిన గులికల ముక్కలను చేర్చి దానిపైన ఎండుమట్టిని పోస్తారు. వీటి కణాలు బాగా జారి బోళ్లు (గుల్ల) లేకుండా ఉండేటట్లు గుంట మూస్తారు. సామాన్యంగా ముక్కలను 1 - 1½ అంగుళం (2½ - 4 సెం.మీ) లోతుకు నాటుతారు. గులాబీ మొదలైన కర్రలను ముక్క అర్థానికి (నగం భాగం) పాతుతారు. కొందరు నర్సరీవాళ్లు ( సస్పోల్టాదకులు) ముక్క యొక్క 2/3వ భాగాన్ని లోతుకి పాతుతారు. గట్టి లాటి చెట్లు ముక్కలను (Hard wood cuttings) సామాన్యంగా లోతుకి నాలుగు - ఐదు అంగుళాల (10-12 సె.మీ.) లోతుకి పాతడం సరైనది. ముక్కలను కుండీలలో నాటివప్పుడు అంచులో నాటితే కడ్డీలు త్వరగా బాగా ఏపుగా వేరు చిగురిస్తుందని అనుభవజ్ఞుల అభిప్రాయం (2-49) కారణమేమిటంటే అంచులో వాయువు కుండీ ద్వారా వచ్చి కుండీలలో ముక్కలు బాగా శ్వాసించడానికి వీలుపడుతుంది. ఈ కాడ వేరు చిగురించడానికి అనుకూల మయ్యేట్టుగా వుంటుంది. వేరు పెరగడానికి సహాయ పడుతుంది.


2.49. ముక్కలను కుండీ చుట్టూ పాతడం మంచిది. కుండీ క్రింద భాగానికి నీళ్లు పోయేటట్లు చేయడమే కాకుండా కుండలో చిల్లి ద్వారా చాలినంత గాలి, వేడిమి లభిస్తుంది. రూలుకర్రలాగా గుండ్రంగా ఉండే ఒక మొనదేలిన శూలం (గునవం)తో (f) ముక్కని నానడానికి గుంటలను చేయాలి. (g) గుంట క్రింద కొంచెం ఇసుకనువేయాలి. (c) అనంతరం కుండీని గుంటలో పెట్టి గునపాన్ని ప్రక్కన గుచ్చి మట్టిని కుండీవైపు త్రోయాలి. (a) కుండీ క్రింద భాగంలో వేసే చాకి ముక్కలు (b) అకుల పారలు. (d) మట్టి మిశ్రమం. మట్టి మన్ను (మన్ను మట్టి).

పండ్ల చెట్లు వీటి ముక్కలను వేసేవి కాలపు అంత్య భాగంలో నాటాలి. ఈ ముక్కలు సుమారు ముక్కాలు - అడుగు (22-30 సెం.మీ.) పొడుగు ఉండటం మంచిది. క్రింద భాగంలో కొంచెం పాత కాండం (వెనుకటి సంవత్సరపు కాండం) ఉండేటట్టుగా కడ్డీలను ముక్కలను చేసినప్పుడు ఈ కడ్డీలు శ్వరగా యిగురిస్తాయి.


వీటిని ముక్క, మొక్క, వెనుకటి (పాదమూలం) భాగం అంటారు. లోవల బెండుండే చెట్లలో అంత్య పాదమూలం (heel) ఉండే ఉంటుంది. ఈ రకపు ముక్కల్ని, పాదమూల ముక్కని అంటారు.

మారు, వేల కట్టల ముక్కలను నాటే నర్సరీ వాళ్లు సన్నని కర్రతోగాని గునవంతోగాని లేదా గడ్డపారతో గాని చిన్నదైన కాలువ (కందకం - Trench) త్రవ్వాలి. కందకానికి ముందే, ముక్కల్ని తీయడానికి సులభంగా ఉండేటట్టుగా కొద్దిగా ఇసుకను చల్లి, మూడు నాలుగు అంగుళాలు (8-10 సెం.మీ.) దూరదూరానికి ముక్కలను కందకంలో దూర్చి, తోడిన మట్టిని కందకానికి (గుంటకి) లాగి కాలిలో తొక్కుతారు. (చిత్రం 2.50, 2.51) ఈ ముక్కల్ని 1-2 సంవత్సరాలు అలాగే పెరగడానికి వదిలివేస్తారు.

2.50 ఒక కందకాన్ని త్రవ్వి ఇసుకని పోసి దానిపైన ముక్కలను నాటి (గుచ్చి) కాలిలో త్రవ్విన మట్టిని ముక్కల వైపు జరిపి, కాలిలో అదమాలి.



अ. ५२



अ. ५३

2.51. కందకంలో ముక్కల్ని పాతెడి మరొక క్రమం. ఎండ ఎక్కువగా ఉండేట ముక్కలను నాటిన తర్వాత కొంత నీడ ఉండేటట్లు ఏర్పాటు చేయడం మంచిది.


ముక్కలను నిలుపునా నాబాలా ! లేదా ఏటవాలుగా నాబాలా ! మొరడు ! మొండి ముక్కలను, మృదువాటి ముక్కలను నిలుపునా, గట్టి వాటిని, పాడైన ముక్కలను ఏటవాలుగాను నాబాలి. బ్యాపియోక (Tapioca) చెఱకు, కంచె వేసి చెట్లు, నీటి ముక్కలను వాలుగా నాబాలి. చాలా సున్నితమైన కోమలమైన ముక్కలను కుండీలలో నిచ్చిన మట్టు నీటి దానిపైన గాజు పాత్రని బోర్లించడం మంచిది. కుండీకి నీరు వేసేటప్పుడు నీటిని మధ్యకు త్రోస్తే ముక్కలు జరగవు (కదలవు). ముక్కలను ఎప్పుడు నాబాలి, అనే విషయాన్ని వెనుకనే ఆక్కడికక్కడే చెప్పడమైంది. సామాన్యంగా తల్లిమొక్క, యొక్క, సుప్తావస్థ మొక్క చివరి భాగంలో కొత్త చిగురు చిగురించడానికి కొంచెం ముందు ముక్కలను కత్తిరించి, నాటడం మంచిది. చలికాలంలోనే బాగా పెరిగిడి చెట్లైతే చలికాలపు ప్రారంభంలోనే ముక్కలని నాబాలి. మన దేశపు మొక్కలను ముంగారు వర్షానికి కొంచెం ముందుగానే ముక్కలను చేసి, నాబాలి (నానబెట్టి నాబాలి).

త్వరగా పెరిగిడి మొక్కల ముక్కలు త్వరగానే వేరును చిగురించేస్తాయి. నిదానంగా పెరిగిడి గట్టి తాటి చెట్ల ముక్కలలో వేరు చిగురించడం నిదానం. కొన్ని సమయాలలో ముక్కలు త్వరగానే వేరును తొడుగుతాయి. (వేరు చిగురిస్తుంది). ఈ పెరుగుదలను చూసి ముక్కలో వేరు చిగురించేసిందని భ్రమించరాదు. ఈ విధంగా పెరిగిన ముక్కలలో వేళ్ళ వృద్ధి, ఏకాసానికి వెళ్ళవలసిన పోషకాలు చిగురుపైపు సాగి (వెళ్ళి), వేరురావడానికి యోగ్యమైందిగానుండదు.

పండు పుష్పాల చెట్లలో ముక్క నాటడానికి (ముక్క చేయడానికి)పై రెమ్మలను ఏర్కవడం యుక్తమైంది. ఇటువంటి ముక్కల ద్వారా ఉత్పత్తయిన చెట్లు (మొక్కలు) ఎక్కువ ఫలాన్ని లేదా పువ్వులను ఇవ్వటమే కాకుండా, వాటిని కొంచెం ముందుగానే ఇస్తాయి. ఉదా : మిరియాలు.

నాశనమైన, బీడైపోయిన, వేరు రానటువంటి, వేరు చిగురించని, ముక్కలనుంచి (ద్వారా) వేరును చిగురించేటట్టు చేయడానికి కొన్ని ఉపాయాలు (మార్గాలున్నాయి). ముక్కలను పాతిన కుండీపైన ప్లాస్టిక్ షీటులను కప్పడం గాజుతో చేసిన ఘంటా పాత్రని బోర్లించాల్సిన వద్దలి ఇంతకు ముందే తెలపడమైంది. మరొక క్రమం సుమారు ఎత్తుగా ఉన్న కుండీకి అద్దం (సగభాగం) ఇసుక - మట్టిని నింపాలి. ఇందులో మరొక సన్నని (చిన్న) కుండీని పెట్టాలి. ఈ సన్న కుండీలలో ముక్కలను పాతాలి. పాతేటప్పుడు కడ్డీలు పెద్ద కుండీ ఎత్తుకన్నా తక్కువ కాకుండా ఉండేటట్లు నాబాలి. నాటిన తర్వాత పెద్ద కుండీ నోటిపై (పైభాగం) ఒక గాజు పలకను మూయాలి. ఆ విధంగా చేస్తే, కుండీలోపలి వేడిమి, తేమ త్వరగా ఆరిపోయి గాలి ఎక్కువగా తగలదు. (చిత్రం 2.52).


2.52 ఇది ఇంకొక రకపు గుడారం b. పెద్ద కుండీ, దీనిలో సగం వరకు ఇసుక నింపబడింది. దీనిపైన ముక్కలను నానపెట్టిన a. సన్న (చిన్న)ని కుండీ కూర్చోపెట్టబడింది. c. పెద్ద కుండీపైన గాజు పలకతో మూయబడింది.



2.54



2.55



A



C



D

2.56 A-D

మరొక క్రమం ఒక పెద్ద కుండీ క్రింద భాగాన ఇటుక ముక్కను పెట్టి, దానిపైన ఒక చిన్న (సన్నని) కుండీని కూర్చోపెట్టి ఈ కుండీ అంచు పెద్ద కుండీ అంచు సమమట్టులో ఉండేటట్లు పెట్టాలి. ఈ రెండు కుండీల మధ్య ఎండిన ఇసుకనో, మట్టిలో నింపి, ఆ తర్వాత లోపలి కుండను మంచి మట్టితో నింపి కడ్డీలను (ముక్కలు) నాటి, మరొక కుండీని దాని అంచు రెండు కుండీల మధ్య దూరేటట్లుగా బోర్లించడానికి (చిత్రం 2.53) ముందు దీని క్రింద భాగాన్ని, బాగా కొట్టండి, కొట్టిన క్రింది భాగాన్ని వదులుగా గాజుతో మూసి, అవసరాన్ని అనుసరించి, రెండు కుండీలకూ నీటిని చల్లి, (కొంచెం గోరువెచ్చని నీటిని వేయడం మంచిది). వేడిని కలుగజేయడానికి గాజు మూతను త్రిప్పిమూయండి.

2.53 ఇక్కడ బయటి (వెలుపలి) కుండీ మొక్క క్రింది భాగాన ఒక ఇటుకను పెట్టి దానిపైన ముక్కలను పాతిన కుండీని పెట్టాలి. బయటి కుండీకి నీటిని చల్లి, వేరొక పెద్ద కుండీని క్రింది భాగాన కోసి (విరగగొట్టి) బోర్లించాలి. c. రాయి, ఇసుక, b. నీళ్లు లేదా తడి చేసిన మట్టి, a. ముక్క నాటిన కుండీ, d. క్రింద చీల్చిన పెద్ద కుండీ, e. గాజు.

క్యాక్టస్, సకులెంటు ముక్కలను నేరుగా తేమ మీడియంలో నాటితే, అవి కుళ్ళిపోవడానికి అవకాశముంది, అందువేత దీన్ని ఎండిన ఇసుకలో కొంతకాలం నాటాలి. అవి కొంచెం ముదురువడతాయి. ఆ తర్వాత వీటిని సరైన మీడియంలో నాటి, జాగ్రత్తతో నీళ్ళు పోస్తుండాలి. ఈ విధంగా ముడతవడిన ముక్కలు బాగా వేరురుతాయి (వేరొస్తాయి). ఈ ముక్కలలో కొన్ని చాలా సన్నగా ఉంటాయి, వీటిని నిలబెట్టడానికి సన్నని కడ్డీలను (కర్రలను) నాటి, ఆధారమివ్వాలి (చిత్రం 2.54).


2.54 క్యాక్టస్ మొదలైన మొక్కల ముక్కలు లోతునకు పాతరాదు. ఆ విధంగా చేస్తే తేమ ఎక్కువ అవుతుంది.

వేరు వచ్చేటట్లు చేయడానికి ఇంకా కొన్ని సులభ ఉపాయములను చిత్రం 2.55, 2.56లలో వివరించబడింది.


2.55 ముక్కలకు కావల్సిన తేమ దొరికేటట్లు పెద్ద కుండీ మధ్య చిన్న (సన్నని) కుండీని జోడించడం ఈ కుండీ మొనదేలిన ముక్కల్ని ఫ్లాస్టర్ లేదా పార్మిల్స్ తో మూస్తే అప్పుడు ఇందులో నీళ్ళు నిలుస్తాయి. రెండు కుండీల మధ్య మిశ్రమాన్ని నింపి కడ్డీలను నాటాలి. ఈ మిశ్రమానికి ఎల్లప్పుడూ చాలినంత తేమ కూడా నీటి ద్వారా లభిస్తుంది.

2.56 కుండీలనుంచి వేరును విడదీయడానికి ఒక సులభ ఉపాయం. a. ఒక ఫ్లాస్టిక్ షీటును (ఆ ఆకారపుదే) పేసి (కప్ప) దానిలోని ఒక సగము భాగముపై సరైన మట్టి మిశ్రమాన్ని లేదా మాస్ (moss) నివరచాలి. ముక్కల్ని సరిగ్గా కత్తిరించి క్రిందిభాగాన్ని హార్మోన్ పాడిలో అద్ది (Root hormone) మిశ్రమంపైన ఒక చివరలో పెట్టాలి. b. శూన్యమైన అర్థ షీట్ ని మడిచి మిశ్రమంపైన మూయాలి. c. ఒక వైపు నుండి ఈ షీటును చావ చుట్టేటట్లుగా చుట్టాలి. d. చుట్టిన షీటుకు విప్పుకునేటట్లు దారం కట్టి ఎక్కువ ఎండ వడని వేడి గాలి, తేమ ఉండే స్థలంలో పెట్టాలి. కొన్ని వారాలనంతరం వేళ్ళు మొలకెత్తుతాయి. పదే పదే నీళ్ళు వెయ్యాలన్న అవసరం లేదు. మిశ్రమంలో





257



258

ముక్కల్ని జోడించేటప్పుడు చాలినంత తేమ ఉంటే ఆ తర్వాత ఆ మట్టను విప్పేరు వచ్చిన మొక్కల్ని (ముక్కల్ని) పాతాలి.

### వేరును ముక్కలుగా కత్తిరించడం (Root cuttings)

నిత్య ఫ్లాక్స్ (perennial phlox), హాలిహాక్ (Hollyhock), గైలార్డియ (Gaillardia), అంచూస (Anchusa), పాపి, జిప్సోఫిల (Gypsophila), సాల్వియ (Salvia) మొదలైన మొక్కల్ని వేరు ముక్కల నుంచి అభివృద్ధిపరచుకోవచ్చును. ఈ ముక్కలను విభజించడానికి ఈ మొక్కలు సుప్రావర్షల్లో ఉన్నప్పుడే (పెరుగుదల నిలిచినప్పుడే) వాటిని మట్టి నుంచి తీసి (ఎత్తి) పెద్ద కండతో కూడిన వేళ్ళను ఏరుకొని 2-3 అంగుళాల (5-8 సెం.మీ.) పొడవైన ముక్కలను చేసుకోవాలి. వీటిని (డ్రాంగ్స్ చిత్రం 2.57) అని వ్యవహరిస్తారు. సాధ్యమైనంత వరకు మొక్క పైభాగపు వైపున ఉండేడి వేళ్ళనే ఏరుకోవాలి. ఇటువైపున్న భాగాన్ని అడ్డంగానూ, దూరంగా ఉన్న భాగాన్ని ఏటవాలుగానూ కత్తిరించాలి. ఈ విధంగా చేస్తే ముక్క క్రిందిభాగమేది, చివరిభాగమేదనే విషయం గుర్తించవచ్చు.

2.57 కొన్ని మొక్కలలో వేళ్ళ నుంచియూ ముక్కలను చేయవచ్చును. L. ఎడమవైపు వేరు ముక్క కత్తిరించవలసిన భాగం చూపడమైనది. R. ముక్కపై భాగాన్ని అడ్డంగానూ, క్రింది భాగాన్ని ఏటవాలుగా కత్తిరించినదానిలో ఏ భాగాన్ని పాతాలి, అనే విషయాన్ని సులభంగా గుర్తించవచ్చును.

ఈ వేరు ముక్కలను పాతేటప్పుడు అడ్డంగా అంటు ఉండే పై భాగం నేల సమానంగా ఉండేటట్టుగా పాతాలి. ముక్కలను నాటిన తర్వాత నాటిన కుండలను బూడిదలో (పాశ్చాత్య దేశాలలో వీటిలో పాతుతారు) పాతాలి. ఈ విధంగా చేస్తే, తేమ, వేడిమి ఆరదు.

నిత్య ఫ్లాక్సు మొదలైన వాటి వేరు ముక్కలను ఎలాగైనా నాటవచ్చును. అడ్డంగానూ పాతుతారు. చిలకడ దుంప కూడా వేరు ఆహారాలతో నిండికొని ఉన్న వేరు కావున ఇది కూడా కొత్త మొక్కలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని కోసం చిలకడదుంపనంతటినీ ఎక్కువ వేడిమి ఉండే తడిమట్టి మిశ్రమంలో నాటుతారు (పాతుతారు). (2.58 చిత్రం).

2.58 తీపి చిలకడదుంప ముక్క X. కండతో నిండిన వేరు. Z దీని నుంచి వచ్చేప్పుడు (Slip) కత్తిరించి పాతతగిన భాగం (నాట తగిన భాగం) Y. వేళ్ళు ఉబ్బుతున్నాయి. దీని నుంచి కొత్త కండనిండిన వేరు ఉత్పత్తి అవుతోంది. స్లీప్ నుంచి A వైపు వేళ్ళు చిగురుస్తున్నాయి.

పై భాగం నుంచి సన్నని కాండాలను (Shoots) మట్టిని త్రోసుకొని బయటకీ (వెలుపలికీ) వస్తాయి. ఈ కాండపు క్రింద భాగాలనుంచి వేళ్ళు బయలుదేరుతాయి. ఈ పిలక మొక్కలను వేరుచేసి, వేరేవోట నాటాలి.

కాండపు ముక్కలలో ఉండేటట్టుగా, వేరు ముక్కలకి పిలకలుగాని, మొగ్గలుగాని ఉండవు. సామాన్యంగా వేరు ముక్కల నుంచి పెంచిన మొక్కలు తల్లి మొక్కలాగే ఉన్ననూ, తల్లి మొక్క ఆకు మొదలైన వాటివల్లే

ఉండతగిన వివిధ వర్ణ సంకలనం (Variegation) వీటిల్లో కనిపించవు.

అన్ని మొక్కల నుండియూ వేరు మొక్కలను వేసి సస్యోత్పాదన చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు. వేరు మొక్కలను చేయడానికి చేయడానికి యోగ్యమైన కొన్ని సస్యాలు ఇవి - వర్బిస్కమ్ (Verbascum - అడవి పాగాకు జాతికి చెందింది). అనియోన్ జపానికా (Anemone japonica) అకిలియ (Achillea) కంపాన్యుల (Companula Pyramidalis - కంపానుల). యూఫోర్బియ కొరొలాటా (Euphorbia Corollata) హీలియాంతస్ (Helianthus caberrinus) పూసనియ (Paeonia - పూసనియ) పాలిగోనియం (Polygonium) కొండమల్లి (తెల్లని బీజ కణాలు లేదా నీటి కణాలు) సపానేరియ (Saponaria) ఆరేలియ (Aralia) క్లెరోడెండ్రస్ (Clerodendron - విషమదారి జాతి) హైపెరికం (Hypericum - చిన్న దామర) లాగర్ స్ట్రోమియ (Lagerstroemia - రేకమందార లేదా చిల్ల జాతికి చెందింది) రూబస్ (Rubus - గోము) రాజబరి (రసపురి) స్టాఫిలెయ (Staphylea) క్సాంతోసేరియస్ (Xanthocereus) హార్స్ రౌడీన్ (ఎర్రముల్లంగి) పీచు సపోట, మర సపోట, ప్లంబాగో (నీలి చిత్రమూలం Plumbago) క్లైవియ (Clivia) పెలర్గోనియం (Pelargonium - జరేనియంజాతి) లెమన్ వండు గజనిమ్మ (Lemon) ఇపికాకుయాన (Ipecacuanha) చింత మొదలైనవి.


కొండపు మొక్కలను (Stem Cuttings) కోయడం

వీటిల్లో కొన్ని విధాలు 1. చీలికలు పెరిగినప్పుడు గట్టి తాట మొక్కలు (Hardwood cuttings) 2. కొంచెం మృదువుగా ఉండే గట్టి తాట మొక్కలు - అర్థం గట్టి తాట మొక్కలు (Semi hard wood cuttings) 3. మృదు తాట మొక్కలు (Soft wood cuttings) 4. ఆకు మొగ్గ మొక్కలు (Leaf bud cuttings) 5. కండ (పీలకల) లేదా మొగ్గ (Bud or eye) 6. పైపింగులు (Pipings).

గట్టి తాట మొక్కలు (కత్తిరింపు) వీటిని పొదలలోనూ, చెట్ల ఉత్పాదనలలోనూ పెంచుతారు. ఆ సంవత్సరపు పెరుగుదల ముగిసిన తర్వాత బలిపిన రెమ్మ నుంచి ఈ మొక్కలను కత్తిరించాలి. కడ్డీకి సుమారు ఒక సంవత్సరం వయస్సు ఉంటే చాలా మంచిది. సామాన్యంగా 3 మీ.మీ. కన్నా లావు 12 మీ.మీ. (సుమారు అర్థ అంగుళం) కన్నా తేలికైన కడ్డీలను 12 నుంచి 18 సెం.మీ. (5 నుంచి 7 అంగుళాలు) పొడవైన మొక్కలుగా కత్తిరించుకోవచ్చు. ఎక్కువగా లావుగా వున్న కడ్డీల (కొమ్మల) ద్వారా ఎక్కువ వేరు పెరుగుతుంది. దీనికి కారణం వాటిల్లో తేలికైన కొమ్మలకన్నా ఎక్కువ ఆహారముంటుంది. అది కాకుండా తేలికైన కొమ్మలలో ఎక్కువ మొగ్గలుంటే పెరగడానికి తగినంత ఆహారం (దొరకకుండా) లభ్యమవునకుండా అడ్డుపడుతాయి.

అన్ని చెట్ల నుంచీయూ కొండపు మొక్కలు నాటడానికి వీలుకాదు. పీచు మొదలైన వాటిని మొక్కలు కత్తిరింపు ద్వారా పెంచడం చాలాకష్టం కాని హానినకల్ మొదలైన వాటి ద్వారా త్వరగా వేరును చిగురింపవేయ వచ్చు.


గట్టి తాని నుంచి పెరిగిన మొక్కలు ఎక్కువ ఆకులు రావడానికి ముందే వాటి స్థలంలో (చోట్లలో) పాతాలి. ఆకు ఎక్కువగా వుంటే నాటిన తర్వాత అవి ఎండిపోవచ్చు.




2.59



2.60



2.61A



2.61B

## సగం / అర్థం గట్టిగా ఉండే తాట ముక్కలు (Semi hardwood cuttings)

వీటిని అర్థం (సగం) బలిసిన రెమ్మల నుంచి కత్తరిస్తారు. ఎక్కువగా పెరగడానికి ముందుగానే ఈ ముక్కలను విభజించుకోవాలి. ఈ రెమ్మలు జాతి, సాలీనా పెరిగిన రెమ్మలై యుండాలి. వెనుకటి (గత) సంవత్సరమైనవిగా ఉండరాదు. విరిచేటప్పుడు కోరుకోసులు లేకుండా విరగకొట్టడానికి వీలైన పీలక మొక్కలనే ఏరుకోవాలి. ఈ రకపు ముక్కలు కోమలంగా ఉండటం చేత వీటిని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి (ఎండిపోకుండా చూసుకోవాలి). ఆకులు ఎక్కువగా వుంటే వాడుతాయి (ఎండిపోతాయి). ప్రొద్దున (వగటిపూట కత్తిరించి) నాటి వరకు తడిబట్టలలో ముట్టేస్తారు. అప్పుడవి ఎండిపోవు. ఈ ముక్కలలో వేరు రావడానికి గాలి, తేమ ఎక్కువగా చల్లదనమైన స్థలాలలో పొతి మధ్యాహ్నపు వేడి తగలకుండా నీడను అందజేయాలి. క్రింది భాగంలో కాండం వుంటే వేరు చిగురిస్తుంది. తేమ వాతావరణం ఉండేట్టు అప్పుడప్పుడు మొక్కలపైన నీటిని చిలకరించాలి.

## మృదు తాట (మెత్తని తాట) ముక్కలు (కొమ్మలు కత్తిరింపు) (Soft wood or green wood cuttings)


జరుగుతున్న సంవత్సరపు లేత మొక్కల పెరుగుదల నుంచి ఈ రకపు మొక్కలను విభజిస్తారు. ఈ మొక్కలకి పైన వివరించిన మొక్కలకి ఉన్న ఒక విభేదాన్ని (వ్యత్యాసాన్ని) మరచరాదు. ఈ మృదు తాట మొక్కల ఆకులు పెరిగేడి చిగురు కలిగి ఉంటాయి. వీటి ద్వారా నీరు బాష్పీకరణమవుతుంది. (అవిరి రూపంలో బయటవెళ్తుంది) (Transpiration). బాష్పీకరణమైన వెంటనే మళ్ళీ బాష్పీకరణమవుతూనే ఉంటుంది. ఈ జల సన్నాన్ని తక్కువ చేయడానికి ఈ మొక్కల ఆకులను  $1/3 - 1/2$  అంత కత్తిరించి తీసేయడం మంచిది. అటువంటి చిగురించిన మొక్కలు పట్టుకోవడానికి, నాటడానికి సులభం. క్రిందిభాగపు ఆకులను పూర్తిగానూ, పై ఆకులను అర్థం (సగం వరకు) భాగం మాత్రమే కత్తిరించడం వాడుక (2.59 - 2.61 A) జేరేనియం, దిగోనియ, డేలియా మొదలైన వాటిని ఈ విధంగానే కత్తరించాలి.

2.59 మృదు తాట మొక్క జేరేనియా మొక్క a. వేరు వచ్చే (చిగురించే) కణుపు b. కాండం వచ్చే కణుపు c. క్రింది ఆకులను గిట్టేసినది (తీసేసినది).


2.60 జెగోనియా మృదు తాట మొక్క పైన పెంకు భాగాన్ని కత్తిరించాలనేది చుక్కలు గీతల ద్వారా సూచించబడింది. క్రింద సిద్ధం చేసిన మొక్క.

2.61 A. డేలియా మృదు తాట మొక్క.



ఈ మొక్కలలో క్రింది అంటును ఏటవాలుగా వేయాలి. ఈ విధంగా కత్తిరించడమూ కత్తిరించిన మొక్కలను నాటడమూ చాలా సులభమైంది. ఇతర మొక్కల వలె వీటిని కణుపు క్రింది భాగానికి కత్తిరించాలి. సామాన్యంగా ఈ రకపు ముక్కలు 15 సెం.మీ. (6 అంగుళాలు) పొడవుండాలి. కనీసం 2 కణుపులంత పొడవు ఉండాలి. దీనికి కారణం ఒక కణుపు పొడవు నేలలోపల (భూమి లోపల) వేరుకోసం మరొకటి వెలుపలి




2. 62



2. 64



2.6.3



(బయట) కాండానికి ఆకు మొదలైనవి చిగురించడానికి అనవసరమవుతుంది.

ఈ మొక్కలను సుమారు 2½ - 5 సెం.మీ. (1-2 అంగుళాలు) లోతుకి నాటితే ఇవి బాగా ఊరి (లోతుకు దిగి) నిలబడటమేకాకుండా ఎండిపోవు. వీటికి నీడపడేటట్టు చూడాలి. మీడియంలోనే తేమ అరకుండా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఇటువంటి మొక్కలను నాటడానికి క్రిములను శుభ్రంచేసి, ఇనుక మట్టి కలిపిన మిశ్రమంతో స్పాగనుమామాస్ వర్మిక్యులైట్, కొబ్బరి నారు చూరు, ధూళు మొదలైన వాటిని పెంచవచ్చు.

**లేత మొక్కలు**

క్యామిలియా (Camellia) మొదలైన నిత్య హరిత మొక్కల ఉత్పాదన కోసం అర్థం (నగం) బలీసిన తాటని ఒక ఆకు దాని క్రింద ఒక సుప్తంగా ఉండే (నిండిన) మొగ్గ (పూర్తిగా వికసించని) ఉండేటట్టుగా ముక్క చేసి ఈ లేత మొగ్గ మీడియం పైన కొంచెం ఉండేట్టుగా నాలుతారు (చిత్రం 2 - 61 B)

2.61 B దారు ఉండే రెమ్మ నుంచి మొగ్గ ముక్కని తీసి (కోసే) రీతి a 1½ అంగుళం పొడవునకు. సుప్తంగా (పెరగని) మొగ్గని లోపలుండేటట్టు ముక్క చేయాలి. b. ముక్క యొక్క ఒక భాగాన్ని చెక్కి గాయపరచాలి. c. గాయపరచిన ముక్కని నాటాలి.

ఆకు మొగ్గ ముక్కలు ఎక్కువగా లభించడం చేత (దొరకడం చేత) ఈ క్రమం ఎక్కువ సస్యోత్పాదనకి సహాయ పడుతుంది. ఇందులో మొగ్గ నుంచి కాండపు ముక్క నుండి వేర్లు పెరుగుతాయి. ఈ ముక్కలను చేయడానికి ఆకు కాడ క్రింద కత్తిరించి ఆ ముక్కను మొగ్గ ముక్కపైన చేర్చి విభజించాలి. ఈ రకపు ఆకు మొగ్గ ముక్కలను బెరీనియం (చిత్రం 2.62) ఫైల్ డెండ్రన్ (Philodendron) పెప్పర్మియా (Peperomia) కోలియన్ మొదలైన ఇంటి మొక్కల (House plants) ద్వారా పెంచుకోవచ్చును (గ్రహించవచ్చు). వీటిని 1 నుంచి 4 సెం.మీ. (½ - 1½ - అంగుళాలు) అంతమాత్రమే పాతాలి. లోతుగా పాతకూడదు. కారణం మీడియం యొక్క బయటి (వెలుపలి) తేమ త్వరగా ఆరిపోతుంది.

2.62 ఆకు మొగ్గ ముక్క.


ఈ రకపు మొక్కలలో తల్లి మొక్క కాండపు జతలోనే ఉండకపోవడం చేత వీటి నుంచి, ఒకటి ప్రక్కన ఇంకోకటి, మరొకటి ప్రక్కన లేదా ఒకే కణుపునుంచి ఎదురు బదురుగా ఆకు పెరగి చోట ఈ రకపు ముక్కలను ఏ విధంగా గ్రహించాలి, తీసికోవాలి అనే విషయాన్ని చిత్రం 2.63లో చూపడమైంది.

2.63 ఆకు మొగ్గ ముక్కలను వేసే రీతి a. క్రింద ఎక్కడ కత్తిరించాలి. b. పైన ఎక్కడ కత్తిరించాలి c. ఆకు మొగ్గ ముక్కను మొగ్గ నేలపై ఉండేటట్టుగా పాతాలి.

**పిలకలు (కంద/కన్ను) కణుపు, ముక్కలు**

ఈ మొక్కలు కూడా ఆకు మొగ్గ ముక్కలలాగే చేయాలి. కాని వీటివల్ల ఆకుని కత్తిరిస్తారు. వీటిని






266




266



267



268



269

వరికాలపు ప్రారంభంలో సువ్రంగా ఉండే మొగ్గలున్న బలిసిన రెమ్మల నుండి గ్రహిస్తారు. (చిత్రం 2.64) ఈ రెమ్మలు సుమారు 4 సెం.మీ. (1½ అంగుళాలు) పొడవు ముక్కలుగా కత్తరిస్తారు.

2.64 సుత్తిమింటి మొక్క (Mallet cutting సుత్తి మొక్క) కణుపు ముక్క.

ఈ విధంగా ముక్కలను విభజించేటప్పుడు కణుపు మొక్క ఎదురు, ప్రక్కలలో రెమ్మ యొక్క చివ్వు, కొంచెం ఉండేటట్టుగా కత్తరించాలి (చిత్రం 2.65) పాతేటప్పుడు కణుపు నేల సమ మట్టానికి ఉండేటట్టు నాదాలి.

2.65 డీఫ్సెంబాచియా సుంచి (Dieffenbachia) ముక్కలను చేసే విధానం 1. ఆకు ఉండే కాండాన్ని కత్తరించి పాలాలి. 2. కాండపు గూడాన్ని అలాగే వదిలి ఉండటం అది కొత్త చిగురు చిగురిస్తుంది. 3, 4. కాండాన్ని ముక్క చేసి పాతేతే ప్రతి కణుపు సుంచి ఒక్కొక్క మొక్క అవుతుంది.

పైపింగు (మొస ముక్కలు కొన ముక్కలు)

కార్నేషన్ (Carnation) పింక్స్ డయాంథస్ (Pinks - Dianthus) మొదలైన మొక్కలలో మొసని మొక్కనుండి లాగి చీలుస్తారు. (గిల్లతారు) (చిత్రం 2.66).

2.66 కార్నేషన్ మొక్క నుండి పైపింగ్ లాగుట (చేయడం).


ఈ కొనముక్కలను పైపింగ్ అంటారు. సన్నని గొట్టం రూపంలో ఉండటం చేత యీ పైపింగ్లో పెరుగుతుంది ఆకు కాండం లేత ఆకులుంటాయి. ఈ మొసలను సులభంగానే గిల్లవేయవచ్చు. కోసిన కొంత కాలానికే ఈ మొసలను మట్టిలో కండి అంచులో పాతి (చిత్రం 2.67) దీని పైన పాలిథిన్ (ప్లాస్టిక్) షీట్ డేరానుంచి, దానితో మూయాలి. ఈ పైపింగ్లో చురుకు కాండం, ఆకు ఉండటం చేత, వీటి జతకీ వేరు త్వరగా పెరిగి, కొత్త మొక్కలౌతాయి. పర్మాన్లో అద్ది పెంచిన కారనేషన్ పైపింగులను చిత్రం 2.68లో చూపడమైంది.

2.67 కార్నేషన్ పైపింగ్లను తొట్టిలో నాటుట.


2.68 హార్మోను పొడితో అద్దిన ముక్కలకు వేరు త్వరగా పెరుగుతుంది. A ఎడమవైపు అద్దిన మొక్కల ముక్కలు, చాలా రోజులైనను వేరు చాలా తక్కువగా పెరిగినది. B. కుడి వైపు మూడు హార్మోన్ పొడి అద్దిన ముక్కలకు వేరు సమృద్ధిగా పెరిగినవి.

ఆకు ముక్కలు Leaf cuttings

ఆకులను ముక్కలుగా కోయడం. గేనియ, గ్లాక్సినియ, సేంట్ హాలీయ (Saint paulia) స్ట్రెప్టో కార్పస్ (Streptocarpus) ఎకివీరియ (Echeveria) సానెస్ వీరియ (Sansevieria) మొదలైన వచ్చని ఇంటి తోట మొక్కలను (Green house plants) ఆ ముక్కల ద్వారా పెంచుకోవచ్చు. (కోమలమైన మొక్కలను పెంచేది



270



271



A



B

2-72

ఇచ్చును “వచ్చునిండ్లు” అని అంటారు). తల్లి మొక్క నుంచి ఆకును బొడ్డిగా కాండంతో వేరు చేయాలి. ఈ కాండపు మొక్కను ఇారపు బ్లెడుతో వాలుగా కత్తిరించాలి. ఈ ఆకు ముక్కని ఆకు అడ్డానికి లేదా ఏటవాలుగా ఇసుక మొదలైన మీడియం పైన పడుకునేటట్లు మీడియంలో నాటాలి. ఈ మీడియంను ఎల్లప్పుడూ తేమతో ఉంచాలి. ఇవే క్రమపు సోపానాలు కొంతకాలమైన తర్వాత 1-2 నెలల తర్వాత ఆకు కాడ క్రింది భాగంలో ఒక చిన్న మొలక పెరుగుతుంది (చిత్రం 2.69, 2.70).

2.69 సానెస్ వీరియపు ముక్క వేరు పెరిగివుండడం.

2.70 పెనరోమియ ఆకు తొడిమిని నాటితే తొడిమ క్రింద నుంచి వేర్లు (X) కొత్త కాండాలూ (Y) వస్తాయి. (పెరుగుతాయి).

ఆకు తొడిమిని మీడియంలో నాటడానికి బదులు వెడల్పు నోరున్న (వెడల్పు మూతివున్న) సీసాలో కొంచెం నీరు వేసి అందులో తొడిమను మారుస్తూండాలి. అనుకూలమైతే గోరు వెచ్చని నీటిని వేయొచ్చు. కొంతకాలమైన తర్వాత మొక్క క్రింది నుంచి వేళ్ళు పెరుగుతాయి (చిగురిస్తాయి). కొద్దిగా వేరు పెరిగిన తర్వాత దీన్ని సూక్తమైన మట్టి మిశ్రమంలో పాతాలి. కారణం నీటిలో పోషకాలు ఉండవు కాబట్టి వేరు పెరిగి వ్యాపించడానికి ఈ విధంగా చేయాలి (చిత్రం 2.71).

2.71 గ్లాస్సేనియ ఆకు తొడిమను నీళ్ళుండే ఇంకు బాటిళులో పెడితే కొన్ని దినాలైన తర్వాత తొడిమ క్రింద గడ్డ కడుతుంది. ఈ గడ్డ ద్వారా మరు సంవత్సరము కొత్త మొక్కవుతుంది.

**రెక్స్ బెగోనియ (Rex Begonia)** (అలంకారపు ఆకు చెట్టు) మొదలైన ఆకు ప్రధాన ఆకు మొక్కలలో ఆకు క్రింది భాగాన్ని ముఖ్య పత్రనాలను (చూడండి మొదటి అధ్యాయం) అక్కడికక్కడే బ్లెడుతో కత్తిరించి ఆకులను మీడియం పై పడుకోబెట్టి పిన్నులను గ్రుచ్చో, అంచుపై మూడు, నాలుగు సన్నని రాళ్లను పెట్టో ఆకు కదలకుండా ఉండేటట్లు చేయాలి. (2.72) కొందరు అంటు వేసిన వైపు కొంచెం ఇసుకను చల్లడమూ కలదు.

2.72, a. రెక్స్ బెగోనియ ఆకు నాలాలను అక్కడికక్కడే అర్థానికి (నగం భాగానికి, క్రింది భాగంలో) b. కత్తిరించి క్రింద మట్టి మిశ్రమం పైన పడుకోబెట్టి మిశ్రమాన్ని తేమతో పెడితే కొంత కాలమైన తర్వాత కత్తిరించిన భాగం నుండి కొత్త కాండాలూ వేరూ వస్తాయి. వీటిని విభజించి వేరే ప్రత్యేక మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చును.

మీడియంనూ, ఆకునూ ఎల్లప్పుడూ తేమతో (తడకాదు, తేమ) ఉండేటట్లుగా నీటిని చిలకరిస్తూ ఉండాలి. కొంత కాలమైన తర్వాత ఈ నాలాలు అంటుగట్టిన చోట క్రింది భాగంలో వేళ్ళూ, పైన కాండం ఆకులు పెరుగుతాయి. వీటిని వేరు చేసి స్వతంత్ర మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు. గ్లాస్సేని మొక్క ఆకు నుండి ఈ విధంగా వేరును వృద్ధి చేసుకోవచ్చును.

లేదా ఆకులను ముఖ్య పత్రనాలూ ఉండేటట్లుగా త్రికోణాకారంలో చిన్న ముక్కలుగా కత్తిరించి, వాటిని మీడియంపై నానబెట్టి మీడియం ఆకు ముక్కలు తేమతో పెడితే ప్రతి మొక్క ఆకు నుంచియూ కొత్త

మొక్కలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఈ క్రమం ద్వారా ఒకే ఆకు నుంచి అనేక మొక్కలను వచ్చేటట్లు చేసుకోవచ్చును. (చిత్రం 2.73 a & b).

2.73 a. రెక్స్ బెగోనియం ఆకు మొక్క, ఒక అంచు తడి (చెమ్మ అయిన) ఇనుకలో పాతికే అక్కడికక్కడే వేరు మొలకెత్తి కాండాన్ని ముందుకు తోస్తుంది.

2.73 b. రెక్స్ బెగోనియం ఆకు ముఖ్య నాళాలను ఒకటి రెండు ఉండేటట్లుగా మూలమూలకీ కత్తిరించి నాళపు భాగాన్ని పాతికే దాని నుంచి కొత్త మొక్కలు పెరుగుతాయి.

**అంటు త్రొక్కటం - అంటు గట్టడం (Graftage)**

ఒక మొక్క యొక్క భాగాన్ని మరొక మొక్కతో చేర్చి రెండింటినీ చేర్చి పెరిగేటట్లుగా చేసే సంవిధానమే అంటుగట్టడం. అంటుగట్టడంలో ముఖ్యంగా రెండు మొక్కలు పాత్ర వహిస్తాయి. 1. కలిపే నవ్వ భాగం, 2. ధరించే నవ్వం.


కలిపే నవ్వ భాగం : సామాన్యంగా ఇది మంచి జాతికీ చెందింది. సీరి నవ్వం ఈ భాగాన్ని సీరికాండం సీరి మొలక, కరీన మొలక సైయన్ (Scion) అని అంటారు.

ఈ సైయన్ను ధరించే సస్యంలు సైయన్నుని ధరించే ముక్క, సామాన్యంగా దృఢంగా పెరిగిడి గుణం గలిగిన మొక్క. దీన్ని మూలససి, తల్లి మొక్క, తల్లి దిండు, ససీపీతం లేదా స్టాకు (Stock) అని అంటారు. సైయన్ను స్టాక్ పైన పెంచేడి క్రమాన్ని అంటు గట్టడాన్ని అంటు త్రొక్కడం, గ్రాఫ్టింగ్ (grafting) అని సైయన్ను, స్టాక్ చేర్చిన మొక్కని అంటు లేదా గ్రాఫ్టు (graft) అనీ, అంటు గట్టి సస్యోత్పాదన చేసుకునే క్రమాన్ని అంటుగట్టడం అంటు త్రొక్కడం గ్రాఫ్టింగ్ (graftage) అని వ్యవహరిస్తారు. ఈ అంటుగట్టడానికే, వెనుక తేటడిన వేరు విడదీయడం, ముక్కలను చేయడం క్రమాలతో ఉన్నవి.


**భేదాలు (వ్యత్యాసాలు) :** అంటు గట్టడంలో సైయన్ కున్న వేరు లేకుండా చేసి (ఒక రకపు క్రమంలో సైయన్ కీ కొంతకాలం వేరుంటుంది. (ముందు చూడండి) వేరుండే వేరే ముక్క (వేరొక మొక్క) పైన కూర్చోబెట్టి పెంచేడి అంటు గట్టడంతో రెండు మొక్కల మిలితం (కలయిక) ఇతర క్రమాలలో ఈ మిలితం (కలయిక) ఉండదు. ఒక మొక్క మాత్రమే పాత్ర వహిస్తుంది.

అంటు త్రొక్కే కళ నిన్న మొన్నటిదికాదు; అనేక శతాబ్దాల కాలం నుంచి ఆచరణలో ఉండే సస్యోత్పాదన క్రమం. క్రీస్తు పూర్వ కాలంలోనే ఈ క్రమం అనుసరణలో యుండింది. ఈ విధంగా ఉండే అంటు గట్టడం ఏదో ఇంద్రజాల విద్యని (ఇంద్రజాలం) అనేకులు భావిస్తూ ఉండడం అల్పర్యకరమైన విషయం. అంటుగట్టడం ద్వారా తత్వాలను అర్థం చేసుకొని, ఈ పనిని గ్రహిస్తే (చేపడితే) దీని గుట్టు రట్టువుతుంది.

అంటు గట్టడం ద్వారా (మూలంగా) తత్వాలను విశదీకరించడానికన్నా ముందు మనం ఎందుకోసం అంటుగడుతున్నాం ? అంటుగట్టడంలోని ఉద్దేశాలు ఏవి ? అనే విషయాలను పరిష్కరించుకోవాలి.



273 A - B



274

సాధారణంగా అంటుసు ఏడు (7) ఉద్దేశాల కొరకు అంటుగడుతారు.

1. దీజాల నుంచి ఉత్తమరకమైన లేదా సీమ వంటి గుణ జాతులను పొందడానికి వీలు లేనప్పుడు. మంచి జాతుల గుణాలను, దాని వంశంలోనూ ఉండేట్టు నిశ్చయించుకోడానికి ఈ మంచి జాతి అల్లెంగిక (అంటే పుష్ప భాగాన్ని వదిలేసి ఇతర భాగాల ద్వారా) సస్యోత్పాదన చేసుకోడానికి అంటుగడతారు.

2. త్వరగా ఫలాన్ని పొందడానికి అంటుగడతారు. సామాన్యంగా విత్తనాల ద్వారా మొలకెత్తిన మొక్కలకన్నా, (అంటుగట్టిన మొక్కలే త్వరగా ఫలాన్ని యిస్తాయి).

3. కొన్ని సీరిజాతి మొక్కలు పాడవుగా పెరగడానికి బదులు మోటుగా (మొండిగా) పెరగడానికి చేయడానికి మోటు చేసి స్టాక్ పైన (Dwarfing stock) అంటుగట్టి పెంచుతారు. ఈ విధంగా మోటు చేయడం చేత పుష్పాలను ఫలాలన్నీ గిల్లట (కోయడం) సులభమవుతుంది. ఔషధాలను చిలకరించడం సులభమవుతుంది. మొక్కల్ని హద్దులో పెట్టుకొని, కాపాడడానికి అనుకూలమవుతుంది.

4. సీరి వంటి జాతి మొక్కలు సామాన్యంగా కోమలమైనవి. ఈ జాతులు ఎక్కువ కాలం పెరిగి జీవించేటట్టు చేయడానికి, ఇటువంటి వానిని గట్టి ముట్టైన స్టాక్ పైన అంటుగట్టి పెంచితే, ఈ స్టాక్ మొక్క దృఢకాయత్వ సీరి దీనికి వస్తుంది. దాని గట్టి ముట్టితనంపైయెన్ లోనూ, కనిపిస్తుంది. సామాన్యంగా స్థాకు మొక్కలు రోగాన్ని కీటకాలని ఎదురించలేవు. ఈ రోగ నిరోధక శక్తిని సీరిజాతికి కలిగించడానికి (ఇవ్వడానికి) అంటుగడతారు.

5. మొక్క లేదా చెట్టు రూపాన్ని మార్చడానికి దాని లావు, రెమ్మల బలాన్ని పెంచడానికి వృద్ధి చేయడానికి లేదా రెమ్మల విరిగిపోయింటే, కొత్త రెమ్మలను పెంచడానికి అంటుగడతారు. ఎలుక, పందికోక్క, ఇతర ప్రాణుల ద్వారా గాయమైతే, చెట్లను బాగు చేయడానికి ఆ రెమ్మల క్రింది వేరొక రెమ్మను అంటుగట్టి చెట్టు రూపం మారకుండా ఉండేటట్టు చేయవచ్చును.

6. పాత మొక్కల్ని, చెట్లని పునరుద్ధరించడం పునర్జీవనం కోసం అంటుగట్టుతారు. చతురత లేకపోవడం చేతనో, అజ్ఞానం చేతనో మనం తోటలో కొన్ని వేళ్లలో కలుపుగోలు జాతి మొక్కల్ని వేస్తాం. పెరిగిన తర్వాత అవి కలుపు మొక్కల జాతికి చెందినవని స్పష్టమవుతుంది. ఈ ప్రధాన తప్పుని దిద్దుకోడానికి ఈ మొక్క చెట్ల పైభాగాన్ని కోసివేసి మిగిలిన భాగాన్ని స్థాకుగా పెట్టుకొని దాని పైన శ్రేష్ట జాతి సైయనులను అంటుగట్టుకోవచ్చును. ఈ పునర్జీవన క్రమానికి "టాప్ వర్కింగ్" (Top working) వై అంటుగట్టుడం అని వ్యవహరిస్తారు. (2.74) మరికొన్ని వేళలలో పాత మొక్కల పునర్జీవింపజేసి, వాటిని యౌవనంగా వుండేటట్టు పునఃస్థాపించడానికి ఈ పై అంటుగట్టి క్రమం అనుసరిస్తారు.

2.74 పాత వండ్ల చెట్లకు కొత్త యౌవనం, చెట్ల రెమ్మలను కత్తిరించి వాటిని స్థాకులుగా చేసుకొని, సీరిజాతి చెట్ల కణుపుంగరాలు (Ring) చేరిస్తే (జతవరిస్తే) ఈ చెట్ల (మొక్కలు) జీవావధి, ఫలశక్తి పెరుగుతుంది. a. సైయాను పెరుగుచున్నది. b. కణుపుంగరాలను జోడించడం. c, d. సైయాన్ స్థాకు చేరి పెరిగిన (చిగురించిన) రెమ్మ.



కొన్ని జాతి మొక్కలలో విజ్ఞాన వేత్తలు ఇటీవల అత్యుత్తమమైన కొత్త ప్రవేదాలను రూపొందించారు. ఈ నవీన జాతులు పెరగడానికి పాత చెట్లను (మొక్కల్ని) కొట్టిపారేయవలసిన అవసరం లేదు. దానికి బదులుగా వీటిని స్థాకులుగా చేసికొని వీటిపైన నవీన జాతులను పైన అంటుగట్టి పెంచవచ్చును.

7. కొన్ని మొక్కల చెట్లలో పురుష పుష్పాలనే కొన్ని, స్త్రీ పుష్పాలనే ఇచ్చే కొన్ని చెట్లుంటాయి. పురుష పుష్పాన్ని ఇచ్చే సంఖ్య తక్కువైనా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నప్పుడు లేదా దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఈ పురుష పుష్పపు వరాగం పుష్ప స్త్రీ పుష్పాలకు లభించదు. ఈ చెట్లు అంటుగట్టకే పలాన్ని ఇవ్వక పోవడం జరుగుతుంది. అటువంటప్పుడు అటువంటి చోట్ల, పుష్పించని పుష్పాలు రాని మొక్క యొక్క కొన్ని రెమ్మల మీద మొగ (పురుష) పుష్పాలనిచ్చే చెట్ల రెమ్మలను అంటుగడితే అప్పుడు వరాగ సంవర్ధం బాగా జరిగి, ఆ చెట్లు వృద్ధి చెందుతాయి.

పై ఏడు అంటుగట్టు పద్ధతులలో ముఖ్య ఉద్దేశాలేవయినా ఇతర ఉద్దేశాలూ ఉన్నాయి. అనేక గులాబీ జాతి మొక్కలని ముక్కచేసి సహ్యత్వాదన చేసుకోవడం చాలా కష్టం. ఈ ముక్కలలో అంత సులభంగా వేరు పెరగదు. ఒక వేళ వేరు వచ్చినా, కావల్సినంతగా పెరగపోతే మొక్క (తల్లితల్లిదండ్రులు) చిగురించదు, పెరగదు. ఈ విధంగా తమ సొంత వేళ్ళపై కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించజాలవు. కాని దీన్ని గట్టిముట్టిన బ్రయర్ గులాబీ స్టాక్ పైన ప్రధాన మొలకవేసి, పెంచితే అవి అందంగానూ, పుష్పభరితంగా పెరుగుతాయి.

ఇంటి ఆవరణలలో లేదా తోట చిన్నదిగా ఉండి, ఆశ ఎక్కువగా పున్నప్పుడు ఒకే చెట్టులో అనేక జాతులను (రకాలను) పెంచడానికి స్టాక్ మొక్క ఒక్కొక్క అడుగు రెమ్మపైన ఒక్కొక్క మొక్కను అంటుగట్టి పెంచుకోవచ్చును.


కొన్ని మొక్కల చెట్ల ఆకులూ, పుష్పాల రూపం బ్రతికిన వేర్లను ఉత్తమోత్తమైన విస్తరణ చేయడానికి అంటుగడతారు. ఉదా. రోడోడ్రన్ (Rhododendron) ఒక మాతనలేజాన్ని (vigour) పెంచడానికి అంటుకడుతారు.

**అంటు గట్టడంలోని మూల తత్వాలు (Principles of Graftage)**


స్టాక్ పైన కూర్చో పెట్టే ఉత్తమ జాతి సైయన్ స్టాక్ తో కూడి (చేరి) పెరగాల్సి వస్తే, స్టాక్ కి, సైయన్ కి విరోధముండరాదు. ఈవిధంగా విరోధముండి, చేరి ఉంటే అంటుకు ముందర (తొలి) పెరుగుదల అంతంత మాత్రంగానే ఉంటుంది. (పెరుగుదల కుంటుపడుతుంది). చేరిన చోట ఉద్ధి ఉండడమో లేదా క్రుశిగి ఉండటమో జరిగితే స్టాక్ కి, సైయన్ కి విరోధముందని తెలుసుకోవాలి (చిత్రం 2.75 a & b).

2.75 a & b. కొన్ని సమయాలలో స్టాక్ కి, సైయన్ కి విరోధముంటుంది. ఈ విధంగా విరోధమున్నప్పుడు a లో స్టాక్ ఉద్ధి సైయన్ భాగం కృశించి యుంటుంది. b లో సైయన్ ఉద్ధి స్టాక్ కృశించి చిన్నదిగా (లావు తగ్గి) ఉంటుంది. పై-సైయన్-స్టా-స్టాకు.


కొన్ని జాతులలో సైయన్ ప్రభావం స్టాక్ పైననూ, స్టాక్ ప్రభావం సైయన్ పైననూపడి కొత్త రకపు మిశ్ర జాతి వస్తుంది. వీటిని అంటు కంకరాలు (Graft hybrids) అని అంటారు. ఈ మిశ్రజాతి (మిశ్రమాల)



275 A-B



276a



\*2.76 B

కొన్ని సమయాలలో ఉత్తమంగా ఉంటాయి. అనేక సమయాలలో ఫలాన్ని ఇవ్వకుండాను పోవచ్చు. అందుచేత స్టాకు సైయన్ల ఎన్నిక (ఏరుకోవడం) చాలా ముఖ్యం.

సామాన్యంగా సామ్యం ఎక్కువగా ఉన్న దగ్గర సంబంధమున్న స్టాక్, సైయన్లే బాగా చేరి (దగ్గరై) పెరుగు గలుగుతాయి. స్టాక్-సైయన్ భాగాలకు వరపురం విరోధం లేకపోయినా వరపురం మైత్రీ ఉన్నమా అవి బాగా చేరాలంటే (దగ్గరవ్వాలంటే) ఈ చేరే భాగాన్ని ఎండిపోకుండా కాపాడాలి. ఈ భాగం ఎండితే ఇవి చేరలేవు. ఈ విధంగా చేరేభాగం ఎండకుండా ఉండడానికి అంటుపై మానాని (ముందు చూడండి) పూస్తారు. లేదా రబ్బర్ బేపు, పాలీతీన్ బేప్ (Polythene tape) ఇటువంటి నీటి నిరోధక (water repellant) వస్తువులతో చుడతారు. వేగ్లపై కాండాన్ని అంటు గట్టి చోట ఈ చేరిన భాగాన్ని నేలలోవల (భూమి లోవల) ఉండటం చేత ఈ భాగపు తేమ ఎండిపోదు.

స్టాక్ సైయన్ ఒత్తుగా చేరేటట్టుగా ఏ విధంగా చేర్చి కట్టాలనే విషయాలు వివరించడమైంది. రెండింటిలోనూ నాలుక తీసుంది. ఈ నాలుకలను ఒకదానిపైన మరొకటి కూర్చోబెడుతారు (చేర్చికడతారు).

ఈ రెండింటి రెమ్మల పాలును (పొర Cambium) కాండ జీవకాలు లేదా కాండంలో వృద్ధి అయ్యే జీవకోశాల పొర (చూడండి మొదటి అధ్యాయం) సమర్థకమయ్యేట్టు చేర్చాలి. అప్పుడు ఈ రెండూ కాంబియం పొరలతో ఒకటవుతాయి. ఒకటై (ఒకటిగా) పెరుగుతాయి.

2.76 a. ఈ సంవర్షం సమతూకంగా ఉండడానికి చురుకైన (Sharp) మొనదేసిన చాకుతో ఈ రెండింటినీ ఏటవాలుగా కత్తిరించాలి, స్టాక్, సైయన్లను కత్తిరించిన భాగాలను ఒకటిగా చేర్చినప్పుడు కత్తిరించిన భాగాలలో కేంద్రియం పొరనుంచి క్యాంబ్ (అంటు) పెరుగుతుంది. ఈ క్యాంబ్ను చురుకుగా పెరిగి కలిసి, స్టాక్, సైయన్లు చేరుతాయి.

2.76 b సస్యోత్పాదనలో ఉపయోగించే వివిధ రకాల చాకులు.

అంటు గట్టడంలో అనేక విధాలున్నాయి. ఒకదానికొక దానికంటే ఒక్కొక్క అనుకూల గుణముంది. ఒక విధానం ద్వారా అంటు చేర్చుచు, మరొక విధానంలో చేరకుండా ఉండొచ్చు. అందుచేత అయా జాతులకు సరిపోయే అంటుగట్టి విధానాన్నే అనుసరించాలి. ఏ జాతికి సరైన విధానాలు ఏవో విషయాన్ని విజ్ఞాన తేత్రలు కనిపెట్టివున్నాయి. అయినా మన వాతావరణానికి మన మొక్కలకు ఏది సరైనదో అనే విషయాల్ని పరిశీలించి ద్వారానో, అనుభవం ద్వారానో తెలుసుకోవాలి. కొన్ని విధానాలు పాత మొక్కలకి చెట్లకి బలిసిన తాట చెట్లకూ సరైనవి. మరి కొన్నింటికి ఒక సంవత్సరపు కాండం లేదా రెమ్మలకు యోగ్యమైంది.

ఎక్కువ సంఖ్యలో అంటు మొక్కల్ని పెంచడానికి సరైన స్థాకులనే పెంచి, వాటికి అంటుగట్టాలి. ఉదా. గులాబి అన్ని రకాల గులాబీలతోపైనే మొలకలను మొలకెత్తించడం సాధ్యం కాదు. ఒక వేళ అంటుగట్టినా అవి పెరగవు. బ్రయర్ ఎడవ్లో మొదలైన స్థాకులను పెంచి వాటికి మొలకలొచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ విజయాన్ని

సాధించవచ్చు. నిమ్మ జాతికి చెందిన మొక్కలలోనూ ఇదే విధంగా అంటుగడుతారు.

దీనికోసం పరిశ్రమ జరిపి ఏ జాతికి ఏది సరైన స్థాకు అనే విషయాన్ని కనుగొంటున్నారు, నులభంగానే కనిపెట్టుతున్నారు. అంటుగట్టడం విజయవంతమైందని అనడానికి అంటు మరో మొక్కలో చేరడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. అంటుగట్టే విధానం కూడా అదేవిధంగా వుంటుంది. వనంతకాలంలో మొక్క చిగురించి పెరుగుతుంది. దీని కేంద్రియం పొర చాలా చురుకుగా ఉంటుంది. ఈ పొర అప్పుడు అంటుగడితే ఈ పొర కత్తి గాయాల్ని (కత్తివే ఏర్పడిన గాయాల్ని) త్వరగా పూడ్చి (మానేటట్టు చేసి) సైయను, స్టాకును త్వరగా ఒకటిగా చేరేట్టుగా చేస్తుంది. వేరే కాలంలో ఈ పొర గట్టిపడి, స్టాక్, సైయనుల అంటును చేర్చడానికి అసక్తమైందిగా వుంటుంది. జీగు, ఆకు పసరు, పాలు, వగరు మొదలైన వాటిని కాగ్నే మొక్కలలో (మొక్కలతో) అంటుగట్టడం చాలా కష్టం. ఈ రసాలు స్టాకుకీ, సైయనుకీ నూటిగా సంవర్షమేర్పడడానికి అడ్డమవుతాయి.

ఏకదళ మొక్కలలో (బీజాలలో) ఒకే తొట (చిప్ప) ఉండే పరి, గోధుమ మొదలైన జాతి మొక్కలలో అంటు గట్టడం కష్టం. అంటులో సైయను దృష్టితో ఉత్తమమైన భాగం. సిరి భాగం - స్టాక్ గట్టి ముట్టిగా ఉండిననూ గుణంలో మట్టుకే వుంటుంది. అందుచేత, స్టాక్ ద్వారా రాతగిన (పెరగగలిగిన) చిగురు కొమ్మలను - వీటిని కంత్రి కొమ్మలని వ్యవహరించడం వాడుక (పిచ్చి కొమ్మలని కూడా వ్యవహరిస్తారు). పెరగడానికి అవకాశమివ్వకుండా అప్పుడప్పుడు వీటిని గిల్లి (పీకి) వేస్తూండాలి. ఆ విధంగా చేయకుండా ఉండి ఇవే పెరిగి, సైయన్ మొలకెత్త నీయకుండా చేస్తుంది. అంటుగట్టడంలోని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం విఫలమవుతుంది.

సైయన్ భాగాన్ని చేర్చి కట్టడానికి ముందే స్టాకు భాగాలలో వేరు చిగురించి పెరుగుతుందో లేదో చూసుకోవాలి, బయట నుంచి స్టాకులను హింపేటప్పుడు ఇవి రోగరహితము అని దృఢపరచుకోవాలి. అవి వేరు పెరిగి స్థాపితమైన తర్వాత అంటుగట్టాలి. సైయన్ న్ను ఏరేటప్పుడు అందులో కనిసం ఒక మంచి మొగ్గైనా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి.

అంటుగట్టడానికి సరిఅయిన కాలం

అంటుగట్టే క్రమాన్ని సంవత్సరపు అనేక కాలాలలో జరుపవచ్చు (నడిపించ వచ్చు). అంటులో ప్రతి ఒక క్రమానికి ఒక్కొక్క నిర్దిష్టమైన కాలముంది. ఆ కాలంలో అంటుగట్టినప్పుడు మాత్రమే అంటు త్రోళ్ళడం జయప్రదమవుతుంది (విజయవంతమవుతుంది). అంటుకట్టడంలో ముఖ్యమైన ఆంశం - స్టాకు, సైయనులు కేంద్రియం పొరల కూడిక, ఏ కాలంలో ఈ పొరలు చురుకుగా వుంటాయో ఆ కాలమే ఆ విధానపు అంటుగట్టడానికి తగిన సరైన కాలం.

అంటుగట్టే విధానాలు :

సైయనుకీ, స్టాకుకీ అనేక విధాలుగా సంవర్షాన్ని ఏర్పరచవచ్చు. సైయనుని అనేక రీతులలో స్టాక్ పై కూర్చోబెట్టి (చేర్చి) అంటుగట్టవచ్చు, సైయన్ని - మొగ్గ కూడా సైయన్నే అవుతుంది. స్టాక్ పై భాగాన్ని (నెత్తెసిన) వేరుపైన, కాండంపైన, తొడిమపైన, లోపలి మొక్కపైన అనేక విధాలుగా చేర్చి (కూర్చోబెట్టి) అంటుగట్టవచ్చు.

సైయన్స్ చేర్చడం లేదా అంటు గట్టి చోటుకి అనుకూలంగా అంటుగట్టి క్రమాలను నాల్గు వర్గాలుగా చేయవచ్చు.

1. వేరుతో అంటుగట్టడం (Root grafting) ఇందులో స్థాకు వేరు భాగం మాత్రమే ఉంటుంది. కాండపు భాగం ఉండదు.
2. పై భాగంతో (వేరు పై భాగంతో/వేరు నెత్తిపై) (Crown grafting) ఈ క్రమంలో సైయన్స్ వేరు పై భాగం (నెత్తి) లేదా గొంతుపైన నేల సమానికి అంటుగడతారు.
3. కాండం లేదా దిండుతో అంటుగట్టడం (Stem grafting) ఇందులో కాండం నుంచి రెమ్మ బయలుదేరి చోటు నుంచి కొద్దిగా క్రింద భాగాన్ని సైయన్స్ చేరుస్తారు (కూరుస్తారు). ఈ క్రమాన్ని లేత మొక్కలకు అంటుగట్టాలంటే అనుసరించే వద్దతి.
4. పై భాగంతో లో అంటుగట్టడం (Top grafting top working) మొక్క లేదా వెట్టు రెమ్మలపైన సైయన్స్ చేర్చి (కూర్చేట్టెట్టి) క్రమం.

#### వేరుతో అంటుగట్టడం


ఈ క్రమంలో వేరుని స్థాకుగా పెట్టుకొని దానిపైన సైయన్స్ చేరుస్తారు (చేర్చి కడతారు). అనేక సమయాలలో సన్నని మొక్కల (చిన్న మొక్కల) చేళ్ళన్నింటినీ స్థాకుగా పెట్టుకొంటారు. సైయన్స్ తల్లివేరు పై భాగంలో వేరస్తే (జోడిస్తే) ఈ అంటు పూర్ణ వేరు అంటుగట్టడం అవుతుంది (Whole root graft) దానికి బదులు వేరుని రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ భాగాలుగా చేసి ఒక్కొక్క దానిపైన అంటుగడితే దీన్ని వేరు భాగాలు అంటుగట్టడం లేదా వేరును భాగాలుగా చేసి అంటుగట్టడం (Piece root graft) అని అంటారు. పొడవుగా వున్న సైయన్స్ మొరటుగా ఉండే వేరు భాగంపై చేర్చి అంటుగడితే దీన్ని (నర్స్ వేరుల అంటుగట్టడం లేదా దాని వేరుతో అంటుగట్టడం (Nurse root graft) అంటారు. సామాన్యంగా పూర్ణ వేరుపై అంటుగట్టడమే ఎక్కువ అనుకూలం, దీన్ని సపోదా, గులాబీ మొక్కల పెంపకంలో అనుసరిస్తారు. (చిత్రం 2.77).

2.77 (1-3) : 1-3 వేరుపైన అంటుగట్టవచ్చును. స్టా-స్టాకు సై-సైయాను.


1. స్థాకు సైయన్స్ లో నాలికను కోసి, జోడించడమైంది.
2. పక్కలను కోసి జోడించడమైంది.
3. మొనడేల్లి (కూను - Sharp) చేసి ఒకదానిపై ఇంకొకటిని కూర్చోపెట్టబడింది.

పై భాగంతో అంటుగట్టడం (పై భాగపు అంటు తొక్కడం) (Top grafting) క్రమాలు :


1. చీలికతో అంటుగట్టడం, (నెరియతో అంటుగట్టడం) ఒక అంగుళంకన్నా లావుగా ఉండే వెట్టు రెమ్మలకు చీలికలతో అంటుగట్టతారు. మొదట రెమ్మను నీటుగా అడ్డంగా కత్తిరించి దాని మధ్యలో గట్టిన చాకుతో లేదా మచ్చు కత్తితో రెండూ, మూడూ అంగుళాల లోతంత చీలిక చేసి చీలిక వోరు తెరచి ఉండేటట్టుగా చాకు లేదా



277




a




c

d

278



279



e

111A

మచ్చు కత్తిని. చీలికలో సైయన్‌న్ని చేర్చేంత వరకు (కూర్చోబెట్టేంతవరకు) అక్కడే పెట్టుండాలి, లేదా దానిలో దువ్వెనని గుచ్చిపెట్టాలి. 2.3 మొగ్గులున్న సైయన్‌న్ని ఈ చీలికలో ఒత్తుగా చేర్చి కూర్చునేట్టుగా (చేరేట్టుగా) పెనవేసిన ఆకారంలో వరచాలి. స్టాక్ చీలికను ఒంచి, (మంచి) ఈ అల్లికను అందులో కూర్చోబెట్టాలి. చేర్చేటప్పుడు సైయన్ మొక్క కేంబియం పొరలు ఒకదానికొకటి అత్తుకొని ఉండేటట్టుగా, సైయన్ మొక్క క్రింది భాగపు మొగ్గు స్టాక్‌కు కొద్దిగా పైన ఉండేటట్టు, సైయన్ అల్లిక మొక్క ఒక భాగం తొడిమకి, స్టాక్‌ను తొడిమతో పొందుకొని ఉండేటట్టు జోడించాలి. వెంటనే అంటుగట్టిన భాగాలకు అంటు జిగురు (grafting wax) (ముందు చూడండి) వూయాలి. కావల్సి వస్తే ఒకే సైయన్‌న్ని మాత్రం మిగుల్చుకోవచ్చును. (2.78 చిత్రం).

2.78 చీలిక లేదా వగల గొట్టుట (Cleft wedge grafting) సైయనులను మొనదేలనట్టుగా చీలికను చేయడం  
a. కాండపు గూడాన్ని ముచ్చికలో చీల్చడం b. ఒంటి బెరడులోని చీలికలో చిక్కించడం. c. చీలికను బెరడుతో పెట్టి మంచి (దూర్చి) రెండు సైయన్ బెరడులను చిక్కించాలి. d. గుంటని తీసేవప్పుడు చీలిక సైయనులను అంటుకొని వట్టు కొంటాయి. e. అంటుగట్టి కత్తరించిన భాగంపైన అంటుకోవడానికి (అత్తుకోడానికి) మైనంను బ్రష్‌తో వూయాలి.

ఈ అల్లిక లేదా చీలిక అంటుక్రమం వెనుక నుంచీ వాడుకలోనున్న సరళమైన క్రమం. పాత వండ్లు చెట్లను పునర్జీవింప జేయడానికి, కాక్టస్ ( - చేదు వనస్పతి) చిత్రం (2.79) జాతులలో అంటుగట్టడానికి సరైన క్రమం, ఉద్దేశం పునర్జీవింపజేయడమే. ఈ పనిని వనంత కాలానికి కొంచెం ముందుగా చెట్టు యొక్క సుస్తావస్థ మొక్క చివరి అంతంలో నడిపించాలి (జరిపించాలి).

2.79 చిత్రం 2.80 చిత్రం.


2.79 నవారి అంటుగట్టడం (saddle grafting) క్వాక్టస్‌లో సైయన్‌న్ని పెనవేసుకొనేట్టుగా కోసి, తెరచి, అదే ఆకారపు, గాత్రపు అంటుగట్టడం స్టాక్‌పైన చీల్చి, సైయన్‌న్ని స్టాక్‌పైన నవారి చేసేటట్టుగా చేర్చి (కూర్చి) అంటును గట్టిగా బిగించాలి.

2.80 నవారి అంటుగట్టడంలోని వివరాలు - సై-సైమును, స్టా - స్టాకు - కూ-కూడిక.


చీలికంటు గట్టడం (Slit grafting) స్టాకులో సందు మూసుకొంటాయి.

సైయన్ మొక్క అల్లికలను (మెలిక అల్లిక) తయారు చేసేటప్పుడు కొన్ని అంశాల్ని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సంభాగించవేసి (పెనవేసినట్టుగా అంటుగట్టే) అంటు క్రమంగానూ మృదుకుగా మొనదేలి (Sharp) ఉండేటట్టు (gradual tapering) చేర్చాలి. ఉప్పట్టుండి మొనదేలినట్టుగా చేయరాదు. అంటుగట్టేటప్పుడు మొగ్గు యొక్క ఒక గీత పై భాగం నుంచి కోయాలి. అంటు చేర్చే మొదట మొగ్గు ఉండే వైపు కణుపు లావుగా ఉండేటట్టుగానూ, దూరంగా ఉండే భాగం క్రింద ఉండేటట్టుగానూ అల్లికను చేర్చే భాగాన్ని మొనదేలినదిగా







2.80




2.82



2.81



2.83



2.84

ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఈ చేరికను స్టాక్పైన పెట్టేటప్పుడు చేరికలావు (అల్లిక) భాగాన్ని బయట ఉండేటట్టుగానూ, తేలికైన సన్నని చేరిక భాగం స్టాక్కి మధ్య భాగపు వైపును ఉండేటట్టుగా (చిత్రం 2.78) చూసుకోవాలి. అప్పుడు కేంబియం పొరలు బాగా (2.100 చిత్రం) అతుక్కొంటాయి.

వీనియర్ అంటుగట్టడం (వీనియర్ - Veneer) ఇటీవల మామిడి మొదలైన అనేక మొక్కలలోని పిలకలు (మొలకలు) వేయడానికి క్రొత్త క్రమాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. దీన్ని వీనియర్ అంటుకట్టడం (Veneer grafting) అంటారు. వీనియర్ అంటే తేలిపొర పొందిక సైయన్ నుంచి 2.3 మొలకలన్నీ వీనియరుని అంటిస్తారు. స్టాక్పైన తేలికైన నష్టమైన అదే సైజు వీనియర్ని కోసి మొలకల వీనియర్ని అంటుగడతారు. ఆ తర్వాత ఈ రెండింటికీ బాగా సంవర్షం కలగడానికి కడతారు. క్రింది చిత్రంలో ఇంకొక రకపు వీనియర్ క్రమం చిత్రపటమిడింది.

**చీలికతో అంటుకట్టడం (చీలికంటు గట్టడం slit grafting):** ఇది పైన పేర్కొన్న క్రమాలకన్నా సులభమైంది. స్టాక్ మొక్క తోలు (చిప్ప) లో రెండు అంగళాలంత ఏటవాలుగా చీలికను చాకుతో చేయాలి. చాకు మొక్క అంచు లోపలి చెట్టుని (చెట్టు లోపలి భాగాన్ని) ముట్టుకోవాలి (తాకాలి). దాన్ని పీకేయకూడదు (ఊపరాదు). సైయన్కి క్రింది భాగాన్ని ఒక అంగుళమంత పెన వేసినట్టున చీలిక సందులు త్రోసి సైయన్ మొక్క రెమ్మ ఏదిక్కులో రావాలో ఆ దిక్కుకు ఈ పెనవేసినట్టునున్న దాన్ని త్రిప్పి పెనవేసినట్టి దాన్ని చీలిక సందులో గట్టిగా అంటుకోవడం చేత ఈ కూడిన చోటుని (స్థలాన్ని) నారుతో బిగించాల్సిన అవసరంలేదు. అయితే సందుని మైనంతో నింపాలి. బయట కూడ పూయాలి. (చిత్రం 2.85).

పూర్వం ఈ బెండల క్రమం ఎక్కువ అవరణలో ఉండేది. దీనికి కారణం ఇది సరళంగా ఉండటమే కాకుండా, విజయవంతంగా అయ్యేది. ఈ పద్ధతిలో జయం నిశ్చయం. ఇటీవల ప్రాచీన వండ్ల చెట్లను పునర్వ్యవస్థీకరణకి లేదా ప్రాచీన చెట్లపైన కొత్త జాతులతో అంటుగట్టడానికి ఈ బెండల క్రమంతో కొన్ని ఊర్పులు జరిగినవి. బెండల ఆకారంలో సైయన్ని కోయడానికి బదులు క్రింది అంచు భాగం వలె లేదా దువ్వైన లాగ కోసి స్టాకును చిల్చడానికి బదులు స్టాక్ మొక్క తొడిమని చీల్చి బేపును కూర్చడం ఒక యోర్పాటు. ఈ క్రమాన్ని కిరీటం లేదా తొక్కతో అంటుగట్టడం (Crown or rind grafting) (చిత్రం 2.81) అంటారు.

2.81 కిరీటం లేదా చిప్పతో అంటుగట్టడం (Crown or rind grafting) a. సైయన్ని పై విధంగా ఏటాలుగానో క్రింది భాగంలో ఉలివలె ఉండే అడుగు భాగంలాగో కోయాలి. b. స్టాక్ తోలుని (చిప్పని) పై విధంగా రెండు మూడు చోట్ల క్రింది భాగం వలె ఒకేవైపులో చీల్చి చిక్కించాలి. c. సైయన్ని చిప్పలోని చీలికలో కూర్చి, చేర్చిన భాగాన్ని కట్టి అంటుగట్టే మైనాన్ని పూయాలి.

ఈ క్రమపు వివరాలు చెట్టు మొక్క పెద్ద రెమ్మలను, అనుకూలమైతే కవలను చీల్చిన వైపు నుంచి ఒక అడుగు దూరానికి సరిగా రంపంతోనో, ఘచ్చకతోనో కత్తరించాలి. ఈ విధంగా చేసినప్పుడు లోపలి చెట్టు దిండు (లావు) దాని చుట్టూ ఉన్న ఈ మొండి స్టాక్ పైన 2 నుంచి 6 సైయనులను కూర్చవచ్చును. ఈ సైయనులను ఏటాలుగా ఉలి అడుగువలె సుమారు ఒకటిన్నర (1½) అంగుళమంత కోయాలి.


అన్ని సైయన్సులను కూర్చు (చేర్చు)తామో అన్ని చీలికలను చిప్పలో (తోలులో) మొండి దిండు (కండ) చుట్టూ వేయాలి. ఒక్కొక్క దానిలోనూ ఒక్కొక్క సైయన్స్ని చేర్చాలి (కూర్చాలి). చేర్చేటప్పుడు. తోలు (చిప్ప) చీలికను కొద్దిగా ఎత్తి కూర్చాలి. (చేర్చాలి / పెట్టాలి) కోసిన భాగాన్ని లోపలికి, సైయన్స్ని మొక్క చిప్పని బయటకు ఉండేటట్లు చేర్చాలి. సైయన్సులు కదలకుండా ఉండేటట్లుగా అరటి నారతో లేదా రఫియ (Raffia) నారతో బిగించి కోసిన భాగం పైనంతా అంటుమైనాన్ని పూయాలి. సైయన్సులను మొండి కాండపు చుట్టూనూ కిరీటంలాగ కూర్చుట చేత దీన్ని కిరీటపు అంటుగట్టడం అని వ్యవహరిస్తారు. ఒక్కొక్క చిప్ప నుంచి (చీలిక నుంచి) ఒక్కొక్క రెమ్మ చిగురిస్తుంది.

ప్రాచీన చంద్ర చెట్లను పునర్జీవించజేయడానికి ఇంకా కొన్ని అంటుగట్టే క్రమాలన్నాయి. ఇటువంటి అతి ప్రాచీన చెట్లకి ప్రక్కనున్న రెమ్మలనో, సైనున్న రెమ్మలనో దీనికోసం (అంటుగట్టడానికి) వేరుగా కేటాయించి ఆ చెట్టును చదరంగా రూపొందించడానికి (Frame working) గూటపు అంటుగట్టడం (Stub grafting), ప్రక్కన ఒక వైపు అంటు గట్టడం (Side grafting) ప్రక్కంటు చీలిక తో అంటుగట్టడం (చీలికంటూ) చిప్ప లేదా తోలుతో అంటు గట్టడం (చిప్పంటు / తోలంటు) (Bark grafting) మొదలైన క్రమాలున్నాయి.


ఈ విధంగా చెట్ల రూపాన్ని సరికేయడానికి చెట్టులోని చీలికలను అలాగే మిగుల్చుకొని (ఉంచడానికి) అడ్డదిడ్డంగా పెరిగిన పెద్ద, చిన్న రెమ్మలను, గూళ్ళను అంటుగట్టడానికి ముందే కత్తరించాలి. గూటిలో అంటుగట్టడం (గూటింటు) (Stub grafting) ముఖ్య రెమ్మకి కావల్సినంత దగ్గరున్న చిన్నవైన ప్రక్క రెమ్మల్ని అంటుగట్టడానికి ఏరుకోవాలి. దానిపైన సైయన్స్ని పెట్టి అంటుగట్టాలి (అంటుగడతారు). మొక్క మిగిలిన అంటుగట్టే క్రమాలలో ముఖ్య రెమ్మలపైనే అంటుగడతారు. మూడు నాల్గు పిలకలన్న మొలకలన్న సైయన్ మొక్క క్రింది భాగాన్ని గూటిలాగ కోసి (గూడులాగ) స్టాక్ మొక్క రెమ్మపైననూ ఇదే ఆకారాన్ని కోసి కొద్దిగా ఏటవాలుగా కూర్చాలి (చేర్చాలి). అంటుగట్టే భాగాన్ని స్టాకుకి కట్టి అంటుమైనాన్ని పూయాలి. అంటు అంటిన తర్వాత సైయన్స్ని కొద్దిగా దూరానికి ( కొద్ది దూరానికి రెమ్మను కత్తరిస్తారు) (చిత్రం 2.82) సైయన్ గూటపు రూపంలో ఉండటంచేత ఈ క్రమానికి గూటపు అంటుగట్టడమని వ్యవహరిస్తారు.

2.82 గూటపు అంటుగట్టడం (గూటం/మొద్దు చెట్టు కొట్టగా మిగిలిన భాగం అంటు) Stub grafting a. సైయాన్ని గూటంలాగ కత్తరించడం. b. స్టాక్ పైన అదే ఆకారపు గాత్రపు అంటుని తీసి గుంటను చేసి, సైయాన్ని మొనదేల్చి సందులోపల చిక్కించాలి.

ఈవిధంగా ఉంటే మాత్రం స్టాక్ మొక్క తోలు చిప్పని లోపలి చెట్టునుంచి (లోపలి బెరడు నుంచి) సులభంగా లేసి, మొలకెత్తించజేయవచ్చును. ఈ విధంగా లోపలి బెరడు నుంచి సులభంగా వేరే అయ్యే లేదా లేవలేని తోలున్న స్టాక్ పైన మొక్కని లేదా పిలకల్ని వెయ్యాలి. అప్పుడు మాత్రమే పిలకలు బాగా త్వరగా అంటు కొంటాయి. కొన్ని సమయాలలో స్టాకులు నీరు లేకుండా కాండం వాడి, చిప్ప సులభంగా బలవడానికి రాక పోవచ్చును. అప్పుడు నీరుకట్టి ఒకవారం ఆయిన తర్వాత మొలకల్ని వేయాలి. గులాబీలో సైయన్ మొలక,




2.85



2.86



2.87



2.88

స్థాకూ, మొలకెత్తడానికి, మొలకెయ్యడానికి సిద్ధంగా ఉందనే విషయం తెలుసుకోవడం సులభం. ముళ్ళ సులభంగా జాలు లేకుండా విరిగేటటువంటివైతే, విరిగిన కొమ్మ భాగం వంకర టింకరగా లేకుండా ఉంటే, తేమతో ఉంటే అటువంటి రెమ్మల మొలకలు, మొలకెత్తించడానికి యోగ్యమైనవి. అటువంటి స్థాకులు మొలకెత్తిన జేయడానికి సిద్ధంగా వున్నవని అర్థం. అంటుకట్టిన తర్వాత స్టాక్ రెమ్మను ఏ చోట కత్తిరించాలనే చుక్కల గీత ద్వారా చూపబడింది. వక్కంటు లేదా పార్వ్యంటు (Sidegrafting) ఇందులో ముఖ్యంగా మూడు రకాలు. ఈ అంటు క్రమాలలో సైయన్ స్టాక్ కి ప్రక్కన (పార్వ్యాన్న) కూర్చుండం చేత దీనికి పేరు కలిగింది. గూటపు అంటుగట్టడంలోనూ సైయన్ న్ను గూటాన్ని స్టాకుకి ప్రక్కన కూర్చున్న (చేర్చు) ఇది కూడా పార్వ్యాంటు ప్రక్కంటువుతుంది. రెండో రకంలో సైయన్ నాలుకవలె ఉంటుంది. (చిత్రం. 2.83, 2.84).

2.83 పార్వ్యాంటు లేదా వక్కంటు (side grafting) స్టాక్ లో T ఆకారపు చీలిక తీసి, సైయాన్ని కూచు (Sharp) లేదా మొనదేలేట్టుగా చేయడం. సైయాన్ని చీలికలో కూర్చి కట్టడం. చుట్టూ అంటు మైనాన్ని పూయాలి.

2.84 పార్వ్యాంటు (ప్రక్కంటు గట్టడం) మొక్క మరొక రకం ఇందులో స్టాక్ లో ఏటవాలుగా కొద్దిగా లోతుకి అంటుగట్టబడింది. ఇందులో దూరేటట్టు (చేరేటట్టుగ) సైయన్ కోయబడింది.

ఈ క్రమంలోనూ సైయన్ న్ని ప్రక్కనే చేరుస్తారు. (చూడండి నాలుకంటు గట్టడం). మూడో క్రమంలో సైయన్ న్ని ఒకచోట క్రిందకేసి, దానికి సరిపోయేటటువంటి స్టాక్ క్రింద భాగాన్ని ప్రక్కన అదే రకపు అంటువేసి, రెండింటినీ చేరుస్తారు. దీన్ని వనియర్ అంటుని (వనియర్ అంటుగట్టడం) అని అంటారు. (చిత్రం 2.100 చూడండి).

తోలు (చిప్ప) తో అంటుగట్టడం (Bark grafting) చెట్ల బెరడు (చిప్పతోలు) లో 7 ఆకారపు చీలిక చేసి పై భాగాన్ని కొద్దిగా ఎత్తి కోసిన సైయన్ న్ని (మొనదేలిన భాగాన్ని) చూపున (Shaped edge) దీని లోపలికి చిక్కించి (దూర్చి) ఒక మేకుని కొట్టాలి. ఆ తర్వాత అంటు గట్టే భాగాన్ని, చీలికనీ అంటు గట్టే మైనంతో అంటుగట్టే చోట (ప్లంంలో) గాలి, నీరు దూరకుండా ఉండేటట్టు పూయాలి. (చిత్రం 2.86, a - e).

2.86 (a - e) తోలు (చిప్ప) మొలక అంటుగట్టే మరొక రీతి b - c సైయన్ న్ని మొనదేలేటట్టుగా చేయడం a. స్టాక్ లో తలక్రిందులైన L ఆకారపు లోపలి అంటుని (లోపల తలక్రిందులుగా చెక్కడం). d. సైయన్ న్ని ఈ చెక్కిన దాంట్లో దూర్చాలి (చిక్కించాలి). జారకుండా మేకుని కొట్టాలి. e. కూడిక పైన అంటుగట్టే మైనాన్ని పూయాలి.

పైన చెప్పిన క్రమాలు పాత (ప్రాచీన) చెట్లను పునర్ ఉత్పాదనకి, పునర్జీవింప చేయడానికి అనుసరించే (కేవలించిన) అంటులోని క్రమాలు. ఇతర అంటుగట్టే క్రమాలు.

### చీటి (కొరడా) నాలుకతో అంటుగట్టడం (Whip and Tongue Grafting)

సామాన్యంగా ఈ క్రమాన్ని లేతదైన, ఒకటి రెండు సంవత్సరపు స్థాకులపైన అంటుగట్టడానికి అనుసరిస్తారు. మొదట స్థాకును సైయన్ న్ని ఏటవాలుగా 1-2 అంగుళాలంత కత్తిరించి ఆ తర్వాత రెండింటిలో

లంబకోణంతో లంబంగా చీల్చాలి. ఈ చీలిక నాలుకవలే ఉండాలి. (చిత్రం 2.87, 2.88).

2.87 నాలుకతో అంటుకట్టడం (Tongue grafting) సైయన్స్ ను నాలుకలాగ కోయాలి. స్టాక్ ను కూడా అదే రీతిలో కోసి రెండింటిని కూర్చి (చేర్చి) కట్టాలి.

2.88 (a - e) నాలుక వంటి ఆకారంతో అంటుగట్టడంలో (నాలుకంటుగట్టడంలో) ఇంకొక రకం a. సైయన్స్ ను ఏటవాలుగా కోసి అందులో నాలుకను విడిపించాలి (వేరు చేయాలి). b. స్టాకులోనూ అదే గాత్ర ఆకారపు గాటు చేయాలి. c. రెండింటిని బాగా సంవర్ధించి ఏర్పడేటట్లుగా చేర్చాలి. d. దీవును చుట్టడం క్రింద నుంచి పైకి చుట్టితే అంటుపైన వర్షపు నీరు దిగదు. e. మైనం పూసి దీవు చివరను వెలువలికి విడవాలి.

అంటుగట్టిన తర్వాత దీవుని విప్పడానికి వీలవుతుంది. సైయన్ మొక్క నాలుకను స్టాక్ మొక్క చీలికలో చిక్కించి (దూర్చి) అంటుకట్టే భాగాన్ని నారతో బిగించాలి. ఈ భాగం నేలపై ఉండే దానికి బయటి (వెలువనున్న) తేమ అంటుకుండా, అంటుగట్టడానికి ఉపయోగించే మైనాన్ని పూయాలి. సామాన్యంగా ఈ నాలుక అంటుగట్టే క్రమాన్ని వేరుపైన అంటుగట్టడానికి ఉపయోగించడం పరిపాటి. వేరు పై అంటుగట్టినప్పుడు అంటు మైనాన్ని పూయాలైన అవసరం లేదు.


ఈ క్రమాన్ని స్టాకు, సైయన్ ఒక గాత్రంగా వుంటే ఉపయోగిస్తారు. లేత పండ్ల మొక్కలను అంటు గట్టడానికి ఈ క్రమం అనుకూలమవుతుంది. కాండంపై అంటుగట్టేదైతే దాన్ని నాల్గు అంగుళాల ఎత్తులో ఉండేటట్లు కత్తిరించాలి. సామాన్యంగా సైయన్ కూడా నాల్గు అంగుళాల ఎత్తులో ఉండేటట్లు కత్తిరించాలి. సామాన్యంగా సైయన్ కూడా నాల్గు అంగుళాలంత పొడవు ఉంటుంది. కూర్చేటప్పుడు (చేర్చేటప్పుడు) స్టాకు, సైయన్ కత్తిరించిన భాగం ఒక దానికొకటి బాగా అంటుకుంటే త్వరగా అంటు కొమ్మ చిగురిస్తుంది.

దీనికన్నా సరళమైంది మెలి అంటుగట్టడం (Splice grafting) రెండు చెట్ల ముక్కల్ని కోసి మెలి తిరిగినట్లుగా (అతుక్కునేట్లుగా) స్టాకు, సైయన్ నులను ఏటవాలుగా కత్తిరించి ఒకదానిపైన ఇంకొక దాన్ని కూర్చి (చేర్చి) నారతో బిగించాలి. ఈ క్రమంలో ఒక నాలుక వంటి చీలిక అననుకూలమయింది. కట్టేటప్పుడు సైయన్ ను జారేకేంద్రియం పారల సంవర్ధించి తప్పిపోవచ్చును. అలా జారకుండా కట్టి, కట్టిన తర్వాత మైనం పూస్తే పై చెప్పిన ఇబ్బంది ఉండదు (చిత్రం 2.89).


2.89 మెలి అతుకు అంటు గట్టడం (Splice grafting) వాలా సులభమైన అంటుగట్టే క్రమం. స్టాకునీ, సైయన్ ను ఏటవాలుగా కోసి, కట్టెలు మోపు కట్టినట్లుగా చేర్చి కట్టాలి.

ఈ రెండు క్రమాలలోనూ స్టాకు లావుగా సుమారు ముక్కాలు అంగుళం (2 సెం.మీ.) కన్నా ఎక్కువ లావుగా ఉంటే అందులో చేర్చిరాదు. ఎందుకంటే నాలిక చీలికల్ని చేయడం అట్టుగట్టడం కష్టమవుతుంది.


అప్రోచ్ అంటు లేదా ఇన్ ఛార్జింగ్ సామాన్య అంటు లేదా ఒక చెట్టు కొమ్మని వరకకుండా మరొక దాంతో అంటుగట్టడం వెంటడించే అంటు లేదా కమాసు (ధవన్యు) అంటు (Approach graft or inarching)



2.89



2.90



2.91

క్రమం, మొక చెప్పబడిన క్రమాలకన్నా కొద్దిగా వేరుగా వుంటుంది. ఆ క్రమాలలో స్థాకుకి మాత్రమే వేరుంటుంది. సైయన్కు వేరుండదు. అయితే ఆస్టోచ్ అంటు క్రమంలో స్థాకుకి, సైయన్కి రెండింటికి వేర్లుంటాయి. సైయన్కు సొంత వేరున్నప్పుడే దీన్ని స్టాక్ తీగకి చేర్చి, రెండూ చేరుకునేట్టుగా చేసి, అంటు అంటుకొన్న అంటునే సైయన్ని దాని వేరు భాగం నుంచి వేరుచేసి ప్రత్యేక మొక్కగా చేస్తారు. ఇదే ఈ క్రమపు వైశిష్ట్యం.

సామాన్యంగా ఇతర అంటుగట్టే క్రమాలలో సైయన్ని స్థాకు పెరుగుతున్న చోటుకు తీసుకొచ్చి స్టాక్పైన కూర్చోబెడతారు. కాని ఈ క్రమంలో స్టాక్ మొక్కల్నే సైయన్ ఉండే తీగ మొక్క దగ్గర వేస్తారు. ఈ విధంగా వేయడానికి (సాగించడానికి) స్థాకు చెట్లను కుండలలో పెంచుతారు. సైయన్ చెట్టు చిన్నదిగా ఉంటే దాని తీగే ఈ స్థాకు మొక్కల్ని పెంచడం కలదు. అందువేత యీ క్రమాన్ని సమీప్య వెంబడించే క్రమమని అంటారు. ఈ క్రమపు విధానాలు.

స్టాక్ కంద, సైయన్ రెమ్మను ఒక దానికొకటి అభిముఖంగా ఉండేటట్టు పొడవుగా కోస్తారు. కోసేటప్పుడు చాకుని కొద్దిగా లోపలి మొక్కకి చెట్టుకి గుచ్చి కోస్తారు. ఈ కోసిన భాగాన్ని ఒకదానికొకటి అంటుకునేట్టు (పొందుకునేట్టుగా) చేసి (చిత్రం 2.90) నారుతో కట్టి మైనం పూస్తారు.

2.90 (a - c) సమీప్య (వెంబడించే) లేదా ధనస్సు (కమాను) అంటుగట్టడం (Approach grafting; Inarching) చాలా సులభమైన క్రమం స్థా - స్థాకు, సై - సైయాను, క - కత్తిరికి a. స్థాకులోనూ సైయాన్లోనూ ఒకే గాత్రపు చీలికను చీల్చాలి. b. స్థాకుకి సైయన్కి సమీప్యం (వెంబడించే) లేదా కమాను బిగించి చీలిన భాగాలు ముద్దగా ఉండేటట్టు చేసి, బీపు చుట్టాలి. c. ఈ చేరిన సంతక స్థాకు మొక్క పై భాగాన్ని సైయన్ మొక్క క్రింది భాగాన్ని కత్తిరించాలి. కొంత కాలమైన తర్వాత ఈ స్థాకు సైయన్ భాగాలు ఒకటై కలిసిపోతాయి. ఒకటైనవని దృఢపరచుకొన్న తర్వాత సైయన్ మొక్కని అంటుక్రింద కత్తిరించి వేరు చేస్తారు. అలాగే అంటు సై భాగంలో స్టాక్ మొక్క ఇతర భాగాన్ని కత్తిరించివేస్తారు.

ఈ క్రమంలో స్థాకుని సైయన్ని ఒకటిగా చేర్చేటప్పుడు రెండింటిని కమాన్ (ఆర్బీలాగా) బిగించాల్సి వచ్చినందున దీని కమాన్ (ఆర్బీ) అంటుగట్టడమని వ్యవహరిస్తారు.

ఈ అంటుకట్టే క్రమం కొద్దిగా వ్యాకులతతో కూడిన వని. అనేక సమయాలలో సైయన్ చెట్టు ఎత్తునకు పెరిగినప్పుడు స్థాకు మొక్కలకు సైయన్ తీగ అండేటట్టుగా కట్టో, రాళ్లు కుండలను పేర్చే, అటక వేసియో, ఈ విధంగా చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ విధంగా ఉన్ననూ ఈ క్రమం నుంచి అనుకూలాలూ ఉన్నాయి. 2.91 చిత్రం.

2.91 సైయన్ మొక్క రెమ్మలు పైకున్నప్పుడు (ఎత్తుగానున్నప్పుడు) స్టాక్ మొక్కలను పైకెత్తవచ్చును. లేదా ఇటుకల్ని పేర్చి అంటు కట్టవచ్చును.

1. ఇతర సస్యోత్పాదన క్రమాలు అనుసరించలేనప్పుడు (అనుసరించలేని సందర్భంలో) లేదా ఈ క్రమాలకి



లోంగని నవ్య జాతులలో ఈ ఆప్రోచ్ అంటుకట్టే క్రమమే జయప్రదం. మస్కడిన్ ద్రాక్ష వెన్న పండు, మామిడి మొదలైన వాటికి ఈ క్రమం అనుకూలమైంది.

2. ప్రాచీన చెట్ల రెమ్మలు అడ్డదిడ్డంగా ఉండి చెట్టు భారం అనమానంగా ఉంటే రెమ్మలు ఒకే వైపు ఉండి చెట్టు ఒకవైపుకి ఉండి చెట్టు ఒకవైపుకి వాలుంటే వీటికి గట్టిగా పట్టుకొనే రెమ్మలు (brace) కలగజేయడానికి ఒక రెమ్మని మరొక రెమ్మ జతపరచడానికి ఈ క్రమం అనుకూలం. ఏ అంటుకట్టే క్రమంలోనూ ఈ విధంగా చెట్టును గట్టిపరచడం చాలాకష్టం.
3. అదేవిధంగా ప్రాచీన చెట్లు ప్రక్కనే ఉంటే - ఇంకొక జాతి చెట్టుని పెంచి దీన్ని పెద్ద చెట్టు రెమ్మకు ప్రాకించి. చేరస్తే (ఒకటిగా జతపరస్తే) చెట్టుకి ఊత దొరుకుతుంది. కొన్ని సంవత్సరాలైన తర్వాత ఈ లేత మొక్క కూడా పెద్ద చెట్టుక్క భాగమవుతుంది.
4. కొన్ని అంటుకట్టే మొక్కలలో స్టాక్ యొక్క భాగం రోగిష్టిదవ్వడము జరుగుతూంటుంది. నిమ్మ చెట్లలో ఈ విధంగా అవుతుంది. అటువంటప్పుడు మొక్కలకి (చెట్లకి) కొత్త స్టాకుని కేటాయించడానికి చెట్టు ప్రక్కనే కొన్ని స్టాకులను పెంచి వీటిని పాత (ప్రాచీన) చెట్ల తీగలకు ప్రాకించి అంటుగడతే కొత్త స్టాకులను కేటాయించి నట్టువుతుంది.
5. నవనీత కోసం ఇటలీ మొదలైన దేశాలలో మట్టు ప్రక్కల పెరిగిన పెద్ద చెట్ల పై భాగాన్ని (నెత్తిని) వంచి ఒకే చెట్టైయ్యేట్లుగా ఈ అంటుకట్టే క్రమాన్ని అనుసరిస్తారు. దీనికి రెండు క్రింది భాగాలు ఒకే పై భాగం (నెత్తి) ఉన్నట్టువుతుంది.

#### మొలకలేయడం మొలకల (మొగ్గల) అంటుకట్టడం (Budding or Bud grafting)

పైయన్ మొక్క మొగ్గ లేదా మొలకలను స్టాక్ పైన కూర్చి (చేర్చి) ఒకటిగా చేసి ఈ క్రమానికి మొగ్గ అంటు గట్టడం అని అంటారు. ఈ క్రమం ద్వారా అనేక అనుకూలాలున్నాయి. ఒకే పైయన్ చెట్టునుంచి ఎక్కువ సంఖ్యలో మొలకలు లభించడం చేత ఎక్కువ స్టాకులకు అంటుగట్టవచ్చును. మొలక ఇతర సస్యభాగాల కన్నా త్వరగా అత్తుకోవడం చేత మొలక / మొగ్గ అంటుకట్టడం ఎక్కువ జయప్రదమవుతుంది. ఎక్కువ మొక్కల్ని చేరో త్వరగా ఉల్పాదన చేసుకోవచ్చును.

ప్రాచీన చెట్లనూ, మొక్కల్ని పునర్జీవించేయడానికి ఈ పద్ధతి చాలా తక్కువ శ్రమతో కూడిన పని. మొలక మొగ్గ అంటుకట్టడం జయప్రదమవ్వడానికి కొన్ని నియమాల్ని పాటించాలి.

1. మొలకకై స్టాకు (వీలక స్టాకు) గట్టి మట్టిగా ఉండే స్థలపు మన్ను, గాలి గుణానికి జతకూడేట్లుగా ఉండాలి.
2. స్టాక్ మొక్క వేరు బాగా వ్యాపించి పెరుగుండాలి.
3. స్టాకు రోగరహితంగా ఉండాలి.

4. స్టాకు జాతికి, సైయన్ మొక్క జాతికి విరోధముండరాదు. వాటికి దగ్గర సంబంధముండాలి.

5. స్టాకులో నస్యరసం (Sap) చురుకుగా పరిభ్రమిస్తుండాలి (చలిస్తుండాలి).


దాలు అంటు గట్టడం లేదా T - అంటుగట్టడం

దీన్ని గులాబి, సపోదా, పీచు, నిమ్మ మొదలైన వండ్ల చెట్లకు అంటుగట్టడానికి అనుసరిస్తారు. ఈ క్రమపు వివరాలు ఈ క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

పుష్టిగా వుండి, సువ్రంగా వుండే (పెరుగుదల అగిపోయిన) మొగ్గలున్న రెమ్మ ఎన్నుకోవాలి. ఆకు (పిడి) సగం (అర్థం) మిగుల్చుకొని మిగిలిన ఆకు భాగాన్ని కత్తిరించి వేయాలి. మొగ్గనుంచి సుమారు అర్థ అంగుళం క్రింద చురుకైన మొనదేలిన చాకుతో రోపలి వరకు చాకును పోనిచ్చి, పైకి త్రిప్పి, పై భాగం నుంచి చాకును బయటకు తీయాలి. ఈ విధంగా చేసినప్పుడు ఒక మొలక (పిలక) దాన్ని వట్టుకోవడానికి ఆకు కాడల గూడు, మొలకకి చేరి యుండే తొడిమి ముక్క, ఈ ముక్క యొక్క ఒక భాగంలో కొద్దిగా రోపలి కాండం దూరుకుంది. చాకు మొనతో ఈ కాండపు తాటను చాలా జాగ్రత్తగా మొలకకు దెబ్బతగలకుండా వేయాలి. మిగిలిన మొలకల ముక్కని దాలు ఆకారంలో బ్లేడుతో సరిగ్గా కత్తిరించాలి. ఆ తర్వాత మొలకను పెట్టువోట T- ఆకారంలో అంటే కొంత అడ్డంగా, కొంత పొడవున మొనదేలిన చాకుతో తొడిమిపైన అంటుచేయాలి, ఈవిధంగా కత్తిరించిన (incision) తొడిమిని చాకు యొక్క కొన భాగంలో లేపి, నోరు విప్పినట్టు చేసి దాలులాగా చేసిన మొలక ముక్కల్ని ఆకు గూటంతో వట్టుకొని, నాజాకుగా ఈ తెరిచిన తొడిమి రోపల చిక్కించి మొలకను వదలి మిగిలిన భాగాన్ని బేపుతోనో, నారతోనో, ప్లాస్టిక్ పట్టీ చేతనో బిగించాలి (చిత్రం 2.92).

2.92 దాలు రూపపు మొక్కల మొలకల్ని వేయడం (Shield or T. budding) స్టాకుతో T- ఆకారపు అంటుగట్టడం, సిరిజాతి చెట్టు యొక్క రెమ్మల మొలకలను దాలు రూపంలో లేపడం, స్టాకు యొక్క అంటు చెవులను వంచి మొలకని దీనిరోపల దూర్చి, ప్లాస్టిక్ బేపుతో బిగించాలి. అప్పుడు మొలకల కేంబియం పొర, స్టాక్ యొక్క కేంబియం పొర సంవర్ధం పొందుతాయి. కొంతకాలం తర్వాత, మొలక స్టాకుతో కూడి చిగురిస్తుంది.


ఈ మొలకల అంటుగట్టడాన్ని వల్లని వేళలోనో, మబ్బుగా వున్నప్పుడు అంటుగట్టడం మంచిది. మొలకలు మొలకెత్తిన తర్వాత దాన్ని త్వరగా స్టాకుపైన కూర్చోబెట్టాలి. (స్టాకుతో చేర్చాలి) మొలకను ఎండిపోకుండా చూడాలి. రోపలి భాగపు మొలకలు లేకుండానే మొలక మాత్రమే మొలకెత్తవు. ఈ విధంగా పెంచిన మొలకలను ఎత్తుడు మొలక (క్రతుక పిలక) (Flipping or popping bud) పిల్ల ఎత్తు చేతుల మొలక అని అంటారు. వానాకాలంలో లేదా వాన ఎక్కువగా వుండే ప్రదేశాలలో T - బదులుగా తలక్రిందులుగా ఉండే అంటే ఆకారంలో అడ్డంగా అంటుకట్టే క్రింది భాగంలో ఉండేటట్లు అంటుగట్టడం కలదు. (చిత్రం 2.93) అప్పుడు అంటుగట్టిన మొక్క యొక్క నోరు తలక్రిందులుగా తెరుచుకోవడం చేత నీరు (వాన నీరు) రోపలికి చేరదు. పిలక కుళ్ళుదు.



2.92



2.93



2.94

2.93 డాలు అంటుగట్టుటలో ఇంకొక ఆకారం, ఈ పద్ధతినందు అంటు T - ఆకారానికి బదులు, తలక్రిందులుగా చేయుట. టేపును సరిగ్గా బిగించి మొలకల అంటుగట్టిన ప్లానికి అంటు మైనాన్ని పూయాలి.

సామాన్యంగా అంటును కూర్చే స్టాకు మొక్క రెమ్మ  $\frac{1}{2}$  -  $2\frac{1}{2}$  సెం.మీ. లావుగా వుండాలి. దానికంటే తేలికైనది, లేదా లాచైన రెమ్మలు అంటుగట్టడానికి యోగ్యమైనది కాదు. సీసపు కడ్డీ అంత మందం గల రెమ్మని మొలకెత్తించడానికి అంటు గట్టడం చాలా యోగ్యమైనది. స్టాకు మొక్క తొడిమి బాగా పెరిగేటట్టుగా వుంటే ఆ మొలకను ఏ కాలంలోనైనా అంటుగట్టవచ్చు. సైయన్‌న్ని సామాన్యంగా ఆ సంవత్సరంలో పెరిగిన కొమ్మ క్రింది భాగం నుంచి ఏరుకోవాలి. మొలకను అంటుకొని చిగురించిన తరువాత చుట్టిన టేపును బయటకు తీయాలి. (2.94) ఆ తర్వాత అంటు గట్టిన పై భాగం పై స్టాకుని కత్తిరించాలి. మొదట అంటునుంచి 15 సెం.మీ. పై భాగాన్ని కత్తిరించి కొన్ని రోజులైన తర్వాత  $1\frac{1}{2}$  -  $2\frac{1}{2}$  సెం.మీ. పైన భాగాన్ని కత్తిరించాలి.

2.94 మొలకెత్తిన కొంత కాలం అయిన తర్వాత మొలకలు వికసించడానికి, విస్తృతంగా పెరగడానికి, టేపును కొంచెం, కొంచెంగా సడలిస్తూ వుండాలి.


ఈ అంటు గట్ట క్రమం చాలా మందికిష్టమైన క్రమం. కాని ఇది చాలా నేర్పుతో కూడుకొన్నవని. నైపుణ్యము వుంటే రోజుకు వెయ్యికి పైగా మొలకల్ని వేయవచ్చును.

### అతుకు అంటుగట్టడం (Patch budding)

ఈ క్రమంలో మొలకలు చిన్నడాలు ఆకారంలోనో లేక, అతుకులాగా వుంటుంది. చిట్కెన ప్రేలంత లావుంటుంది. స్టాకుపైన చాలా మొనదేలిన చాకుతో ఆ ఆకారంలో తొడిమిని లేపాలి. ఇదే ఆకారంలోనూ, ఇదే మందంతో సైయన్‌నుంచి లేపి, స్టాకు అంటుపైన కూర్చోబెట్టాలి. మొలక ఈ ముక్కల మధ్య ఉండేటట్టుగా కత్తిరించాలి. ఈ అతుకుల అంటుకి సుమారు రెండు సంవత్సరాల రెమ్మతో బలసిన మొలకలు సరి అయినవి. అతుకు స్టాకుని బాగా అంటుకునేవిధంగా నారతో బిగించి కట్టాలి. నారని మొలకపై బిగించరాదు. అతుకు చేసిన తర్వాత అంటుపైన అంటుమైనాన్ని పూయాలి. మొలక చిగురించిన తర్వాత డాలు అంటులకు చేసే విధమే దీనికి కూడా అన్వయిస్తుంది. ఈ క్రమాన్ని మామిడి, రబ్బరు మొదలైన చెట్లను పెంచడానికి అనుసరిస్తారు. అతుకు వేయడానికి స్టాకు రెమ్మ  $1\frac{1}{2}$  - 10 సెం.మీ. ఉండొచ్చు. ఇది ఏ కాలంలోనైనా అనుసరించ తగిన క్రమం. చిత్రం 2.95.

2.95 అతుకుని అంటుగట్టడం (Patch Grafting) ఇక్కడ పిలకల్ని, తొడిమి లోతు ఆకారంలో కత్తిరించి, స్టాకు నుంచి తొడిమి లోతుయున్న భాగం రెండింటిని చేర్చి టేపుతో కట్టాలి.

ఈ క్రమంలో కొన్ని మార్పులు చేసుకొనవచ్చును. అతుకు ఆయాకారంలో ఉండేటట్టు కాకుండా దీనికి బదులు ఉంగరం ఆకారంలాగా వుండవచ్చును. స్టాకుపైన క్రింద ఒక చుట్టు, పైన ఒక చుట్టు చాకును దూర్చి, ఈ అంటుల మధ్య చాకును కదిలించి ఉంగరంలాగా అతుకును చేయాలి. ఇదే ఆకారంలోనున్న,



295




297



298

296



మందం ఉన్న అతుకుని లేపి, స్టాకు అంటు యొక్క ఉంగరం ఆకారంలోనున్న దానిపైన చేర్చి, నారతో బిగించి, మొలకెత్తిస్తే, స్టాకు క్రింది భాగం నుండి పై భాగం వరకు మొక్క రసం చలించకుండా నీరు ఎక్కుకుండా, పుంగరపు పై భాగం చనిపోవచ్చు. చిత్రం 2.96.

2.96 (a - c) పిలకుంగరాలు, జోడించడం సైయన్ (Ring budding) నుంచి పిలకున్న పుంగరాల్ని తీసి జోడించే క్రమం ఇలా వుంటుంది. a. సీరి మొక్క అతుకును కత్తిరించి మొలకలు పున్న పుంగరాలను చేయాలి. b. ఒక పుంగరం. c. స్టాకులో ఈ పుంగరం మార్చేట్టుగా తొడిమిని చెక్కాలి. d. ఉంగరాన్ని చేర్చడం. e. ఉంగరపు పిలక/మొలక మొలకెత్తుతుండడం.

ఈ క్రమం 1½ - 2 సెం.మీ. లావు పున్న స్టాకులకు సరిపోయే క్రమం. స్టాకుపై T- ఆకారానికి బదులు, H - ఆకారపు అంటును అంటుగట్టడం మరొక మార్పు. ఈ క్రమంలో 2 లంబ కత్తిరింపులు, అవి చేరేట్టుగా ఒక అడ్డ కత్తిరింపు స్టాకు పైన కత్తిరించి తొడిమిని లేపాలి. మొలక అతుకుపైన అంటే మడతలో క్రింది మడతలో అర్థ భాగం ఉండేట్టు చిక్కించి, బిగించి అంటుగట్టడానికి మైనం వూయాలి. ఇదే క్రమంలో చేయాల్సిన వనులు మొలకలలో చిన్న మొలకల్ని తీసేటప్పుడు 2 అడ్డు కత్తిరింపులు 2 లంబ కత్తిరింపులు చేసి మొలకల అతుకుని చేసుకోవాలి. చిత్రం. 2.97.

2.97 H - వలె గాడి తీసిన స్టాకులో H - ఆకారంలో రెండు మూతల్ని చేసి దాని లోపల ఆయాకారపు మొలక అతుకుని చేర్చాలి (కూర్చాలి).

3. **బిచ్చ అంటు (Chip budding) :** ఈ క్రమంలో అంటుగట్టడంతో పాటు, కొద్దిగా కాండపు చెక్కని అంటుగడలాడు. ఈ విధంగా మొలకల్ని మొలకెత్తించడానికి స్టాక్ మొక్క గాత్రం 2 సెం.మీ. అంత ఉండాలి. ఎక్కువ మందం కలిగి ఉండరాదు. స్టాకు కూడా నిద్రావస్థలో ఉన్నప్పుడు అంటే వసంత కాలానికి ముందుగా, చిరుగు రావడానికి రెండు వారాలుండగా, మొలకల్ని చేయడానికి సిద్ధంగా వుంటుంది. ఈ క్రమంలో చెక్కకూడా ఉండటం చేత స్టాక్ పైన కొద్దిగా లోతుగా ఉండేట్టు కత్తిరించాలి. సుమారుగా బాగుండే స్టాకు భాగంపైన 2½ - 3 సెం.మీ. పొడవుగా కాండం లోపలికి కొద్దిగా కత్తిరించాలి. (చిత్రం 2.98).

2.98 బిచ్చ అంటుగట్టడం (Chip budding) సైయన్ నుంచి మొలకున్న ఒక బిచ్చని అంటుగట్టడానికి తీసి, అదేవిధమైన గుంతను స్టాక్ లోనూ చేసి, ఈ రెండింటిని చేర్చి స్టాప్ టేపుతో కట్టాలి.

పైన తెలుపబడిన విధానాలేకాక, మరికొన్ని ముఖ్యమైన క్రింద పేర్కొన్న క్రమాలను నేరేడు, మామిడి, మొదలైన చెట్ల సస్యోత్పాదనలో ఇటీవలి కాలంలో ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. ఫోర్క్ కెట్ట్ అంటుగట్టే క్రమం (Forkert Method) చిత్రం. 2.99.

2.99 నేరేడులో ఫోర్క్ కెట్ట్ క్రమాన్ని అనుసరించవచ్చును. ఈ క్రమం ఈ క్రింది విధంగా వుంటుంది.

a. సైయన్ లో ఆయాకారపు మొలకల అతుకు చేయాలి. b. మొలక అతుకు, c. స్టాకుపైన వాకుని మూడుచోట్ల

దూర్చి, సరివడ మూతని (Flap) లేపి మూతను క్రిందపడేయాలి. d. మొలకలు అతుకును స్టాక్ కట్టలో కూర్చి సరివడ మూత యొక్క అర్థ భాగాన్ని సైకెట్రాలి. e. దీవును చుట్టాలి. f. కొద్ది కాలం అయిన తర్వాత మూతను కత్తరించి మొలకెత్తడానికి అవకాశాన్ని ఏర్పరచాలి.

అలాగే 'H' అంటుగట్టే విధానంలో ఇంకొక, వినియర్ (Veneer) అంటుగట్టడం కొత్త విధానం. ఈ పద్ధతిని మామిడి మొదలైన వాటిల్లో అనుసరిస్తారు (2.100).

2.100 వినియర్ (Veneer) అంటుగట్టడం. ఇటీవల కాలంలో మామిడి మొలకలను మొలకెత్తించడానికి క్రొత్త క్రమాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. దీనిని వినియర్ అంటు (Veneer grafting) అంటారు. వినియర్ అంటే తేలికైన పొర మూత, సైయన్ నుంచి 2.3 మొలకలున్న వినియర్ ను తీస్తారు. స్టాకుపైన తేలికైన అదే సైజులోని వినియర్ ను కోసి, మొలక వినియర్ ను చేరుస్తారు. ఈ రెండింటిని బాగా సంమర్శింపచేయడానికి కడతారు. క్రింది చిత్రంలో మరొక రకం వినియర్ (క్రమాన్ని).

### మైనంత్ అంటుగట్టడం (Grafting Wax)

అంటుగట్టే స్థలంలో తేమ ఆరకుండా ఉండడానికి, గాలి వీచి స్టాకు, సైయన్ ఎండకుండా ఉండడానికి రోగకారకమైన శిలీంధ్రాలు లోపల పోకుండా ఉండడానికి, ఈ స్థలానికి కొన్ని వస్తువులు పూస్తారు. ఆ వస్తువులు మైనానికి సంబంధించినవై యుండొచ్చు. లేదా జీడి అయి వుండొచ్చు. ఇటువంటి వస్తువులను "అంటు మైనం" అని అంటారు. ఉత్తమమైన అంటుగట్టే మైనంలో ఈ క్రింది గుణాలు ఉండాలి.

1. దీని ద్వారా గాలి లోపలికి దూరరాదు, లోపలి తేమ ఎండ కూడదు, శిలీంధ్రాలు లోపల చేరరాదు.
2. అందులో సస్యపు అంగాంగాన్ని వివహారితం చేసే వస్తువు వుండరాదు.
3. చలి కాలంలో ఈ మైనం బీటలు పడరాదు.
4. వేసవి కాలంలో వేడికి ఇది కరిగి పోరాదు.
5. సైయన్ను స్టాకు చేరి పెరిగిన తర్వాత, పెద్దదైనప్పుడు ఈ మైనపు పొరను తీసే వేయాలి, అంటుగట్టే భాగాన్ని పిండకూడదు.
6. దీని వెల ఎక్కువగా వుండరాదు.

సైన్ పేర్కొన్న గుణాలు కొన్ని అంటుగట్టే మైనం వివరాలను, వాటి తయారీ క్రమాన్ని క్రింద చూడవచ్చు.

**A. తేలి మైనం (Hand Wax) :** ఇది చేతితో పూసే మైనం. దీన్ని పూయడానికి మరో ఉపకరణాలు అవసరం లేదు. ఈ మిశ్రమానికి కావలసిన వస్తువులు ½ కిలో చర్చి, 1 కిలో తేనె మైనం, 2 కిలోల అడవి చెట్లనచ్చని పసరు. పీటన్నింటిని కరిగించాలి (మరిగించరాదు). కొద్దిగా ఆరిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని చల్లని నీటిలో పోయాలి. చర్చితో చేతిని జిడ్డు చేసుకొని, చేతితో ముట్టడానికి తగ్గిన వేడిలో నీటి నుంచి సైకి తీయాలి. అప్పుడు

ఈ అంటుగట్టి మైనం రంగు గడ్డి రంగుకి తిరుగుతుంది. దీన్ని వెంటనే ఉండలుగా వేసి, జిడ్డు కాగితంలో మట్టుబెట్టి, ఆ తర్వాత అవసరం వచ్చినప్పుడు ఉపయోగించుకొనవచ్చును. ఆకు వసరు ఎక్కువైతే (Linsseed Oil) వేస్తే, మృదువుగా అవుతుంది. మొదటి రకం వేసవికాలంలో రెండోరకం చలికాలంలో పూయడానికి అనుకూలం.

**B. కుంచె మైనం (Brush Wax) :** బ్రష్ తో పూసేది బ్రష్ మైనం. దీనిని తయారు చేయడానికి కావలసిన సామగ్రి, 2¼ కిలో ఆకువసరు, 500 గ్రా. తేనెటీగల మైనం, 125 గ్రా. అన్నిడ్ ఆయిల్, 250 గ్రా. బొగ్గు పొడి లేదా దీపపు నుసి. మొదట ఆకు వసరును నిదానంగా కరిగించి, ఆ తర్వాత తేనెటీగ మైనం వేసి, దాన్ని కరిగించి, నూనె వేయాలి. ఆతర్వాత బొగ్గు పొడిని వేసి కలపాలి. ఈ మిశ్రమం మైనాన్ని గట్టివరుస్తుంది. ఈ మైనం సామాన్య ఉష్ణంలో గట్టిపడుతూ వుంటుంది. దీన్ని ఉపయోగించాల్సినపుడు, దీన్ని కరిగించాలి. ఒక అంగుళం వెడల్పుగల బ్రష్ ద్వారా పూయాలి. ఈ మైనం బిరడాలను మూయడానికి అనుకూలం, వలుచగా పూయాలి. పూసేటప్పుడు వేడిగా లేకుండేటట్టు చూసుకోవాలి. మైనం కరిగేటట్టు వుండాలి.

**C. మద్య రస మైనం (Alcoholic Brush Wax) :** ఇది కూడా కుంచెతో పూసేటటువంటి మైనం. దీని గుణమేమంటే దీన్ని కరిగించాల్సిన అవసరం లేదు. సామాన్య ఉష్ణంలోనూ ద్రవరూపంలో వుంటుంది. దీని తయారుకు 2 కిలోల ఆకువసరు పొడి, 250 గ్రా. చల్చి, 1 కిలో మద్యరసం (Spirit) కావాలి. చల్చిని కరిగించి ఆకువసరు పొడిని పోసి, ఈ రెండింటిని బాగా కరిగించి నిప్పు మండి వేరు చేయాలి. కొద్దిగా వేడి చల్లాల్సి దీనిలో స్పిరిటును కొద్దిగా పోయ్యాలి. అరిన తర్వాత దీన్ని టిన్నర్ తోనో, సీసార్ తోనో వేసి జాగ్రత్తగా మూసి, గాలిపోకుండా ఉండేటట్టు మూతను మూయాలి. కావలసిన వచ్చినప్పుడు కుంచెతో తీసుకొని పూయాలి. ఎండిన తర్వాత ఈ లేవనం గట్టిపడుతుంది.

**D. మైనపు వత్తుల మిశ్రమంతో మైనం (Paraffin Wax) :** దీన్ని తయారు చేయడానికి కావలసిన సామగ్రి. 500 గ్రా. ఆకు వసరు పొడి, 80 గ్రా. లెస్సిడ్ నూనె, 135 గ్రా. మైనపు వత్తుల మైనం, వసరు, లెస్సిడ్ నూనెను ఒకటిగా కరిగించి మైనపు వత్తుల మైనాన్ని వేరు వేరుగా కరిగించి, రెండింటిని కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని నూనె రాసిన కాగితంపై 1.2 అంగుళాల లావుగా ఉండేటట్టు దోసీలాగా పోయాలి. కావలసిన వచ్చినప్పుడు ఈ ముక్కలను కరిగించుకొని పూయాలి.

మైనపు వత్తి మైనం నుంచి మరొక అంటుగట్టి మైనాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చును. అది ఒక భాగం ఆకు వసరు పొడి, ఒక భాగం తేనె మైనం, రి భాగాల మైనాన్ని చిన్న మంటలో కరిగించాలి. ఇది ద్రవరూపానికి వచ్చినప్పుడు మైనపు వత్తుల మైనాన్ని వేసి కరిగించాలి. మిశ్రమం వలచనైన తర్వాత, పొయ్యి నుంచి క్రిందకు దించి, గట్టి పడడానికి వదిలి వేయాలి. ఈ మిశ్రమం స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. కావలసిన వచ్చినప్పుడు కరిగించి, ఉపయోగించుకొనవచ్చును. ఇది సైయన్స్ పూర్తిగా వంచడానికి, కత్తిరించిన భాగాన్ని అంటుగట్టుడానికి బయటికి వచ్చే మొక్క మొదలైన వాటిని వంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది.



E. అంటుగట్టే జీడి (Grafting Clay) అంటుగట్టే మైనానికి బదులుగా రెండు భాగాల బంక, ఒక భాగం పేడ, రెండటినీ కలిపి, జిగురు వచ్చేంత వరకు చిలకాలి. అంటుగట్టే జీడిని పూయడానికి కొంచెం ముందుగ ఈ మైనాన్ని చేసి పెట్టుకోవాలి.

F. అంటుగట్టే నాడా (Grafting Tape) స్టాకు, సైయన్ చేర్చే భాగానికి అర్థ అంగుళం, వెడల్పు గల్లిన నన్నుని నాడానో, నూలు దారాన్నో కరిగించిన అంటుమైనంలో అద్ది, ఎండబెట్టి, దాన్ని అంటుగట్టుడానికి ఉపయోగించవచ్చు. దీనికి బదులుగా మందార మొదలైన చెట్ల లోపలి కాండాన్ని ఒలిచి కట్టుడానికి మలచుకోవచ్చును. అదేవిధంగా అంటుగట్టే దారాలను, మైనంలో అద్ది ఉపయోగించుకోవచ్చును.

### అనుబంధం

#### (బీజాల సరాసరి మొలకల అవధి చూడండి)

5 రోజులలో మొలకెత్తగలిగినది ఆజిరేటం, అంథేమస్, ఆలివమ్, ఓనోధిరం, ఓణ బిరిస్ (క్యాండెటబ్స్) సెమామియా, కాన్మాన్, కార్నియం, కోరి యాప్పస్, గాంఫ్రెన్, జెరియాఫస్, షినియా డయాంథస్, (పింక్స్) సెమీసియ, మారిగోల్డ్, రెసిడ్ (మినోనీ) పాత ఫ్లవర్, స్టాక్స్, సీడం, స్వీట్ విలియం, పెంబారియం, సైనేగ్జనం, హీలియాండస్ (సూర్యకాంతి).

8 రోజులలో మొలకెత్తే మొలకలు ఆక్రోశీనం, కంప్యాసులు, క్యాలియాప్పస్, కాలిస్సెనర్ (వార్నిక్ ఆప్సరు) క్రిసాంథియమ్ (చామంతి) నాస్టర్షియం, నైజెల్లు, బాల్పమ్, మై ఓ సూటన్, లాడినస్, వర్బిన్, సాలిడాగో.

10 రోజులలో మొలకెత్తే మొలకలు, అంజాన్, ఆకాలిన్, ఆకేలియం, ఆర్క్టోమేనియం, ఆంటరైసం, విక్రీ విరియం, ఎరిద్రైస (హలిదాణం) కార్నేషన్, కాలెంకో, స్లీమామ్, కోలియస్, కెలాండ్యుల, క్రోటరేరియ, గెస్పిరియ, జస్టోపైలు, బెరెనియం, ఫ్యాన్సి, పాపి, ఫ్లాటికోడన్, ఫాసలియ, ఫ్లాక్స్, పెంట్ పైమస్, మిములస్, బ్రాటస్, కాన్వియ, టైథోనియ, డైమాప్రోథిక్, ధన్బర్నియ, లైనేరియ, నయాల, శస్పడేసి, సవనేరియ, స్కాబియోస, స్టాటన్, సినిరేరియా, సిలోషియ, హాలిహాక్ (అల్లింగు).

15 రోజులలో మొలకెత్తే మొక్కలు, ఆకేమినెస్, అనిమోన్, అల్టోమేనియం, ఆప్సర్ (పెరినియల్ ఆప్సర్) మెకీల్మన్, డేసి, ఇంటిఫెన్స్, క్యాక్టస్, క్యాలియాలేరియం, కుచ్చు, కోబియ, గ్లాక్సినియ, గోర్డ్ (ఛెల్సికాయలు) గోడేషియా, జర్నిర, బోరినియ, బ్రోవేలియ, మోరాడియ, యూఫోర్బియ, ర్యానాన్ క్యులస్, ల్యామెడర్, మిక, వెరోనిక్, స్టాక్స్ ప్రాజా, స్టాల్కిగ్యాపిస్, సాల్వియా, నెంపర్వియం, స్ట్రీట్ పిం (లాసైరస్) హెమోర్యోలిస్, హైబిస్కస్.

20 రోజులలో మొలకెత్తే మొలకలు, ఆకోనిటం, ఆగ్నోపాథస్, ఆగ్రోసెమ్మ, వరస్ (ఫ్లాక్స్) గ్లాడియోలస్, గ్రెల్లియా, జకరాండ, జాట్స్ బియర్, నికోటియాన్, ఫర్న్, పుక్కియం, పిసాంథస్, అప్రికన్ వయోలెట్, సోలానం.

## మూడవ అధ్యాయము సస్యజ్ఞేత్రం మట్టి నిర్వహణ

**మట్టి, సస్య జీవనం :**

సామాన్యంగా అన్ని మొక్కలు, చెట్లు మట్టిపైనే పెరుగుతాయి. దీన్ని నిరూపించడానికి కొద్ది ప్రమాణంలో కొద్ది స్థలంలో కొన్ని మొక్కల్ని వరిక్షించడానికి ప్రయోగార్థం నాటి, పెంచవచ్చును. నిజానికి సీతాఫలం వుష్పంబ ఆర్కిడ్ (Orchid) మొదలైన కొన్ని జాతుల మొక్కలు మట్టి లేకుండా కేవలం నీటితో పెరగలేవు. ఇది సత్యమే కానీ ఈ రీతిగా పెరిగే మొక్కలు చాలా తక్కువ. మట్టిపై పెంచే మొక్కలే ఎక్కువ.

మొక్కలకి మట్టి ఎందుకోసం కావలసి వస్తుంది ? మొక్కలు నిలిచేది మట్టిలోనే, మొక్కలు నిలబడడానికి ప్రేళ్ళే పగ్గాలు, మట్టి కణాలే గుంట. ప్రేళ్ళు మట్టి కణాల్ని మట్టి అతుక్కోవడం చేత మొక్కలు, చెట్లు గాలి హోరుని, పారే నీటి తీవ్రతని ఎదుర్కొని నిలబడలేవు. ఇవి నిలబడాలంటే ప్రేళ్ళు నేలలోనికి దిగి అంటుకొని వుండాలి.

నేలపై వుండే ప్రకాండపు గాత్రం విస్తరించడాన్ని చూస్తే, వేరుకన్నా ఈ భాగమే పెద్దదిగా కనిస్తూ వుంటుంది. కానీ అనేక సస్యాలలోని ప్రేళ్ళే, సస్యపు పెద్ద భాగమంటే అభ్యర్థవడవచ్చు. ఇవి మట్టి లోపల దాగి కంటికి కనిపించకుండా ఉండటం చేత వీటి వ్యాప్తి, గాత్రం (మందం) మనకి తెలియటం లేదు.

సస్యాలకి ఇంత వేరు, ఈ వేర్ల వ్యాప్తి ఆధికం ఎందులకు ? ప్రేళ్ళు సస్యజీవనానికి అత్యవసరమైనది. మొక్కలు తమ ఆహారాన్ని ఎక్కువ భాగం వేర్లనుండే పొందుతాయి. సామాన్యంగా మొక్కలు సరిగ్గా అరోగ్యంగా ఉండడానికి సుమారు 16 ఆహారాంశాలు పోషకాలు కావాలి. అవి: 1. ఆక్సిజన్, 2. ఫాస్ఫరస్, 3. పొటాషియం, 4. బొగ్గు పులుసు వాయువు, 5. హైడ్రోజన్, 6. అసిడ్ ఉత్పాదన, 7. గంధకం, 8. మన్నం, 9. ఇనుము, 10. మెగ్నీషియం, 11. లాప్రం, 12. సీసం, 13. మాలిబ్డినం, 14. బోరాన్, 15. మ్యాంగనీసు, 16. క్లోరిన్. ఈ వడపోరు సస్య పోషకాలలో బొగ్గు పులుసు వాయువు తప్పితే మిగిలిన వడపోసు పోషకాలను మొక్కలు మట్టి నుంచే పొందుతాయి. అందుచేత మన్ను సస్యపోషకాల ఉగ్రాణం అని చెప్పుకోవచ్చు.

వేర్లు ఈ పోషకాలను పీల్చుకొంటాయే తప్ప, మనలాగ నమిలి మింగలేవు. ఈ విధంగా పీల్చుకోవడానికి, ఈ పోషకాలు ద్రవ రూపంలో వుండాలి. నీటిలో కరగాలి. నీరే సస్య పోషకాల వాహకం. నీరు సస్యపోషకాల వాహకమే కాక, అది మొక్కలకి కావలసిన ఆక్సిజనకాన్ని, హైడ్రోజన్ను ఇచ్చే వస్తువు. ఇది కాకుండా వేర్లద్వారా పీల్చుకొన్న పోషకాలను ఆకు, మొగ్గ, కాయ మొదలగు భాగాలకు తీసుకెళ్ళడానికి నీరు కావాలి. ఈ మసలకు కావలసిన నీరు మొక్కలకి లభించేది మట్టిలోనే, అనగా మట్టి సస్యాలకి కావలసిన నీటిని ఇచ్చే జ్ఞేత్రం, మొక్కలకి జలాశయం.

కొన్ని జాతుల మొక్కలలో వేర్లు మొక్కలకి ఆహారాన్ని వేర్చిపెడతాయి. వీటిని తీపి దుంప (చికడ దుంప)ని వ్యవహరిస్తారు. ఈ విధంగా ఆహారం చెడకుండా వేర్చి పెట్టడానికి మట్టి రోడ్డుతుంది.

మట్టి యొక్క మరొక పని : విత్తనాల మొలకలకి కావలసిన అనుకూల సన్నివేశాన్ని కల్పిస్తాయి. విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి వాలినంత తేమ, వేడిమి, వాయువు ఉండాలి. విత్తనం మట్టి పైన, బయట మొలకెత్తకుండా ఉండడానికి కారణం ఈ అనుకూల పరిస్థితులు లేకుండా ఉండటం చేతనే. మట్టి కణాల మధ్య వుండే నీరు, తేమనీ, శ్వాసించడానికి వాయువునిస్తాయి. ఈ కణాలు సూర్య రశ్మిని వేడిని (గ్రీహించి మొలకెత్తే విత్తనాలకి వేడినిస్తాయి. అంటే మట్టి విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి అనుకూలమైన క్షేత్రం. మొలకెత్తే క్షేత్రం. ఈ విధంగా మట్టికి, సస్యజీవనానికి దగ్గర సంబంధముంది.

**మట్టి / మన్ను అంటే ఏమిటి ?**

మట్టి శిలల నుంచి (రాళ్ళ నుంచి) వచ్చిన వస్తువని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే మట్టి కేవలం శిలాపాడి మాత్రమే కాదు. అంతేకాకుండా శిలమట్టిగా మారడానికి, సస్యజీవనానికి యోగ్యమైందిగా అవడానికి సూరారు సంవత్సరములు పడుతుంది. సూరారు సంవత్సరాలు శిల రూపంలోనూ, నిర్మాణంలోనూ, గుణంలోనూ, నైసర్గిక శక్తుల చేత సంస్కరించబడి మట్టవుతుంది. పెరుగుదలకు సరియైన క్షేత్రమవుతుంది. మొలకల్ని ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యాన్ని పొందుతుంది.

శిల జడ పదార్థం : చేతనం లేనిది - కాని మట్టి చురుకైన వస్తువు. సజీవమైంది. సజీవన పదార్థం. పెరుగుదల శక్తి, ఫలవంతంతో కూడుకొన్న పదార్థం. శిల సజీవన మవ్వడానికి మొదట దాంట్లో, భౌతిక మార్పులు జరగాలి. అఖండమైన రాయి పగిలి, ముక్కలు లేచి, పొరలుగా మారి, చిల్లులు పడి ముక్కలు పగిలి, నుగ్గే పాడి పాడిగా అవ్వాలి. ఈ మార్పులు జరిగేది ఎండ, వాన, గాలి, మంచు మొదలైన నైసర్గిక శక్తుల చేత, ఇదే నైసర్గిక శక్తి చేత ; శిలల రసాయనిక నిర్మాణంలో మార్పులు కలుగుతాయి. వానలో కరిగి, వాయువుతో సంయోజనం చెందో, శిలల ఖనిజాలు రూపాంతరం చెందుతాయి. సస్య పోషకాలవుతాయి. ఈ భౌతిక, రసాయనిక, మార్పుల జతకి, మరొక రకపు సంస్కరణం - రసాయనిక (ఔషధ) పువ్వు (శిలావల్కలం - Lichens - లైకెనిస్) మొదలైనవి పెరిగి, చచ్చి, కుళ్ళి శిలల పాడి జతలో కలిసిపోతాయి. ఈ విధంగా ఈ అల్పమైన సస్యాల జీవనం శిలాపాడి జతలో చేరిన తర్వాత, ఇందులో చిన్న చిన్న మొక్కలు చిగురులు చిగురించే శక్తి వస్తుంది. ఇవి చచ్చి, కుళ్ళి, ఈ శిలా పాడి, సావయవ (సర్వావయాల) అంశాన్ని పెంచుతుంది. పెద్ద చెట్లు పెరగడానికి అనుకూలమవుతుంది. ఈ విధంగా సర్వావయవ పదార్థం నుండి లక్షాంతర, సూక్ష్మాణువులతో చేరిన శిలా పాడిలో పురుగు, పుట్ర జీవించి, నశించి సర్వావయాన్ని మరింత వృద్ధిచేస్తాయి. పాడిపైన పెరిగిన ఆకు, గడ్డి, వానపాములకు ఆహారమవుతుంది. అవి ఆ మట్టు ప్రక్కల నంచరించి, మలమూత్రాదులు శిలా పాడిలో కలుస్తాయి. ఆ ప్రాణులు మరణించిన తర్వాత వాటి శరీరం మట్టి శిలాపాడి పెరుగుదలకు యోగ్యమైన మట్టిగా సంస్కరణ చెందుతుంది. అందుచేత మట్టి శిలాపాడి మాత్రమే కాకుండా కేవలం ఖనిజ పదార్థాలేకాక, వాటికి తోడు జీవావధారమైన సర్వావయవ పదార్థాలు అందులో వుంటాయి.

పెరుగుదలకు యోగ్యమైన మట్టిలో ఐదు పదార్థాలు వుంటాయి.

1. శిలా శిథిలాల వల్ల ఏర్పడిన ఖనిజాలు నిక్షిప్త పదార్థాలు.
2. మొక్కల, ప్రాణుల మిగిలినవి - సజీవ పదార్థాలు.

3. మట్టి కణాల మధ్య ఉండే వాయువు (మట్టి, గాలి) (Soil - Air).
4. ఇదే కణాల మట్టూ, మధ్యన వుండే జలం (నీరు - Soil - Water).
5. కోట్యాంతర సూక్ష్మ జీవాలు.

మట్టిలో సుమారుగా అర్థభాగం మాత్రం ఖనిజ వదార్థాలు, శిలల నుండి ఏర్పడినవి. మిగిలినవి గాలి, నీరు, జీవ వదార్థాల సూక్ష్మ జీవులచే ఏర్పడినవి.

ఈ పైన పేర్కొన్న ఐదు (5) వదార్థాలు అన్ని రకాల మట్టిలోనూ ఒకే ప్రమాణంలోనుండవు. కొత్త మట్టిలో నిస్సారమైన మట్టిలో ఖనిజ వస్తువే హెచ్చు. ఇసుక మట్టిలో గాలి, నీరు అంతా లే ఎక్కువ కానీ ఫలవంతమయ్యే తోట మట్టిలో ఈ ఐదు భాగాలు సస్య పోషణకి, పెరుగుదలకి సరిపోయే ప్రమాణాలలో వుంటాయి. ప్రాచీన తోటల మట్టిలో జీవ వదార్థాలు, నల్లని కందిన పురుగులు మొదలైన సజీవ వదార్థాలు ఎక్కువగా వుంటాయి.

ఈ ఐదు వదార్థాలు మట్టిలోని అన్ని పొరలలోను ఒక ప్రమాణంలో వుండవు. పై మట్టిలో జీవ వదార్థాలు, సావయవ వదార్థాలు ఎక్కువగా వుంటాయి. క్రింది మట్టిలో ఖనిజాంశాలు ఎక్కువగా వుంటాయి. రోతులో వుండే మట్టిలో పైనున్న మట్టిలో ఉండే జలాంశకన్నా ఎక్కువ శాతంలో జలాంశముంటుంది.

### మట్టి నిర్మాణం (Soil Texture)

స్వభావికమైన శిల శిథిలమైనప్పుడు దాని నుండి ఒకేరకపు లేదా ఆకారం లేదా గాత్రపు ముక్కలు మిగలవు. శిల అనేక రకాల ఖనిజాల నుంచి ఏర్పడుతుంది. వీటిలో కొన్ని కఠినమైనవి. ఇవి చలి, గాలి, వాన, ఎండలకు సులభంగా కరగజాలవు. మరికొన్ని చాలా మృదువైనవి. సులభంగా పాడి అయ్యేవి, మరికొన్ని నీటిలో కరిగిపోతాయి. స్ఫటిక జాతి రాయి కఠినమైంది. ఫెల్డ్ స్పార్ (Feldspar) ఖనిజం మృదువైంది.

శిలల ఖనిజాలు ఈ రీతిగా వుండటం వల్ల ఇవి శిథిలమైనప్పుడు కొన్ని రాళ్ళుగాను, కొంత గరకు మట్టిగాను మార్పు చెందుతూ మట్టిగానూ, పెద్ద కణాలుగా మిగిలి పోతాయి. మరికొన్ని త్వరగా పాడిఅయ్యి, సూక్ష్మ కణాలై నిలబడుతాయి. అంటే ఒకే శిల నుండి వచ్చిన మట్టిలో వివిధ మందంలో గాత్రంలో మట్టి కణాలుంటాయి.

మట్టి కణాల్ని స్థూలంగా నాలుగు భాగాలుగా విభజించ వచ్చు. గట్టి మట్టి, గోడు, జేడి మొదలైన రకాలు. 2 మి.మీ. కన్నా ఎక్కువ వ్యాసమున్న కణాల్ని గరకు అని, సురుజా, రాళ్ళ ముక్కలని, 0.05 నుంచి 2 మి.మీ. వ్యాసమున్న కణాలను మట్టి కణాలని, 0.002 మి.మీ. నుంచి 0.05 మి.మీ. వ్యాసమున్న చాటిని గోడు (ముక్కలు, చెక్కలు Silt) 0.002 మి.మీ. కన్నా తక్కువగా వ్యాసమున్న కణాల్ని జోడి (బంక - Clay) అని వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ నాలుగు రకాల మట్టి కణాలు వ్యాసం లేదా గాత్రంలో మాత్రమే కాకుండా గుణాలలోను విభిన్నంగానే వుంటాయి.

మట్టి కణాలు సులభంగా ఒకటవ్వవు. తడిగావున్ననూ, వేరు వేరుగా వుంటాయి. ఈ రకపు మట్టి కణాలలో మొక్కలకి కావలసిన పోషక వదార్థాలు తక్కువగా వుంటాయి. మట్టి కణాలే ప్రధానంగా వుండే

ఇనుక మట్టిలో ఈ గుణాన్ని మనం చూడగలుగుతాము. ఇటువంటి మట్టిలో కణాలు వేరు వేరుగా వుండటం చేత, చేర్చడం, పాతడం, శ్రవ్యడం వంటి పనులు సులభం. తేలికైనందున ఇనుక మట్టిని తేలిక మృత్తిక అని అంటారు. తేలిక మట్టి (మృత్తిక) అని అంటే మట్టి బరువు తక్కువగా వుంటుందని భావించరాదు. పని మాత్రమే తేలిక. ఈ ఇనుక మట్టిలో కణాలు లావుగా వుండటం చేత, కణాలు ఒత్తుగా వేరలేవు. కణాల మధ్య, కణాంతరపు మధ్య, గాలి వీచడానికి, నీరు పోవడానికి అడ్డు తక్కువగా వుంటుంది. వేళ్ళు వ్యాపించడానికి, పెరగడానికి, శ్వాసించే డానికి అనుకూలంగా వుంటుంది. అదేవిధంగా గడ్డ కట్టడానికి అడ్డులేకపోవడం చేత, బంగాళ దుంప, చిలకడ దుంప, డాలయా, వేరుశనగ మొదలైన వాటి పెరుగుదలకు ఇనుక ప్రధానమైన మట్టి, ఎక్కువ అనుకూలంగా వుంటుంది. అయితే ఈ రకపు మట్టిలో మొక్కలకు కావలసిన పోషకాలు తక్కువగా వుండటం చేత నీరింకిపోవడం చేత, ఎక్కువగా పెరుగుదలను పెంచడానికి, నీటికి ఎక్కువ ఎరువును వేయాలి. వదే వదే నీటిని చల్లుతూ వుండాలి. సామాన్యంగా ఇనుక మట్టి, ధాన్యపు పెరుగుదలకు, రాగి, వరి, జొన్న మొదలగు వాటికి అంత అనుకూలమైంది కాదు. అయితే చాలినంత ఎరువులు వేసి, నీటి వసతిని కల్పించినట్లయితే ఈ ఇనుక మట్టిలో అనేకరకాల కాయ కూరలను జయప్రదంగా పెంచుకోవచ్చు.

జీడి కణాలు (బంక) : గుణంలోనూ, గాత్రంలోనూ ఇనుక కణాలకు వ్యతిరేకంగా వుంటాయి. ఈ కణాలు సులభంగా కలిసిపోవడం చేత ఒకదానికొకటి హత్తుకొని వుండటం చేత ఇవి బంకగా వుంటాయి. అందుచేత జీడి, ప్రధానమైన జీడి, ఎర్రమట్టిలో కలవడం, శ్రవ్యడం, పాతడానికి, సాగుబడి పనులకు, కష్టతరం. వాస్తవానికి జీడి (బంక) కణాలు ఇనుక కణాలకన్నా తేలికైంది. జీడి కణాలు చాలా సూక్ష్మమైన గాత్రం కలిగివని. అందుచేత ఇవి ఒత్తుగా వుంటాయి. కణాంతరం చాలా తక్కువగా వుంటుంది. గాలి లోపలికి వెళ్ళటం చాలా కష్టం. వేరు వ్యాపించడానికి ఇది అడ్డు తగులుతుంది. అందుచేత గడ్డల పెరుగుదలకు ఈ రకపు మన్ను అనుకూలమైంది కాదు. కణాంతరం తక్కువగా వున్నందువల్ల నీళ్ళు నిదానంగానే లోపలికి పోతాయి. అదే విధంగా ఆ నీరు ఎండడం కూడ చాలా నిదానంగానే జరుగుతుంది. తేమ ఆరడం కూడ చాలా తక్కువే. శ్రవ్యడం మొదలైన పనులు త్వరగా జరగవు. పెరుగుదల చాలా నిదానంగానే జరుగుతుంది. ఈ విధంగా వుండటం చేత, జీడి మన్నుకు నీరు చల్లడం చాలా జాగ్రత్తతో కూడిన పని. బీటలుబారకుండా, ముద్దవ్వకుండా నిదానంగా చాలా తక్కువసార్లు నీటిని చల్లాలి. ఈ మట్టి బీటలు బారే పరిస్థితి వస్తే, వాటిని రాకుండా ఎక్కువ అడ్డుపడుతాయి కాబట్టి, ఈ రకపు మట్టి వరి మొదలైన ధాన్యాలను పెంచడానికి ఎక్కువ అనుకూలంగా వుంటుంది. కణాలు జిగురుగా వుండటం చేత, జీడి మట్టి ఎండినప్పుడు ఎక్కువగా పేకెస్తాయి. కాబట్టి సరైన పద్ధతిలో నాటడమో, శ్రవ్యడమో వంటి పనులు చేస్తే, సమస్య తీరుతుంది.

జీడి మట్టిలో తేమ తొందరగా ఆరకుండా వుండటం చేత ఎక్కువ నీరు చాలా కాలం నిలువ వుండటం చేత, ఈ మట్టి కాయకూరలు, పండ్లు, పుచ్చెల పెంపకానికి అనుకూలంగా వుంటుంది. దీనికి కారణం యితర మొక్కలు మట్టులా ఒకటై గట్టిపడినప్పుడు ఆ గట్టితనాన్ని (త్రోసిపువు) బయటకు రాలేవు. అప్పుడు ఆ మొక్కల వేళ్ళు సులభంగా శ్వాసించలేవు.

బంకమట్టి కణాలలో మొక్కల పోషకాలు ఎక్కువగా వుంటాయి. మట్టిని ఫలవంతం చేసే కణాలివే. అందుచేత ఎర్రమన్ను, ఎరువున్న మన్ను, సామాన్యంగా ఎక్కువగా ఫలవంతంగా వుంటాయి. దీనికి ఇనుక

మట్టికి కావలసిన ఎరువుగాని, నీరుగాని అక్కరలేదు. తోటమాలికి బంకమట్టి అంటేనే జాగున్న, బంకమట్టిలో పంటనే జాగున్నాకరమైన పని, అయితే ఏ మట్టిలో జీగురు (బంక) అంతముందడో ఆ మట్టిలో సారం చాలా తక్కువగా వుంటుంది. అంతేకాకుండా, దాని అభివృద్ధి పెరుగుదల కూడా చాలా తక్కువగానే వుంటుంది. కొద్ది ప్రమాణంలో జీగురు వుంటే ఆ మట్టి కణాల విన్యాసం పెరుగుదలకి చాలా వరకు అనుకూలంగా వుంటుంది. పాదులలో సన్నని స్థలాలలో, కుండలలో మట్టిని బాగా వుంచుకోవడానికి, ఆ మట్టితోపాటు కావల్సిన బంకమట్టిని చేర్చడం ఉత్తమ పద్ధతి.

**సిల్ట్ కణాలు :** (Silt) గాత్రంలోనూ, గుణంలోనూ, ఇసుక, బంక (జీగురు) మట్టికి మధ్యస్థమైంది. ఇసుక, బంకమట్టిలోని ఉత్తమ గుణాలు పొంది వుండటమే కాకుండా వాటి అవగుణాలు సాధ్యమైనంత వరకు దింట్లో వుండవు. ఇసుక కణాలకన్నా సులభంగా ఒకటై చేరి, మట్టి బెరడులవుతాయి. లేదా పొరలుగా అవుతాయి. ఈ పొరలు ఇసుక కణాలవలె లావుగా వుండటం చేత, గాలి దూరడానికి, నీరు ఉండడానికి వేరువ్యాపించడానికి, అనుకూలమవుతాయి. ఈ మట్టి కణాలు అనేక సూక్ష్మ కణాల చేత కూడి ఉండటం చేత, బంక కణాలలాగ ఎక్కువ నీటిని పీల్చుకొని, ఎక్కువ నీటిని మిగుల్చుకొనలేవు. అంటే నీటిచ్చులో తేమ తక్కువకాలం వుంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ మొక్కల కణాలు ఎక్కువ సారవంతంగా వుంటుంది. ఇసుక మట్టికన్నా ఎక్కువ ఫలవంతమవుతుంది. జీడికన్నా తక్కువ సారవంతమైంది.

**బురద కణాలు :** గుణంలో ఇసుకకి, బంకమట్టికి మధ్యస్థంగా వుంటుంది. ఇసుక బంకమట్టి యొక్క ఉత్తమ గుణాల్ని పొంది వుండటమే కాకుండా, సాధ్యమైనంతవరకు వాటి అవగుణాల్ని పొందవు. ఇసుక కణాలకన్నా సులభంగా చేరి మట్టి కణాలవుతాయి. ఈ మట్టి గడ్డలు ఇసుక కణాలకన్నా లావుగా వుండటం చేత, గాలి దూరడానికి, నీరు ఉండడానికి వేరు వ్యాపించడానికి అనుకూలంగా వుంటుంది. ఈ మట్టి కణాలు అనేక సూక్ష్మ కణాల చేత కూడి ఉండటం చేత బంకమట్టి కణాలలాగ ఎక్కువ నీటిని పీల్చుకొని, ఎక్కువ కాలం నిలుపుదల చేసుకోజాలవు. అంటే నీటిలో చల్లదనం ఎక్కువకాలం వుంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ మొక్కలు కణాలు, ఎక్కువ సారవంతంగా వుంటుంది. ఇసుక మట్టికన్నా ఎక్కువ ఫలవంతమైంది. బంకమట్టికన్నా కొద్దిగా తక్కువైన సారవంతమైంది.

బురదమన్న కణాలు ఎక్కువగా వున్న మట్టి గడ్డలు, బంకమట్టిలాగ బిగుసుకోవు. మట్టి ముద్దలు పిలవు. బీటలు వారవు. వేర్లు విస్తరించడానికి అడ్డుపడదు. అందుచేత బురద మట్టి కణాలు ప్రాధాన్యంగా వున్న సారవంతమైన మట్టి (Loam) తోట అభివృద్ధి చెందడానికి, తోట పెంపకానికి అన్ని విధాల సరైన మట్టి, సులభంగా శుభ్రపరచవచ్చును. నాటడు వసులను చేసుకోవచ్చును. ఈ మట్టికి ఇసుక లాగ పడే పడే నీళ్లు చిలకరించవలసిన అవసరం లేదు. తేమ ఎక్కువపై ఉన్ననూ, బంక మట్టిలాగ జీగురు పడుతుందనే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. దీనికి ఇసుక మట్టికి వెయ్యూల్సిన ఎరువు వేయూల్సిన పనిలేదు. పూర్ణిన ఎరువులోని పోషక పదార్థాలు ఇసుక మట్టిలో కరిగి ద్రవమై, వ్యర్థమైనట్టు, ఈ మట్టిలో పోషక పదార్థాలు వ్యర్థము కావు.

తోట పెంపకాన్ని విజయవంతంగా సాగించడానికి సరైన మట్టి సారవంతమైన ఈ గోడు (ఓండ్ర) మట్టి. అందుచేతనే మట్టి భూముల్ని సాగుచేయడానికి, చెరువుల నదీ డెల్టాల ఓండ్ర మట్టిని తెచ్చి పాతే పద్ధతిని గొట్టరం గోడు అందారు. నీరు ఉంటే ఎంతటి మొద్దైనా తోటను చక్కగా తయారు చేసుకోగలదు. తోట పెంపకంలోని మట్టిలోని రకాలను చాలా సులభంగా ఎక్కువ ఖర్చులేకుండా, చాలా కాలం ప్రతిఫలం ఇచ్చే క్రమమంటే, ఆ ఓండ్ర మట్టిని తోటలో మొక్కల పాదులలో మట్టిలో కలిపి, పాదులు చేసి పెంచాలి.

## మట్టిలోని రకాల వర్గీకరణ (Textural Classification of Soils)

మట్టిలో ప్రధానంగా మున్ను కణాల ఆధారంగా మట్టి వర్గీకరించబడింది. ఇసుక (Sandy) - సారవంతమైన ఇసుక కల్గిన మట్టి (Loamy sand) ఇసుకలోని సారవంతమైన మట్టి (Sandy Loam) సారవంతమైన ఒండ్రు మట్టి (Loam) చీలిక ద్వారా ఏర్పడిన ఒండ్రు మట్టి (Silt Loam) చీలిక మట్టి (Silt) ఇసుక, బంక, ఒండ్రుమట్టి చేరినది (Clay Loam) చీలిక మట్టి, బంక, ఒండ్రు మట్టి (Silty, Clay, Loam) ఇసుక, బంక (Sandy Clay) చీలికైన ఒండ్రు మట్టి (Silty Clay) బంక (Clay) అనే రకాల్ని వర్గీకరించారు.

ఏ వర్గపు మట్టిలో ఎంత మట్టి, ఇసుక, పొడి, బంక మట్టి కణాల అంశముంటుందనే విషయాల వివరణ క్రింద పట్టిలో ఇవ్వబడింది. ఈ అన్ని రకపు మట్టి రకాలు తోటమాలికి సరిపోవు. అయితే మన తోటలోని మట్టిలో ఏ కణాలు వున్నాయి, ఏ కణాలు తక్కువగా ఉందనే విషయాన్ని తెలుసుకొని, ఆ లోపాన్ని పూరించడమో లేదా ఆ మట్టిని పెంపకానికి తగు విధంగా మార్చుకోవడమో చేయాలి. దీనికి సహాయపడే పట్టిక క్రింద ఇవ్వబడినది.

### మట్టి రకాల పర్కాలు

మట్టి లోని రకాలు	శాత పరిమితి		
	ఇసుక కణాలు %	ఒండ్రుమట్టి కణాలు %	బంక మట్టి కణాలు %
1. ఇసుక	85.100	0.15	0.10
2. ఒండ్రు మట్టి ఇసుక	70.90	0.30	0.15
3. ఇసుక ఒండ్రు మట్టి	43.80	0.50	0.20
4. ఒండ్రు మట్టి	23.52	28.50	7.27
5. సారవంతమైన ఒండ్రు మట్టి	0.50	50.88	0.27
6. సారవంతమైన మట్టి	0.20	8.10	0.12
7. ఇసుక, బంకమన్ను, ఒండ్రు మట్టి	45.80	0.28	20.35
8. బంకమన్ను, ఒండ్రు మట్టి	20.45	15.53	27.40
9. సారవంతమైన మట్టి, బంకమన్ను, ఒండ్రు మట్టి	0.20	40.73	27.40
10. ఇసుక, బంకమట్టి	45.65	0.20	35.45
11. సారవంతమైన మట్టి, బండబదిక (కూడిన)	0.20	40.60	40.60
12. బంక మట్టి	0.45	0.40	40.100

ఈ పైన పేర్కొన్న 12 రకాల మట్టి వర్గాలలో తోట పెంపకానికి అనుకూలమైన, అదర్భమైన, మట్టి రకాల వర్గాలు - 3 (ఇసుక, ఒండ్రు మట్టి). 4 (ఒండ్రు మట్టి). ఈ వర్గాలకి చేరినటువంటి, మట్టి (ఇసుక)నో,

ఒండు మట్టిలో పూడ్చి, మనకున్న మట్టిని సారవంతంగా చేసుకోవాలి.

మట్టి కణాల ప్రమాణం రోజూ కృషి క్రమంతో మార్పుకోవడానికి వీలులేదు. అయితే చిన్న స్థలాల్లో, పాదులలో, కుండీలలో, ఇసుక, ఒండు మట్టి లేదా బంకమట్టిని బయట నుండి తెచ్చి, ఈ మట్టిని చాలా వరకు సారవంతంగా చేసుకోవచ్చు కాని ఎక్కువ స్థలమున్న జమానులలో ఈ రీతిలో సారవంతం చేసుకోవడం దుబారాతో కూడినవని.

ఈ మట్టి వర్గాల కణాల నుంచి మట్టి యొక్క గుణాల్ని, లక్షణాల్ని ఏవని తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఈ విషయాల్ని తెలుసుకొని ఉంటే, ఎటువంటి మట్టిలో ఎటువంటి రకాల్ని ఏ విధంగా కలుపుకొని మొక్కల పుల్లత్తిని వృద్ధి చేసుకోవచ్చో తెలుస్తుంది. ఎటువంటి మొక్కల్ని ఏ విధంగా, ఎప్పుడు నాటాలి. ఎప్పుడు ఎంత నీరు పోయాలి, ఎటువంటి రకపు ఎరువును ఎప్పుడెప్పుడు ఏవిధంగా చేయాలనే విషయాలు నిర్ధారించుకోవడానికి ఈ మట్టి రకాలు ఎంతగానో తోడ్పడుతాయి.

## మట్టిని నిర్వహించే విధానం (మట్టి నిర్వహణం) Soil Management

### 1. మోటుయిన మట్టిలోని రకాల నిర్వహణ విధానం

మోటుగా కణాలు ఎక్కువగా వుండే గుంపులో ఇసుక మట్టి, ఇసుక ఒండు మట్టి, ఒండు మట్టి, ఇసుక మన్ను చేరుంటాయి. ఇవి తేలికైనవి. వీటితో తోటవని చాలా సులభంగా చేసుకోవచ్చును. చలికాలంలో కావలసిన ఉష్ణాన్ని పీల్చుకోవడం చేత ఈ మట్టి వేసిన మొక్కలు త్వరగా ఫలవంతమవుతాయి. అందుచే దీన్ని శీఘ్రమన్ను అని వ్యవహరిస్తారు. ఇవి వర్షం కురిసినప్పుడు లేదా నీరు పోసిన కొంత కాలానికే మొలకలు నాటడానికి వీలుగా వుంటాయి. అందుచేత ఎక్కువ కాలం వేచి యుండక సాగుబడి చేసుకొనవచ్చు.

ఈ మట్టి యందు నీరు త్వరగా ఇంకిపోవును. అందుచేత లేత మొక్కలకు, నారుకు అప్పుడప్పుడు నీరును పోస్తూండాలి. ఇసుక మట్టికి ఎక్కువ ఎరువును నీటిని వెయ్యాలి. కణాల మధ్య గాలి, నీరు, వేడి ప్రసరించడం చేత, వేసిన ఎరువు నుండి పోషక పదార్థములు చెట్లకు త్వరగా అందుతుంది. ఇదే కారణాల చేత పోషక పదార్థములు నీటిలో కరిగి సాదృశ్యమైన ద్రవ పదార్థంగా మార్పు చెందుతాయి. ఇందులో నన్నని, సూక్ష్మమైన అంశాలు కరిగి త్వరగా పులుస్తాయి. వీటిని సమర్థించడానికి అక్కడికక్కడే సున్నాన్ని వేయాలి. మొక్కల పెరుగుదలకు పూడ్చిన ఎరువు ఆ సంవత్సరమే ఖర్చయిపోయి, పుల్లని ద్రవంగా మారిపోవటం చేత ఈ రకపు మట్టిలో ప్రతి మొక్క మొక్కకి ఎరువును వేసి పూడ్చాలి.

ఈ విధమైన మట్టిని తోటల పెంపకానికి అనుకూలంగా మార్పుకోవడానికి మూడు రకాల క్రమాలున్నాయి.

1. క్రమంగా అప్పుడప్పుడు అకుల అలములతో ఏర్పడిన ఎరువును, కంపోస్టు, పచ్చికల ఎరువులను, సావయవ ఎరువులను ఎక్కువ ప్రమాణంలో మొక్కలకు వేయాలి. 2. అనుకూల ముంటే గోడు, బంకమట్టిని బయట నుండి తెచ్చి పూడ్చి, తోట మట్టితో కలపాలి. 3. వదే వదే నీరు చల్లుతూ వుండాలి. ఈ విధంగా చక్కటి మొలకల్ని మొలకెత్తించుకోవచ్చును.

### 2. మృదువయిన మట్టి నిర్వహణ విధానం



మృదువైన మట్టిని మొక్కల్ని పెంచడానికి అనువైన సారవంతమైన మట్టిగా తయారు చేసుకొనవచ్చును. ఈ రకపు మట్టిలో కణాల అంశం చాలా తక్కువగా వుండును. వీటిల్లో బంక అంశం ఎక్కువగా వుంటుంది. ఈ రకానికి చెందిన మట్టిగా యితర మట్టిని తయారు చేసుకొనవచ్చును. ఈ రకపు మట్టిలో కణాల అంశం చాలా తక్కువగా వుండును. వీటిల్లో బంక అంశం ఎక్కువగా వుంటుంది. ఈ రకానికి చెందిన మట్టి రకాలివి: సారవంతమైన మట్టి, ఒండ్రు మట్టి, సారవంతమైన బంకమన్ను, మొదలగునవి.

ఈ మట్టిలో నూళ్ళమైన కణాలు ఎక్కువగా వుండటంచే, ఈ కణాలు ముద్దగా, ఒట్టగా, ఒకదానితోనొకటి చేరుంటాయి. మొరటైన మట్టిలో కణాలు దగ్గరదగ్గరగా చేరుంటాయి. ఇందులో జీగురుండటం చేత ఈ మట్టిని నిర్వర్తించడం చాలా కష్టం. త్వరగా పక్వానికి రావు. నీరు త్వరగా ఇంకదు. పక్వానికి రావడానికి ముందుగానే తోట వముల ప్రారంభించితే మట్టి చిందర వందరగా తయారౌతుంది. అలస్యం చేస్తే గట్టి పడుతుంది. త్రవ్వడం చేస్తే కలుపు మొక్కలు ఎక్కువగా పెరుగుతాయి.

ఈ మట్టిలో చల్లదనపు అంశం ఎక్కువ, కాబట్టి చలికాలంలో మొక్కలు నాటడానికి, పెంచడానికి వీలుకాదు. ఇందులో మొక్కలు త్వరగా మొలకెత్తవు. ఈ రకపు మట్టి తోటల పెంపకానికి పనికిరాదు. ఈ రకపు మట్టిలో కొన్ని మంచిగుణాలు కలవు. వీటికి ఎక్కువ నీరు ఎక్కువ ఎరువు అవసరం లేదు. నీరు ఎక్కువ కాలం ఇంకకుండా వుండటంచేత ఎరువులోని పోషక పదార్థాలు ఇంక, పోషకాలైన ద్రవ పదార్థాలుగా వుండుటచే కొన్ని రకాల మొక్కలు పెరుగుతాయి.

ఈ మట్టిని విధిలేని పరిస్థితులలో పువయోగించాలంటే 1. నీరు నిలువకుండా ఉండేటట్లు చిరుకాలువలను తయారు చేసుకోవాలి. 2. సుమారుగా మాగిన కంపోస్టు గొట్టాలలో ఎరువులను ఎక్కువ పరిమాణంలో వేయాలి. మాగిన ఎరువుని ఈ ఎరువుమట్టి కొంత సారవంతం చేస్తుంది. 3. ఆకు వచ్చని ఎరువును ఈ నిస్సారమైన మట్టిలో కలపాలి. లేదా సకాలంలో గుంటలు త్రవ్వి, అందులో పేడను మొదలగునవి చేర్చి ఎండాకాలంలో బాగా మ్రుగ్గేట్లు చేసి ఆ భూమిని సారవంతము చేసుకొనవచ్చును. ఇందు దుంప మొక్కలు, ఇటువంటి అనేక రకములగు మొక్కలు పెంచుకొనుటకు యోగ్యమైన నేలగా తయారు చేసుకొనవచ్చును.

### 3. మధ్య రకపు మట్టి రకాలు - వాటితో తోటను పెంచువిధానం

మొరటుగానూకాక, మృదువుగానూకాక మధ్యస్థంగా వుండు మట్టి రకాలు ఒండ్రుమట్టి, బంక, ఒండ్రు మట్టి మిశ్రమం, ఇనుక సారవంతమైన మట్టి, వీటిలో బంక కణాల అంశం సరిసమానముగా వుంటుంది. ఈ మట్టి తోటల పెంపకానికి సరైనది. ఈ మట్టిలో నీరు త్వరగా ఇంకిపోదు. ఎండిపోదు, అంతేకాక నిలువ వుండదు. చాలా కొద్ది కాలంలోనే, నేల పక్వానికి వచ్చి మొలకెత్తడానికి అనువుగా వుంటుంది. దీనికి ఎక్కువ ఎరువు అవసరం లేదు. పోషక పదార్థాలు సులభంగా కరగవు. ఎటువంటి ఎరువు లేకనే ఈ మట్టి సత్ఫలితాన్ని - ఎక్కువ నీరు, ఎక్కువ ఎరువు లేకనే తోటమాలికి కలుగజేస్తుంది.

ఈ రకపు మట్టి ద్వారా తోటను పెంచడం సులభ సాధ్యం కాబట్టి ఈ తోటలోని మట్టిని సారవంతం చేయడానికి ఎటువంటి క్రమమును పాటించనవసరంలేదు. చిన్న స్థలంలో - పాదులు త్రవ్వి తీగలను పెంచుకోవచ్చు. లేదా కుండీలో ఈ మట్టిని నింపి మనకు కావలసిన రీతిలో మొక్కలను పెంచుకొనవచ్చును. ఈ మట్టి యందు రకాలు ఏంటే 1. ఎఱ్ఱ మన్ను (Red Earth) 2. మాగిన గుఱ్ఱపు లేదా పశువుల ఎరువు

కలిసిన మట్టి 3. ఇసుక 4. ఆకుల పొడి వీటిని వివిధ పరిమాణంలో కలిపి మట్టి మిశ్రమాన్ని (Soil Mixtures) ఈ విధంగా తయారు చేసుకొన్న మిశ్రమాన్ని కుండీల మిశ్రమం అని అంటారు. వివిధ రకాలైన మొక్కల పెంపకానికి వివిధ రకాలైన మిశ్రమాన్ని ఉపయోగించాల్సి వుంటుంది. వాటి వివరాలు ఈ క్రింది పట్టికలో ఇవ్వబడినవి.

ఏ రకాన్ని ఎంతభాగం, ఏ మట్టి కణాలతో కలపాలో వాటి వివరాలు

మొక్కలు	గుడ్డపు లద్ది	ఎర్ర మట్టి	ఇసుక	ఆకుల పొడి	ఒండ్రు మట్టి	బొగ్గ పొడి	మన్నపు పొడి
1. సాంవత్సరిక పుష్పాలు (a)	2	1	1½	-	-	-	-
2. మట్టిపై పెరిగే చెట్లు (b)	3	2	1½	1	-	-	-
3. దుంప పుష్పాల మొక్కలు (c)	2	2	2	2	1	¼	-
4. గులాబీ	3	2	1½	1	-	-	¼
5. క్రోటను	2	2	1½	1	-	-	¼
6. పామ్స్ (తాటిచెట్టు) రకాలు	1	1½	2	2	1	-	-
7. పెర్న్లు	1	-	1½	2	1	¼	¼
8. బోగన్ విల్లా	2	2	1½	2	-	½	¼
9. కెలేడియం	2	2	1½	2	-	¼	¼
10. డ్రెస్సినా	1	-	1½	2	1	¼	¼
11. ఆకు చెట్లు	½	-	1	2	½	¼	-
12. అంతురియం	½	-	1	2	-	½	-
13. ఆర్కిడ్స్	-	-	-	½	½	½	-
14. జెముడు (Cacti & Succulents)	1	1	1	2	1	-	1
15. పొదలు / తీగలు	2	2½	2	2	-	-	-
16. వచ్చు	1	2	1	-	-	-	-
17. ముక్కలు (Cuttings)	½	1	1	-	-	-	-
18. విత్తనాలు వదిలేదానికి	1½	1½	3	-	-	-	-

a : ఆస్పరు, అంతురైసమ్ మొదలైనవి సాంవత్సరిక మొక్కలు.

b : జెరేనియం వయెలేట్ మొదలైన - మృదు చెక్కల మొక్కలు (Soft - wooded plants)

c : క్యాన డాలియా మొదలైనవి.

పై వట్టికలో చూపబడిన వస్తువులు వాటి పరిమాణాలు ఉజ్జాయింపే కాని ఖచ్చితమైన కొలమానాలు కావు. గుర్రపు లద్ది దొరికినపుడు దానికి ఎర్రమన్నుకు బదులు తోటలో ఉన్న మట్టిని కలపవచ్చు. ఇదేవిధంగా అనేకమైన వస్తు మిశ్రమాన్ని ఒకదానికొకటి లభ్యమైన వాటితో ఎరువులను తగు పాళ్ళలో కలుపుకొని తోట మట్టిని సారవంతము చేసుకొన వచ్చును. నీరు ఇంక కుండా వుండుటకు బంకమన్నును ఆ తొట్టిలో కలపడం మంచిది.

మనం పెంచే మన తోట మట్టి ఏ రకానికి చెందినదో తెలుసుకొనుటకు తోటలో వివిధ భాగాల నుండి కొద్దిపాటి మట్టిని Sampleగా తీసుకొని వ్యవసాయదారుల కార్యాలయానికో లేక తోటల పెంపక పరిశోధకులకో పంపి అది ఏ రకానికి చెందినదో తెలుసుకొనవచ్చును.

మట్టి పరిశ్చ చేయడానికి వీలుకాని పరిస్థితుల యందు ఆ మట్టి ఏ రకానికి చెందినదో కొంతలో కొంత తెలుసుకోవచ్చు. అది 1. కొద్దిగా తడిగావున్న మట్టిని (చిత్రం 3.1) తీసుకొని రెండు ద్రేళ్ళు మధ్య ఆ మట్టిని చిదిపితే గరకు గరకుగా వుండిన అది ఇసుకతో కూడిన మట్టి అనియు, మట్టిని గుండ్రముగా వుండలు మట్టి దొడ్లిచినపుడు అవి ఎక్కడ ఆగకుండా దొడ్లితే అందులో బంక శాతం ఎక్కువగా వున్నదని అది బంకమట్టి అని గ్రహించవచ్చును.

3.1 మట్టి వర్షాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఒక పీడికెడు మట్టిని బాగా అదిమి పిడికిలిని తెరచినప్పుడు మన్ను పొడి పొడిగా వున్న అది మొక్కల పెంపకానికి అనువైన మట్టి, లేక ఉండలు ఉండలుగా వున్న అందులో లేమి ఎక్కువగా వున్న మట్టి అని గ్రహించి, దానికి తగ్గ మొక్కలను నాదాలి.

తడిగా వున్నప్పుడు ఒండ్రు మట్టిని కొద్దిగా చేతిలోకి తీసుకొని పరీక్షించితే అది గరుకుగా వుండదు. చేతికి అంటుకోదు. పిండిలాగ మృదువుగాను వుండదు. చేతిలో కొద్దిగా ఆ మట్టి తాలూకు కణాలు మిగిలి పోతాయి. సారవంతమైన మట్టి ఎండితే పిండిలాగనో, పొడరు లాగనో వుండును. తడిగా వున్నప్పుడు దీనిని చేతితో నలిపిన కొద్దిగా మెరుస్తూ వుండును.

**మట్టిలోని కణాల నిర్మాణం లేదా మట్టి కణాల చేరిక**

మట్టి నిర్మాణం ప్రకృతి సిద్ధమైనది. ఇసుక మట్టిని, ఒండ్రుమట్టిని, బంకమట్టిని కాని ఇసుకగా చేయడం సాధ్యం కాదు. అయితే మట్టి కణాలు అందులోను బంక మట్టి, సారవంతమైన మట్టిలోని కణాల కూడిక మన సొంత శ్రమతో వాటిని మార్చుకోవచ్చు. వివిధ పాళ్ళలో రకరకాల మట్టిని తయారు చేసుకొనవచ్చు. బంకమట్టి కణాలు, ఇసుక కణాల శాతం కొద్దిగా కలుపుకొని వీటి మిశ్రమాన్ని తయారు చేసుకొనవచ్చు. ఈ మిశ్రమం ద్వారా మట్టిలోని కొన్ని అవగుణాలను తొలగించుకొనవచ్చును. లావుగావున్న ఇసుక కణాలు ఒకటిగా చేరివుండవు. అయితే మృదువైన ఇసుక కణాలు చేర్చి ఎరువు మట్టి కలిపి మరింత లావైన కణాలుగా తయారు చేసుకొని ఆ మట్టిని మొక్కల పెరుగుదలకు ఉపయోగించుకొనవచ్చును.

బంక మట్టి, సారవంతమైన మట్టి కణాలు సామాన్యంగా వేరు వేరుగా వుండవు. ఒకదానితో ఒకటి కలిసి వుంటాయి. తడిపినపుడు, పరిశోత కోసి తూర్పార బట్టినపుడు ఈ మట్టి వేరు వేరు గడ్డలుగా

నిలిచిపోతాయి. దానికి ఆ మట్టిలోని బంక స్వభావమే, కొన్ని సమయాలందు ఒక దానికొకటి అంటుకొని పెద్ద పెద్ద మట్టి గడ్డలుగా అవుతుందాయి.

ఒక్కొక్క రకపు మొక్కలకు ఒక్కొక్క విధమైన మట్టి కణాల నిర్మాణం అనుకూలం. ఉదా. వరి వంటకు బంక మట్టి కణాలు వేరు వేరుగా వుంటే కొద్దిగా ఇతర మట్టి కణాలు కలిసిన నిర్మాణం అవసరం అవుతుంది. ఇందులో బంకమట్టి వున్నంత మాత్రాన అది నీటిని పీల్చుకొని నిలువ వుంటుందని చెప్పడానికి వీలులేదు. కాని ఈ మట్టిలో నీటి తేమ ఎక్కువ కాలం నిలువ వుంటుంది. వరి మొక్కకు సగం పాలు తేమ వుండే మట్టి కణాలు అవసరం. ఈ మట్టి కణాలలో నీరు నిలిచి వరి త్వరగా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

కాని సాధారణంగా అనేక రకాల తోటల పెంపకానికి, మట్టి కణాలు ఒకదానితోనొకటి చేరి, నన్నుని మట్టి కణాలుగా మారి వుండాలి. మట్టిలోని రాళ్ళను ఏరి, మట్టిలోని స్వాభావికమైన గుణాదులను తెలుసుకొని దానికి తగిన మొక్కల్ని వేయడం, తాను పెంచుకోదల్చిన మొక్కలకు తగిన విధంగా తోటలోని మట్టి కణాల్ని మార్చుకోవడం, తోటను చక్కగా అభివృద్ధి చేయడానికి కావలసిన విధంగా తోటలోని మట్టి కణాల్ని మార్చడమే తోటమాలి యొక్క ప్రధాన కార్యక్రమం. ఈ విధంగా చేయు విధానాన్ని మట్టి కణాలను దున్నడం అని అంటారు. సారవంతమైన తోట మట్టి కణాలు సుమారు 1½ నుంచి 5 మి.మీ. వ్యాసముండేట్టుగా వుండాయి. ఈ కణాల ముందరి వ్యాసం ఈ విధంగా వుంటే, అందులో గాలి చాలినంతగా హితమితంగా చలిస్తూ వుంటుంది. దీనిలో నీరు నిలువకుండా, మితంగా కావలసినంత నీరు మాత్రం మట్టిలో ఇంకుతుంది. త్వరగా తడి ఆరదు. అలాగని నీరు నిలవదు. ఈ రకపు కణ నిర్మాణమున్న మట్టిలో వర్షపు నీరు చాలా సులభంగా ఇంకి ఊరిపోవడంవేత మట్టిలో ఏర్పడే సారాన్ని అడ్డగిస్తుంది.

మట్టిలోని కణాల నిర్మాణాన్ని మన మొక్కల పెరుగుదలకు తగిన విధంగా రూపొందించుకొనడానికి ఎన్నో క్రమాలు, పద్ధతులు ఈ క్రింద వివరించ బడ్డాయి.

1. మట్టి బాగా మారి, పెంట, చెత్త చెదారాలు దానిలో బాగా కలిపి, వాటిని వదులుగా చేసి, గాలికి, ఎండకి కొద్ది రోజులు వదలి వేయాలి. ఈ విధంగా చేసిన కొంత కాలానికి మట్టి ముద్దలు పొడి పొడిగానో లేదా నన్నుని, మట్టి ముద్దలుగానో శిథిలమవుతాయి. ఈ విధంగా చేసిన, మొక్కలకు కావలసిన పోషక వదార్థాలు తయారు అవుతాయి. ఈ కారణం చేతనే తోటలో మొక్కలు పెరిగి పెద్దవైన తర్వాత, ఒక పెద్దదైన గుంట త్రవ్వి ఈ గుంటలోని మట్టి ముద్దల్ని పొడి చేయకుండానే వేస్తారు.
2. కొన్ని రకాల వేళ్ళ మట్టి కణాల నిర్మాణాన్ని అనుసరించి భూమిలోపల అతి త్వరగా వ్యాపించడమో, లేక పెరుగుదల అగిపోవడమో జరుగుతుంది. గడ్డి, గడ్డి జాతికి చెందిన రాగి మొదలైన వాటిలో వేళ్ళ గుబురుగా వుండి నన్నుని ఒండ్రు మట్టిలో అతి త్వరగా వ్యాపించి వృద్ధి చెందుతుంది. ఈ ప్రేళ్ళు అతి స్వల్పకాలంలో అధికంగా పెరిగి చుట్టు ప్రక్కలనున్న ఇతర ప్రేళ్ళను అన్ని దిక్కులకు తోసి వేస్తూ వుంటుంది. ఈ విధంగా తోసివేసినప్పుడు ఆ చెట్లలోని విత్తనాలు పెంట కుప్పలలో పడి ఎండకు ఎండి, చిట్టి, భూమిలో పాతుకొని మొలకెత్తుతాయి. ఈ విధంగా మొలకెత్తే మొలకలు, కలుపు మొక్కలతో కలువకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. మరికొన్ని విత్తనాలు ఆ పెంట కుప్పలలో ఎలాంటి మార్పు లేక వుండవలసి వస్తుంది. ఇటువంటి కుప్పలకు

సారవంతమైన మట్టిని ఎరువులు వేసి అందులోని విత్తనాలు మొలకెత్తుటకు తోటమాలి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఈ రకానికి చెందినవి. రాగి విత్తనాలు, ఈ మట్టిలోని వ్యర్థ కణాలని ఏరిపారవేస్తుందని అంటారు. ప్రతి సంవత్సరం ఒకేరకపు ధాన్యాన్ని కాని మొక్కలను పెంచినట్లయితే అందులోని పోషక పదార్థాల సారం తగ్గి పోతుంది. దీనినే రైతులు “తామ్ర” సోకింది అని అంటారు. రాగి మొదలైన గుబురు వేర్లవంటి మొక్కలు పెరిగిన భూమి యందు ఈ తామ్రవంటి వ్యాధి సోకుటకు అవకాశం లేదు.

3. చెత్త చెదారాలతో ఏర్పరచిన ఎరువు, కంపోస్టు పసుపు వచ్చని గడ్డి ఇత్యాదులచే ఏర్పరచిన ఎరువును భూమిలో కలుపుట వలన ఈ మట్టిలోని మట్టి కణాల నిర్మాణం విత్తనాలు మొలకెత్తుటకు అనుకూలంగా వుంటుంది. ఈ రకపు ఎరువులు భూమిలో లోతులోకి పోయి “హ్యూమస్” (Humus) అనే నల్లని సావయవ పన్నువుగా మిగిలి పోతుంది. ఈ హ్యూమస్ సస్య పోషకాలకి ప్రధానమైనది. అంతేకాక ఆ మట్టి కణాలలో అంటుకొని వున్న పోషక పదార్థాలను మాత్రం గ్రహించి అందులోని అనవసర పదార్థాలను ఇవలకు తోసి వేసి సామర్థ్యం కలిగి వుంది. హ్యూమస్ చాలినంత వుంటే ఇందులో కొన్ని రకాల సూక్ష్మ క్రిములు వృద్ధి అవుతాయి. ఇవి కూడా జిగురు పదార్థాన్ని వృద్ధి చేస్తాయి. ఈ జిగురు మట్టి కణాలను తోసి వెయ్యలేవు. అందుచేత తోటలోని మట్టి క్రమాన్ని క్రమం తప్పకుండా సాధ్యమైనంత వరకు సావయవ (జంతుప్రాణులను పూడ్చిగా ఏర్పడిన ఎరువు) ఎరువులను, కంపోస్టు, ఆవు పేడ, ఆకులములు వేస్తూండాలి. కొన్ని రకాల మట్టిలో సున్నాన్ని కలుపగా అది మరింత సారవంతమైన మట్టిగా మారుతుంది. ఇవి కూడా చిన్న చిన్న మట్టి గడ్డలుగా ఏర్పడుతాయి.

4. ప్రకృతిలో వానపాములు మట్టిలోని సారవంత శక్తిని వృద్ధి చేస్తాయి. కావున తోటమాలి వాన పాములు అభివృద్ధి అవుటకు అనుకూల పరిస్థితులను ఏర్పరచాలి. వాటి ద్వారా మట్టిని శుభ్రపరచుకోవచ్చును. పూర్తి తోటకు సుమారుగా మాగిన కొద్దో గొప్పో మిగిలిన సావయవ ఎరువును చేరిస్తే ఇవే అవారంగా వున్న వానపాములు వృద్ధి అవుతాయి. ఎన్నో తోటలు సారవంతమై వృద్ధి చెందడానికి ఈ వాన పాములే కారణం. ఇవి సుమారు 5-6 అంగుళాల పొడవుతో చుట్టు చుట్టుకొని వుంటాయి. ఈ విధంగా వుండుటచే గాలి, నీరు సులభంగా లోపలికి పోగలుగుతుంది. ఈ విధంగా నీరు లోపలికి పోవడం చేత మట్టిలోని పోషక పదార్థాలు అధికమై భూమిలో ఒదిగి వుంటాయి. గాలి ద్వారానో, నీటి ద్వారానో కొట్టుకొని వచ్చి విత్తనాలు విస్తరించి, పైకి వచ్చి మొలకెత్తుతాయి. కొన్ని అతి ప్రాచీనమైన తోటలలో ఒక ఎకరపు భూమిలో సుమారు 10 లక్షల వాన పాములు ఉండుట కద్దు. లక్ష సంఖ్యలో వున్న వానపాములు తోటంతా విస్తరించి తిరగలి రాగా మట్టి కణాల్ని బాగా కలిపేటట్లు చేసి, మట్టి కణాల్ని సారవంతం చేస్తాయి. ప్రకృతి సిద్ధంగా నేలని దున్నడానికి యోగ్యమైందిగా చేస్తుంది.

5. చివరి క్రమం, మట్టిలో ఇతరశ్ర చెడు పదార్థాలు చేరి చెడిపోకుండా కాపాడుకోవడం. మట్టిలో మట్టి కణాల నిర్మాణం ఉన్నది వున్నట్లుగా కాకుండా మార్పులు చేర్పులు పొందడానికి అనేక కారణాలున్నాయి. తగిన స్థితిలోలేని మట్టిని దున్నడం, ఎరువులను మట్టిలో కలపడం నేలను సారవంతం చేయడం, సర్య సాధారణమైన విషయాలు. కాని మట్టి తడిగా ఉండేటప్పుడు దున్నడం, ఎరువులు కలపడం చేయకూడదు. ఆ విధంగా చేస్తే విత్తనాలు మొలకెత్తవు. అంతేకాక విత్తనాలు చెల్లా చెదురై, చెత్తగా, బురదగా తయారవుతుంది.

తడిగావున్నప్పుడు విత్తనాలు చల్లినా, నాదీనా అవి చీలి, వగిలి మొలకెత్తే భాగం కుల్చిపోతుంది. భారీ వర్షాలకు మట్టిలోని మట్టి కణాలు మరింత భూమిలో పాతుకుపోతుంది. అంతేకాక వేరే విధమైన మట్టి గడ్డలు రూపొందించుకు మ్మిచ్చిన మట్టి, కణాల మధ్య చేరి, విత్తనాలకు లేదా మొలకలకు గాలి, నీరు పారకుండా చేస్తాయి. ఇందువేత ఆ భూమిని దున్ను, నేల సారవంతం చేసుకోవాలి. విత్తనాలు నాదీన ప్రారంభకాలంలో వర్షం కురిస్తే, ఇంకీ పోవడానికి అనుకూలంగానే వుంటుంది. మట్టి కణాలు చెల్లా చెదురవచ్చు. వచ్చు ధాన్యాలైన ముడిరిన మొక్కలుంటే నాదీని వదిలేస్తే, అవి వర్షపు జల్లుకు, భూమిలోపడి, వాటంతట అవే నాటుకు పోయి విస్తరించుతుంది.

ఈ విధంగా మనకు అనుకూలంగా మట్టి కణాల్ని మార్పుకొని మంచి తోటను పెంచుకొనవచ్చును. మన తోటలోని మట్టి కణాలు తోటల పెంపకానికి అనుకూలమో కాదో సులభంగా తెలుసుకోవచ్చును. 3.2 చిత్రం 3.2 మట్టి నిర్మాణం లేదా కణాల నిర్మాణం.

i. నిర్మాణం సవ్యంగా లేక గట్టుయిన రాళ్లు వుండటం.

ii నిర్మాణం సవ్యంగా వుంటే, కణాలు రేణువులై ఒకదానితో ఒకటి కలిసి పోయి, పొడిపాడిగా అవుతాయి.

మట్టి రంగు : మట్టి రంగు ద్వారా మట్టి పూర్వ వృత్తాంతం, ప్రస్తుత పరిస్థితిలో ఎంతవరకు ఫలవంతమవుతో సూచిస్తుంది. మట్టిలో ఉండు జనక శిలలు, కట్టడాల రాళ్లు, చివ్విడి రాళ్లు లేదా ఎర్ర ఇసుక రాళ్లు లేక ఆ శిల నుండి వచ్చిన ఎరువు బ్రాష్ మొదలైనవి ముఖ్యం. నల్లశిల, జనక శిలైతే దాని మట్టి రంగు నలుపుగా వుంటుంది. వీటి రంగు కొన్ని కారణాలచే కొన్ని సందర్భాలలో మార్పు చెందుతూ వుంటుంది. ఆకులు, అలములు, ఎరువు కుళ్ళి, ఎండి మిగిలిన హ్యూమస్ సావయవాళం ఎక్కువగా వున్న ఆ మట్టి నల్లగా మారుతుంది. తోటలోని మట్టి చుట్టు ప్రక్కల మట్టి కన్నా నల్లగా వుండడానికిదే కారణం.

మట్టిలో కార్బుక ఎక్కువగా వున్న ఎరువు రంగుకి మారుతుంది. పిలిక, సున్నం ఎక్కువగావున్న తెలుపు రంగుగా మారుతుంది. నీరు పీల్చుకొని మట్టి నురుగురంగులోనూ, బాగా నీరు పీల్చుకొనే మట్టి రంగు సామాన్యంగా ఏ రంగులో వుంటుందో అదే రంగులో వుంటుంది.

## మట్టి సావయవం (Soil Organic Matter)

మట్టి గుణ లక్షణాల పరిణామకారిగా నిర్ధారించే వస్తువు సావయవ వస్తువు. ఇది మట్టిలో పెరిగిడి మొక్కలపై తన ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. ఇది మట్టిలో రెండు రూపాలలో ఉండొచ్చు.

1. చురుకుగా వుండే సావయవ పదార్థం : ప్రుగ్గి, కుళ్ళి ఒకదానితో నొకటి బాగా మిశ్రమమై, భౌతికంగా సన్న సన్న భాగాలయ్యేడివి. రసాయనికంగా భేదించేడి ప్రాణి, నస్యజన్య మలమూత్రాదులు, చెత్తా చెదారాలతో ఏర్పడిన ఎరువు, కంపోస్టు, పసుపు వచ్చిన ఎరువు మొదలైనవి సావయవ ఎరువులు.
2. చురుకు కాని తలస్థంగా వుండే భౌతిక రసాయనిక మార్పులను పొందిన హ్యూమస్, ఇది సావయవ పదార్థాలు మార్పు చెందిన తర్వాత చిట్ట చివర మిగిలేడి పదార్థం. మార్పు చెందిన తరువాత వీటి కణాలు

వాలా సూక్ష్మమైనవి. వీటికి నిర్దిష్టమైన ఆకారం లేదు. రసాయనాలకున్నంత మరుకుదనం లేదు. దీని రంగు మట్టి రంగు లేదా నలుపు. ఇది జీగురుగా వుండి మట్టి కణాల్ని ఒకటిగా చేర్చి మట్టి రాళ్ళుగా చేసి, మట్టి కణాల నిర్మాణాన్ని ఒక నిర్దిష్ట రూపంలో వుండేట్లు చేస్తుంది. మట్టి యొక్క భౌతిక గుణాలను ఉత్తమోత్తంగా రూపొందిస్తుంది.

మట్టిలో వుండే సావయవ వస్తు ప్రభావాన్ని భౌతిక, రసాయనిక, దైవిక ప్రభావాలుగా వివరించవచ్చును.

1. మట్టి యొక్క సావయవ వదార్థం మట్టి, అందులోనూ బంకమట్టి, ఎర్ర మట్టి, ఒండ్రు మట్టి కణాలు, వాటి మిశ్రమాలు మొక్కల పెరుగుదలకు అనుకూలమైనవి. మట్టిలో ఈ కణాల మిశ్రమాలు ఏ ఏ పాళ్ళలో ఉండాలో గ్రహించి ఆయా పాళ్ళలో వాటిని కలిపినపుడు ఆ మట్టిలో నీరు సులభంగా ఇంకి గాలి బాగా వీచే వేళ్లు ఒక దానితో ఒకటి అల్లుకోకుండా విశాలంగా విస్తరించి వేరు వేరుగా వృద్ధి చెందుతాయి.
2. మట్టిలోని సావయవ వదార్థంలో తేమ తక్కువగా వున్నప్పుడు ఈ మిశ్రమం నీటిని నిలువ వుంచుకోని తగిన సమయంలో మొక్కకు అందవేస్తుంది. సావయవ వదార్థానికి నీటిని పీల్చుకోవడం, దానిని నిలువ ఉంచుకోవడం అనే అంశాలు సర్వ సాధారణమైనవి. అందుచేత సావయవ వదార్థం ఎక్కువగా వున్న మట్టి ఎక్కువ నీటిని పీల్చుకొంటుంది. అంతేకాక ఎక్కువ కాలం నిలువ చేసుకొంటుంది. మొక్కలకి నీరు అవసరమైనప్పుడు అందవేస్తుంది. జలగ్రహణ శక్తి ఎక్కువగా వుండుటచేత ఎక్కువగా వర్షపు నీటిని నిలువ వుంచుకొంటుంది. ఈ నీరు నేలపైన వృధా కాదు.
3. మట్టి లోని సావయవ వదార్థం మట్టిని బురదలాగ మారుస్తుంది. ఇందులోని ఇసుక కణాలని మట్టిలో కలిపి పోకుండా వేరు వేరుగా వున్నప్పుడు ఇది వర్షం కురిసినపుడు వర్షపు నీటిలో చెల్లా చెదురవుతుంది. అలా అయినప్పుడు ఈ సావయవ వదార్థం ఇసుక రేణువులు మట్టితో కలిసి నీటి పారుదలను అడ్డగించి మట్టిలోని నీరు ఇంకి పోకుండా చేస్తుంది. సస్యపు ఆకారానికి, అభివృద్ధికి అతి ముఖ్యమైన ప్రాణ వాయువును ఈ సావయవ వదార్థము నుండి లభించును. ఈ సావయవ రూపంలో ఉండు ప్రాణవాయువు, గంధకం రెండూ కలిసి వుంటుంది. ఈ పోషకాలేకా ఇంకా మైసోన్ పోషకాలు వున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇందులో హోర్మోన్ (Hormone) అనే ద్యోతక వదార్థాలు మొక్కలలో ఏదేని రోగాలను నిరోధించి మొక్కల పెరుగుదలకు తోడ్పడుతాయి. సావయవ వదార్థంలో ఈ “హోర్మోన్” ఉంటుంది. అవసరమైనప్పుడు ఇది మొక్కలకు అందవేస్తుంది.
4. సావయవ వదార్థం మట్టిలో వున్న సస్య పోషకాలను సస్యాలకు అందజేసి వాటి నిర్దిష్ట రూపం రావడానికి తోడ్పడుతుంది. సావయవ వదార్థం కుచ్చి పోయినపుడు, ఎండిపోయినపుడు, కొన్ని ఆమ్లములు (Acids) ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఈ ఆమ్లాలు మట్టిలోని “పొటాషియం” (Potassium) మొదలైన ఖనిజ భాగాలను సస్యపోషకాలను పైకి త్రోసి మొక్కలకు అందేట్లుగా చేస్తాయి.
5. సావయవ వదార్థం కృత్రిమంగా తయారు చేసిన ఎరువు నీటిలో కరిగి నీరు నిలుపుదలను తొలగిస్తుంది. వాటి పువయోగాలను హెచ్చిస్తుంది. ఈ కృతక పోషక ఎరువులను సావయవ వదార్థంతో కలిపి మొక్కలకు వేసిన పెరుగుదల అగిపోయిన మొక్కలు కూడా వృద్ధి చెందుతాయి.
3. ఈ సావయవ వదార్థం మట్టిలో అసంఖ్యాకంగా వున్న సూక్ష్మ జీవ కణాలు, సస్యాలువులు, ఈ రకానికి

పెందినవాటికి ఆహారాన్ని అందజేసి పోషిస్తుంది. ఈ సూక్ష్మజీవులు సవ్యపు పెరుగుదలకు చాలా సహాయకారిగా వుంటాయి. (చూడండి మట్టిలోని సూక్ష్మ జీవకణాలు).

7. సావయవ పదార్థం వాన పాములు, చీమలు మొదలైన మట్టిలో వుండు ప్రాణులకు ఆహారాన్ని అందజేస్తుంది. ఈ ప్రాణుల ద్వారా కూడా మొక్కలకు అనేక ఉపయోగాలున్నాయి.
8. ఈ సావయవ పదార్థం మట్టిలోని శార గుణాన్ని (Alkanity) తగ్గిస్తుంది. కొన్ని కారణాల చేత మట్టిలోని లవణాలన్ని చేరి మట్టిని శారవంతం చేస్తాయి. (ఉప్పుగా వుంటుంది). దీని వల్ల మొక్కల పెరుగుదల ఆగిపోతుంది. కాబట్టి సావయవ పదార్థాన్ని మట్టిలో అప్పుడప్పుడు కలిపి, మట్టిని శుభ్రపరచే మట్టిలో శార గుణాన్ని తొలగించవచ్చు.

### తోట వసులలో సావయవ పదార్థపు ప్రాధాన్యత ప్రయోజనం

పంటపొలాలలో సావయవ పదార్థం తక్కువగా వుంటుంది. అయితే పండి మొదలైన ఎరువు పదార్థాలను వేసి ఉత్తమమైన పెరుగుదలను పెంపొందించుకోవచ్చును. వళ్ళిన దేశాలలో ఆకు కూరల ఎరువులు, కంపోస్టు ఎరువులు, వచ్చని ఆకులతో ఏర్పడిన ఎరువులను తోటలో వేయకుండానే రసాయనిక ఎరువులను వేసి మొక్కలను బాగా పెంచుతుంటారు. అయితే తోట పెంపకంలో అందులో చాలా తక్కువ స్థలంలో అనగా ఇంధ్రయందు పెంచెడి తోటలలో, కుండిలలో పెంచెడి మొక్కలను జయప్రదంగా పెంచాలంటే సావయవ ఎరువులు ఎక్కువగా సహాయపడుతాయి. మట్టిలో రోగాన్ని ప్రతిఘటించే ఎరువులు, చెల్తా చెదారం, ప్రాణవాయువు, సారవంతమైన ఒండ్రుమట్టిలో వుండే పోషక పదార్థాలు, సావయవ పదార్థాలకు, మొక్కల పెరుగుదలకి ఎక్కువగా తోడ్పడుతాయి. సారవంతమైన నేలలో సావయవ పదార్థం ఎక్కువగా ఉండివుంటే ఆ మట్టి వేడిని, వాయువుని, తేహంశాలని, పోషక పదార్థాలను సమ పాళ్ళల్లో కలిగి వుంటుంది. ఇది మొక్కల పెరుగుదలకు సహాయకారిగా వుంటుంది. ఇటువంటి నేలలో పెంచిన మొక్కలు త్వరగా పెరగడమేకాక, ఎక్కువ ప్రతిసలాన్ని కూడా యిస్తాయి. మట్టిలో నీరు బాగుగా ఇంకడం చేత ఈ మట్టికి పాదులు చేసి నీరు ఎరువు వేయడం వంటి ప్రత్యేక వసులు చేయనక్కర లేదు. ఈ రకపు మొక్కలు వున్న సారవంతమైన మట్టిలో తేమ త్వరగా ఎండదు. అందుచే నీరు వదే వదే చల్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రకపు మట్టిలో మొక్కలు ఆటంకం లేక బాగా పెరుగుతాయి.


ఈ కారణాల చేత తోటవారి ఈ రకపు మట్టిలోని సావయవ పదార్థాలను ఎల్లప్పుడు వుండునట్లు చూసుకోవాలి. అంతేకాక ప్రతి మొక్కకు వశు ప్రాణుల ఎరువులు, కంపోస్టు ఎరువులు, ఆకులముల ఎరువులను వేస్తూ వుండాలి.

### మట్టిలోని సూక్ష్మ జీవాలు (Soil Microorganisms)

మట్టిలో కోబాను కోట్ల సూక్ష్మ జీవులున్నాయి. ఒక గ్రాము మట్టిలో సుమారు నూరు కోట్ల సస్యజీవులు (Bacteria), ఒక కోటి ఆఫ్థీనో మైసిటీస్, వది లక్షల శిలీంధ్రాలు (Fungus), ఒక లక్ష నీటి సాచి (Algae) వుంటాయి. ఒక ఎకరపు మట్టిలో (4-5 అంగుళాల లోతులో) సుమారు 2500 "పొండిస్ట్" సూక్ష్మ జీవులు వుంటాయి. ఈ విధంగా వున్నందు చేత మట్టిని జీవ పదార్థమని, నజీవ పదార్థమని పరిగణిస్తున్నారు. తోట




3.1



3.2

3.3



మట్టిలో ఈ సూక్ష్మ జీవాల సంఖ్య పాలాలలోని మట్టిలో వున్న సంఖ్య కంటే ఎక్కువగా వుంటాయి. తోట మట్టిలోని మొక్కలు ఫలవంతమయి వృద్ధి చెందుటకు ఈ సూక్ష్మ జీవులే కారణమని చెప్పుకొనవచ్చును. ఈ సూక్ష్మ జీవుల పనులేమిటి? వీటి వల్ల మొక్కలకు లాభమేమిటి? మొక్కల పెరుగుదలకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి? ఈ సూక్ష్మ జీవుల సావయవ పదార్థాలను, ప్రాణులను, మొక్కలకు చెందిన వైత చెదారం, పీచు పదార్థం, మల మూత్రాదులను బాగుగా కుచ్చేటట్టు చేసి ఆ తోటలోని మట్టిలో కలసిపోయేటట్టు చేయడమేకాక నేలను గుళ్ల వరుస్తాయి. పీచు వంటి పదార్థాలని ఎర్రలు, క్రిమి కీటకాలు బాగుగా కొరికి నమిలి మింగి ఆ తరువాత బయటకు త్రోసి వేస్తాయి. శిథిలమైన ఈ పదార్థము మరొక రూపంలో బయటకు వచ్చి కుళ్ళిపోతుంది. అనగా వాటి రూపంలోను, నిర్మాణంలోను మార్పు వస్తుంది. గట్టిగా వున్న పదార్థం మృదువుగాను, కఠినంగా వున్నచో సరళంగాను మార్పు చెందుతాయి. మొక్కలకు పనికిరాని పదార్థాన్ని పనికి వచ్చే పదార్థంగా ఇవి మారుస్తాయి.

### మట్టిలోని తేమ (Soil Moisture)


మట్టిలోని నీటికి, మొక్కలకు వాటి పెరుగదలకు ఎక్కువ సంబంధం ఉండటం చేత మట్టిలోని నీరు ఏ రీతిలో ఇంకుతుంది? ఆ ఇంకిన నీరు ఏ విధంగా నిలువ వుంటుంది? అది ఏ విధంగా అందజేయబడుతుంది. అనే విషయాలను తోటమాలి తెలుసుకొని వుండాలి (చిత్రం 3-4).

మట్టిలో రంధ్రాలు, మట్టిలోని రకాన్ని బట్టి వుంటాయని ఇంతకుముందే వివరింపబడింది. ఈ విధంగా ఉండటం చేత నీరు మట్టిలో ఇంకడానికి అనుకూలంగా వుంటుంది. మట్టి కణాలలో సందులు వుండటం చేత వాటి మధ్య స్థలం ఉండటం. దీనిని మట్టి కణాంతరాలు (Pore Space) అని అంటారు. మట్టిలోని ఇతర రకాల మట్టి కణాలను పెద్ద కణాంతరాలుగా చేయాలి వచ్చినప్పుడు వీటిలో ఇసుకను కలుపుతారు. అప్పుడు ఈ బంక మట్టి కణ మధ్యాంతరం ఇసుక మట్టిలాగ పెద్దది అవుతుంది. ఈ కణాంతరం పెద్దదిగా వున్న నీరు త్వరగా ఇంకిపోతుంది. అవసరమైతే అంత త్వరగానే ఎండిపోతుంది. ఈ మట్టిలో నీరు నిలువ వుండదు. అదే విధంగా బంకమట్టిలో ఇంకడం, ఎండడం అలస్యమే. వీటిలో ఈ బేధానికి కారణం మట్టిలో కణాలలోని కణాంతరాల బేధంవల్ల ఏర్పడుతోంది.



మట్టిలో నీరు దిగిన తర్వాత కొద్దిపాటి నీరు ప్రతి ఒక మట్టి కణాల మట్టు పార రూపంలో కణాన్ని అంటుకొని నిలబడుతుంది. దీన్ని బంధిత జలం - హైగ్రో స్కోపిక్ నీళ్ళు అని అంటారు. 3.3 చిత్రం.

3.3 ప్రాణ వాయువు పుత్తుల్ని అయ్యే చక్రం - గాలి ద్వారా మట్టికి, మట్టి నుండి మొక్కలకు, మొక్కల నుండి ప్రాణులకు, ప్రాణుల నుండి గాలి మట్టికి ప్రాణవాయువు చక్రంలాగా తిరుగుతూ వుంటుంది.

1. మొక్కలు, 2. సప్తాణువు - బాక్టీరియా, 3. కుళ్ళినవి, 4. అమోనియం చేరిన పదార్థాలు, 5. నైట్రేట్, 6. నైట్రో బాక్టీరియా వీటిని నైట్రేట్ రూపానికి తెస్తుంది. 7. ట్రుగ్లిపోయిడివి, 8. నైట్రేట్ ను ప్రాణ వాయువు రూపానికి తెచ్చే బాక్టీరియాలు, 9. ప్రాణవాయువు గాలిలో చేరడం, 10. లెగ్యూము మొక్కలు (బీన్లు, శనగవప్పు మొదలైనవి) 11. ఇవి మట్టిలోని వాయువులో వున్న ప్రాణ వాయువును స్థిరీకరించి, నైట్రేట్ రూపానికి తెస్తాయి. 12. ఈ నైట్రేట్లు నీటిలో సులభంగా కరిగి మొక్కలకి అందుతాయి. 3.4 చిత్రం.



3.4



3.4 a - c. మట్టిలో నీళ్ళు ఏ నిధంగా ఇంకుతాయి.

a. ఎండిన మట్టి కణాంతరంలో గానీ, కణాల మట్టా పార రూపంలో గానీ నీరు వుండదు. b. మట్టి కణాలు, కణాంతరాలు పూర్తిగా నీటిని నింపుకొని వుండటం c. తరువాత అని ఉబ్బి కణాల మట్టా పారలో నీరు నిండుకొని ఉండటం. కణాంతరాలు ఖాళీ భాగం గాలి నిండుకొని వుండటం.

ఈ నీరు ప్రేళ్ళకి అందివ్వడం చాలా తక్కువే. కణం చాలా చిన్నదిగా, సన్నగా వున్నప్పుడు ఈ రీతిలో బంధించబడే జలాంశం ఎక్కువ. ఉదా. బంక మట్టి ఇసుక మట్టికన్నా రెండు, రెండున్నర పాళ్ళు ఎక్కువ నీటిని గ్రహించి నిలువ వుంచుకొంటుంది. ఇటువంటి నీరుని, గురుత్వ నీరు అని అంటారు. ఇది కూడా మొక్కలకు చెప్పుకోదగ్గంత నీరు అందివ్వదు. కొద్దిపాటి నీటిని కణాంతరాలలో కణాల్ని మిగుల్చుకొని ఆవరించుకొని ఉంటుంది. దీన్ని పార నీరు, కేళ నాళిక నీరు (Capillary) అని అంటారు. ఈ నీరే మొక్కల వేళ్ళకి అందచేసే నీరు. చిత్రం 3.5.


3.5 వేరు రోమాలు మట్టి కణాల్ని ఆవరించుకొని కణాలు మట్టా వుండే పార. నీటిని అందులో కరిగిన పోషకాల్ని పీల్చుకొంటుంది. పీల్చుకొన్న పోషక వదార్థాన్ని రోవల ఇతర భాగాలకు అంద చేస్తుంది. a. వేరు రోమం, b. నీరు కణాల మధ్య మొదటి ఇంకి పోతుంది.

మొక్క మట్టా నీరు నిలువ వుండేటట్టు త్రవ్వ పాదును చేయడం, ఈ అంశాల్ని గమనిస్తూ వుండాలి. చిన్న పాదును చేస్తే ఎక్కువగా నీటి కణాలు ఉబ్బి, ఈ నీరు కణాలకి బందాలై, మొక్కలకి కావలసినంత నీరు లభించదు. ఎక్కువ నీరు నిలువ వుండేటట్టు పాదును చేస్తే, ఎక్కువ నీరు ఉబ్బి, మొక్కలలో నీరు ఇంకి పోయి, కొంతకాలానికి వసుపు వచ్చుగా మారిపోతుంది. నీరు వ్యర్థమవుతుంది. మొక్కల వేళ్ళకి, అందివ్వగలిగినంత నీరు కణాంతరాలలో పారై నిలబడేంత నీటిని గ్రహిస్తేనే దానిలో నీటిని పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.

జలంలో నీటిని పైన్, ఆ పైన్ చిలకరించాల్సినంత ఆవసరం లేదు. ఆ విధంగా చిలకరెస్తే నీటిలో వుండు ప్రేళ్ళు మట్టి పారలకు ఇంకదు. పై పారల కణాలే ఆ నీటిని పీల్చుకొంటాయి. అంటే దీని వలన ప్రేళ్ళు మిట్టలాగ అవుతుంది. ఇటువంటి మిట్ట వేర్లు గాలి వీచినప్పుడు తట్టుకోలేవు. మొలకలు సులభంగా మొలకెత్తుతాయి. లేదా ఎండి పోతాయి. ఆ విధంగా ఎండి పోయినప్పుడు ప్రేళ్ళకు నీరు లభించక మొక్కలు, ప్రేళ్ళు వాడిపోతాయి. మొక్కల క్రింది భాగాన వేర్లు వ్యాపించి ఉన్నట్లయితే పై భాగాన ఉన్న పారలు ఎండిపోయినా క్రింద భాగాన ఉన్న పారలలో తేమ ఉండటం వల్ల కొద్ది కాలం నీరు లేక పోయినప్పటికీ వాడదు. కాపున 15-20 సెం.మీ. లోతు వరకు నీరు వెళ్ళేటట్లు పాదులు చేసిన ఆ లోతులో వున్న పారలు నీటిని గ్రహించి, నీటిని నిలువ వుండునట్లు చేస్తాయి. దీని వలన ఎక్కువ కాలం మట్టిలో తేమ వుంటుంది. దాని వల్ల ఆ మొక్కలు నీరు వడే వడే లేకున్నను, వృద్ధి చెందుతాయి.

**మట్టిలోని ఆప్లుత్యం, ఛారత్యం**

కొన్ని మట్టి రకాలలో ఆప్లుకం వుంటుంది. మరి కొన్ని రకాలలో ఉప్పు (షారం) ఉండొచ్చు. లేదా కొద్ది కాలానంతరం ఆ మట్టిలోని షారం వల్ల మట్టి ఛారత్యాన్ని పొందుతుంది. సాధారణంగా తోట పెంపకానికి, పులుపు, ఉప్పు రెండూ అవసరం లేదు. ఇవి వున్న మొక్కలు అభివృద్ధి చెందవు. అయితే కొన్ని రకాల చెట్లకి



3.7

మట్టిలో పులుపు వుండాలి. చిలకడ దుంప, కొన్ని పూల మొక్కలకు “రోడ్ డెండ్రస్”, అసెలీయా, ఓట్టు, ఎక్కువ పులుపు లేదా ఆమ్లత్వాన్ని భరించలేవు. ఉదా. మొక్క తొన్న, స్టాలెం వండు, పాగాకు, సుమారైన ఆమ్లత్వాన్ని భరించగలవు. అలసందలు, ప్రత్తి, వేరుశనగ, సూర్యకాంతి, గోధుమ వీటికి ఆమ్లత్వం అవసరం లేదు. ఉండిన ఎడల చాలా కొద్దిగా వుండొచ్చు.

లూనర్ను, క్యాబేజీ, ఉల్లి పాయలు, స్ట్రెనాన్ మొదలైనవి ఖారగుణం ఏమాత్రం భరించలేవు. ఈత, చెఱకు, రోట్టు, పొట్లకాయ, గడ్డి మొదలైనవి కొద్దిగా ఖారత్వాన్ని భరించగలవు. దానిమ్మ, ఖర్జూరం, ద్రాక్ష, ఎర్రముల్లంగి, కొబ్బరి ఈ రకానికి చెందినవే. అయితే వీటి మొలకలు చాలా నిదానంగా పెరుగుతాయి. సపోటా, జామ, కమలా, నిమ్మ, తెల్ల ముల్లంగి, బుడత బీన్సు, వేరుశనగ మొదలైనవి ఖారత్వాన్ని ఏ మాత్రం భరించలేవు. కాపున మట్టిలోని ఆమ్లత్వ, ఖారత్వాలను వ్యవసాయ కార్యాలయం ద్వారా తెలుసు కొని వారితోటలోని మట్టిలో ఏ రకపు మొక్కలు పెరుగుతాయో, వాటిని పెంచడం ఉత్తమం. కొద్ది మట్టిలో ఖారత్వం, ఆమ్లత్వం వున్నయెడల రసాయనిక చర్యల చేత అనగా ఆ మట్టి యందు సున్నం వేసిన ఆ మట్టి యందు ఖారత్వం, ఆమ్లత్వం తొలగిపోతుంది. సామాన్యంగా బంకమట్టిలోని పులుపును పోగొట్టడానికి ఇసుక మట్టికి వేసి సున్నం శాతం ఎక్కువగా వుండాలి.

ఖారత్వాన్ని పోగొట్టడానికి వీటిలో ఉప్పును కరిగించి ఆ వీటిని మరగ కాచి, గట్టి మట్టిపై ఒక క్రమంలో చల్లుతూ వస్తే అందులో ఖారత్వం కొద్ది కొద్దిగా తగ్గుతుంది. తగ్గనట్లయితే, ఖారత్వం కావలసిన ఆకు కూరలను ఆ నేలలో పెంచడం మంచిది. 3.6 చిత్రం.

3.6 లెగ్యుములు (ద్విదళాలు) పేరు గ్రంధులు, బీన్సు, అనన మొదలైన మొక్కల ప్రేళ్ళలో గ్రంధులు లేక, గుంటలు లేదా ముడులు వుంటాయి. ఈ స్థలంలో వుండే బాక్టీరియాలు ప్రాణజాయువుని నైట్రేట్ రూపంలోకి మార్చి బయటకు తోస్తుంది. ఈ పేళ్ళు క్రుచ్చి, నశించిన తరువాత ఈ నైట్రేట్ మొక్కలకి లభిస్తుంది. అందువల్లనే పసుపు పచ్చని ఎరువులను వేయుట, మొక్కలను పూడ్చుట. ఈ కారణం వల్లనే, జీవం, గంధకం మొదలైన పదార్థాలను వేసి నేలలోని ఆమ్లత్వాన్ని, ఖారత్వాన్ని తొలగించుకొనే వద్దతి మూడవ క్రమం.

మట్టిలోని ప్రక్రియలను కొలిచేడి, కొలమానం పట్టి, స్కేలు మట్టిలోని ఖారత్వాన్ని, ఆమ్లత్వాన్ని కొలవడానికి ఒక స్కేలుని ఏర్పరిచినారు. దీని pH - స్కేలు అని అంటారు. చిత్రం 3.7.

3.7. మట్టిలోని ఆమ్లత్వాన్ని, ఖారత్వాన్ని ఎంత వుందో తెలుసుకోవడానికి pH - Scale అంటారు. 1. కొలిచే స్కేలు, 2. ఎంత ఆమ్లత్వం, ఖారత్వం ఉందో తెలిపేది a. తటస్థ (PH 6.9 - 7.1 స్కేలు), b. అల్కలైన్ ఖారత్వం. (P.H. 7.1 - 7.5) c. మధ్యమఖారత్వం (PH 7.6 - 8.2) d. విపరీత ఖారం (P.H. 8.3 కన్నా ఎక్కువ) e. PH 6.9 - 6.5 ఆమ్లత్వం కొద్దిగా వుండటం. f. PH 6.4 - 5.3 మధ్యమ ఆమ్లత్వం. g. PH 5.2 కన్నా తక్కువగా ఉండడం విపరీత ఆమ్లత్వం.

ఈ పై పట్టిలో 7 తటస్థ స్థితి లేదా ప్రతి క్రియను (Neutral) సూచిస్తుంది. డాక్టరు మాసెడి ధర్మా మీటరులో 98.4°F. ఏ విధంగా తటస్థం సూచిస్తుందో అదే విధంగా 7 కన్నా తక్కువగా వున్న ఆ మట్టిలో ఆమ్లత్వం తక్కువగా వున్నట్లు. ఖారత్వం 7 కన్నా ఎక్కువగా వుంటే ఎక్కువ వున్నట్లు గ్రహించాలి.

మన తోటలోని మట్టిలోని ప్రతి రకం తెలుసుకోవాలంటే ఆ మట్టిని సమీపంలో వున్న పరిశ్వా కేంద్రాలకు పంపి నిర్ధారించుకొని దానికి అనుగుణంగా మొక్కలు వేయాలి. పరిశ్వా కేంద్రాలవారు ఆ మట్టిని పరిశీలించి ఆ మట్టి యందు శారత్వం, ఆమ్లత్వం ఉన్నది, లేనిది తెలిపి ఆ మట్టి యందు పెంచగలిగిన మొక్కలను కూడా తెలుపుతారు (PH సంఖ్యలో).

మట్టిలో PH కొలమానం 7.1 నుంచి 7.5 వరకు వుంటే ఆ మట్టిలో శారత్వం తక్కువ. మట్టిలో PH కొలమానం 7.5 నుంచి 8.0 వరకు వున్న ఆ మట్టిలో శారత్వం మధ్యమం PH కొలమానం 8 - ఆపైన వున్న శారత్వం ఎక్కువగాను, PH కొలమానం 6.9 నుంచి 6.5 వుంటే ఆమ్ల శాతం తక్కువగాను, PH కొలమానం 6.5 నుంచి 5.3 వున్న ఆమ్ల శాతం మధ్యమంగాను. మట్టిలో PH కొలమానం 5.2 కన్నా తక్కువగా వుంటే ఆమ్ల శాతం ఎక్కువ అని గ్రహించాలి.

కొన్ని మొక్కలు ఆమ్లత్వాన్ని, శారత్వాన్ని అనలు భరించలేవు. కావున మొక్కల పెంపకానికి PH కొలమానం ఎంతెంత కావాలో ఈ క్రింద తెలుపబడింది.

ఆస్ట్రేలియా బీన్సు, బ్రసెల్, స్ట్రాబ్స్, గోధుమ, ముల్లంగి, క్యారెట్లు, కోను, సీసీరియా, అలసందులు, దోసకాయ, పైక్లామెన్, ఫర్నలు, హైడ్రాంజియ, కొన్ని లిగ్నీలు, కొన్ని చిన్న ధాన్యాలు, ఓట్లు, అర్రెడులు, బబానీ, ఎండు మిరపకాయలు, అరటి, బంగాళ దుంప, తీయ గుమ్మడి, రసబూరి పండు, రోడ్ డెండ్రన్, రై గడ్డి, సోయా బీన్సు, కర్బూరం, స్ట్రాబెరి, చిలకడ దుంప, పొగాకు, టర్నిప్, వయోలిట్, గోధుమ, జినియా, మొక్కజొన్న, ఈ చెట్లకు ఉండదగిన పులుపు / ఆమ్ల శాతం PH కొలమానం 5.6 నుండి 6.5 వరకు ఉండవచ్చు. ఈ విధంగా వుంటే కొన్ని సమయాలందు సుమారుగాను, కొన్ని సమయాలందు బాగా పెరుగుతాయి.

బీన్సు, జవ గోధుమ, క్యారెట్లు, కోను, మొక్కజొన్న, అలసందులు, దోసకాయ, ఓట్లు, బబానీ, మిరప, తీగ గుమ్మడి, ముల్లంగి, రై గడ్డి, సోయా బీన్సు, కర్బూరం, చిలకడ దుంప, పొగాకు, టమోటా, టర్నిపు, గోధుమలు, వీటికి ఆమ్లత 6.5 నుంచి 7 వరకు లేదా అల్ప శారజమనుగలో పెరిగిడి మొక్కలివి. వీటికి PH 6.5 కన్నా ఎక్కువ శాతం పులుపు వుండకూడదు.

## సస్య పోషణ - తోట పెంపకానికి కావలసిన ఎరువులు

### Plant Nutrition

మట్టిలో మొక్కలు సమృద్ధిగా పెరగడానికి కావలసిన విధంగా మట్టిని మొక్కల పెంపకానికి అనుకూలంగా మార్చడానికి ఆ మట్టిలో కలిపి రక రకాల పదార్థాల మిశ్రమాన్ని ఎరువు అంటారు. ఈ ఎరువు మట్టిలో మరణించిన క్రిమి కీటకాలు, చెత్తా చెదారాలు, లేదా మొక్కలు ఎండి వాటి ద్వారా ఏర్పడిన ఎరువుగాను ఉండొచ్చును. పేడతో కలిసి ఊరిన కంపోస్టు, మేక లద్ది, కోళ్ళు చెత్త, ఇతర వ్యర్థ పదార్థాలు, ఎముకల పొడి, పశువుల, ఎద్దులు మొదలైన ప్రాణుల నుంచి తయారైన ఎరువు, పిండ్లు, తరగు, కుళ్ళు, మురికి మొదలైన వాటి ద్వారా తయారైన కంపోస్టు, అకు పొడి, పసుపు పచ్చని ఎరువు, మొదలైన మొక్కల ద్వారా, ప్రాణుల ద్వారా ఏర్పడిన ఈ రకపు ఎరువులను సావయవ ఎరువు అని అంటారు. కృత్రిమంగా కార్బానాల్తో రసాయనిక చర్యల వలన తయారయ్యే, అమోనియం, సల్ఫేట్, సూపర్ ఫాస్ఫేట్, పొటాషియం సల్ఫేట్లు మొదలైన వాటిని సున్నం, రాళ్ళు మొదలైన వాటిని ఖనిజ ఎరువులు అనగా నిర్జీవ నిరవయవ ఎరువులు అని వ్యవహరిస్తారు. సామాన్యంగా వాడుకలో వీటిని రసాయనిక ఎరువులు. కృత్రిమ ఎరువులని వ్యవహరిస్తారు.

సావయవ ఎరువు, కృత్రిమ ఎరువు, వరస్పర విరోధమైనవని తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని కలిగివున్నారు. కానీ వీటికి ఎటువంటి విరోధం లేదు. వ్యవసాయదారులు, లేదా తోటమాటలు ఈ రెండు రకాల్ని కలిపి భూమిని, నేలను దున్నిత ఆవుడు ఆ మట్టికి పుష్టి కలిగి మొక్కలు పుద్ది చెందుతాయి.

సావయవ ఎరువులో సామాన్యంగా సస్యపోషకాలు చాలా తక్కువ. కృత్రిమ ఎరువులలో ఈ పోషకాలు ఎక్కువగా వుంటాయి. వీటిల్లో కొన్ని భేదాలున్నాయి. వివరించడానికి ముందు సస్య పోషకాలను గురించి కొన్ని అంశాలను, వివరాలను తెలుసుకొందాం.

### సస్య పోషకాలు (Plant Nutrients)

మొక్కల వికాసానికి, ఫల పుత్పత్తికి, చక్కటి పండు, కాయ పండడానికి ఏ పదార్థం తోడ్పడుతుందో అదే సస్య పోషకమవుతుంది. ఇటువంటి పంపులు - మూల పదార్థాలు (Elements) 180 రకాలు. అవి.

- ఎ. బొగ్గు పులుసు : ప్రాణ వాయువు, హైడ్రోజన్.
- బి. నైట్రోజన్ : ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం.
- సి. సున్నం : మెగ్నీషియం, సల్ఫర్.
- డి. బోరన్ : రాగి, ఇనుము, జింక్, మ్యాంగనీసు.
- ఇ. మాలిబ్డినం : కోబాల్ట్, సోడియం, క్లోరిన్.

మొదటి తెగకు చెందిన పదార్థాల్ని మొక్కలు గాలి ద్వారాను, నీటి ద్వారాను పొందుతాయి. మిగిలిన



15 మూల పదార్థాల్ని మట్టి ద్వారానో, ఎరువుల ద్వారానో పొందుతాయి.

ఎ. గుంపులోని కాల్షన్, ప్రాణ వాయువు, హైడ్రోజన్లను, ఎరువుల ద్వారా మొక్కలకి అంత సులభంగా అంద చేయలేము. ఒకవేళ అందచేసినా అంత ప్రయోజనకరంగా వుండదు. మొక్కలలోని ఆకులే గాలిలో వుండే కాల్షన్, ప్రాణ వాయువులను, వేళ్లు పీల్చుకొనే నీటి ద్వారా హైడ్రోజన్ నీ తమ కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ద్వారానే పొందాలి. ఈ విధంగా పొందడానికి మనం చేసే సహాయం ఆకులు వెడల్పుగా, వచ్చగా పెరిగేటట్టు, వ్రళ్ళు చాలా లోతులో విశాలంగా వ్యాపించేటట్టు ఎరువు గూడులను నిర్మించి పెరగడానికి అనుకూలంగా కృషి చేయాలి. ఈ గుంపులో మిగిలిన పదార్థాలు మట్టిలో కావల్సినంత ప్రమాణంలో లేకపోయినట్లైతే దాన్ని ఎరువుల రూపంలో మొక్కలకు అందజేయాలి.

బి. గుంపులో నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, మొక్కలకు ఖచ్చితంగా తప్పనిసరిగా కావలసిన పదార్థాలు. అందుచే వీటిని ప్రథమ పోషకాలు అని అంటారు. ఇవి లేకపోతే మొక్కలు పెరగవు. ఫలవంతము కాలేవు. ఈ పోషకాలు మొక్కలకు అతి ముఖ్యమైనవి. అంతేకాక మొక్కలకు ఎక్కువ ప్రమాణంలో లభించాలి. మొక్కలకు కావలసినంత ప్రమాణంలో అందచేయాలి.

సి. గుంపులోని సున్నం, మెగ్నీషియం, గంధకం మొక్కలకు అవసరం. అయితే ప్రథమ పోషకాలంత ఎక్కువ ప్రమాణం అవసరం లేదు. వీటిని ద్వితీయ పోషకాలని అంటారు.

డి. మరియు ఇ. గుంపులోని పోషకాలు, చాలా సూక్ష్మ ప్రమాణంలో చాలా తక్కువ ప్రమాణంలో గ్రహించే పోషకాలు సూక్ష్మ పోషకాలు.

పై పేర్కొన్న ప్రతి మొక్క పోషక పదార్థానికి నిర్దిష్టమైన, నిర్ణీత కార్యాలున్నాయి. వివిధ పోషకాలకి వివిధ కార్యాలను కొద్దిగా తెలుసుకొందాం.

మొక్కల శరీరపు భాగంలో ఎక్కువగా కాల్షన్ వుంటుంది. విత్తనాలు, ఫలవంతమైన భాగంలో ఈ కాల్షన్ ఉంటుంది. కాల్షన్ లేకుండా ఏ ప్రాణియు ఉండలేదు. కాల్షన్ సంయోగం లేకుండా సావయవ పదార్థమే లేదు. అందుచేత మొక్కల భాగం పెరగడానికి కాల్షన్ అత్యవసరమైంది.

ప్రాణ వాయువు : మొక్కల వేళ్ళు, జీవించే ప్రతి విభాగానికి కూడా ప్రాణ వాయువు అత్యవసరం, శ్వాసించే ప్రతి వస్తువు ప్రాణవాయువును కలిగి వుంటుంది. ప్రాణ వాయువు ప్రాణులలో జీవనాళం వంటిది. అంతేకాక ప్రాణవాయువు కాల్షన్-డై-ఆక్సైడ్, హైడ్రోజన్ ఇవి మూడు సంయోగం చెంది, కార్బో హైడ్రేట్ పదార్థమే శక్తి. దేహ క్రియకు కావలసిన శక్తికి మూలం. నైట్రోజన్ ప్రాణులకు ఆధార పదార్థం. ఇది లేనట్లయితే విత్తనం చిట్టించి చిగురించదు. ఏ చెట్టైనా పెద్దదైనా, చిన్నదైనా జీవ కోశాల ద్వారా నిర్మితమైందని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈ జీవ కోశం, జీవరసాన్ని, ప్రోటో ప్లాసమ్, దాని రసం, కాల్షన్, ప్రాణ వాయువు, హైడ్రోజన్, నైట్రోజన్, సంయోగం చెందే పదార్థము చేత నిర్మితమైంది. ఈ జీవ రస ఉత్పత్తికి, జీవకోశాల నిర్మాణం, వాటి వృద్ధికి, అంగాంశాల పెరుగుదలకు, ఫల సామర్థ్యానికి నైట్రోజన్ అత్యవసరమైంది.

ఆకులు మొక్కల అవారపు కార్థానాలు. ఆకుల పనులు : దుగ్గతి సంగ్రహణం, సూర్య రశ్మి వెలుతురు,

సహాయంతో ఆకు పచ్చని పదార్థం, చాలా సరళమైన పదార్థాల ద్వారా మొక్కకి కావలసిన అహారాన్ని తయారు చేసి క్రియ. ఈ పచ్చని ఆకులకు ఈ పచ్చదనం చాలా ముఖ్యమైంది. ఈ క్లోరోఫిల్ వుండటం చేతనే ఆకులు పచ్చగా వుండేది. ఈ పచ్చదనం అహారపు ప్రతి క్రియల చర్యలచే ఏర్పడిన పదార్థం. అభివృద్ధిని ప్రేరేపించడానికి ఈ పదార్థ నిర్మాణానికి నైట్రోజన్ చాలా అవసరమైంది. అందుచే, ఎరువుల ద్వారా మొక్కలకి నైట్రోజన్ను వేస్తే, ఆకులు దట్టంగా, వెడల్పుగా పెరగడమేకాక, పచ్చని రంగుకూడా వస్తుంది. ఆకులు ఆకు పచ్చగా వుండిన కొద్దీ కిరణజన్య సంయోగ క్రియ చాలా బాగా జరుగుతుంది. ఈ విధంగా జరిగితే మొక్కలకి అహారం కేడాయించి, పెరుగుదలని వృద్ధి చేస్తుంది. అంతేకాక ఫలాన్ని వృద్ధి చేస్తుంది. అందుచే మొక్కలకి పెరుగుదలకు ప్రాణవాయువు అత్యవసరమైన పదార్థం.

మొక్కలకు కావలసిన ప్రాణ వాయువు లభించక పోయినట్లయితే మొక్కలో కొన్ని కొరతలు కనిపిస్తాయి.

1. మొట్ట మొదట ఆకులు తెల్లబారుతాయి.
2. ఆకులు చిన్నవిగా వుంటాయి.
3. మొక్కల పెరుగుదల కుంటుపడుతుంది.
4. చాలా కొద్ది ఫలాలనిస్తుంది.
5. కొన్ని రకాల మొక్కలలో ఆకులు ఎండి పోతాయి.
6. ధాన్యపు మొక్కల పెరుగుదలలో క్రింది భాగపు వేళ్ళు పెరగవు.
7. నిమ్మ మొదలైన వాటిల్లో ఆకులు రాలిపోతాయి.
8. పువ్వులు, కాయలు, పుష్పంకే కాలం కంటే ముందుగానే పుష్పించి కాయలు కాసి, మొక్కల పెరుగుదల చాలాన్ని, ఇచ్చే ఫల సంపదని తగ్గిస్తుంది.

మొక్కలకు కావలసినంత ప్రాణవాయువునేకాక, ఎక్కువ ప్రాణ వాయువును అందజేసినప్పుడు కూడా కొన్ని అవగుణాలు తలెత్తుతాయి. అవి. 1. ఆకులు, రెమ్మలు, చక్కగా పెరుగుతాయి. కానీ వాటికి సరితూగే వేళ్ళు పెరగవు, వ్యాపించవు. ఈ విధంగా వేళ్ళు పెరగక పోవడం చేత, మట్టిలో తేమ కొద్దిగా తక్కువైతే, ఆకులకు కావలసినంత నీటిని పీల్చుకోవడానికి కావలసినంత ద్రవ్య పెరగకపోవడం చేత ప్రకాండపు భాగాలలో సాట్టులు పడతాయి. 2. ప్రాణ వాయువు ఎక్కువైనప్పుడు రెమ్మలు మొదలైనవి గట్టిగా వుండడానికి బదులు మృదువుగా వుంటాయి. ధాన్యపు బరువును, గాలి వేగాన్ని తట్టుకోజాలదు, రెమ్మలు, ఆకులు విరిగి క్రింద పడిపోతాయి. 3. అందంగా పెరిగిన ఆకులు, రెమ్మలు వీటికి చుక్క, రోగం, బూజు రోగం మొదలైన రోగాలు వచ్చి ఆకులలో రెమ్మలలో చిల్లులు పడుతాయి. 4. మొక్కల అంగ భాగాలే పెరుగుతూ, ఫలాన్ని నిదానంగా ఇస్తుంది. కొన్ని సందర్భాలలో చాలా కొద్ది ఫలాన్ని ఇస్తుంది.

కావున తోటమాలి ప్రాణవాయువును సరిగ్గా సరిపడేంత ప్రమాణంలో మొక్కలకు అందజేయాలి. సామాన్యంగా మన దేశపు మట్టిలో ప్రాణ వాయువు శాతం చాలా తక్కువ. అదే చలి దేశాలలో ఈ అంశం ఎక్కువగా వుంటుంది. దీనికి కారణం ఆ దేశాలలో మట్టిలో వూడిన, ఎరువు పదార్థాలు మొదలైనవి త్వరగా

చేరవు. మన దేశం ఉష్ణ దేశం అయినందున ఈ ఉష్ణం చేత ఎరువులు, సావయవ ఎరువులు త్వరగా మట్టిలో కలిసిపోతాయి. ప్రాణ వాయువు అందులో చేరడానికి అవకాశమే వుండదు. మన దేశంలో ధాన్యపు మొక్కలు చాలా లోతులోకి నాటడానికి ముఖ్య కారణం మన మట్టిలో ప్రాణవాయువు లేకపోవడమే. ఈ రకపు కొరతని తీర్చడానికి, పశువుల లద్దెతో ఏర్పరచిన ఎరువు, కంపోస్టు మొదలైన సావయవ ఎరువులను వేయడమేకాకుండా వీటి జతకు కృత్రిమమైన ఎరువులను చేర్స్తే ఈ కొరతను తొలగించుకోగలుగుతాము.

ఫాస్ఫరస్ : కిరణ జన్య సంయోగ క్రియలో ఫాస్ఫరస్ పాత్ర ప్రధానమైనది. ఈ పదార్థం జీవకోశ నిర్మాణానికి అవసరమవుతుంది. ఈ కేంద్రాలు రెండు భాగాలుగా చీలుతూ వుంటేనే, మొక్క యొక్క అంగాలు వృద్ధి అవుతుందాయి. అంటే సస్య వృద్ధికి ఫాస్ఫరస్ చాలా అవసరం. అందులోనూ పెరిగిడి భాగాలకు, ద్రేచ్చు చివరి భాగానికి, కాండపు కణాల భాగానికి, మొగ్గకు మొదలైన భాగాలకు వాటి వికాసానికి ఫాస్ఫరస్ తప్పకుండా కావాలి. ఈ పోషక పదార్థం మొక్కలకి కావల్సినంత లభించకపోతే కొన్ని కొరతలు వున్నాయి. వేళ్లు వృద్ధి చెంది వ్యాపించవు, మొక్కలు ఎత్తుకు పెరగవు, రెమ్మలు రాకుండా, ఒకటో, రెండో మాత్రమే వుందాయి. మొగ్గులు వికసించవు. ధాన్యపు కాండలు, కాడలు బాగా చీలవు. పప్పు ధాన్యాలలో కందిపప్పు, పెసరపప్పు, మినప పప్పు మొదలైన వాటిలో వేరుపైన పెరిగిడి సస్యాణువులు, దుంచల పొడవులోనూ, మందంలోనూ తగ్గి పోతాయి. కొన్ని సమయాలలో పెరుగుదల కుంటు పడుతుంది. వీటిల్లో ఉండే సస్యాణువులు కావలసినంత నైట్రిటను తయారు చేయలేవు. ఈ ధాన్యపు వృద్ధి తగ్గిపోతుంది. అందుకోసం ఈ రకపు లెగ్యూమలకు నత్రజని ఎరువు వేస్తే, లాభకరంగా వుంటుంది.

నత్రజని, విత్తనాలు అంటు గట్టడానికి, ఫలాలు ఫలవంతమవడానికి అవసరమవుతుంది. మట్టిలో ప్రాణ వాయువు, నత్రజని, కావల్సినంత ప్రమాణంలో ఉంటేవేరుకు తగినంత ప్రకాండం, ప్రకాండానికి తగినంత వేరు, పెరిగి మొక్క వృద్ధి చెంది, చక్కటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది.

గులాబి మొదలైన ముక్కల్ని వృద్ధి చేయడానికి కాండపు ముక్కల్ని నాటతారు. ఈ ముక్కలు బాగా వేరు చిగురించి, అంటుకొని, పెరగడానికి, ఈ ముక్కలకు కావలసినంత నత్రజని కావాలి. తక్కువైతే వీటి ద్రేచ్చు పెరగవు. అలాగని నత్రజని ఎక్కువైతే కూడా వాటిల్లో వేరు, కాండం, ఆకులు బాగా పెరిగి, పళ్ళను ఇవ్వవలసిన కాలం కంటే ముందుగానే పువ్వులు పుష్పించి కాయలు కాస్తాయి. ఈ విధంగా ముందుగానే పుష్పించి కాయకోసి, ఫలవంతం అవడంతో ఆ మొక్క కాలపరిమితి తగ్గిపోతుంది. కొన్ని సమయాలలో ఎక్కువ కావడంతో కొన్ని సూక్ష్మ పోషకాలు కొరవడం జరుగుతూ వుంటుంది. అయితే అద్భుతవశాత్తు మట్టిలో నత్రజని ఎక్కువగా వుండటం అనేది అవురూపం. ఒకవేళ వుంటే కూడా మొక్కల వేళ్లకు లభించడం చాలా కష్టం. దీని కారణం నత్రజని యొక్క చంచల స్వభావమే. నత్రజని వేసిన చోట చాలా త్వరగా మట్టిలో త్వరగా కొన్ని పదార్థాలలో కలిసిపోతాయి. ప్లిరీకరణం చెంది, మొక్కలకు అందచేయలేని రూపానికి మార్పు చెందుతుంది. ఈ రకపు ప్లిరీకరణం ఇనుము పదార్థం ఎక్కువగా వుండే ఎర్ర మట్టి, బొంతరాయి మట్టిలో ఎక్కువగా జరుగుతూ వుంటుంది. ఈ గుణం అవగుణం అని అనిపించినా, ఈ ప్లిరీకరణం ద్వారా నత్రజని ఫాస్ఫరస్ వీటిలో కలిసి, మ్రగ్గి తరువాత మొక్కలకి కొద్ది కొద్దిగానైనా నత్రజని లభిస్తుంది.

పాటాషియం : నత్రజని, ఫాస్ఫరస్ మొక్కల అంగాంగ నిర్మాణానికి కావలసినంత వదార్థం, పాటాషియం. ఈ పనికి అవసరం లేకపోయినా అనేక మొక్కలు క్రియలలో ఈ వదార్థం అవసరమవుతుంది. నత్రజని, ప్రోటీన్సు సారవంతం చేసే నత్రజని వదార్థం (వప్పు ధాన్యాలలో ప్రధానంగా వుండి వదార్థం) గా సంయోగం చెందడానికి ఆకులలో కిరణజన్య సంయోగ క్రియ / ద్యుతి సంశ్లేషణ క్రియ సరిగ్గా జరగడానికి, ఆకులలో తయారైన అవార వదార్థాలు ఆకుల నుండి వేర్లకు, ఇతర భాగాలకు విభజించడానికి ఈ పాటాషియం కావాలి. ఇది మొక్కలలో కావల్సినంత లభించక, మొక్కల కాండాలు, కాడలు, గడ్డి మొక్కలు మొదలైనవి బలమైనవి. గాలికి విరిగిపోవు, పడిపోవు. కాడలతో మొక్క నిండి వుంటుంది. మొక్కల ఆరోగ్య పరిస్థితి రోగాల్ని ఎదురించగల శక్తిని పొంది వుంటుంది. దుంప మొక్కలలో కాండపు మొక్కలలో వెజకు వీటిల్లలో చక్కెర, పిండి వదార్థం వృద్ధి అవడానికి సహాయకారిగా వుంటుంది. బాసర్పు, బీన్సు వీటికి పాటాషియం కావల్సినంత వుంటే చక్కగా దృఢంగా పెరుగుతాయి. స్థూలంగా చెప్పాలంటే ఫాస్ఫరస్ మొక్క వృద్ధికి ఫల పోషణానికి కారణమయితే, పాటాషియం మొక్కల ఆరోగ్యానికి చక్కటి వృద్ధికి కారణమవుతుంది.

ఈ పోషక వదార్థం కొరవడితే అందులో మొదట స్పష్టంగా వ్యక్తమయ్యేది, పాత ఆకులలో ఆకుల చివర, పసుపుగా మార్పు చెందుతుంది. ఆ తర్వాత ఎండి పోతుంది. ఈ కొరవడిన శాతం ఎక్కువైతే లేత ఆకులలోను పై రకపు మార్పు వస్తుంది. మట్టిలో కావల్సినంత పాటాషియం వున్న చోట మొక్క వున్నట్లయితే, పోసిన నీటినే సరిపెచ్చు కోగలదు. అనగా ఈ పోషక వదార్థం మొక్క ఎండి పోకుండా, పచ్చగా వుండడానికి సహాయపడుతుంది.

ఈ పోషక వదార్థం కావలసినంత లేకపోతే, కాండపు క్రింది భాగం, కణుపుల మధ్య భాగం, చాలా తక్కువగా వుంటుంది. అంటే కాండం పొడవుగా, పుష్టిగా పెరగదు. వేరులో కూడా శక్తి వుండదు. వ్యాపించడానికి అనుకూలంగా వుండదు.

పొగాకులో, పాటాషియం కొరత చేత, ఆకుల నరాలు, మధ్య తెల్లని మక్కలు ఏర్పడుతాయి. ఆకుల కొనలు, అంచులు, చుట్టుకొని పోతాయి. మొక్కజొన్నలో అందులోనూ లేత మొక్కల అంచున ఆకుల అంచు, కొన భాగాలు చుట్టుకొని చుట్టలాగ కనిపిస్తుంది. పెరుగుదలలో ఆకు చిన్నదిగా వుండి చుట్టుకొని, గుంటలు, గుంటలుగా వుంటుంది. ఆకు పైన పసుపు గీతలు వుంటాయి. బంగాళా దుంపలోని ఆకులలో ఆకులు చిన్నవిగా వుండి మక్కలు పడుతాయి. పాత ఆకులు పసుపు రంగుకి మార్పు చెందుతాయి. ఆ తర్వాత ఎండిపోతాయి. పెరుగుదల తగ్గుతుంది. ద్విదళాలు పెరుగుదలలో ఆకుల అంచులలో పసుపు రంగు కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఈ భాగం ఎండిపోతుంది. నిమ్మ జాతికి చెందిన మొక్కలలో పుష్పించే కాలంలో ఆకులు ఎక్కువగా రాలిపోతాయి. ఆకు, కొమ్మలు, బలపడడానికి ముందే ఆకులు రాలిపోతాయి. ఆకు కూరలు, కాయకూరలు మొక్కల పెరుగుదలలో పాత ఆకులు కంచు రంగులోకి మారుతాయి. పత్ర నాళాలు పైన అక్కడక్కడ తెల్లని మక్కలు ఏర్పడుతాయి. నిమ్మజాతిలో పండ్ల తోలు లావుగా అయి, సరిగ్గా పండవు, వృద్ధి చెందవు.

సున్నం : ఇది సస్య పోషకము మాత్రమే కాకుండా మట్టిని సారవంతం చేసే వదార్థంగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. మట్టిలోని వృద్ధదాన్ని తొలగించడానికి, మట్టి రకాల్ని సారవంతంగా చేయడానికి, దీన్ని

మట్టిలో పూడుస్తారు. అయితే పోషకాలుగా మొక్కలు గ్రహించేది చాలా తక్కువ శాతంలోనే వుంటుంది. సామాన్యంగా మొక్కల పోషణకు కావలసినంత సున్నం మట్టిలోనే - పులుపు - వడ్ల మట్టిలోనూ లభిస్తుంది. అంతేకాక కొన్ని కృత్రిమ ఎరువులలోనూ, కాల్షియం, అమ్మోనియం నైట్రేట్ మొదలైన వాటిల్లో ఈ పోషక పదార్థం వుంటుంది.

సున్నం మొక్కల నిర్మాణానికి కావలసిన పదార్థం. జీవకోశాల చిత్తనాల గోడలకు సున్నం అవసరమవుతుంది. ఆకుల లేత వేర్ల కొనలు పెరుగడానికి ఈ పోషక పదార్థం అవసరమవుతుంది. ద్విదళాల వేర్లపైన ముడులు వున్న సస్యాణువులు చురుకుగా పని చేయడానికి సున్నం అవసరమవుతుంది. సావయవ ఎరువులు, త్వరగా మారి, వాటి పోషకాల్ని సున్నం బయటకు తోస్తుంది. అల్పామినియం, ఇనుము, మ్యాంగనీసు మొదలైన వన్న పదార్థాల ద్వారా కొన్ని సమయాలలో మొక్కలకి హానికలుగుతుంది. సున్నం ఈ హానిని అడ్డుకొంటుంది.

సున్నం కొరవడితే మొక్క జొన్నలో లేత ఆకులు వికసించడానికి బదులు ఒకదానితో ఒకటి అంటుకొని పోతాయి. బంగాళా దుంపల్లో లేత ఆకుల అంచలపైన లేత పసుపు గీతలు ఏర్పడుతాయి. ఆకు చుట్టుకొని పోవడం కూడా జరుగుతుంది. కాయ కూరల మొక్కలలో కాండం లావుగా వుంటుంది. ఆకులలో తెల్లని చుక్కలు ఏర్పడుతాయి. కొత్త భాగాలు వంకర బింకరగా వుంటాయి. ద్విదళాల వేర్లలో కణుపులు సన్నగా వుంటాయి. వేర్లు తక్కువగానే వుంటాయి. నిమ్మ జాతి మొక్కలలో ఆకు అంచ చీలికలు చీలి, తెల్లని చారలు ఏర్పడుతాయి. ఆ తర్వాత పత్ర నాళాలు మధ్య భాగం కూడా తెల్లగా మార్పు చెందుతుంది. సున్నం ఎక్కువైతే డోరాన్, లావ్రు, ఇనుము, మ్యాంగనీసు పోషకాలు కొరత పడవచ్చు.

మెగ్నీషియం : ఇది ఆకు పచ్చగా వుండడానికి ఉపయోగపడే పదార్థం. ఆకు పచ్చగా ఉండడానికి కావలసిన క్రియ జరపడానికి మెగ్నీషియం అత్యవసరం. దీని వల్ల ఆకులు పచ్చటి రంగుగానే మిగిలిపోతాయి. మొక్కలలో వృష్టికరమైన, ప్రోటీను, జీగురు పదార్థాలు, విటమినులు తయారు కావాలంటే ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఈ పోషక పదార్థం కావలసినంత లభిస్తే, మొక్కలు ఫాస్ఫరస్ నిగ్రహించడానికి, దీనిని ఇతర మొక్కలలోని భాగాలకి పంపడానికి తోపుడుతుంది. ఈ పోషక పదార్థం కొరవడితే, మొదట అతి ప్రాచీనమైన ఆకులపైన కొన్ని చివ్చిలు కనిపిస్తాయి. ఆకులలోని ఈనెల మధ్య భాగంలో పచ్చదనముండదు. ఈ భాగాలు తెల్లగా అవుతాయి. సామాన్యంగా ధాన్యాల పెరుగుదలకు మెగ్నీషియం కొరత వలన అంతగా కీడు జరగదు. కొద్దిగా పసుపు పచ్చని రంగుగా మార్పు చెందుతుంది. అంతేకాక పండు పెరుగడంలో ఈ కొరత వల్ల ఏర్పడి కీడు ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఆకులు రాలిపోవచ్చు. బంగాళా దుంపలలో ఆకులు తడి తడిగా వుంటాయి. ద్విదళాలలో ఆకులు అంచ ముడుచుకొని పోతాయి. పసుపు రంగులోకి మార్పు చెందుతాయి. కూరగాయల పెరుగుదలకూడా ఇలాగే వుంటుంది. అయితే అందులో కొత్త ఆకులు మొదట రాలిపోతాయి. ఆ తర్వాత పాత ఆకులు రాలుతాయి.

సల్ఫర్ : సస్యాంగాలు ప్రోటీను ద్వారా నిర్మితమవుతాయి. సల్ఫర్ ప్రోటీను మొక్క భాగాంగము. పిండి పదార్థాల నిర్మాణాలలోనూ, వేర్ల పెరుగడంలో సహాయపడుతుంది. అంటే మొక్కలకి చాలినంత సల్ఫర్ లభిస్తే, ఆకులు

ముదురు పచ్చని రంగుగా అవుతాయి. వేర్లు విశాలంగా వ్యాపిస్తాయి. లెగ్యూమ్ మొక్కల వేర్లలోని ముడుల సంఖ్య మందం ఎక్కువవుతుంది. ప్రోటీనుల నిర్మాణపు గరుకుతనం చేత సాగటం చేత మొక్కలు కూడా బిరుసుగానే పెరుగుతాయి. నల్లర్ కొరవడితే కనిపించే చివ్వులు నల్లజని కొరతకు కనిపించే చివ్వుల వంటివే. ఆకులు పసుపుగా మార్పు చెందడం, పళ్ళలో కండ తగ్గటం, మొదలైనవి. లేత ఆకులలో ఈ చివ్వులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.

ఇనుము : మొక్క యొక్క పచ్చదనానికి అవసరం లేకపోయినా, దాని నిర్మాణానికి ఇది ద్యోతకమవుతుంది. ఇది కావలసినంత లేక పోయినట్లైతే ఆకు తెల్లబారుతుంది. లేదా పసుపు రంగుకు మార్పు చెందుతుంది. పెరుగుదల క్రుంగటమే కాకుండా ఉత్పత్తి కూడా తగ్గిపోతుంది. ఇనుము కొరవడిన మొక్కల కాండం, రెమ్మలు మోటుగా, తేలికగాను వుంటాయి. పత్ర నాళాల మధ్య భాగల నిర్మాణం అవుతుంది. అయితే నాళాలు మాత్రం పచ్చగానే వుంటాయి. నిమ్మజాతి చెట్లలో క్రింది భాగం, కొమ్మలు ఎండుతూ, పెరుగుదల తగ్గుతుంది.

సామాన్యంగా ఇనుము కొరత సాంవత్సరిక మొక్కలలో కన్నా నిత్య మొక్కలలో ఎక్కువ సంవత్సరాలు పెరిగిడి పళ్ళ చెట్లలో ఎక్కువగా వ్యక్తమవుతుంది.

హ్యూంగ్‌సేసు : ఇనుములాగే ఇది కూడా పచ్చదనాన్ని నిర్మించడానికి సహాయపడుతుంది. నిమ్మ, నారింజ, ఉసిరికాయ, జామ మొదలైన వర్షలో విటమిన్ "C" ఎక్కువగా ఉండడానికి, ప్రోటీన్ నిర్మాణానికి సహాయపడుతుంది. ఇది కొరవడితే మొక్కలలో కార్బోహైడ్రేట్ తక్కువగా తయారౌతుంది. మొక్క పెరుగుదల మోటువుతుంది. ఆకులు తెల్లబారుతాయి. ధాన్యపు మొక్కలలో ఆకులు కంది, చుట్టగా చుట్టుకుపోవచ్చు. లేదా గాజాలాగ ప్రదర్శనీయంగా ఉండొచ్చు.

బోరాన్ : సూక్ష్మ పోషకాలలో బోరాన్ పోషక పదార్థపు కొరత వల్ల ఏర్పడే పరిణామాలే ఎక్కువ స్పష్టంగా కనిపిస్తూంటాయి. ఇవి మొక్కలలో వృద్ధి చెందే మొగ్గల, మొలకల చివర, వేర్ల చివర మొదలైన చోట్ల ఎక్కువ స్పష్టంగా కనిపిస్తూంటాయి. వీటి కొరత వల్ల సస్య ఆహారాన్ని అందజేసే ఈనెల వ్యవస్థ చెడుతుంది. జామకాయలు పండు లోపలి భాగం బెండవుతుంది. కొన్ని చెట్లలో కాండం చీలుతుంది. మొక్క జొన్నలో లేత ఆకులు, చిన్నవిగా అవుతాయి. మొలకెత్తి పెరిగిడి కొనలు మరణిస్తాయి. ఆకులు పసుపు రంగులోకి మార్పు చెందుతాయి. బంగాళా దుంపలో దుంప గుణం చెడి రుచికి చచ్చుగా వుంటుంది. ఇటువంటి గడ్డను పెంచినప్పుడు మొక్క నిలబడడానికి బదులు ముద్దవుతుంది. కూర గాయలలో కాండం, వేళ్ళపైన ఈ కొరత యొక్క పరిణామం ఎక్కువగా వుంటుంది. కొత్త ఆకులు తెల్లబారడమేకాక, త్వరగా విరిగి పోతాయి. అంతేకాక పత్రరూపాల్ని దాల్చుస్తాయి. మొగ్గలు అంటుకోకుండా ఒకటై వికసించడానికి కష్టమవుతుంది. ఈ చివ్వున్న రీసెటింగ్ అని వ్యవహరిస్తారు. లెగ్యూములలో వేరు ముడులు వృద్ధి చెందవు. మొగ్గలు మరణిస్తాయి. పువ్వులు తక్కువ అవుతాయి. నిమ్మ జాతి చెట్లలో పై తోలు గట్టిపడి బిగుసవుతుంది. దానిపైన అంటు ముడులు పెరగటం మొదలు పెడుతుంది. ముఖ్యంగా బోరాన్ కొరత చేత ఆకు, కాండం, పువ్వులు, పళ్ళ రూపాలు వికారమవుతాయి.

సీసం : ఆకుల కిరణ జన్య సంయోగ క్రియలో తోడ్పడే లోహం. ఈ పోషక పదార్థం తగిన ప్రమాణంలో మొక్కలకు

లభిస్తే మొక్కలలో వచ్చుదనం ఎక్కువగా వుంటుంది. ఇది లేకపోతే పెరుగుదల కుంటువడుతుంది. మొగ్గలు రాలిపోతాయి. విత్తనాలు సరిగా మొలకెత్తవు. మొక్క జొన్నలో ఇది లేకపోతే, తెల్ల మొగ్గు రోగం వస్తుంది బంగాళా దుంపలలో ఆకు మధ్య కందిపోవడం లేదా కంచు రంగుల మచ్చలు వస్తాయి. నిమ్మజాతిలో ఆకులు చిల్లులు పడుతాయి. కాయకూరలు ఇదేవిధంగా చిల్లులు పడతాయి.

**తామ్ర (రాగి) :** ఇది ఆకుల కిరణ జన్య సంయోగ క్రియలో భాగం పంచుకొంటుంది. చిటమిన్ "A" నిర్మాణంలోను సహాయపడుతుంది. మొక్కలలో తామ్ర కొరత ఏర్పడితే ఆకులు తెల్లబారుతాయి. కొన్ని సమయాలలో ఆకులు రాలి మొక్కలే నాశనమవుతాయి. బంగాళా దుంపలో లేత ఆకులు ఎండిపోతాయి. చివరి మొగ్గలు రాలిపోతూ ఉండడం సర్వ సాధారణం. కాయకూరలు పెంపకం కుంటు వడుతుంది. ఆకులలో జలాంశం తక్కువై అవి మొలకెత్తవు, చిగురించవు. సొట్టలు పడుంటాయి. అంతేకాక తెల్లబారుతాయి. నిమ్మ జాతి చెట్లలో పెద్ద ఆకులు వికారత్వం పొందుతాయి. ఆకులు వసువు రంగులోకి మార్పు చెందొచ్చు. వల్లలో జిగురు పదార్థం వృద్ధి చెంది అది ద్రవ పదార్థంగా మారి కారవచ్చు.

**మాలిబ్డినం :** కోబాల్ట్, సోడియం, క్లోరిన్ ఇవి ఎక్కువ కొలతలలో పలు ప్రమాణాలలో మొక్కలకు అవసరం అవుతాయి. వీటి పనులు ఇంకా స్పష్టంగా తెలియ రాలేదు. కొన్ని సమయాలలో ఈ పదార్థాల్ని మొక్కలకి ఎరువుల ద్వారా అందించడం చేత, లాభానికన్నా నష్టమే ఎక్కువ అవడానికి అవకాశముంది. అందుచేత తోటమాలి ఈ పదార్థాల్ని తగిన వారి సలహాల్ని పొంది తగినవిధంగా, తగిన కొలతలలో మొక్కలకు వేయాలి.

## ఎరువులు

పైన వివరించిన సస్య పోషకాల జతకి మొక్కలకి నత్రజని, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, ఎక్కువ కొలతలలో కావల్సినందున, వీటిని ఎరువు రూపంలో అందివ్వాలి వస్తుంది. వీనిని ఎరువు పోషకాలని వ్యవహరిస్తారు. సున్నపు రాళ్ళను పూడవడం ద్వారా సున్నమేకాక మ్యాంగనీసు అందివ్వడం చేత దీన్ని సున్నపు పోషకాలని, మిగిలిన వాటిని తక్కువ ప్రమాణంలో వేయడం చేత వీటిని అల్ప పోషకాలని వ్యవహరిస్తారు.

ఎరువుల పోషకాలైన నత్రజని, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియంలను వివిధ కృత్రిమ ఎరువుల ద్వారా అందివ్వచ్చు. నత్రజనపు కృత్రిక ఎరువులు మార్కెట్లో లభించే కృత్రిమ ఎరువు ద్వారా లభించే నత్రజనిని నాలుగు వర్గాలుగాను, గుంపులుగాను వర్గీకరించవచ్చు.

1. నైట్రేట్ (Nitrate) రూపంలో నత్రజని అందచేసే సోడియం నైట్రేట్, కాల్షియం నైట్రేట్ మొదలైనవి.
2. అమ్మోనియం (Ammonium) రూపంలో నత్రజనిని అందించడం. అమ్మోనియం సల్ఫేట్, అమ్మోనియం క్లోరైడ్, అమ్మోనియం ద్రవం మొదలైనవి.
3. నైట్రేట్ : అమ్మోనియం రెండింటి ద్వారా నత్రజనిని అందజేయడం. అమ్మోనియం సల్ఫేట్, నైట్రేట్, అమ్మోనియం ద్రవం మొదలైనవి.
4. ఆమైడ్ రూపంలో కాల్షియం సైనామిడ్ యూరియా మొదలగునవి.

నైట్రేట్ ఎరువులు నీటిలో త్వరగా కరిగిపోతాయి. అంతేకాకుండా మొక్కల వేళ్లకు త్వరగా ఎటువంటి మార్పు రాకుండా అందచేస్తుంది. నత్రజని కొరతను చాలా కొద్ది కాలంలోనే నివారించడానికి ఈ ఎరువులు చాలా ఉపయోగకారిగా వుంటాయి. సామాన్యంగా ఎరువులను ద్రవ్య, పోషక వేర్లు ఉండే మట్టి పొరలలో వేసి పూడిస్తే అప్పుడు వాటి ద్వారా అనుకొన్న ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు. అయితే మొలక మొలకెత్తిన తర్వాత ఈ రీతిగా ఎరువు పూడ్చడానికి మట్టిని చెదర్చిన మృదువైన పోషక వేళ్లకే దెబ్బ తగలవచ్చు. అటువంటి సందర్భాలలో నీటిలో సులభంగా కరిగి అందజేయగల మట్టిలో అడుగును క్రింది భాగవరకూ దిగగల ఎరువును మట్టి పై భాగాన్నే వేస్తారు. ఈ విధం పై పైనే పూడ్చే పై ఎరువులు వేయడానికి చాలా అనుకూలమైనది. ఈ నైట్రేట్ ఎరువు అవగుణాలు - ఇవి నీటిలో త్వరగా కరిగిపోవడం చేత సారవంతమైన నీటితో పాటు క్రిందికి, పోతాయి. కొన్ని సమయాలలో చెడిపోతాయి. (నాశనమవుతాయి).

**సోడియం నైట్రేట్ (Sodium Nitrate) -** నైట్రేట్ ఎరువులలో దీన్నే ఎక్కువగా వాడుతున్నారు (ఉపయోగిస్తున్నారు). దీన్ని చలి సాల్ట్ పీటర్ అని కూడా వ్యవహరిస్తారు. ఎందుకంటే ఇది చలి దేశంలో నిక్షేప (deposit) రూపంలో లభించడము చేత ఆ విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. కృత్రిమ ఎరువులను కార్మానాలలో తయారు చేయడానికి ముందుగా సోడియం నైట్రేటును ఎక్కువగా వేస్తారు. ఈ ఎరువు అనేక మొలకలకి అనేక రకాల మట్టిలో వేయడానికి యోగ్యమైంది. అయితే సులభంగా నీటిలో అడుగును మట్టి చేరుతుంది. మట్టిలోని రకాలకు కొన్నింటికి సరిపోవును. ఎందుకంటే ఈ ఎరువు మట్టిని త్వరగా మురికి చేసి బురద ఏర్పరుస్తుంది. అప్పుడు ఆ మొక్క యొక్క కణ విన్యాస క్రమం చెడుతుంది.

ఈ ఎరువులో 100 భాగాలలో 16 భాగాలు నత్రజని. ఇది పుల్లబి మట్టికి ప్రతి రూపం. గాలి నుంచి గీతలు లేదా చిల్లులు, గుంటలు వడి మొలకలు త్వరగా వృద్ధి చెందడానికి వేయవల్సిన ఎరువుల కొరతలు 1 చ.గ. నకు  $\frac{1}{2}$  నుంచి 1 కిలో (1 చ.మీ 16 నుంచి 32 గ్రా.) మట్టిలో కలిపి పూడ్చాలి (వేయాలి).

**పొటాషియం నైట్రేట్ ( $KNO_3$ ) -** సోడియం నైట్రేట్ లాగే త్వరగా నత్రజనిని అందజేస్తుంది. దీనితోపాటు పొటాషియం పోషకాన్ని కూడా అందచేస్తుంది. దీంట్లో సోడియం నైట్రేట్ అవగుణాలుండవు.

**కాల్షియం నైట్రేట్ (Calcium Nitrate) -** దీంట్లో నత్రజనాంశం 15 శాతం. దీన్ని ఇంత ఎక్కువగా ప్రస్తుతము ఉపయోగించడము లేదు. దీన్ని నైట్రో చాక్ (Nitro chalk) అని కూడా వ్యవహరిస్తారు. దీనిలోని నత్రజని సోడియం నైట్రేట్ నైట్రేట్ శక్తిసంత భరించి, మొక్కలకి అవసరమైనంత పరిధిలో అందజేస్తుంది. ఇది కూడా పుల్ల పండ్లకి ఉపయోగకరమైంది. సోడియం నైట్రేట్ అవగుణాలు వీటికి ఉండవు.

అమ్మోనియం రూపంలో నత్రజనిని అందజేసే ఎరువులు రెండవ వర్గానికి చెందినవి. వీటిలోని నత్రజనిని మట్టి కణాలు అంటుకొని ఉండడం చేత, ఈ నైట్రోజన్ వేడి నీళ్ళలో కలిసి బురదలాగ కాదు. అంటే పోషక వద్యాల్ని మొక్కలకి అందజేయడం కొంత నిదానమవుతుంది. అగి అగి మొక్కలకి మెల్లగా అందజేస్తుంది. మట్టిలో సావయవ అంశం ఎక్కువగా వుంటే అందులో జీవించే సూక్ష్మ క్రిమిలు, అమ్మోనియం రూపంలో నున్న నత్రజనిని (నైట్రోజన్) కొద్ది కాలంలోనే నైట్రేట్ రూపానికి తెస్తుంది. అందుచేత ఈ ఎరువుల పోషణ మొక్కలకి త్వరగా అందివ్వడానికి మట్టిలో కావల్సినంత సావయవాంశం ఉండాలి. ఆకుల, అలముల, చెత్త



చెదారాల ఎరువు, చచ్చాకుల ఎరువులు ఎక్కువ ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.

**అమోనియం సల్ఫేటు (Ammonium Sulphate)** - ఈ రకానికి చెందిన ఎరువులలో ఎక్కువ జనాదరణ పొందింది. ఇందులో నీరు 20.5 అంత అంటే 5లో 1భాగమంత నత్రజనికాంశం వుంటుంది. ఈ ఎరువులో సున్నపు ఖారం ఎక్కువగా వుంటుంది. ఉప్పు ఉండే సామాన్య మట్టిలో పూర్తిగానికే యోగ్యమైంది. పులుపు ఎక్కిన (చేరిన) మట్టిలో ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు వేయొచ్చు కాని దీన్ని ప్రతి సంవత్సరము వేస్తే మట్టిలో పులుపు ఎక్కువై మొక్కల పెంపకం చెడుతుంది. ధాన్యాలు చెడకుండా ఉండడానికి వేయొచ్చు. మట్టిలో సున్నపు అంశం తగ్గొచ్చు. పాస్ఫరస్ (రంజకం) పొటాషియం పాలు తగ్గవచ్చు.

అమోనియం సల్ఫేటుకు గరకు, జిగురు మట్టిని వేయొచ్చు. వరి గడ్డి (వరి మడుల్లో) ఎక్కువ కాలం నీరు నిలువ వుండడం చేత, ఈ ఎరువు వేయడానికి అనుకూలం. నైట్రోజన్ (నత్రజని) అమోనియం రూపంలో ఉండడం చేత ఎక్కువ పాడవ్వదు.

ఈ ఎరువు క్రమ వరిణామం స్పష్టమవుడానికి 10-15 దినాలు పడుతుంది. చలికాలంలో సూక్ష్మ క్రిములు ఎక్కువ చురుకుదనం (జెత్తుకం) లేకపోవడం చేత ఈ ఎరువుల ప్రభావం ఇంకా అలస్యమవుతుంది. ఇది చచ్చుగడ్డిచరువులకు (లాన్సుకి lawns) ఆకు కూరకీ (ఆకులకు) అనేక రకాల తోటల పెంపకానికి యోగ్యమైన ఎరువు.

**అమోనియం క్లోరైడ్ (Ammonium Chloride)** - ఇది కూడా తెల్లని స్పృహించేదే ఎరువు. దీని నత్రజనాంశం (నైట్రోజనాంశం) నాల్గోలో ఒక భాగం. ఇది కూడా మ్రుగ్గి పొడైపోదు. కాని, చలికాలం వేస్తుంటే మట్టి పులుపు ఆపుత్యం మట్టి కొస్తుంది.

**అమోనియం ద్రవం (Liquid ammonia)** - అమోనియాన్ని ద్రవరూపంలో ఎరువుగా ఉపయోగించు కోవచ్చు. దీన్ని మట్టిలో పాతడానికి విశేష ఉపకరణాలు కావాలి. అవి ఇంజెక్షన్లు. ఇందులో శా. 82 అంత నత్రజని ఉంటుంది. ఎక్కువ పోషక పదార్థాలున్న కొద్దిగా వెల తక్కువైనా దీన్ని వేయాలంటే, ఎక్కువ ఖరీదైన ఉపకరణం కావల్సి రావడంతో దీని వాడుక చాలా తక్కువ.

**అమోనియం సల్ఫేటు - నైట్రేటు (Ammonium Sulphate - nitrate ASN)** - ఇందులో నత్రజని పోషక పదార్థం నైట్రేట్ అమోనియం రెండు రూపాలలోనూ ఉంటుంది. దీని నత్రజనాంశం శా. 26 పావు భాగం నైట్రేట్ రూపంలో ఉంటుంది. మిగిలిన ముప్పావు భాగం అమోనియం రూపంలో ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఉండడము చేత ఈ ఎరువులో పోషియం నైట్రేటులాగే వెంటనే అందించే నత్రజని, అమోనియం పీల్చిలాగి ఆగి అందించే పోషకాలున్నాయి. అందుచేత ఈ ఎరువు ప్రభావం నిశ్చయమై (గుప్తమై) నిదానంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

ఇది కూడా చాలా కాలం (సంవత్సరాలు) నేలలో పాతుతూ వస్తే, మట్టిలో ఆఫ్లత్వాన్ని ఎక్కువ (పుద్రి) చేస్తుంది. దీన్ని సేకరించినప్పుడు కొద్దిగా తేమను పీల్చుకొని ముద్దగా అవుతుంటుంది. ఈ ఎరువును సైన వేసే ఎరువుగాను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇది ఇప్పుడు మన దేశంలో తయారౌతుంది.

**అమోనియం నైట్రేట్ (Ammonium Nitrate) -** ఇందులోనే 33 అంటే మూడింటిలో ఒక భాగం నత్రజనాంశం ఉంటుంది. పోషక పదార్థాలలో ఇది మంచి ఎరువైనా ఇందులో ఇతర అవగుణాలు ఎక్కువ. త్వరగా తేమను పీల్చుకొని గట్టి మట్టి ముద్దలౌతాయి. సాగుబడి వేయడానికి కష్టమవుతుంది. సరిగ్గా సేకరించకపోతే, కొద్దిగా ఒత్తిడి ఉన్నా, స్పృటకమై మందు గుండు వలె చిల్లుతుంది. ఇటీవల దీన్ని సున్నంతో కలిపి సులభంగా జారే సన్నని లాఠైన కాడలుగా (ధాన్యపు గింజలుగా) తయారు చేసి, దీని అవగుణాల్ని తొలగిస్తున్నారు.

**కాల్షియం అమోనియం నైట్రేట్ (Calcium Ammonium Nitrate CAN)** లో అర్థ భాగం నైట్రేట్ రూపంలో ఉంటుంది. మిగిలిన భాగం అమోనియం రూపంలో ఉంటుంది. ఈ ఎరువు రంగు తెల్లగా లేదా నిర్బలంగా స్వచ్ఛతగా మృదువైన (కోమల) విత్తనాల రూపంలో ఉంటుంది. రాగి విత్తనాలు లాగ వేళ్ళ మధ్యలో శీఘ్రంగా జారిపోతుంది. కాబట్టి దీన్ని పాతడం చాలా సులభం. ఇందులో సున్నం ఉండడం చేత దీన్ని ప్రతి సంవత్సరం పాతినా వేసినా మట్టికి అప్పుకం (పులుపు) అంటుకోదు. కొద్దిగా మాత్రం అప్పుత్యం పొందుతుంది. అందుచేత ఈ ఎరువును నిర్భయంగా మట్టిలో పాతవచ్చు. దీన్ని జిగురు, గూడు మట్టిలో కలువవచ్చు (మిశ్రమింప చేయవచ్చు). దీని నత్రజనాంశం ప్రుగ్గినాశనం అవ్వదు. ఇసుక మట్టిలో దీన్ని ఒకసారిగా ఒకే ఒకసారి వేయడానికి బదులు అర్థ, అర్థ భాగాలుగా రెండుసార్లుగా పాతడం (వేయడం) మంచిది. ఈ క్రమాన్ని చెఱచు, మిరపకాయలు మొదలైన వాటిని పెంచడానికి ఉపయోగిస్తే ఇది ఎక్కువ ప్రయోజనకారిగా వుంటుంది.

**యూరియా (Urea) -** నత్రజని ఎరువులో నత్రజనకాంశం అత్యధిక ప్రమాణంలో ఉండేది యూరియా ఎరువులోనే. 100 కిలోల అమోనియం సల్ఫేటులో ఉండేంత నత్రజని 45 కిలోల యూరియాలో ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఉండడము చేత పోషకపు సాగుబడి, నంచి, సేకరణ, పాతే ఖర్చు సగం వరకు తక్కువ అవుతుంది (తగ్గుతుంది). అన్ని ఎరువులకన్నా యూరియా మిత ఖర్చుతో వచ్చే ఎరువు. ఈ ఎరువు పూర్తిగా నీటిలో కరగటం చేత, నీటి ఎరువు (నీటిరువు) (Liquid manure) అంటారు. ఆకులపైన చిలకరించి (చల్లి) పోషక పదార్థాన్ని అందజేయడానికి చాలా అనుకూలమైంది. ఈ ఎరువులోని నత్రజనిని వేయడానికి అది అమోనియం నైట్రేట్ రూపంలోకి వచ్చిన తర్వాత మట్టిలోని సూక్ష్మ జీవుల సహాయంతో ఈ రూపం మార్పు చెందుతుంది. పాతిన, పూడ్చిన సముద్ర ఒకటి రెండు వారాలలో ప్రుగ్గి పోషక పదార్థం యిస్తుంది. భారీ వర్షాలు వడేట్టున్నప్పుడు - ఎక్కువ నీరు కట్టినప్పుడు మాత్రమే ఇది నాశనం అవుతుందనే భయం కలుగుతుంది.

ఇది సాంద్రత (ఎక్కువ పోషక పదార్థం గలిగినది) ఎరువు అయినందున దీన్ని బూడిదతోనో, మట్టితోనో కలిపి పాతడం మంచిది. ఆ విధంగా చేస్తే, ఎరువును సమంగా వరచడానికి అనుకూలం. అవిధంగా వేయకపోతే భూమిలో కొన్ని చోట్ల ఎక్కువగా వడి అక్కడుండే వేర్లకు కష్టమవుతుంది (ఇబ్బంది కలుగుతుంది).

ఈ ఎరువు తెల్లని రత్నం (రాళ్ళ ముక్కలలాగ) రూపంలో ఉంటుంది. దీన్ని పాతడానికి సులభంగా ఉండేటట్టు గుండ్రని విత్తనాల రూపంలో తయారు చేస్తారు. యూరియా వాయువులోని తేమని త్వరగా పీల్చుకొంటుంది. అందుచేత దీని సేకరణ కష్టం. అందుచేతనే రాళ్ళకి జలవిరోధి వస్తువుల్ని పూసి విత్తనాలుగా తయారు చేస్తుంటారు.

యూరియాని పాతిన తర్వాత మట్టి లోపలికి చేరడానికి ఆ మట్టి బాగా కలపాలి. అంత మాత్రం చేత మట్టిలోని సూక్ష్మ జీవులు నత్రజనిని మొక్కలకి అందించే రూపానికి తీసుకొని రాలేవు. ఈ ఎరువును ధాన్యాలు నాటేటప్పుడు లేదా పైన వేసే ఎరువుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. యూరియాని ఎండిన మట్టిలోనే పాతాలి. తేమగా వుండే నత్రజని రూపాంతరం పొందదు. అంతేకాకుండా త్వరగా డ్రుగ్గి (నీరు దిగి) నాశనమవుతుంది. పాతిన ఒక వారమైన తర్వాత నాటడం, లేదా విత్తనాలు వేయాలి.

**కాల్షియం సయనామైడ్ (Calcium Cyanamide) -** ఇందులో 21 శాతం అంత నత్రజనికాంశముంటుంది. ఇది మట్టిని ఆఫ్ఘికరించదు. (పులుపు అయ్యేట్లు చేయదు). దీని పోషక వదార్థాన్ని మొక్కలకి అందివ్వడానికి మట్టి గరకుగా ఉండాలి. గాలి దూరేట్లు మట్టికణాంతరాలు పెద్దగా ఉండాలి. ఇది సావయవ ఎరువు, పాతిన అప్పుడైన మట్టికి వేయడానికి, యోగ్యమైన ఎరువు. దీన్ని విత్తనాలు వేయడానికి లేదా మొక్కలు నాటడానికి 2-3 వారాల ముందే వేయాలి.

**నత్రజనియమైన ఎరువులు అత్యుత్పత్తమైనవి**

ఒక్కొక్క ఎరువులో విశేష గుణాలూ ఉంటాయి, అవగుణాలూ ఉంటాయి అనే విషయంపైన తెలుపబడింది. మట్టి, ధాన్యాల పెంపుదల ఋణ సేకరణ - సౌకర్యం, ఖర్చు, తోట వెల, మొదలైన అంశాలని గమనించి తోటమాలి తమ ఆవసరానికి సరైన ఎరువుని ఎన్నుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రం ఈ ఎరువుల పుణ్యఫలాన్ని పొందడానికి సాధ్యమవుతుంది. నీటి సౌకర్యం లేకుండా ఉండి వర్షపు నీటిపైన ఆధారపడి పెరిగే ప్లలాలు తక్కువ నత్రజనాంశం ఉండే ఎరువుని, ఏరుకోవాలి. నీటి సౌకర్యం వుండి ఎక్కువ వర్షముంటే ఎక్కువ నత్రజని అంశముండే ఎరువుని ఎన్నుకోవాలి. ఆపుత మట్టికి పులుపు ఎక్కువగల ఎరువులను వేయకూడదు.

పెరుగుదల త్వరగా వచ్చేట్లు, కుదురుకునేట్లు లేదా శీఘ్రంగా (త్వరగా) పెరగాల్సి ఉన్నప్పుడు (ఆకులు, పెరుగుదల గడ్డి మొదలైనవి) నైట్రిన్ ఎరువులను వేయడం మంచిది. ఇందులోని పోషక వదార్థం త్వరగా లభించడము చేత, దీర్ఘకాల పెరుగుదలకు అమ్మోనియం ఎరువులు అనుకూలమైనది. పోకరించడానికి ఎక్కువ స్థలం లేక పోయినట్లైతే యూరియాని సాంద్ర ఎరువుగా అవ్వడం చేత ఎంచుకోవాలి ఉంటుంది.

**పాస్ఫోటిక్ ఎరువులు :** పాస్ఫోటిక్ ఎరువులను మూడు తెగలుగా విభజించవచ్చు.

1. పాస్ఫోటిక్ ఎరువు నీటిలో కరిగే రూపంలో సాదా, సాంద్ర, సూపర్ ఫాస్ఫేట్, మానో, డై అమ్మోనియం పాస్ఫేటు (Mono and di ammonium Phosphate).
2. పాస్ఫేటు సిట్రేట్ ఎరువు (Citrate) జందీర లవణం కరిగే బేసిక్ స్లాగ్ (Basic Slag)
3. పాస్ఫేటు కరగకుండా ఉండే శిలా పాస్ఫేట్ (Rock phosphate) ఎముకల పొడి యిల్పాదివి.

వీటిల్లో ఎక్కువ వాడుకలో ఉన్న సూపర్ పాస్ఫేటు ఎముకల పొడి మన దేశంలో అమ్మోనియం పాస్ఫేట్ ఎరువుగా తయారవుతోంది.

## సూపర్ పాస్పేటు (Super Phosphate)

ఇది మన దేశంలోనూ, అనేక దేశాలలోనూ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్న పాస్పరీయ ఎరువు. దీనికి కారణం, దీని పాస్పరాంశం మొక్కలకి, అందించే రూపంలో ఉండడం. అంతేకాకుండా త్వరగా చేతికి అంది రావడం. సామాన్య సూపర్ లో (Ordinary Super) సుమారు 16 నుంచి 20 శాతం అంత నీటిలో కరిగే పాస్పరాంశం ఉంటుంది. ఇది తెల్లని రంగులో బూడిదలాగ ఉండే పొడి, అందువేత దీన్ని మన రైతులు 'బూడిదెరువు' అని వ్యవహరిస్తారు.

ఇది అనేక రకాల మట్టికి అంద చేసే ఎరువు. అయితే మట్టిలో ఆమ్లం (పులుపు) లేదా ఖారం (లవణం) ఎక్కువగా ఉంటే దీని పోషక పదార్థం స్థిరీకరణంగా (Fixation) మొక్కలకి అందివ్వ వలసినంత శక్తిని అందివ్వలేదు. అందువేత సూపర్ వల్ల ఎక్కువ ప్రతి ఫలం లభించాలంటే పులుపు (ఆమ్లం లేక) ఉప్పుక్కిన తటస్థ మట్టిలో (Neutral soils) లభిస్తుంది. గడుసు బీడు భూములలోనే దీని ప్రభావం, ప్రయోజనం ఎక్కువగా పుంటుంది. చిన్న రకపు మట్టిలో దీని ప్రభావం తక్కువ.

ఎక్కువ పాస్పరాంశం, ఉన్న సూపర్ ని, డబుల్ సూపర్ లేదా ట్రిబుల్ సూపర్ అంటారు (Double or Triple Super Phosphate). ఇందులో సుమారు 40 నుంచి 48 శాతం నీటిలో కరగ గగ్గిన పోషక పదార్థాలుంటాయి. అందువేత ఇది యూరియాలాగే మిత ఖర్చులో లభించే ఎరువు. ఆమ్మోనియం పాస్పేటు (Ammonium Phosphate) ఈ ఎరువులో దాని పేరు సూచించేటప్పుడు, రెండు సస్య పోషకాలు, నత్రజని (ఆమ్మోనియం రూపంలో) పాస్పరన్ ఉంటాయి. ఈ పోషకాల్ని వేరు వేరుగా గ్రహించి మిశ్రమం చేసి (కలిపి) పాతడానికి బదులు రెండింటినీ ఒకే ఎరువు ద్వారా అందించవచ్చుంటే ఇది తోటమాలికి ఎక్కువ అనుకూలమైన ఎరువు ఈ ఎరువులోనూ 2 రకాలు. 1. మోన్ ఆమ్మోనియం పాస్పేట్. ఇందులోనే 4 నుంచి 11 పాళ్లు నత్రజని 48 పాళ్లు పాస్పరస్ ( $P_2O_5$  - Phosphoric acid) 2. డై ఆమ్మోనియం పాస్పేట్ ఇందులోనే 21 శాతం నత్రజని 54 శాతం పాస్పరస్ ఆమ్లం ఉంటుంది.

మరొక ఎరువు మన దేశంలో ఇటీవల తయారౌతున్న ఆమ్మోఫాస్ (Ammophos) B ఇందులో 16 శాతం నత్రజని 20 శాతం పాస్పరస్. ఆమ్లం 15 శాతం సల్ఫర్ (గంధకం) ఉంటుంది. ఈ ఎరువు తెల్లగా సురగ రంగులో ఉంటుంది. నీటిని పీల్చుకోదు. సేకరించడం సులభం, అనేక రకాల మట్టి రకాలకి సరిపోతుంది. పులుపు కలిగిన ఆమ్లకృత మట్టి రకాలకు కొంచెం ఎక్కువగా సరిపోయేది (నరైనది) డై కాల్షియం పాస్పేటు (Di Calcium Phosphate) ఇందులో 35-40 శాతం సిట్రేట్ లో కరిగే పాస్పరస్ ఉంటుంది. దీని వెల కొద్దిగా తక్కువ. సేకరించడం సులభం.

బేసిక్ స్లాగ్ (Basic Slag) - ఇది ఎంతో అరుదుగా వుండుచుగా ఉంటుంది. ఇది లభిస్తే వీని ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఇందులోని పాస్పరస్ అంశం త్వరగా ఇతర భాగాలకు అందివ్వగలదు. అంతే కాకుండా తక్కువ కూడ. కేవలం 3 నుంచి 5 శాతం అయినందున మొక్కలకు కావల్సినంత పాస్పరస్ ఈ ఎరువు ద్వారానే అందివ్వాలి వస్తే ఎక్కువ ప్రమాణంలో (కొలతలలో) పాతాల్ని వస్తుంది. ఈ కారణాల వేత ఇది ప్రజాదరణ పొందలేదు, అయితే చెఱకు కార్మాణాలలో ఎక్కువ ప్రమాణంలో (కొలతలలో) లభించే

వర్ష వర్షావృతమైనందున, దీన్ని సద్వినియోగించుకోవడానికి, ఎరువుగా మార్చుకోవచ్చు.

### ఎముకల పొడి (Bone meal)

ఇందులో పాస్ఫరస్ కాకుండా నత్రజని కూడా వుంది. దీని సారాంశం నీటిలో కరగకపోవుట చేత, ఇది పెరుగుదలకు వెంటనే పనిజేయదు. ఈ కారణం చేత ఎముకల పొడి స్వల్పపరిమాణ (శీఘ్రంగా) ధాన్యాల కన్నా దీర్ఘపరిమాణ, మొక్కల (ధాన్యాలకు)కు ఉత్తమమైనది. దీని ద్వారా ఎక్కువ ప్రతిఫలాన్ని పొందడానికి దీన్ని అమ్మోనియం సల్ఫేటు, పసుపు వచ్చిన ఎరువుల జతలో కలిపి పాతడం మంచిది. అప్పుకృతమైన మట్టికి ఎముకల పొడి ఉపయోగమైన పాస్ఫరస్ ఎరువు, పులుపు (అమ్మం), దీని పాస్ఫరాంశాన్ని మొక్కలకు అందించే రూపానికి తెస్తుంది. ఎక్కువ వర్షం కురిసే ప్రదేశాలకు ఇది సరైన సమర్థనీయమైన ఎరువు. పోషకాలు త్వరగా నాశనంకావు.

ఎముకల్ని వేయించి చాలా మృదువుగా రుట్టి, స్టీమ్ బోన్ మేల్ (Steamed Bone Meal) అనేదాన్ని చేస్తారు. ఇది సాధారణ ఎముకల పొడికన్నా ఎక్కువ మరుకుగా వుంటుంది. సస్యరోపకాలకు కొద్దిగా త్వరగానే అందజేస్తుంది. సామాన్య ఎముక పొడిలో 3 పాళ్ళుకీ నత్రజని సుమారు 8 యంతలు అందజేసే పాస్ఫరస్ ఉంటుంది. అదే వేయించిన ఎముక పొడిలో  $1\frac{1}{2}$  యంతలు నత్రజని 16 శాతం అందివ్వడానికి సరిపడే పాస్ఫరస్ అమ్మం ఉంటుంది.

### పొటాషియం ఎరువులు (Potassic fertilisers)

నీటిలో ముఖ్యమైంది పొటాషియం సల్ఫేట్ (Potassium sulphate) పొటాషియం క్లోరైడ్ - మ్యూరియేట్ ఆఫ్ పొటాష్ (Potassium chloride - Muriate of Potash) కట్టెల బూడిద (Wood ash).

పొటాషియం సల్ఫేటులో 48 నుంచి 52 భాగాలు పొటాషియం ఆక్సైడ్ ( $K_2O$  Potassium Oxide) ఉంటుంది. మ్యూరియేట్లో ఇంకా ఎక్కువ 50 నుంచి 60 శాతం వుంటుంది. రెండింటిలోనూ పోషకాంశం నీటిలో కరిగి మొక్కలకి అందించే రూపంలో ఉంటుంది. మ్యూరియేట్ నీటిలో బాగా కరగడం చేత, ఎరువు నీటి రూపంలో అకులపైన చల్లడానికి అంది వస్తుంది.

చిన్న తరహా (కణాల) మట్టిలో ఈ ఎరువులను మట్టిపైన వరచి కలయజెల్పాలి. అయితే బంకమట్టిలో వీటిని వేర్లు ఎక్కువగా పెరిగే స్థలంలో భూమిలోపల నాటాలి.

వర్షాల ఎక్కువగా ఉన్నవైపు మ్యూరియేట్ కన్నా సల్ఫేట్ మంచిది. యూరియా కన్నా సల్ఫేట్ పొగాకు, దుంపలు, నూనె గింజలు, ధాన్యాలకు అనుకూలమైనది, సరైనది. సున్నం ఎక్కువగా వుండే, కొద్దిగా షారముండే నేలకు పొటాషియం సల్ఫేట్ సమర్థవంతమైంది, సరైనది.

చిన్న తరహా నిర్గుల మట్టికి సల్ఫేటుని, గట్టి నేలకు అమ్మ మట్టికి మ్యూరియేటును ఎన్నుకోవాలి. అయితే నల్ల, ఎర్ర మట్టికి (Black Cotton Soils) సల్ఫేటు ఎక్కువ తృప్తికరమైన ఫలితాన్నిస్తుంది.

## మిశ్రమ ఎరువులు (Compound & Complex fertilisers & Fertilizer mixtures)

ఒక రకపు రసాయనిక ఎరువులో ఒకేరకపు సస్యపోషకం ఉండడం **సర్వ సాధారణం**. అమ్మోనియం సల్ఫేట్, యూరియా, సోడియం నైట్రేటు మొదలైన వాటిల్లో నత్రజని మాత్రముంటుంది. సూపర్ ఫాస్ఫేట్లో సల్ఫూరికామ్లం మాత్రమే ఉంటుంది. మ్యూరియేట్ ఆఫ్ పొటాషియంలో పొటాష్ (పొటాషియం డై ఆక్సైడు) మాత్రమే ఉంటాయి. కాని కొన్ని రకాల ఎరువులలో రెండు లేదా మూడు పోషకాలు సంయుక్తంగా వుంటాయి. కాల్షియం, అమ్మోనియం, నైట్రేట్లో సున్నం, నత్రజని, మోనో, అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్లు (దీన్ని అమోఫాస్ AB అంటారు). పై అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్లో (దీనిని డై అమోఫాస్ అంటారు). నత్రజని ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం నైట్రేటులో నత్రజని పొటాషియం పోషకాలు రసాయనికంగా సంయుక్తమై ఉంటాయి. వీటిని సంయుక్త ఎరువులని అంటారు. కాంపౌండు ఎరువు (Compound Fertilizers)లని అంటారు. ఇవి రెండు రకాల పోషకాల్ని మొక్కలకి అందజేయగలవు. అందుచేత సాగుబడి, సేకరణ, పాతే ఖర్చు, ఏక పోషక ఎరువులకన్నా తక్కువ.

మొక్కలకి ఒకే పోషకాన్ని అందచేస్తే చాలదు. మరెన్నో పోషకాలు కావాలి. ఈ పోషకాలలో వెనుక తెలిపినట్లు నత్రజని, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం పోషకాలు ఎక్కువ మోతాదులో ఉండాలి. మిగిలిన అల్ప పోషకాల్ని మొక్కల మట్టి నుంచో మట్టిలో పాతే అవుల పేడ ద్వారానో, గుడ్డిపు లద్ది ఎరువు ద్వారానో, పిండి ద్వారానో సావయవ ఎరువుల ద్వారానో పొందుతాయి.

నత్రజని, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం సస్య పోషకాలలో ఒకదానికొకటి కొరవడి పెరుగుదల చెడుతుంది. అందుచేత అయినంత వరకు ఎరువులు, పెరుగుదలకు కావల్సినంత మట్టిలోని పోషకాల అంతస్తుకి తగిన విధంగా ఉండాలి. సమూహపుండేటట్లు అందివ్వాలి. ఈ విధంగా రెండు పోషకాల్ని అందివ్వడానికి రెండు మార్గాలున్నాయి. 1. మూడు పోషకాలు రసాయనికంగా కలిసి సమిశ్రమమై (Complex) ఎరువులను పాతడం లేదా 2. వివిధ పోషకాలుండేటటువంటి వివిధ ఎరువుల మిశ్రమం వేయడం.

ఇటీవల మన దేశంలో సుఫల మొదలైన 3 పోషకాలున్న సమిశ్ర ఎరువులు విత్తనాల రూపంలో తయారౌ తున్నాయి. వీటిల్లో ప్రస్తుతానికి 3-4 దశ్శీలు (మాదిరీలు) మాత్రం లభిస్తున్నాయి. ఇక ముందు వివిధ ధాన్యాలకు అయో ప్రదేశాలకు నరైనవి సమర్థవంతమైనవి. వివిధ మాదిరీల సమిశ్రమాలయిన ఎరువులు తయారౌతాయి. ఇది తోటమాలికి చక్కటి సౌకర్యం. మూడు రకాల ఎరువులకు బదులుగా ఒకదాన్ని పాతడం ఆసుకూలమైన పద్ధతి. అయినా దీనివలన కొన్ని అనానుకూలాలు కూడా వున్నాయి. వీటి గురించి తర్వాత చర్చించ బడింది.

వివిధ ధాన్యాలకు వివిధ ప్రదేశాలలో సరిపోయే ఎరువుల మిశ్రమాలను ప్రభుత్వంవారు సొంత ఎరువుల కంపెనీలను ఏర్పరచి విక్రయిస్తున్నారు. దీన్ని వరి మిశ్రమం, పుష్పాల (పూల మొక్కల) మిశ్రమం అని వ్యవహరిస్తున్నారు. వీటిని ఒక క్రమ పద్ధతిలో మిశ్రమము చేసి తయారు చేస్తుండడం చేత ఇవి కొద్దిగా ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందినాయి. ఈ మిశ్రమాలను ఎక్కువ కాలం నిలువ చేయడానికి ఇటీవల వీటిని విత్తనాల రూపంలో తయారు చేస్తున్నారు. ఈ విత్తనాలను (Granulated fertilizer mixtures) (చిన్న రేణు ఎరువులు) ఎక్కువ కాలం సేకరించి పెట్టుకోవచ్చు. అంతే కాకుండా ఇవి గడ్డ కట్టవు. తేమను పీల్చుకోవు. అధికాకుండా చిన్న

రేణువులు త్వరగా దొడ్లడం చేత వీటిని చేతితో (విన్యాసంతో) గరిటతో, ఉవకరణాలతో పాతడం సులభం. అందుచేత తోటమాలి, ధాన్యాలకు మొక్కల పెంపకానికి అనుకూలమైన ఎరువుల మిశ్రమాన్ని కొని పాతవచ్చు.

కాని ఈ మిశ్రమాలలో కొన్ని గ్రేడు లేదా మాదిరిలు తయారు అవుతుండడం చేత ఆ మిశ్రమంలో ఉండే పోషకాలన్ని అవసరం లేదు. అక్కర లేకపోయినా పాలాల్ని వస్తుంది. ఈ విధంగా చేస్తే అనవసరం అయిన పోషకాల్ని నాశనం చేయడమే కాకుండా, దానికి చేసే ఖర్చు వ్యర్థం. అందుచేత తోటమాలి కొన్ని సందర్భాలలో తమ పాలాలలో ధాన్యాల పెంపకానికి సరైన సమర్థవంతమైన పోషకాలను సరైన మోతాదులో అందివ్వడానికి తానే సాంతంగా తయారు చేసుకుంటాడు. ఇది జాగువుతో కూడిన వనే అయినా ఖర్చు తక్కువ. ఎందుకంటే కార్మానులలో తయారు చేసే మిశ్రమాలపైన వేసే లాభం మిగులుతుంది. దీనికి తోడు అనావశ్యకమైన పోషకాల్ని మనం తయారుచేసుకొనే మిశ్రమంలో చేర్చుకుండా పోవడంతో దీని ఖర్చు మిగులుతుంది. అంతేకాకుండా మనం తయారు చేసుకొన్న మిశ్రమం, మనతోటలోని మొక్కలకి, మట్టికి సరైనది అయినందున పోషకాల పూర్ణ ఫలం మనకి లభిస్తుంది.

అన్ని ఎరువులను మిశ్రమంగా తయారు చేసుకోలేము. కొన్ని ఎరువులు కలవవు. ఒకవేల కలిపితే రసాయనిక క్రియకు లోనవుతుంది. చిత్రం 4.6లో ఏయే ఎరువులను మొదటి కలిపి పెట్టుకోవచ్చు. ఏయే వాటిని పాతడానికి ముందు మాత్రమే కలిపి పెట్టుకోవాలి. కొన్నిటిని అసలు కలవకుండా ఉండాలి. మొదలైన అంశాల్ని తెలుపబడింది. దీని ప్రకారం మనం సాంతంగా మిశ్రమాల్ని తయారుచేసుకోవాలి (అనుబంధం చూడండి).

### ఇతర ఎరువులు

నత్రజని, పోటాషియం తప్ప మిగిలిన ఇతర సస్యపోషకాలు తక్కువ ప్రమాణంలో కావల్సి రావడంతో వాటిని రసాయనిక రూపంలో అందివ్వడం పరిణామకారి. మెగ్నీషియం అనే మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ సీసమునే, జింక్ సల్ఫేట్, తామ్రమునే, కాఫర్ సల్ఫేట్ (మైలుతుత్తం) మాల్బిద్రినం అనే మాల్బిద్రినం ఆప్రైడ్ బొరాక్స్ రూపంలో వేయాలి. వీటిని ఎంత కావాలో అంతే వేయాలి. కొద్దిగా ఎక్కువ వేసినా మొక్కలకి హాని కలుగుతుంది. ఏ యే పోషకాన్ని ఏ యే సందర్భంలో ఎంతెంత వేయాలనే వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడింది.

సున్నం, సున్నాన్ని ఎక్కువగా ఆమ్లత్వాన్ని (పులుపుని) నివారించడానికి, తగ్గించడానికి ఉపయోగించడం పరిపాటి. సస్యపోషణకు చాలినంత సున్నపు అంశం ఆమ్లత్వం లేని (పులుపుకాని) అనేక రకాల మట్టి ఉంటుంది. ఈ అంశం కాల్షియం, ఆమ్మోనియం, నైట్రేట్, కాల్షియం, సయానమైడ్ మొదలైన ఎరువులలోనూ ఉంటుంది. మట్టిని సారవంతం చేయడానికి సున్నాన్ని వివిధ రూపంలో పాతుతూ ఉంటారు.

1. సున్నపు రాళ్ళు (Limestone) బాగా పొడిచేసి సున్నపు రాయి కాల్షియం కార్బోనేట్ (Calcium Carbonate).
2. కాల్షియం సున్నపు రాళ్ళు (burnt Lime Stone)
3. వీటిలో మరగ గాచిన సున్నం (గారె సున్నం)
4. ఇసుక కార్మానులలోని మట్టి స్లాగ్ (Slag)
5. చెట్టు బూడిద.

ఎక్కువగా పాడుకలో ఉన్నది సున్నపు రాళ్ళ పొడి అనేది. మట్టిని పరీక్ష చేసే తగిన శాస్త్రజ్ఞుల సలహాను పొందాలి.

## తోట పెంపకానికి సరైన ఎరువుల వివరణ

తోట మాలి తప్పని సరిగా మట్టి యొక్క భౌతిక గుణాన్ని, ఫలాన్ని కాపాడడానికి ప్రతి సంవత్సరం తప్పకుండా అవు, గేదెల పేద ఎరువును, కంపోస్టు, ఆకుల అలుముల ఎరువు మొదలైన ఎరువులను చాలినంత కొలతలలో - ఒక ఎకరానికి వది బండ్ల అంతైనా (అవుల) వశువుల ఎరువు, 1 చదరపు మీటరుకి 5 కిలో పాడి వశువుల ఎరువును అంతే గుఱ్ఱపు ఎరువును (లద్దిన) చ.మీ.4 కిలోల గొఱ్ఱల ఎరువును వేయాలి. దీని జతకి / లేదా బదులుగా సరైన కొలతలలో రసాయనిక ఎరువులను వేయాలి. ఈ ఎరువులను వేయడానికి ముందుగా తోటమాలి కొన్ని అంశాల్ని గమనించాలి. పెంచతగిన దాన్యానికి ఏయే పోషకాలు ఏ మోతాదులో అవసరమౌతుంది ? పెంచదోయే మట్టిలో ఏ పోషక పదార్థం తక్కువగా వుంది / లేదా కొరవడింది. ఎరువుల వెల ఎంత (ఖరీదెంత) ? గ్రహించాల్సిన ఎరువు మట్టిపై ఏ ప్రతి క్రియ చూపుతుంది. ఖరతను లేదా మట్టిలోని అప్పుతను పెంచుతుందా ? లేదా తగ్గిస్తుందా, ఎరువుల భౌతిక స్థితి ఏమిటి ? వస్తరించిన రూపంలోనే ఉందా ? వేళ్ళ ద్వారా జారుతోందా ? లేదా. కర్ర పరికరం ద్వారా (దేని సహాయంతో) దొగ్గి క్రిందికి దిగుతోందా ? అడ్డు పడి నిల్చిపోతోందా ? ఎరువుల్ని ఏ కాలంలో మట్టిలో పాతాలి ? అప్పుడు వాతావరణం ఎలాగుంటుంది! తేమాంశం ఎక్కువా? పాతిన తగ్గుత నీరావిరి అయ్యే పౌకర్యం వుందా ? మొదలైన విషయాలని ఆలోచించి తెలుసుకొని ఏ ఎరువుని గ్రహించాలనేది నిర్ధారించుకోవాలి. ఉదా. ఆకులే ఫలమయితే, ఆ మొక్కలకి పాస్పరస్ కన్నా ఎక్కువ నత్రజని అవసరమవుతుంది. బీటు, బంగాళా దుంప, పొగాకుకు, మిరపకాయలకు, ఎరువుకు పొటాషియం ఎక్కువ కొలతలలో అవసరమవుతుంది. మొక్కల్ని త్వరగా, సర్దుకొని, స్థిరపడిట్టు చేయడానికి నైట్రేటు రూపంలో నత్రజని ఉండే కాల్షియం అమ్మోనియం నైట్రేటు, సోడియం నైట్రేట్, పొటాషియం నైట్రేట్, అమ్మోనియం సల్ఫేట్ నైట్రేట్ మొదలైనవి. కేవలం అమ్మోనియం, సల్ఫేట్ కన్నా ఉత్తమము.

చిత్తూరులో పెరుగుదల తగ్గినప్పుడు సులభంగా అందివ్వగలిగిన నత్రజనిని వేయడం మంచిది. మొక్కలలో ఏ రకపు సారజనకమైన నత్రజని ఎరువు ఉందో సులభంగా తెలుసుకోవచ్చును. వర్షా కాలంలో నైట్రేట్ రూపపు ఎరువు త్వరగా కరిగి ఇంకిపోతుంది. మొక్కలు సులభంగా గ్రహించగలుగుతాయి. అమ్మోనియం రూపంలో ఉన్న అమ్మోనియం సల్ఫేటు మొదలైన ఎరువులను ఎన్నుకోవడం యుక్తమైంది. రసాయనిక ఎరువులలో కొన్ని ఎక్కువ ఖరాన్ని కలుగజేస్తాయి. ఇవి ఏవంటే సోడియం సల్ఫేటు, కాల్షియం సైరామిడ్, పొటాషియం నైట్రేట్ ఎక్కువ. పులుపుని (అమ్మన్న) కలుగజేసే ఎరువులు అవి అమ్మోనియం, క్లోరైడు, అమ్మోనియం సల్ఫేటు, నైట్రేటు, యూరియా, కొన్ని మొక్కలకి, అసేలీయ, క్యామిలీయ మొదలైన వాటికి సున్నం పడదు. అటువంటి వాటికి సున్నం ఎక్కువగా ఉన్న కాల్షియం, అమ్మోనియం నైట్రేటు, ధై కాల్షియం పాస్ఫేటు వేయకూడదు. ఖరాన్ని గాని, అమ్మన్న గాని ఎక్కువ కలుగ చేయని ఎరువులు అవి కాల్షియం సల్ఫేటు, సూపర్ మ్యూరియేట్ అఫ్ పొటాష్, పొటాషియం సల్ఫేట్, మోనో పొటాషియం పాస్ఫేట్, తోటలోని మట్టిని పరిశీలకు పంపినప్పుడు ఆ మట్టి ఎటువంటిదో విషయం తెలుపుతారు. అందులో ఖరముందో, పులుపుందో, లేదా రెండింటికీ మధ్యస్థంగా వుందో తెలుసుకొని (చూడండి మట్టి పరిశీ) దానికి తగిన ఎరువును ఎన్నుకోవాలి. పులుపు వచ్చే సూచనలు ఉంటే, ఆ మట్టికి అమ్మోనియం సల్ఫేటుకన్నా కాల్షియం నైట్రేట్ సరైనది. పులుపున్న మట్టికి, అవిరిలో పెట్టిన (దోసు) ఎముకల పాడి సూపర్ కన్నా మేలైనది.



ఎరువుల్ని చల్లేట్టుయితే, విత్తనాలు చల్లడం ఉత్తమం, వర్షాకాలంలో వికసింపే, వ్యాపింపే ఎరువులు గడ్డకట్టడం చేత విత్తన రూపంలో ఉండే యూరియ మొదలైన ఎరువులను ఎన్నుకోవాలి. అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైంది - వివిధ పాషకాల వెల ఎంతనే విషయాన్ని తెలుసుకొని లెక్కతీసుకొని ఖర్చుపెడితే, ఖర్చు తగ్గుతుంది. సరైన సమర్థవంతమైన పాషకాల్ని ఏ విధంగా ఎప్పుడు వేయాలనే విషయాలు క్రింద యివ్వబడ్డాయి.

S.No.	పాషక	ఏ రూపంలో	ఏ సందర్భంలో	ఏవిధంగా ఎంత
1.	మెగ్నీషియం	మెగ్నీషియం సల్ఫేట్	సున్నం ఎక్కువగా ఉన్న మట్టిలో పాపురస్ ని మొక్కలు చాలినంత తీసుకోకుండా ఉంటే పాపురస్ కొరత.	శాస్త్రజ్ఞుల సలహా మేరకు చల్లడం లేదా ఎరువుతో కలిపి చల్లడం.
2.	పీసం సత్తు	జింక్ సల్ఫేటు	చాలా గట్టిగాయుండి ఎర్ర మట్టికి వానా కాలంలో.	ఎకరానికి 1-2 పౌండ్లు (½ -1 కిలో) నీటిలో కలిపి చల్లాలి.
3.	ఇనుము	ఫెరస్ సల్ఫేటు	సున్నం ఎక్కువగా ఉన్న పాపురస్ ఎక్కువైనప్పుడు.	శాస్త్రజ్ఞుల సలహా అనుసరించి చల్లండి.
4.	మాంగనీస్	మాంగనీస్ సల్ఫేట్	జ్వారపు మట్టికి ఎక్కువగా సున్నం ఉన్న మట్టికి	ఎకరానికి 1-2 పౌండ్లు చల్లండి.
5.	తామ్ర	కాపర్ సల్ఫేట్	ఇనుక, రాళ్ళున్న నేలకు	ఎకరానికి 2½-5 పౌండ్లు చల్లండి.
6.	మాల్మిడిన్	మాల్మిడినం ఆట్రైడ్	పుల్ల మట్టి, ఇనుక మట్టి, కొన్ని ద్వీప మొక్కలకి	ఎకరానికి 1 నుంచి 8 టన్నులు ఎరువుతో కలిపి వేయాలి.
7.	సోడియం	వంటుప్పు (సోడియం క్లోరైడ్)	బీటురూట్ బల్బ్స్, చెండుమట్టి మొ.వి.	కొద్దిగా ఎరువుతో కలిపి వేయాలి.
8.	బోరాన్	బోరాక్స్	పుల్లగావుండే మట్టికి సున్నం వేసినప్పుడు	ఎకరానికి 10-20 పౌండ్లు ఎరువుతో కలిపి వేయాలి.
9.	గంధకం	జాప్సం	మసాలా ఆకులు మొదలైనవి.	ఎకరానికి 220 నుంచి 440 పౌండ్లు సామాన్యంగా అమ్మోనియం సల్ఫేటు కొద్దిగా గంధకాన్ని అందచేస్తుంది.

### రసాయనిక ఎరువులను వేసే రీతి (సర్దుతి)

రసాయనిక ఎరువుల ద్వారా సంపూర్ణ లాభాన్ని పొందాలి. అంటే సరైన ఎరువుల్ని సరైన కొలతలలో సరైన కాలంలో సరైన స్థలంలో మొక్కల స్వభావానికి, పెరుగుదలకి అనుగుణంగా పాలాలి.

సరైన ఎరువులు ఏవి ? చెట్లలో ఏ భాగాన్ని ఫలవంతమని భావిస్తామో, ఉపయోగిస్తామో, ఆ ఫలాన్ని, గుణాన్ని పెంచే పదార్థమే సరైన ఎరువు. బంగాళా దుంపలో ఫలవంతమైన భాగం, భూమిలోపల పెరిగే దుంప (కాండం). చిలకడ దుంపలో ఉబ్బి ఉన్న వేరు. కూరగాయలలో, ఆకులలో ఆకు, రాగిలో విత్తనాలు, మామిడిలో పండు, అలంకారపు మొక్కలలో పువ్వులు, రబ్బరులో పై నుంచి క్రిందకు జారింపే పాలు, కొబ్బరిలో కాయ, కండ ఇత్యాదివి.

తెనుక వివిధ మొక్కల పాషకాల వసులు ఏవో విషయాలు వివరించబడ్డాయి. పాషకాలలో నత్రజని

వని - ముఖ్యంగా మొక్కల్ని వృద్ధి చేయడం, దాని ద్వారా ఫలవంతం చేయడం, అందుచేత సస్యపు అలైంగిక భాగాలైన ఆకు, వేరు, కాండం, మొగ్గ ఇవే ఫలాలైతే ఈ పోషకాన్ని ఇంకొంచెం ఎక్కువగా చేస్తుంది.

దుంప మొక్కలలో కండవేరడానికి చెఱకులో చక్కెర అంశం ఎక్కువ అవ్వడానికి అన్ని మొక్కలు అరోగ్యంగా ఉండడానికి పాబాషియాన్ని కొద్దిగా ఎక్కువ కొలతలో వేయాలి. కొన్ని మొక్కల పెరుగుదలకి పోషకాల అవశ్యకత ఇక్కడ ఉదాహరణలుగా ఇవ్వబడ్డాయి.

పాస్పరస్, పాబాషియంకన్నా, నత్రజనినే కొద్దిగా ఎక్కువ కొలతలలో ఆపేషించేవి - గోధుమ, బీన్సు, అలసందలు మొదలైన ద్విదల లెగ్యూములు. అముదం, పొటీ వళ్ళు, రబ్బరు, ముల్లంగి, అకులు, అస్ట్రాగస్, టీ మొదలైన వాటికి నత్రజనిని ఎరువు రూపంలో ఇవ్వాలైన అవసరం లేదు. ఇవి తమ వేరు గ్రంధులలో ఉన్న సస్యాణువుల నుండి (bacteria) మట్టిలో ఉన్న గాలిలోని నత్రజనినే సొంతంగా తామే గ్రహించుకొంటాయి.

#### 4.1 చిత్రం.

4.1 నత్రజని, పాస్పరస్, పాబాషియం అత్యవసరమైన సస్యపోషకాలు. వాటికి మొక్కల నిర్మాణం, జీవనంలో వివిధ పాత్రలున్నాయి. 1. నత్రజని కాండం, పువ్వు, ఆకు, ఫలాలకి చాలా ముఖ్యం. 2. పాస్పరస్ వేరు, ఫలానికి అతి ముఖ్యమైంది. 3. పాబాషియం వేరు కాండపుదారు సస్యపు అరోగ్యానికి అతి ముఖ్యం.

నత్రజనికన్నా పాస్పరస్ని ఎక్కువ ప్రమాణంలో (కొలతలలో) ఆపేషించ తగినవి అవురూపం. నత్రజనికన్నా ఎక్కువ పాబాషియంని గ్రహించేవి ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇవి ఏవంటే, మొక్క జొన్న, వరి, బంగాళా దుంపలు, చిలగడ దుంప, క్యారెట్టు, కొబ్బరి, అనాసన్, ద్రాక్ష, అరటి, నూలు కోలు, దోసకాయ, బొమేటో, మిరపకాయలు, బీబీరూట్, ఉల్లిపాయలు, లెట్యూస్, పాగాకు, కాఫీ ఇత్యాదివి. అందుచేత మొక్కల పెరుగుదలకి సరైన రసాయనిక ఎరువును అందివ్వాలి. ముందు పులలలో తోట మొక్కల పెంపకాల పెరుగుదల ప్రస్తావన చేసేటప్పుడు ఆ రకానికి చెందిన ఎక్కువ వివరాలు ఇవ్వబడినాయి.

వివిధ మొక్కల ధాన్యాల పెంపకానికి వివిధ కొలతలలో పోషకాల్ని వేయాలనడానికి ఈ క్రింద కొన్ని దృష్టాంతాలు ఇవ్వబడ్డాయి.

1. వార్షిక పువ్వులు చెట్లకు (Annual Flowers) 4-8-10 లేదా 4-8-4 లేదా 5-10-8 గ్రేడు ఎరువులను ముందు వాడండి.
2. ఆకు చెట్లకు (Foliage Plants) పెరటి మొక్కలకి (House Plants) 4-12-4 లేదా 5-10-8 గ్రేడు ఎరువులు.
3. గులాబీలకు 5-10-5 లేదా 5-7-5 గ్రేడు ఎరువులు.
4. ఆర్కిడ్లు (సితా పువ్వులు) 10-10-10 గ్రేడు ఎరువులు.
5. బంగాళా దుంపలకు 4-8-8 గ్రేడు ఎరువులు.
6. చిలకడ దుంప, ఎర్ర ముల్లంగికి 2-10-8 గ్రేడు ఎరువు.

7. అనేక రకాల కాయగూరలకు 7-7-7 గ్రేడ్ ఎరువు.

8. కుండీనిండా వేళ్ళున్న కుండీ బంధ (Pot bound) మొక్కలకి 3-1-1 గ్రేడ్ ఎరువు.

9. గడ్డి పరువులకు (Lawns) (లాన్స్ కి) 10-6-4 లేదా 10-10-10 గ్రేడ్ ఎరువులు.

ఎరువుల గ్రేడ్ లేదా దర్జీ (Grade)

————

వ్యాపారస్తులు విక్రయించే మిశ్రమాలలో కొన్ని గ్రేడులున్నాయి. ఈ గ్రేడ్ ను మూడు సంఖ్యల ద్వారా (5-10-5, 9-9-10) గుర్తిస్తారు. ఈ సంఖ్యల అర్థం మొదటి భాగంలో 100 భాగాలలో ఎంత భాగం నత్రజని ఉందనేది 2వది పాస్ఫరస్ అంశాన్ని మూడోది పాదాపీయం ( $K_2O$ ) అంశాన్ని సూచిస్తుంది. ఉదా. 4-10-4 ఎరువు మిశ్రమంలో 100 కిలోలలో 4 కిలోల నత్రజనిని 10 కిలోల పాస్ఫరసామ్లం, 4 కిలోల పాదాపీ అని అర్థం. 9-9-0 మిశ్రమంలో 100 పౌండ్ల మిశ్రమంలో 9 పౌండ్ల నత్రజనిని 9 పౌండ్ల పాస్ఫరసామ్లం, సున్న పౌండ్ పాదాపీయం ఉందని అర్థము. 5-10-5, 4-10-4, 8-8-8 మొదలైన గ్రేడులు చాలా తక్కువ పోషకపు మిశ్రమాలు. ఎందుకంటే వీటిలో 100 భాగాలలో 20, 18, 24 భాగాల పోషకాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. మిగిలిన భాగాలు ఈ పోషకాల్ని తీసుకెళ్ళే పోషకాలు.

కానీ అదే 15-15-15 (సుఫల మొదలైనవి) ఎక్కువ పోషకాలు ఉన్న మిశ్రమాలు. ఇందులో 45 శాతం పోషకాలున్నాయి. మనకు కావల్సిన గ్రేడు మిశ్రమాన్ని మనం ఈ విధంగానే తయారు చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకి వార్షిక పుష్పల మొక్కల పెంవకానికి 5-10-5 గ్రేడ్ ఎరువు ఉత్తమమైంది. ఈ గ్రేడ్ లో 100 పౌండ్ల మిశ్రమంలో 5 పౌండ్ల నత్రజని, 10 పౌండ్ల పాస్ఫరసామ్లం, 5 పౌండ్ల పాదాపీయం ఉండాల్సి.

5 పౌండ్ల నత్రజనికి, 24.2 పౌండ్ల అమ్మోనియం సల్ఫేటు చేర్చాలి. (ఇందులోనే 20.6 నత్రజని ఉండడం చేత). 10 పౌండ్ల పాస్ఫరసామ్లాన్ని, 62.5 పౌండ్ల సూపర్ ఫాస్ఫేట్ చేర్చాలి. (ఇందులో 16 పాస్ఫరసామ్లం ఉండడం చేత). 5 పౌండ్ల పాదాపీయంను, 10.4 పౌండ్ల పాదాపీయం సల్ఫేటు అందచేస్తుంది. (ఇందులోనే 48 పాదాపీ ఉండడం చేత).

$$\text{మిశ్రపు మొత్తం} \quad 24.2 + 62.5 + 10.4 = 95.1$$

$$\text{ఇసుక} \quad = 4.9$$

$$\underline{100-00}$$

అంటే 24.2 అమ్మోనియం సల్ఫేటు, 62.5 పౌండ్ల సూపర్, 10.4 పౌండ్ల పాదాపీయం, 4.9 పౌండ్ల ఇసుక మిశ్రమం చేస్తే, అందులో 5 పౌండ్ల నత్రజని 10 పౌండ్ల పాస్ఫరసామ్లం, 5 పౌండ్ల పాదాపీ ఉంటుంది.

ఇంకా ఉదా. 15-15-15 గ్రేడ్ మిశ్రమాన్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలి. ఇందులో మొత్తం  $15+15+15 = 45\%$  పోషకాలుండడం చేత దీనిని చేసుకోవడం తేలిక. పోషకాలున్న యూరియ (46% నత్రజనిని) డబల్ సూపర్ (40% పాస్ఫరసామ్లం) మూరియేట్ ఆఫ్ పాదాపీ 60% (పాదాపీ) ఎరువులను ఎన్నుకోవాలి. 15 కిలోల నత్రజని 32.6 కిలోల యూరియా ఇస్తుంది. 15 కిలోల పాస్ఫరసామ్లాన్ని 37.5 కిలో డబ్బాలో సూపర్ ఇస్తుంది. 15 కిలోల పాదాపీ 25.0 కిలోల మ్యూరియేటు ఇస్తుంది.

మొక్కలకు ఎరువులు వేయడానికి సరైన కాలం ఏది ?

రసాయనిక ఎరువులో చాలామట్టుకు వేసినంతగా మొక్కలకి అందవు. సోడియం నైట్రేట్ అందినంత త్వరగా అమ్మోనియం సల్ఫేట్ అందదు. ఎముకల పొడైన నత్రజని, ఇంకా చాలా నెమ్మదిగా మొక్కలలోకి వెళుతుంది. అదేవిధంగా సూపర్ ఫాస్ఫరస్ అందించేంత త్వరగా ఎముకల పొడి ఫాస్ఫరస్ అందివ్వదు (పోషకాల్ని).

ఇవి మొక్కలకి పోషక పదార్థాల్ని అందివ్వాలంటే మట్టిలోని తేమాంశం, వేడిమి, గాలి అందులో ఉండు జీవాణువులకు, అనుగుణంగా ఉండాలి. ఇవి ఎక్కువైన కొద్దీ ఎక్కువ పోషకాల్ని మొక్కలకి అందిస్తాయి. చలికాలంలో అమ్మోనియం సల్ఫేట్లోని నత్రజనిని అందివ్వడం చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. దీనికి కారణం తక్కువ వేడిమి, జడ జీవాణువుల కదలికలు. అటువంటప్పుడు ఆ కాలంలో త్వరగా పోషకాల్ని అందించే కార్నియం అమ్మోనియం నైట్రేట్, సోడియం నైట్రేట్ను వేయాలి.

ఫాస్ఫరస్ నత్రజనిలాగ మట్టిలో కలవదు. అదుచేత దీన్ని పైన వేసే ఎరువుగా మొక్క పెరిగిన తర్వాత వేస్తే ప్రయోజనం లేదు. సామాన్యంగా ఫాస్ఫరస్ లేత మొక్కల వేరు వ్యాపింపజేయడానికి, పెరుగుదలకి సహాయకారి కావడంతో దీన్ని విత్తనం నాటడానికి ముందుగానే వేయాలి. నత్రజని మొక్క యొక్క అన్ని భాగాలకి కావల్సి వస్తుంది. అందుచేత, విత్తు నాటినప్పుడు, నీటితో మడులు కట్టేటప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా వడే వేస్తూండవచ్చు.


పోటాష్ ఫాస్ఫరస్ అవలం కాకపోయినా దీన్ని విత్తునాటే కాలంలోనూ కొన్నిసార్లు పై ఎరువులుగానూ వేయాలి. (విత్తనాలు చల్లిన కొన్ని వారాలు అయిన తర్వాత). పై పైనిచ్చే ఎరువుల్ని (పై ఎరువులు) (Top dressing) అని అంటారు.

మొక్కలలో ఏ రకపు మొక్కల్ని పెంపకానికయినా అంతంలో ఎరువులు వేయడం మంచిది. మొక్కలకి పోషకాల అవశ్యకత ఒకే రకంగా ఉండదు. వెనుక తెలిపినట్లుగా మొక్కలకి వేరు పెరుగుదలకి నత్రజనికన్నా ఫాస్ఫరస్ అవశ్యకతే ఎక్కువ. వృద్ధికాలంలో ఫాస్ఫరస్కన్నా నత్రజనియే ఎక్కువ అవసరమౌతుంది. మొక్క వృద్ధి చెంది, పిందెలు వేసి కాయలతో నిండే సమయంలో నత్రజని మాత్రమేకాకుండా ఫాస్ఫరస్ పోటాషియం కావల్సి వస్తుంది. ఈ విధంగా ఉన్ననూ, విత్తనాలు వచ్చేకాలంలో ఫాస్ఫరస్ ఎరువులు వేస్తే ఏం ప్రయోజనం ఉండదు. ఇంతకు పూర్వం వేసిన ఫాస్ఫరస్ ఉపయోగపడుతుంది అంతే !

పోషకాలలో ఫాస్ఫరస్ పోటాషియాన్ని పూర్తిగానూ, నత్రజనిని, అర్థ భాగం లేదా 1/3వ భాగాన్ని విత్తు వేసిన, లేదా నాటిన కాలంలో వేయడం యుక్తమైంది. కొన్ని సమయాల్లో ఫాస్ఫరస్ ఎరువును తోటని శుభ్రం చేసి అప్పుడే ఎరువును వేసి నేలని సారవంతం చేసియుంచుతారు. దాని గుణం నాటే రీతి, ఎరువుల వెల,



4.1



4.2



a



b



c



d



e

4.3

మంచి గుణాలు, చెడ్డ గుణాలు అనుసరించి ఉంటాయి. ఈ అంశాలు ఒక్కొక్క తోటకు ఒక్కొక్క విధంగా ప్రతి సంవత్సరానికి వ్యత్యాసంగా ఉంటుంది. నిఖరంగా ఈ క్రమమే మేలు అని చెప్పడానికి వీలు లేదు. కాని ఈ వివిధ క్రమాల అనుకూలతలేవి ? అననుకూలాలేవి ? అనే విషయాలు తెలుసుకొంటే మనం ఎక్కువైన తోటలకి మొక్కలకి, యుక్తమైన క్రమాన్ని, అనుసరించి, ఎరువులను వేసి పెంచవచ్చు.

రసాయనిక ఎరువులలో పాస్ఫరస్ ఎరువులోని పోషకాలు వేసిన స్థలాలలో లేదా దాని సమీపంలోనే మిగిలి పోతాయి. దీనికి చలన శక్తి (Mobility) చాలా తక్కువ. అందుచేత ఈ ఎరువును వేరు వచ్చేదాకా పోషణ వేరు (Feeding roots) ఉన్న చోటనే వేయాలి. అంటే వరుసలో కొద్దిగా ప్రక్కగా క్రింద భాగాన్ని పాలాలి. ఈ ఎరువును విత్తనాలపైనా క్రింద భాగాన్ను వేస్తే ప్రయోజనం లేదు. అక్కడ వేర్లు రావు. ఎరువును విత్తనాల వరుస ప్రక్కన కొద్దిగా రోతుగా వేయడానికి జల్లెడ ద్వారా వేయొచ్చు. (చిత్రం 4.2) లేదా నాగలితో త్రవ్వ భూమిలో రోతుగా, కొద్దిగా ప్రక్కగా విత్తనాలు వేయడానికి అనుకూలంగా (చిత్రం 4.3) ఉండేటట్టుగా వేయాలి.

4.2 a. ఎరువును విత్తనపు క్రింద భాగాన్ని వేయడం. b. ఎరువును విత్తనము పైన వేయడం. c. విత్తనాల ప్రక్కకి క్రిందికి వేయడం మంచిది, సరైనది. d. విత్తనాల రెండు ప్రక్కల క్రింద భాగంలో వేయడం ఇంకా మేలు.

4.3 రసాయనిక ఎరువులను వేసే క్రమం.

a. చల్లడం, b. చెట్టు ప్రక్కన వరుసగా పెట్టి కెడకడం. c. నాగలికి జల్లెడ లాంటి పరికరాన్ని కట్టి సాలులో నేల క్రింద భాగంలో ఎరువును వేయాలి. d. మొక్కల క్రింద వుండే భాగాలకు పోషకాలు అందేట్టుగా పాదులు వేసి, ఆ పాదులలో ఎరువును వేయాలి. e. ఎద్దులతో దున్నించి, దున్నిన భూమిలో ఎరువుల్ని వేయాలి.

చిన్న తోటలలో కిరోసిన్ లాడిగలాగ కొద్దిగా పొడవుగా ఉన్న కొళాయిలాంటి దాంట్లో వేసి, దాన్ని సడ్డెలాగ ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇదే కొన్ని ఎరువుల విత్తనాల జంట కుప్పలుంటాయి. ఈ ఎరువుల్ని ఒక బట్టలోనూ ఇంకొక బట్టలో విత్తనాల రాశిని, మూటలుగా కట్టుతారు. ఎరువులున్న మూటని కొద్దిగా రోతుగా విత్తనాల మూట ప్రక్కనే పెడతారు. చిన్ని తోటలో, చేతి చాలుతో (Furrow - చాలు) అడ్డంగా తీసి క్రింద భాగాన్ని ఎరువును దింపాచ్చు.

నత్రజని పోషకం మట్టిలో త్వరగా చలించడం చేత వీటిని వేయొచ్చు. దీన్ని కావల్సి వస్తే చాలులో కొద్దిగా ఎరువును వేసి మూసేయొచ్చు. వీటితోపాటు ఉండల్ని అక్కడికక్కడే పొతవచ్చు. లేదా నీటితో కలిపి మొక్కలకి చల్లవచ్చు. లేదా చిలకరించవచ్చు.

పొటాషియం పోషకం వెనుక తెలిపినట్టుగా పాస్ఫరస్లాగా అవలం కాదు. నత్రజనిలాగా త్వరగా చలించనూ చలించదు. అందుచేత దీన్ని విత్తనాల్ని నాటేకాలంలో చాలులలో వేయడం పరిపాటి. దీని అవశ్యకత ఏమిటంటే పైపైన వేసి ఎరువులుగా వేయొచ్చు. కానీ దీన్ని చల్లడం చేత అంతగా ప్రయోజనం ఉండదు.

ఒత్తుగా పెరిగే చెట్లలో గడ్డి వరువులకు చల్లే ఎరువులు యుక్తమైనవి. వరుసలో దూర దూరంగా పెరిగే మొక్కలకు చాలు ఎరువులు మంచిది. చాలులో ఎంత దూరానికి ఎంత రోతుకి ఎరువుల్ని పాలాలనేది

నిర్ధారించడానికి పోషకాల్ని పీల్చుకొనే మృదువైన పోషణవేర్లు ఎక్కడుంటాయనేది తెలిపకాని వాటికి లాభించేట్టుగా ఎరువులను అందిస్తాల్సి. చిన్నకారు నేలలో కుండలలో వేరు వేరుగా పెరిగేది పాదులకు వళ్ల వెళ్లకు ఎరువును క్రింద నుండి దూరంగా పై భాగం విస్తరించేంత దూరానికి చుట్టూ మండంగా పాదు వేసి క్రింద భాగాన్ని ఎరువు వట్టివేసి మట్టి ముయ్యాలి. నీటిని కాలువలలో (Furrows) పారిచి పెంపే మొక్కలకి వెళుకు మొదలైన వాటికి కాలువ క్రింద భాగం వరకు మొక్కల ప్రక్కన ఎరువును వేయాలి. (చిత్రం 4.4).

4.4 సాలు (వరుస) మొక్కలకి పాదులు త్రవ్వి నీటిని కట్టినప్పుడు ఎరువును ఎక్కడ వేయాలి. a. నీటి కాలువ, b. కాలువ నీటి మట్టం పైన ఎరువు వేస్తే నీరు మట్టిలో కలిసే రీతిని c. d. బాణాలు సూచిస్తాయి.

కుండీలలో పెరిగే మొక్కలకి గడ్డి వరువులకు చిన్న తోటలలోని మొక్కలకి నీటి ఎరువు (ఎరువులు నీటితో కలిపినవి). అనుకూలంగా ఉంటుంది.

నీటి ఎరువులు (Liquid Manure) : తోటమాలికి నీటిరువులు అనేక రీతులలో అనుకూలంగా ఉంటాయి. సస్య పోషకాలను కరిగిన రూపంలోనే వేర్లు పీల్చుకొంటాయి. మనమే కరిగించి వేయడం చేత ఇవి మొక్కలకి చాలా త్వరగా పోషకాల్ని అందిస్తాయి. ఘన రూపంలో ఎరువులను లేత మొక్కలకి వేస్తే వాటి మృదు వేగ్లకు ఎరువు స్పర్శించినప్పుడు అవి మోడవచ్చు. నీటి ఎరువులతో ఇటువంటి భీతి ఉండదు.

పోషకాలను అందులోనూ తక్కువ మొత్తంలో వేసే పోషకాల్ని, సమంగా, ఏక క్రమంగా నీటి ద్వారా పంపడం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.

బెంగుళూరు తోటమాలులు నీరెరువుల్ని చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. అందులోనూ కుండీలలో పెంపే చామంతి, డేలీయా, గులాబి మొదలైన వాటిని పువ్వు ప్రదర్శన వేళకి కుదురుగా కుదిరించి, పువ్వులు వికసించే యధానికే ఈ నీటి ఎరువుల్ని వేస్తుంటారు. వీరు పిండి నీటిని వేస్తారు. అందులోనూ ఆకు పాడి, పిచ్చి నువ్వుల పిండిని పెద్దనీటి డ్రమ్ములలో కలిపి వానపొంతువరకూ క్రుళ్ళబెట్టి, తేటను నీటిలో కలిపి వదే వదే మొక్కలకి వేస్తుంటారు. ఈ విధంగా చేసినప్పుడు మొక్కలు ఏవుగా గుబురుగా పెరిగి పెద్ద పెద్ద పువ్వులను పూస్తాయి. సామాన్యంగా మొగ్గ వికసించే సమయంలో వాడుక పువ్వు ప్రదర్శనకు ఆలస్యం అవుతుందంటే వీనికి ఫోర్సు (Force) కలుగ చేయడానికి ఒత్తిడి చేయడానికి వదే వదే ఎరువు నీటిని వేస్తారు.

పిండి మాత్రమే కాకుండా పేడతోనూ, గుజ్జుపు లద్దితోనూ నీరెరువును తయారు చేయొచ్చు. దీనికోసం కొత్త పేడని ఒక వల్లటి వస్త్రంలో కట్టి బకెట్టు నీటిలో ముంచి వేస్తారు. కొన్ని రోజులైన తర్వాత పేడలోనున్న కరగగల్గిన అంకాలన్నీ నీటిలో కరిగి కషాయంలాగ మారుతుంది. టీ డికాక్షన్ రంగుకి మారినాక నీటితో కలిపి మొక్కలకి వేస్తారు. ఇదే విధంగా, గొఱ్ఱ, మేక, వశి, గుజ్జుపు లద్దిలతో నీరెరువును తయారు చేసుకోవచ్చు.

నీటిలో సులభంగా కరిగే రసాయనిక ఎరువులతోనూ నీరెరువుల్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి పిండి, పేడలాగ అసహ్యకరం, జాగుపాకరమైన వసులు కావు. అంతేకాకుండా ఎక్కువ, చురుకుగా పుంటుంది. నీటిని తడువవల్సిన అవసరం లేదు. కలపాల్సిన అవసరం లేదు. వ్రుగ్గేట్టు చేయాల్సిన పనిలేదు. యుక్తమైన కొలతలతో నీటిలో కరిగించి నేరుగా మొక్కలకి వేయొచ్చు.

ఎంతనీటికి ఏ రకపు ఎరువును ఎంత కరిగించాలనే విషయాలు ఈ క్రింది పట్టికలో సూచించబడినవి.

4 గ్యాలన్ల (కిరోసిన్ టీన్) 18 లీటర్ల నీటికి (1 టెన్సు = 28 గ్రాములు)

1. ఆమ్లనియం సల్ఫేటు అయితే  $1\frac{1}{2}$  - 2 టెన్సు (42 - 56 గ్రాములు).
2. ఆమ్లనియం పాస్ఫేటు అయితే  $1\frac{1}{2}$  - 2 టెన్సు (42 - 56 గ్రాములు).
3. సోడియం నైట్రేటు అయితే  $1\frac{1}{2}$  - 2 టెన్సు (42 - 56 గ్రాములు).
4. పొటాషియం సల్ఫేటు అయితే  $1\frac{1}{2}$  - 2 టెన్సు (42 - 56 గ్రాములు).
5. కార్బియం నైట్రేట్ అయితే  $1\frac{1}{2}$  - 2 టెన్సు (42 - 56 గ్రాములు).
6. సూపర్ పాస్ఫేటు అయితే 4 టెన్సు (112 గ్రాములు).
7. పొటాషియం నైట్రేటు అయితే 1 -  $1\frac{1}{4}$  టెన్సు (28 - 35 గ్రాములు).
8. యూరియా అయితే  $\frac{4}{5}$  లేదా 1 టెన్సు (23 - 28 గ్రాములు).
9. రసాయనిక ఎరువుల మిశ్రమం అయితే 2 టెన్సు (56 గ్రాములు).

సామాన్యంగా 100 చ.అ.లకు  $7\frac{1}{2}$  కిరోసిన్ టీన్ల నీరువు కావల్సి వస్తుంది.

కొలవడానికి అనుకూలం లేకపోయినట్లయితే 1 టిన్నుకి 4 పెద్ద చెమ్మల ఎరువును వేసి కరిగించవచ్చు. రసాయనిక నీరువుల్ని మొక్కలకి నీటిని వేసిన తర్వాత వేయడం మంచిది.

ఆకు మొక్కలకి నత్రజని నీరువు యుక్తమైంది. పుష్పాలకు (పువ్వులకు) పుష్పించే కాలంలో పాస్పరస్ ఎరువు కరిగించి వేస్తే ఉత్తమం. వర్ష చెట్లకు వండే కాలంలో పొటాష్ నీరువుని ఆకుపైన చల్లడం ఉత్తమం.

మూడు ముఖ్యమైన పోషకాలున్న ఎరువు అనేక రకాల మొక్కలకి యుక్తమైంది. నీరువుల మిశ్రమం జాన్ ఇన్స్ లిక్విడ్ ఫీడ్ (John Innes liquid feed) ఈక్రింది విధంగా ఉంది.

15 భాగాల ఆమ్లనియం సల్ఫేటు (తూకం)

$2\frac{1}{4}$  భాగాల పొటాషియం నైట్రేట్ (తూకం)

$2\frac{1}{4}$  భాగాల మోనో ఆమ్లనియం పాస్ఫేటు (తూకం).

ఈ మిశ్రమం 2 నుంచి 4 టెన్సులను (56 గ్రా. - 112 గ్రా) ఒక కిరోసిన్ టిన్ను (4 గ్యాలన్స్) నీటిలో కరిగించి వేయాలి. (1 లీటర్ కి సుమారు 3 గ్రాములు).

### పత్ర పోషణ (Foliar Feeding : Foliar Spray)

కొన్ని సంవత్సరాల క్రింద మొక్కలు వేర్ల ద్వారా నత్రజని, పాస్పరస్, పొటాషియం, ఇనుము, సీసం (సత్తు) మొదలైన ఖనిజ పోషకాల్ని పీల్చుకొనెడివి అని నమ్ముతూండేవాళ్ళు. కాని ఇప్పుడు అనేక రకాల మొక్కలు



తమ ఆకుల ద్వారానూ, మరికొన్ని కాండం ద్వారానూ, ఈ పోషకాల్ని పీల్చుకోగలుగుతాయని కనుక్కొన్నారు. కాని వాటిని పీల్చుకొనాలంటే అవి నీటిలో పూర్తిగా కరిగిపోయినవిగా ఉండాలి. ఈ విధంగా పత్ర పోషణకు అనుకూలమైన ఎరువులు - యూరియ, మోన్ అమోనియం సల్ఫేట్, డై అమ్మోనియం ఫాస్ఫేటు, పాచాషియం సల్ఫేట్, పాచాషియం సైట్రేట్, ఫెరస్ సల్ఫేట్, మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ ఇత్యాది. వీటిని యుక్తమైన కొలతలతో నీటిలో కరిగించి (స్పై) ద్వారా చల్లవచ్చు. కొలతలలో వేయవల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ వేసి నీటిలో కరగించి ఆకులపై చల్లితే, ఆకులు కాలుతాయి. పత్ర పోషణ విధానం అనేక రకాల మొక్కలకి అనుకూలమైందని తెలుసుకొన్నాం. ఇవి ఏవంటే ? జామ, నారింజ, టీ, నేరేడు, టామాటో, కోమ, గోధుమ, వరి, అలంకార మొక్కలలో గులాబీ మొక్కకి పత్రపోషణ సామాన్యంగా ఉంటుంది. 10-15 రోజులకొకసారి పోషకాల్ని చల్లితే గులాబీ మొక్కల పెరుగుదల, పువ్వుల సంఖ్య, మందం వృద్ధి అవుతుంది, అని పరిశోధన ద్వారా గ్రహించినారు. గులాబీ ఆకులపైన చల్లడానికి 2 రకాల మిశ్రమాలను సిఫార్సు చేస్తారు.

1. యూరియా 30 గ్రా., డై అమోనియం హైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేటు 30 గ్రా., డై పాచాషియం హైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేటు 30 గ్రా., ఈ మిశ్రమపు 30 గ్రా.లను పదిలీటర్ల నీటిలో కరిగించి దీనితోపాటు 14 గ్రా. ద్రవమబ్బుని (Liquid Soap) కలిపి (పోషకాలు పత్రాల పైన అంటుకోడానికి) ఆకుల పైన 10 దినాలకి ఒక్కసారి చల్లుతుంటారు.
2. ఈ మిశ్రమాన్ని ఇంగ్లండు రాయల్ నేషనల్ రోస్ సొసైటీ వాళ్ళు అమోదించి యున్నారు. యూరియా 3 భాగాలు, డై హైడ్రోజన్ అమ్మోనియం ఫాస్ఫేటు 2 భాగాలు (తూకం) పాచాషియం సైట్రేట్ 1½ భాగాలు ఈ మిశ్రమపు 15 గ్రా. 4½ లీటర్ల నీటిలో కరిగించి చల్లాలి.

పత్రాల ద్వారా పోషకాల్ని మొక్కలకి చాలా కొద్దిగా మాత్రమే అందివ్వగలుగ వచ్చు. ఖర్చు తక్కువ. ఈ విధంగా తక్కువ కొలతలతో ఇచ్చిననూ సామాన్యంగా మట్టిలో పాతే ఎరువు ఎంతో అంతే విలువ ఉంటుంది.

కొన్ని రసాయనిక ఎరువులు ఎంత వేస్తామో అంతా మొక్కలకి చేరవు. నత్రజని ఎరువులు కొన్ని భాగాలు నీటిలో కలిసి సమసిపోతాయి. ఫాస్ఫరస్ అంశం మట్టిలో కలిసి స్థిరపడుతుంది. మొక్కలకి అందవలసిన పోషకాలు అందివ్వవు. కాని పత్ర పోషణలో ఆ విధంగా జరగదు. వేసినంత, పోషకాలు, (వాన కురియకుండా వుంటే) మొక్కల రోపల చేరుతాయి.

కొన్ని పోషకాలు, కొన్ని రకాల మట్టిలో ఎంత వేసినా, దాని ప్రభావం ఏ మాత్రం, వ్యక్తపరచవు. అటువంటి మట్టిలో పోషకాలు చాలా త్వరగా మొక్కలకి అందే రూపానికి మార్పు చెందుతూ వుంటాయి. ఇనుము ఈ విధంగా మార్పు చెందేది. కాబట్టి ఇటు మట్టిలో మొక్కలకి ఇనుము అందివ్వడానికి పత్ర పోషణమే ఏకైక సాధనం. కొన్ని పోషకాలు, చాలా ఖరీదైనవి. వీటిని ఎక్కువ కొలతలలో మట్టి ద్వారా మొక్కలకి వేసి బదులు, కొద్దిపాటి కొలతలతో పత్రాల ద్వారా పోషకాలను అందివ్వడం మంచిది. పోషకాల్ని ఆకులపైన, క్రింద భాగాలపైన చల్లవచ్చు. ఈ పోషకాలు పత్రాలు చర్మం ద్వారా లోపలికి వెళ్ళగలవు.

### మట్టి పరీక్ష - సస్య పోషకాల అవశ్యకతను అందాజు వేయడం

మట్టిలో ఏయే సస్య పోషకాలు ఏ మొత్తంలో ఉన్నాయి, ఏ పోషకాలు కొరవడినాయి, ఏ పోషకాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి మొదలైన విషయాలను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోడానికి మట్టి పరీక్ష అత్యవసరం. మన మట్టిని


పరీక్ష చేయడానికి మునుపటికన్నా ఇప్పుడు చాలా సులభం. వ్యవసాయం, తోటకార్యాలయ అధికారులు అనేక మట్టి రకాలను పరీక్షించి ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. ప్రయోగశాలలను (Soil testing laboratories) ఏర్పరచి యున్నారు. సంచార ప్రయోగశాలలూ ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోగశాల మోటారు కార్లు పల్లెలకు వెళ్లి అక్కడే ఇష్టపడినవారి మట్టిని పరీక్షచేసి, సలహా ఇచ్చే వ్యవస్థ ఒకటయింది. ఈ సౌకర్యాన్ని తోటమాలి ఉపయోగించుకోవాలి.

మట్టిని పరీక్షించే ఉద్దేశం మన మట్టి సారవంత శక్తిని, ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవడం కోసం. పరీక్షాలయాల మన మట్టిని పరీక్షించి అందులో ఏయే విషకాలు ఏయే శాతంలో ఉన్నాయో అని మొక్కల పెరుగుదలకు ఏయే రూపంలో పనికి వస్తాయో తెలియజేస్తారు. అంతేకాకుండా ఏయే ఎరువు ఎంతశాతంలో ఎప్పుడు వేస్తే మిత వ్యయ దృష్టిలో మంచిది అనే విషయాలు తెలియజేస్తారు. మట్టిలో షార్ గుణం ఉందా, ఉంటే ఏ శాతంలో ఉంది, లేదా ఆమ్లత్వం ఉందా, ఉంటే ఏ శాతంలో ఉంది దీన్ని సరిచేయడానికి సున్నం లేదా జిప్సం ఎంత వేయాలి? మట్టి యొక్క ఫలవశ్ర భౌతిక గుణాలు కాపాడడానికి ఎంత సావధనం ఎరువును వేయాలి. అనే విషయాలు తెలుసుకో గలుగుతాము.


తోట మట్టిని మనమే పరీక్షకు వంపించాలంటే ఒక నియమిత క్రమాన్ని అనుసరించాలి. ఆ క్రమాన్ని అనుసరించి దాన్ని గ్రహించి పంపకపోతే లాభం లేదు. అంతేకాకుండా తోటలో అన్ని చోట్ల ఒకే రకపు సాలు ఉంటుందని చెప్పడానికి వీలు వేదు. తోటలో కొన్ని చోట్ల ఇసుక ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. కొన్ని స్థలాలు బంకగా ఉండొచ్చు. మరి కొన్ని చోట్ల ఒండ్రుమట్టి ఉండొచ్చు. మరికొన్ని చోట్ల మట్టి ఉప్పుగాను, పులుపుగాను ఉండొచ్చు. అందువేత వివిధ చోట్ల నుండి మట్టిని పరీక్షకు కొద్దిగా (Sample - మాదిరి) గ్రహించి పరీక్షకు వంపాలి. చాలా కాలం నుంచి పదిలేసిన చోటునుంచి, సారవంతమైన కంచె, కంపోస్టు, గుట్టలు వేసిన స్థలాల నుండి స్వాంపుల్ గ్రహించరాదు.

మట్టిని స్వాంపులుగా గ్రహించడానికి దానికోసం, తయారు చేసిన మట్టి గునపంతో లేదా పారతో బాగా త్రవ్వ మట్టిని కలిపి తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఇది సాధ్యంకాకపోతే, దేనితోనో కొడవలితోనో, గొడ్డలితోనో మట్టిని తోడి తీసుకోవచ్చు.

స్వాంపుల్ గ్రహించడానికి మొదట సైనున్న చెత్తా చెదరాన్ని తోసివేయాలి. శుభ్రపరచి ఆ తర్వాత 15-18 సెం.మీ. లోతులో 15-20 చోట్ల మట్టిని తోడాలి. నేల ఒకవేళ గట్టిగా ఉంటే 15 సెం.మీ. పొడవుగాను, వెడల్పుగానూ, లోతుగాను, గుంటని త్రవ్వ, ఆ గుంటలోని నాలుగు ప్రక్కల నుండి Y ఆకారంలో మట్టిని తీసుకోవాలి. వెనుకటి మొక్కల వరుసలలో స్వాంపుల్లను, ఆ వరుసల మధ్య నుంచి గ్రహించాలి. 15-20 చోట్ల గ్రహించిన మట్టిని శుభ్రమైన బజ్జెట్టులో వేయాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని పాత వార్తా పత్రికపైన వేసి మట్టి ముద్దగా పీసికి బాగా కలిపి గుంపుగా గుట్టగా వేయాలి. ఈ గుట్టని నాలుగు భాగాలు చేసి, ఎదురు బదురు భాగాలను మరొక కాగితంపై వేసి కలిపి మరో గుట్ట వేయాలి. ఈ గుట్టని మొకటిలాగే నాలుగు, భాగాలు చేసి రెండు భాగాల్ని మిగుల్చుకొని (ఉంచుకొని) మళ్ళీ ఈ క్రమాన్ని అనుసరించాలి. చివరికి ½ కిలో లేదా ఒక పౌండు మట్టిని పరీక్షకు శుభ్రమైన డబ్బాలో వేసి పరీక్షాలయానికి వంపాలి. వివిధ జాతుల మట్టి ఉంటే ఒక్కొక్క రకానికి ఒక్కొక్క స్వాంపుల్ని వంపాలి. స్వాంపుల్తోపాటు పరీక్షాలయానికి ఈ క్రింది వివరాలను జతచేయాలి.



4.4



4.5

1. వెనుకటి రెండు సంవత్సరాలలో స్వాంపుల్ గ్రహించిన నేలలో ఏవిధమైన పంటను పండించినారు.
2. మట్టిని దున్ని లేదా సాగుబడివేసి ఎంత కాలమైంది.
3. ఏయే ఎరువుల్ని ఎంతెంత ఎప్పుడు వేశారు.
4. భూమిలో ద్విదశ మొక్కలను (అనవకాయలు, చిక్కడు, బీన్సు మొదలైనవి) పెంచుతున్నారా ?
5. వసరు ఎరువుల్ని ఎప్పుడు వేశారు.
6. నేల మట్టం, సమ మట్టం ఎలా వుంది, సమంగా ఉందా లేదా ?
7. నేలలోని మట్టి అంటుకొంటూ క్రుచ్చినదా ?
8. నేలలో నీరు బాగా ఇంకుతోందా ? మట్టినిటిని పీల్చుకొంటుందా ?
9. మొదటి దశా (ఇకముందు) ఎటువంటి పంటలు పండించదలచుకొన్నారు. ఈ స్వాంపులు వసులకు గ్రామ సేవకుల సహకారాన్ని పొందడం మంచిది.

ఒకవేళ మట్టిని పరీక్షకు పంపడానికి సాధ్యం కాకపోతే, పంట లక్షణాల నుంచి ఏయే పోషకాలు కొరవడని అనే విషయాల్ని కొద్దిగా ఊహించుకోవచ్చు. చిత్రం (4.5 1-4)

4.5 (1-4) ఇక్కడ నాల్గు కుండీలలో మొక్క, జొన్న మొక్కలు చూపబడ్డాయి.

1. నత్రజని వేయని మొక్క.
2. పాస్పరస్ వేయని మొక్క.
3. పొటాషియం వేయని మొక్క.
4. మూడింటిని వేసిన మొక్క.

నత్రజని కొరతవుంటే తెల్లని రంగులో ఉంటుంది. సామాన్యంగా ఇసుక మట్టిలో నత్రజనాంశం తక్కువ. ఆ మట్టిలో వేసి సావయవ ఎరువులో నత్రజని కొరత ఉంటే ఉంటుంది. కుచ్చే మట్టిలో నత్రజనాంశం తక్కువ. అప్పుడప్పుడు మట్టిని కాలుస్తే - చెజుకు తోటలలో గడ్డిని, కొబ్బరి ఆకుల్ని, పెంటని కాలుస్తారు. నత్రజని తగ్గుతుంది. పెరుగుదల (వృద్ధి) తక్కువైతే, కుంటుపడితే, నిదానమైతే ముందుగానే మట్టిలో నత్రజనాంశం తక్కువగా వుందని ఊహించుకోవచ్చు. తోటలోని చెట్ల ఆకులు ముందుగానే రాలిపోతే అందులో ఈ పోషక వదార్థం కొరవడిందని గ్రహించాలి. పంట నిదానంగా బలీస్తే, ఆకు దట్టమైన ఆకు పచ్చని రంగులో ఉంటే పంట నేలపై పడియుంటే నత్రజని ఎక్కువగా వుందని గ్రహించవచ్చు.

పాస్పరస్ కొరత వుంటే మట్టి రంగులో సురగ రంగుపైనుంటుంది. మట్టి కణాలు చాలా మృదువుగా వుండి మట్టి బాగా సమసుంటే అటువంటి మట్టిలో పాస్పరస్ తక్కువగా వుంటుంది. మట్టిలో సావయవ అంశం తక్కువైనా ఈ విధంగానే అవుతుంది. పంట బాగుండి పంటకి తగినట్టుగా కాడలు ధాన్యాలు పెరగకుండా ఉంటే దానికి ముఖ్య కారణం పాస్పరస్ కొరతని గ్రహించాలి.

పంట పేర్ల వ్యాప్తి ఎక్కువగా వుంటే, మొక్కలు సకాలంలో సామాన్య అవధిలో బలీస్తే, పంటకి తగినంత ఫలముంటే ఆ మట్టిలో పాస్పరస్ కొరత లేదని చెప్పవచ్చు.

పావాన్ కొరత నురగ వంటి మట్టిలో లేదా ఇసుక మట్టిలో ఎక్కువ. మొక్కలు మొలకలు వాలిపోయేది పావాషియం కొరత చేతనే. వేళ్లు బాగా వ్యాపించి యుంటే పెరుగుదల సమర్థవంతంగా వుంటే ఆకు కాండం మొదలైనవి ఆరోగ్యంగా మొగ్గ తోడిగుంటే ఆ మట్టిలో వాలినంత పావాన్ ఉందని ఊహించుకోవచ్చు.

వర్షం ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాలలో మట్టి కొద్దిగా పుల్లిగా (ఆమ్లత్వం) ఉంటుంది. వర్షం తక్కువగా వుండే ప్రదేశాలలో షారత్వం తలచూవవచ్చు. స్రుగ్గిన నేలలో షారత్వం కనిపిస్తుంటుంది.

### సావయవ ఎరువులు

తోటవని ఒకరకమైన తీవ్ర కృషి. తోటలో పెంచే పంటలు చేతికందాలంటే దున్నడం, సాగుబడి నీరు పట్టడం, ఎరువులు వేయడం, పంటరక్షణ మొదలైన వాటిని ఎట్లు ఎదుట సకాలంలో యుక్తమైన క్రమాల వున్నంగా నిరంతరం చేస్తూండాల్సిన పనులు. తోటలోని అనేక పంటలు పొలాలలోని పంటలలాంటివి కావు. సంవత్సరంలో వండ్లన్నే సీజను ముగిసిన తర్వాత ఎండిపోయే రకాలు కావు. వండ్లు, (తాటి) చెట్లు మొదలగునవి దీర్ఘకాలం ఉంటాయి. చాలా కాలం పండ్లనిస్తూనే వుంటాయి. ఈ విధంగా ప్రతి సంవత్సరమూ ఫలవంతంగా ఇవ్వాలంటే ప్రతి సంవత్సరం కుంటుపడకుండా ఒకేరకపు పళ్ళని ఇవ్వాలంటే ఆ తోటలోని మట్టికి కావలసిన పోషక పదార్థాలు ఎరువు రూపాన అందించాలి. పొలాలు, పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు తాము పెంచే పంటకు ఎక్కువ కాలవ్యవధి అవసరం లేక పోవడం చేత తాము వండించే పంటకు కావలసిన ఎరువు ఆ మట్టిలో ఉండడం చేత ఎరువుల గురించి వారు శ్రద్ధ వహించరు. కాని తోటమాలి, ఆ విధంగా ఉండడానికి వీలులేదు. ఎందుకంటే తోటలో కొన్ని దీర్ఘకాలిక చెట్లు వుంటాయి. కొన్ని స్వల్పకాలిక మొక్కలుంటాయి. కాబట్టి తోటమాలి మట్టిని ఎప్పటికప్పుడు సారవంతం చేసుకోవడానికి సహజ ఎరువులను కృతక ఎరువులను ఉపయోగించే రీతిని తెలుసుకొని ఉండాలి. ముఖ్యంగా మొక్కలకి సావయవ ఎరువులు ప్రతి మొక్కకి ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి పంటకు వాలినంత కొలతలో క్రమ వద్దతిన అందించాల్సి ఉంటుంది. కేవలం కృతక ఎరువులనే, సావయవ ఎరువులనే ఉపయోగిస్తే చాలదు. రెండింటికీ కలిపి వాడితే ఈ ఎరువులకు వరస్పర విరోధం లేదు. ఒకదానిలో ఒకటి, తోటలోని మొక్కలకి ఇవి తల్లితండ్రులవంటివి. సావయవ ఎరువు తల్లిగాను కృతక ఎరువు తండ్రిగాను పని చేస్తాయి. తల్లి వలె సావయవ ఎరువు నెమ్మదిగా మొక్కలు వృద్ధి అవడానికి సహకరిస్తుంది. కృతక ఎరువులు తండ్రి వలె ఆ మొక్కల వృద్ధికి మరొక తోడ్పడుతాయి. ఈ రెండునూ తమ సంతానపు యశస్సు వల్లస్సు, శ్రేయస్సును కోరుతాయి. ఈ రెండు ఎరువులను తోటమాలి ఉపయోగిస్తే తోట ఫలవంతమై చక్కటి పూవులను పండ్లని యిస్తుంది. ఈ రెండు ఎరువులకు విరోధం లేకున్ననూ వైవిధ్యం వుంది. సామాన్యంగా సావయవ ఎరువులలో సస్యపోషకాలు చాలా తక్కువగా వుంటాయి. బాగా తయారు చేసిన కంపోస్టు ఎరువులో కూడా నత్రజని అంశం శేరులో రెండుకంటే ఎక్కువగా ఉండదు. (రెండు భాగాలుకన్నా ఎక్కువ ఉండదు). పిండి ఎరువులలోను, ఈ నత్రజని అంశం 7-8 భాగాలు మాత్రమే ఉంటుంది. అదే కృతక ఎరువులలో ఏ పోషకమైనా సరే, శేరుకి 15కన్నా తక్కువగా ఉండదు. కొన్నింటిలో నూటికి 50 లేక 60 భాగాలు పోషకాలు అయి ఉంటాయి. ఈ భేదం ఉండడం చేత పంటకు కావలసినంత పోషకాలని సావయవ ఎరువుల రూపంలోనూ కావలసినంత కృత్రిమ ఎరువుల రూపంలోనూ వేయాలి. నూరు పౌణ్ణ అమ్మోనియం సల్ఫేట్ అందించే నత్రజనిని పశు-పక్ష్యాదుల పేడ ఇత్యాదుల ఎరువుల ద్వారా అందిస్తాలి. 2-3 వేల పౌణ్ణ (2-3 బండ్ల) ఎరువును వేయాలి.

అంతేకాకుండా కృతక ఎరువులో పోషకాంశం నిర్దిష్టమై ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మనం అమ్మోనియం సల్ఫేటు ఎప్పుడు ఎవరు వేసినా సరే, ఎక్కడ వేసినా సరే అందులో నత్రజని అంశం ఒక శేరుకు 20.5 (పౌండ్లు) ఉండే వుంటుంది. అదే పళ్ళులు, గుడ్డలు మొదలైనవాటి ఎరువులలో నత్రజని అంశం ఒక శేరుకి  $\frac{1}{4}$  పాళ్ళునుంచి 2 పాళ్ళు వరకు ఉంటుంది. కుప్ప, మురికి నీరు ఎక్కువగా ఉంటే ఎరువు ఉంచబడిన పాత్ర వాన, ఎండల బారి నుండి రక్షింపబడుతూ ఉంటే ఆ మట్టిలో చాలినంత వేడి ఉన్నట్లయితే ఈ నత్రజని అంశం కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వానలో తడిసి, ఎండలో ఎండి చెత్తా చెదారం ఎక్కువగా ఉంటే ఈ నత్రజని అంశం తక్కువగానే ఉంటుంది. అందుచేత ఈ సావయవ ఎరువు సరియైన ఎరువు కాదు. వీటి ద్వారా వంటకి కావలసిన పోషకాలు ఖచ్చితంగా అందుకోవడానికి చెప్పలేము.

కృతక ఎరువులలో ఉన్న పోషకాలు మొక్కలకు సులభంగా అందే స్థితిలో వుంటాయి. లేదా ఆ స్థితికి త్వరగా వస్తాయి. కొన్ని ఎరువులలో పోషకాలు మొక్కలకి వెంటనే లభిస్తాయి. కాని అదే సావయవ ఎరువులలోని పోషకాలు వెంటనే మొక్కలకి అందవు. అందులోని పోషకాలు మొక్కలకి అందే రూపానికి రావడానికి కొంత కాలం పడుతుంది. ఈ సావయవ ఎరువు తనకు అనుకూలమైన పరిస్థితిలో ఉంటేనే, ఆ ఎరువులో ఉన్న పోషకాంశాలు అందించే స్థితికి వస్తుంది. లేకపోతే ఆ పోషక వదార్థాలు అలాగే మిగిలిపోతాయి. మొక్కలకి అందవు. అందుచేత 100 పౌండ్ల అమ్మోనియం సల్ఫేటులో ఉన్న నత్రజని పోషక వదార్థము అంతా అదే వంటకి అదే సంవత్సరములో అందివ్వాలంటే 2-3 బండ్ల ఎరువును వేసినా చాలదు. దానికి మూడింతలు ఎక్కువగా 6-9 బండ్ల ఎరువును వేయాల్సి వస్తుంది.

సావయవ ఎరువులను, కంపోస్టులను, పేడ ఇత్యాదుల ఎరువులను సరిగా తయారు చేయాలంటే వీటిని, సేకరించి, చేర్చి పెట్టడానికి ఎక్కువ స్థలం కావాలి. పెరటి తోటలలో, అందులోనూ ఇంటి ఆవరణలో ఈ విధంగా చేయడం చాలా కష్టం. అయితే కృతక ఎరువులు కావలసి వచ్చినప్పుడు, కావలసినంత గ్రహించి, వంటలకు వేయవచ్చు. వీటిని చేర్చి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. చేర్చి పెట్టాల్సిన అవసరము వస్తే ఎక్కువ స్థలం అవసరము లేదు.

సావయవ ఎరువులలో పోషక వదార్థాల అంశం ఎక్కువగా ఉన్నా వీటిలో అనేక రకాల పోషక వదార్థాలు ఉంటాయి. ఉదా. పేడ వంటి ఎరువులో నత్రజని కాకుండా ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, సున్నం, మెగ్నీషియం, మొదలైన పోషకాలు, కొద్దిగానో, గొప్పగానో ఉంటాయి. అదే కార్మానాలలో తయారు చేసిన కృతక ఎరువులలో ఒకటి లేక రెండు మించితే మూడు పోషక వదార్థాలు మాత్రమే ఉంటాయి. అమ్మోనియం సల్ఫేటులో, నత్రజని అంశమే ప్రాధాన్యత వహిస్తుంది. కొద్దిగా గంధకం ఉంటుంది. అయోడాన్ లో నత్రజని ఫాస్ఫరస్ మాత్రమే ఉంటాయి. కాల్షియం అమ్మోనియం నైట్రేట్ లో నత్రజని కాకుండా సున్నం ఉంటుంది. అంటే సావయవ ఎరువులో ఉండేటటువంటి సస్యపోషకాలు వీటిలో ఉండవు. సావయవ ఎరువు తోటపనికి తోటలకి అత్యవసరమవడానికి కారణం అందులో ఉండే పోషకాల కోసంకాదు. మట్టి పై ఈ ఎరువు చూపే ప్రభావం కోసం ఉపయోగిస్తూ వుంటారు. ఆ ప్రభావం ఎటువంటిదనే విషయం ముందే చెప్పబడింది.

సావయవ ఎరువులని రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు. 1. సస్య జన్య, 2. ప్రాణి జన్య.

ఆకుల అలముల ఎరువు (ఆకు, తరువు మొదలైన వాటికే ప్రాధాన్యతనిస్తూ చెత్తా చెదారం ద్వారా తయారైన చెత్తా చెదార ఎరువు) కంపోస్టు, గడ్డి మొ॥ వచ్చని వదార్థాల ద్వారా ఏర్పడిన ఎరువులు సస్యజన్యమైన

ఎరువులు. అయితే వీటి ద్వారా లాభం పొందడానికి వీటికి ఎక్కువ కొలతలలో మట్టిలో కలపాల్సి ఉండడం చేత దానిని స్థూల గుట్టల ఎరువు (Bulky manures) అంటారు. సస్య జన్యమైన ఎరువులన్ని స్థూల ఎరువులు కావు. పిండి మొదలైన ఎరువులు సస్య జన్యమైనా వీటిని సస్య పోషకాలు (Concentrated manures) అని వ్యవహరిస్తారు. వీటిని బండ్ల లెక్కన వేయవలసినది లేదు. కాని మూకుడంత లేక బాణలి అంత ఎరువులను వేయాల్సి ఉంటుంది.

గోర్స్ ఇనుప పొడి, ఎండిన రక్తం మొదలైనవి ప్రాణి జన్యము. సామాన్యంగా వీటిలో పోషక పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండడం చేత వీటిని సాంద్ర ఎరువులనే వ్యవహరిస్తారు.

## సాంద్ర ఎరువులు

పిండి ఎరువులు (Oil cakes) :

ఇవి నూనె గింజల నుండి నూనెను తీయగా మిగిలిన పిండి పదార్థము. ఆ పిండి పదార్థాలలో ఇతర పోషకాలు కొద్దో గొప్పో ఉండగా వీటిని తోట పెంపకానికి వేయడానికి కారణం వీటిలో ఎక్కువశాతంలో నత్రజని ఉండడం చేత. మన దేశంలో అనేక రకాల నూనె గింజలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి.

పొగాకు, ఆమడుం, పిప్పిలి, వేప, ఆవ, అవిశ, పిండి గింజలను వదిలేస్తే మిగిలిన పిండి గింజల పిండిని పశువులకు ఎక్కువగా శ్రేష్టమైన ఆహారంగా ఉపయోగిస్తూ వుంటారు. అందుచేత ఈ పిండి పదార్థాన్ని ఎరువుగా ఉపయోగించడం కన్నా పశువులకు ఆహారంగా ఉపయోగిస్తూ వుంటారు. దీని వల్ల పశువుల ద్వారా పాలు, పేడ ఎక్కువగా లభిస్తాయి. పశువుల ఆహార పదార్థాలు కొరత ఎక్కువగా ఉన్న దేశాలలో ఇటువంటి పశు ఆహారము ఎరువుగా ఉపయోగించడం, రాష్ట్రపు ఒకరకమైన సంపదని, ఇంకొక విధంగా నాశనం చేసినట్లే. పట్టు పరిశ్రమ వేస్తు, చర్మ పరిశ్రమ వేస్తు, బూడిద, మట్టి మొదలగునవి కూడ ఎరువులుగా ఉపయోగిస్తారు.

## 1. పేదాదుల ఎరువు (Farm Yard Manure)

పేదాదుల ఎరువులో పశువుల మల మూత్రాదులు మాత్రమే కాకుండా, వేసిన ఆకులు, తరగు, గడ్డి తినకుండా మిగిలిన లేదా క్రింద పడిన మేత ఇవన్నీ చేరుంటాయి. ఈ పదార్థాలు ఒకే రీతిగా ఉండవు, కాబట్టి పశువుల పేదాదుల ఎరువులు పోషకాలు సమంగా వుండవు. అంతేకాకుండా, ఈ ఎరువుని ప్రుగ్గ పెట్టే రీతే వేరుగా ఉంటుంది. గడ్డి మొదలైన పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండి పేడ తక్కువగా వుంటే మూత్రాన్ని సరిగా చేర్చి పెట్టకుండా పాడుచేస్తే, ఎరువుల పాత్రలను, గుట్టలను ఎండలో ఎండబెడితే, వానకు తడిస్తే అటువంటి ఎరువునిస్సారవై యుంటుంది. అందుచేత సారవంతమైన పేదాది ఎరువులను తయారు చేయడానికి సరైన క్రమాన్ని అనుసరించాలి.

పశువుల పేడల ఎరువును ముఖ్యంగా 3 విధాలుగా తయారు చెయ్యవచ్చు. 1. గుట్ట లేదా కుప్పగా పోసి తయారు చేయడం, 2. అండా లాంటి పాత్రలలో వేసి కూడబెట్టడం, 3. పశువుల చావడిలోనే కూడబెట్టడం.

గుట్టలుగా వేస్తే ఎరువు త్వరగా మాగుతుంది. అండాలో ఎరువు నిదానముగా ప్రుగ్గుతుంది. పశువుల చావడిలో తయారు చేసే ఎరువు వీటి రెండింటికన్నా నిదానంగా మాగుతుంది.

పశువుల చావడిలో పేదాదులతో ఎరువును తయారు చేసే విధానం ఎంతైనా ముఖ్యం. కుప్పలో వేసే పదార్థాలకు కొంచెం గమనించి వేయాలి. ప్రాణుల మూత్రం, మలం కన్నా (పేడకన్నా) ఎక్కువ సారవంతంగా వుంటుంది. అందుచేత వాటి మూత్రాలు కొంచెం కూడా పొడైపోకుండా కూడబెట్టి కుప్పకు చేరేట్టుగా చూడాలి. మూత్రాన్ని బాగా పీల్చుకొనేటట్టుగా పశువుల పడకలకు ఒత్తుగా గడ్డిని, పొట్టును, తగరుని రంపపు పొడిని వరచాలి. పశువుల చావడిని అప్పుడప్పుడు కెలికి మూత్రం పీల్చుకొన్న మట్టిని కుప్పకు చేర్చి నేలకి కొత్త మట్టిని వేస్తూండాలి. పశువుల చావడికి రాళ్ళు వేసుంటే మూత్రం చావడిలో క్రుల్చిన నీరు నిలవకుండా పారేట్టుగా కాలువలను తోడి ఉంచాలి. లేదా కట్టించాలి. ఈ మూత్రపు నీటిని ఒక రాతి తొట్టిలోకో లేదా సిమెంటు తొట్టిలోకో పెళ్ళేట్టు చేయాలి. ఈ నీటిని పేడ, గడ్డి, ఆకు మొదలైన వాటి జతతో బాగా చేర్చి కలిపి కుప్పతోట్టికి పెళ్ళేట్టు చేయాలి.

గట్టుచేసి ఎరువును తయారు చేసేట్టుయితే, నిత్యం పశువుల చావడిలోని పేడని, చెత్తా చెదరాన్ని వరచి త్రొక్కి, పైన తొట్టిలో నీటిని చిలకరించి మట్టిని పల్చగా వరచి మూయాలి. అండాల్లో వేసేటప్పుడు కూడా ఇదేవిధంగా పొరలు, పొరలుగా వేసి, త్రొక్కి మట్టిని వరచి మూసేయాలి. ఎండా, వానలకు చిక్కుకోకుండా, అండాపైన గడ్డి తెప్పలను కట్టాలి.



వర్షాల ఎక్కువగా కురిసే దేశాలలో, వాన ఎక్కువగానున్న స్థలాలలో పశువుల చావడిలో ఎరువును, తయారు చేసే పద్ధతి ఇదే. దీని కోసం పశువుల చావడి నేలను తోడి తగ్గించి, ప్రతి నిత్యం చెత్తా చెదరాన్ని వరచి దానిపైన గడ్డికి బదులుగా బయటనుంచి పచ్చని ఆకుల్ని నరికి తెచ్చి, నేలపైన వేస్తూండారు. పశువుల తొక్కిడాల వల్ల పేడ, ఆకు ఇత్యాదివి అణగిపోయి కూర్చోబాటు. క్రమేపీ పశువుల చావడి తగిసిట్టుగా ఈ ఎరువుతో నిండిపోతుంది. పేడ, ఆకు, మూత్రం మిగిలినవి బాగా కలియడంతో చాలా సారవంతంగా ఎరువు తయారవుతుంది.

## 2. కంపోస్టులు

పశువుల పేడ, చెత్త, మూత్రం, గడ్డి, కొమ్మలు, పుల్లలు మొదలైనవి క్రుల్చిపోవడం చేత ఏర్పడే పదార్థాన్ని కంపోస్టు అని అంటారు. కాని కంపోస్టుని తయారు చేయడానికి పైన చెప్పిన పదార్థాలన్నీ అవసరం లేదు. ఆకులు అలుములు, చెత్తా చెదరం ఆకుల పొడితో కంపోస్టును తయారు చేయ వచ్చు. ఈ పదార్థాలు తమంత తామే త్వరగా కుళ్ళవు. దీనికి కారణం వీటిలో దారు (నారు - Cellulose) ఎక్కువగా ఉంటుంది. సత్రజని అంశం తక్కువగా ఉంటుంది. అందుచేత వీటిని కుళ్ళేట్టు చేయడానికి సత్రజని అంశమున్న పేడ మూత్రము పశువుల శాలను కడిగిన నీరు లేదా ఉప్పు ఎరువులను కలిపిన నీటిని వేయాలి. తోటలో అనేక రకాల వృక్ష వస్తువులు లభిస్తాయి. అవి ఆకులు, అలములు ఈనెలు, పువ్వులు, పువ్వు రోఖలు, పళ్ళి తోళ్ళు, తాటి ఆకులు, దంటి ఆకులు మొదలైన పదార్థాలు ధారాళంగా లభిస్తాయి. వీటిని అన్నీ కూడబెట్టి కంపోస్టు ఎరువును తయారు చేస్తే అదే తోటకి చక్కటి ఎరువు అవుతుంది. తోటకూడా శుభ్రపడుతుంది. శుచిగా వుంటుంది. ఈ పదార్థాలు ద్వారా కంపోస్టును తయారు చేయడానికి, కొన్ని విధానాలున్నాయి. 1. ఇందూరు విధానం, 2. బెంగుళూరు విధానం, 3. కోయంబత్తూరు విధానం మొదలైనవి. 4.7 i & ii.

4.7 i. కంపోస్టు తయారు చేసే విధానం. పైచిత్రంలో ఆకులు అలుములు చెత్తా చెదరం చేర్చి ఒక పొరగా





4.7(i-ii)

వరచబడింది. దానిపైన పేడ, గడ్డి ఇత్యాదులతో మరొక పొర ఏర్పరచబడింది. ఇదే విధంగా వరుసగా కాలువ వలె పొడవుగా వివిధ పొరలుగా ఏర్పరచి కుప్పను ఒకదాని పైన ఇంకొక దానిని వేయాలి.

ii. క్రింది చిత్రం ఇంకొక క్రమం ఇందూరు క్రమం. ఒక పెద్ద అండా వంటి పాత్రలో కంపోస్టు ఎరువు తయారు చేయడం - అండా పై భాగం వరకు వేస్తుతో పొరలు కట్టి మట్టిని చల్లాలి. క్రమేనా ఎరువు క్రుచ్చి కృశించి సమ మట్టానికి వస్తుంది. అంటే అండా వంటి పాత్రలోనో లేదా నేలలో విశాలంగా గోత్రని త్రవ్వ వాటిలో విభాగాలు ఏర్పరచి, ఈ విభాగాలలో ఆకులు అలములను మట్టిని పొరలు పొరలుగా వేసి ప్రుగ్గ బెట్టితే ఉత్తమమైన, ఉత్కృష్టమైన కంపోస్టు ఎరువు తయారు అవుతుంది.

ఈ రీతి చాలా సులభమయింది. తోటలో ఒక ప్రక్క ఎక్కువ సంచారం లేని స్థలంలో లేదా ఒక మూలగా 3-4 అడుగుల లోతుకు 5-6 అడుగుల వెడల్పుకు అనుకూలమైన పొడవుతో ఒక గుంటను త్రవ్వ అందులో తోటలో లభించే వృద్ధ వదార్దం ఒక అడుగు ఎత్తు వరకు వేసి ఈ పొరని బాగా త్రొక్కి రోవలికి పోయేట్లు చేసి ఈ చెత్తకు తేమ తగిలేంత వరకూ నీటిని చల్లాలి. చాలినంత తేమ లేకపోతే ఈ వదార్దాలు సరిగా కుచ్చవు. ఈ పొర కుచ్చేట్లు, పేడ, పశు పశ్యాదుల మల మూత్రాలు గుజ్జవు లద్దిలు, కోళ్ళ పెంట మొదలైనవి లభిస్తే వాటిని నీటిలో వేసి కలిపి ఈ పొరల మీద చల్లాలి. ఇవి లభించకపోతే అమ్మోనియం సల్ఫేటు కాల్షియం సైనయేట్ మొదలైన నత్రజని ఉన్న ఉప్పు ఎరువులను నీటిలో కలిపి చల్లవచ్చు. లేదా పిండి (నూనె గింజల పిండి)ని కలిపి చల్లవచ్చు. కంపోస్టులు ఎక్కువగా సారవంతమై ఉండటానికి, ఈ వదార్దాలకి ఎముకల పొడిని, రక్తమాంసాలను చేసల పొడిని వేయాలి. నీరు చల్లిన తరువాత గుంట త్రవ్వగా వచ్చిన మట్టిని కొద్దిగా సుమారు 1 అంగుళం లావు మేరకు, మట్టిని పొరగా వేయాలి. వేసిన తరువాత మరల త్రొక్కి కొంత కాలమైన తరువాత మరొక అడుగు మేర చెత్త చెదారం పెంటను పొరపైన వేసి త్రొక్కాలి. తడిచేసి ప్రుగ్గేట్లు చేసి క్రుంగిన తరువాత మట్టి మట్టిని లోతుకు వెళ్ళేట్లు వేయాలి. వేసిన తరువాత మట్టిని త్రొక్కాలి. ఈ విధంగా మట్టిని చెత్తను పొరలు పొరలుగా వేసి నింపాలి. నింపిన తరువాత కూడా ఒకటి రెండు పొరలు వేయాలి. ఈ విధంగా వేస్తే చివరికి నేల సమ మట్టానికి ఈ పెంట 1-2 అడుగుల ఎత్తుకు వచ్చిన తరువాత ఈ గుంటను ఎక్కువ గాలి లేనప్పుడు సన్నని సారవంతమైన మట్టి చల్లాలి. క్రమేనా ఈ గుట్ట క్రుంగి క్రిందకి దిగుతుంది. అప్పుడప్పుడూ అందులోనూ వేసని కాలంలో ఈ విధంగా గుంటలు త్రవ్వితే అందులో తేమ ఆరకుండా నీటిని చల్లుతుండాల్సి. 5-6 నెలల్లో ఈ గుంట లోని కుప్ప లేక పెంట బాగా కుచ్చి ఎరువుగా మారుతుంది.

అనుకూలంగా వుంటే ఈ గుంటలో పొగాకు, పువ్వులు, గ్లైరీడిసిడియా (gliricidia) మొదలైన వచ్చని ఆకుల్ని ముక్కలు ముక్కలు చేసి వరచడం ద్వారా కంపోస్టు ఇంకా ఎక్కువగా సారవంతమవుతుంది. సన్నటి సారవంతమైన మట్టి వేసిన రెండు నెలల తర్వాత ఈ కుప్పని త్రిప్పి, కలిపి, నీరున్న చోట గుట్టగా వేసి, రెండు మూడు నెలలు వదిలేస్తే, ఎరువు వచ్చుగా పొడి పొడిగా అవుతుంది. ఈ క్రమం కోయంబత్తూరు విధానం.

ఇందూరు విధానంలో కంపోస్టుని గుంటలు త్రవ్వడానికి బదులుగా గుట్టలు గుట్టలుగా ఆనకట్టలాగ కడతారు. అప్పుడప్పుడు నీటిని చిలకరిస్తారు. గుట్టని కెలికి త్రిప్పుతూ వుంటే ఆ పెంట త్వరగా ప్రుగ్గుతుంది. కంపోస్టు చాలా త్వరగా కావల్సి వస్తే గుట్టగా విభాగాలుగా కట్టి తయారు చేసుకోవడం మంచిది. లేకపోతే గుంట త్రవ్వడమే మేలు.

### 3. గుజ్జపు ఎరువు

గుజ్జపు లద్దెకు, పశువుల పేడకు ఉన్న ముఖ్యమైన బేధం - లద్దె త్వరగా క్రుళ్ళిపోతుంది, పేడ చాలా నిదానం. ఈవిధంగా కుళ్ళేస్తున్నది ఎక్కువ ఉష్ణం ఉత్పత్తి అవుతుంది. కొన్ని వేళలలో (సమయాలలో) ఈ ఉష్ణం ఎక్కువై లద్దె గుట్ట లోపలి భాగం కాలవచ్చు. అందువేత గుజ్జపు ఎరువును (వేడి ఎరువని) కాషాయి ఎరువుని పశువుల ఎరువని చల్లని ఎరువని వ్యవహరిస్తారు.

గుజ్జపు ఎరువుని మాగకుండా, కుళ్ళు బెట్టకుండా, మొక్కలకి వేయరాదు. గుజ్జపు ఎరువును తోటమాలి ఒక రీతిలో ఉపయోగించుకోవచ్చు. చలి కాలంలో ఉష్ణపు శాతం తక్కువగా ఉండడం చేత మొలకలు సస్యాల పెరుగుదలలు కుంటు పడుతూ ఉంటాయి. వీటిని కుదర్చడానికి ఒట్లు పాతి క్రింద వరకూ పచ్చనైన తడి లద్దెను వేసి దానిపైన మట్టిని నింపుతారు. క్రింద భాగం నుండి మొలకలాగ వస్తుంది. మొక్క పుష్పించి, వికసించి పెరుగుతుంది. ఉష్ణం చాలా తక్కువగా వుండే కాలంలో మొక్కల ద్వారా (అంటుగట్టే పద్ధతిలో) వేరు మచ్చెట్టుగా చేయడానికి కూడా ఈ రీతి క్రింది కొమ్మల్ని కత్తిరించి యిస్తారు. చలికాలంలో కుండీలలో పెరిగేడి మొక్కలు కుదురుకొని, సకాలానికి పుష్పాలను ఇవ్వడానికి కుండీలలో వేసేడి మట్టిలో గుజ్జపు లద్దెను కలుపుతారు. ఇతర కాలాలలోను ఎజ్జమట్టి జతకు గుజ్జపు ఎరువును చేర్చి కుండీలలో నింపే పద్ధతి బెంగుళూరు పద్ధతి. ఇదే పద్ధతి ఇప్పటికీ వాడుకలో ఉంది.

### 4. పచ్చని ఎరువు

పశువులన్నీ తోటమాలికి కావల్సిన పశుపేదాది ఎరువులు బాగానే లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా పేడ, చెత్త చెదరాన్ని, పెంటని ఉపయోగించి సులభంగా కంపోస్టును తయారు చేసుకోవచ్చు. కాని చిన్న తోటన్న తోటమాలికి ఈ సౌకర్యాల లేవు. ఇటువంటి వారు మట్టికి కావల్సినంత కొలతలలో సావయవ పదార్థాలను వేయడానికి ఒక ఉపాయం ఉంది. పచ్చ గడ్డి ఎరువు.

పచ్చగడ్డి ఎరువును తోటలోనే పెంచి, త్రొక్కి మట్టిలో చేర్చవచ్చును. లేదా తే బయట నుంచి పచ్చని ఆకులను త్రుంచి తెచ్చి పాతాలి. లేదా పచ్చగడ్డి ఎరువు కోసం తోట అంచులలో కంచెలు బదులుగ పైన గైరెసిడియా (Gliricidia), సెస్సేనియా (Sesbania) మొదలైన చెట్లను పెంచుకోవచ్చు.

పచ్చ గడ్డి ఎరువుల చెట్లను, తోటలోనే పెంచితే అందులో ఒక పంటను తగ్గించుకోవల్సి వస్తుంది. అయినా ఆ విధంగా చేయడం చేత తోటమాలికి లాభం కూడా వుంది. తన భూమిలోనే అందుకోనూ తోటలలో ఒకటైన తర్వాత మరొక పంటను పండిస్తున్నారు. అప్పుడు ఆ భూమిలో ఫలశక్తి తగ్గుతుంది. మట్టి కణాల విన్యాసం చెడుతుంది. మట్టికి జలుబు (Soil sickness) వస్తుంది. రోగము కీటకాలు ఎక్కువ అవుతాయి. ఈ కారణాల చేత వెంట వెంటనే కనిసం 3-4 పంటలు పండించిన తర్వాత ఆ భూమికి కొంత విరామం ఇవ్వడం మంచిది. పంటను తీసి పోరేసి మట్టిని ఎండకు ఎండేటట్టుగా వదిలేయడం ఒక రకం. పచ్చ గడ్డి ఎరువును పెంచడం మరొక రకమైన విరామం. ఈ విధంగా పెంచిన పచ్చగడ్డి ఎరువును కత్తిరించి, మట్టిలో కలిపితే మట్టిలోనే సావయవఅంశం ఎక్కువ అవ్వడమే కాకుండా, ఈ పచ్చని గడ్డి సామాన్యంగా లోతుకు దిగుంటుంది. కావున క్రింది భాగపు పొరలు సస్య పోషణాలను పీల్చుకొని పైకి తీసుకొని రావడమే కాకుండా మట్టిలోని లోపలి పొరలను నడటిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఈ మొక్కలు లెగ్యూమ్ (Legume - ద్విదళ) జాతికి చేరినవైతే ఈ

రకపు చెట్ల వేరుపైన వాయువులో నత్రజనిని సస్య పోకంగా చేసే సస్యాణువుల గ్రంథులు (ముడులు/ కణుపులు) పెరుగుతాయి. ఇవి రూపొందించిన నైట్రేట్ పోషక పదార్థం, తరువాత మొక్కలకి లభిస్తుంది. అందుచేత తోట మొక్కల పెంపకపు చక్రంలో - వంటలు మొక్కలు పరివృత్త క్రమాన్ని (Crop rotation) పచ్చగడ్డి ఎరువులను చేర్చడం ద్వారా, ఆ నేలకు విరామం లభిస్తుంది. మట్టి చక్కబడుతుంది. పచ్చని మొక్కలు ఒత్తుగా పెరగడం చేత రెమ్మలు తలెత్తుతాయి. నేల పరిశుభ్రం చేసినట్లువుతుంది. బయట నుంచి తెచ్చి పాతిన పచ్చని ఆకుల వల్ల పాతిన వెంటనే ఈ లాభాలన్నీ లభించక పోయినా మట్టిలోని సావయవాంశం సారవంతమవుతుంది.

ఒక వంటని వదులుకోడానికి ఇష్టపడకపోతే, పచ్చని ఆకుల్ని బయటినుంచి, లేవడానికి వీలులేని వాళుకి, పచ్చగడ్డి ఎరువుల లాభాన్ని పొందడానికి మరొక మార్గముంది. అది ఏమిటంటే వంటల మధ్య రెండు మూడు వరుసల మధ్య పచ్చనాకుల ఎరువుల మొక్కల్ని పెంచి, వంట ముగిసిన తర్వాత వాటిని తుంపి, మట్టిలో కలిపేయాలి.

పచ్చని ఎరువులకు యుక్తమైన జాతులు : ఎండిన, కుళ్ళిన మాంసం, అడవి నీలం పువ్వుల చెట్టు (Wild indigo - *indigofera articulata* or *oblongifolia*) దయాంచి సైసైలియ (Tephrosia Purpurea) కక్కెం ఎక్కెం ధైరిసిడియ, పాగాకు ఇత్యాదివి. వీటిలో భూమిలో వంటలు వండటానికి అనుకూలమైనవి - ఎండు మాంసం, దయాంచి, అలసందలు, చిక్కడు. వీటి నుంచి సంపూర్ణంగా లాభం పొందడానికి వీటిని ఒత్తుగా గుంపుగా పెంచాలి. అంటే ఎక్కువ విత్తనాలను, ఎకరానికి 20-30 పౌండ్ల (10-15 కె.జి) అంత చల్లాలి. చల్లేబప్పుడు దానితోపాటు సూపర్ ఫాస్ఫేటు (బూడిద ఎరువును) వేస్తే ఆకు పుల్లగా ఉండటమే కాకుండా దీనిలోని నత్రజనాంశం ఇక ముందు పెంచే వంటకి సులభంగా లభిస్తుంది. అంతులలో ఆకుల మొక్కలు పెరగడానికి యోగ్యమైనవి - ధైరిసిడియ, పెప్టెలియ, డెపోసియ మొదలైనవి, చెట్టులుగా పెరగడానికి పాగాకు మొదలైనవి.

చెఱుకు త్వరగా పెరగడానికి పచ్చని ఎరువులు 10 వారాలలో కత్తిరించి మట్టిలో చేర్చాలి. గూడు మట్టిలో నీటి పారుదల బాగా ఉన్నచోట మొక్కలు బాగా పెరుగుతాయి. దంటి కూడా త్వరగా పెరిగే ఆకు కూరే. గూడు, ఆకు మట్టిలో బాగా పెరుగుతుంది. నీళ్ళు నిలువ ఉన్నచోట, నీళ్ళు తక్కువగా ఉన్నచోట ఇవి పెరగవు. కాని, చెఱుకు కన్నా నిదానంగా పెరుగుతుంది. మూడు నెలలు అయిన తర్వాత వికసిస్తే రెమ్మల నారు (దారు) ఇగిరిస్తుంది. సులభంగా పడిపోవు ధైరిసిడియాని పొదలాగానో, చిన్న చెట్టుగానో పెంచవచ్చు. దారాలు కట్టి కంచెలలో వేయడం యుక్తం.

ఎటువంటి ఆకుపచ్చ ఎరువుల్ని పెంచనీ, లేదా బయటనుంచి తెచ్చి వేసినా వాటిని లేతగా ఉన్నప్పుడే కత్తిరించి మట్టిలో కలపాలి. బరిసిన ఆకు, రెమ్మలు త్వరగా కుళ్ళవు. అంతేకాకుండా ఈ రకపు ఆకు కూరల్ని వేస్తే తర్వాత వంటకు దానికి కావల్సిన నత్రజనాంశాన్ని ఈ ఎరువే అందిస్తుందాని కోసం గ్రహిస్తుంది. ఆకుకూరల్ని కత్తిరించడానికి చాలా అనువైన కాలం అది పుష్పించే కాలం. ఆ కాలంలో ఆకులు రసవంతమై ఎక్కువ రసంతో కూడుకొని త్వరగా తెగిపోతాయి.

కోలారు, బెంగుళూరు జిల్లాలలో పాగాకు తోటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. తోటమాలి రాలిన పాగాకును, పువ్వును ఊడ్చి చిన్న తోటల వంటలకు వేయడం పరిపాటి. ఇది త్వరగా క్రుల్చి పోతుంది. గుజ్జిపు ఎరువులాగ ప్రుగ్గేటప్పుడు వేడి (శాకం) ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుచేత దిన్ని చాలా జాగ్రత్తగా తక్కువ

మొత్తంలో వేయాలి.

పచ్చని ఎరువు మట్టిలోని నత్రజనాంశం పెంచడమే కాకుండా అది క్రుళ్ళేటప్పుడు కొన్ని ఆవస్థలను మెలువరిస్తుంది. ఈ ఆవస్థల మట్టిలోని పోషకాలను రసాయనికంగా మార్చి, మొక్కలకి అందవేసే రూపానికి తెస్తుంది.

#### 5. ఆకుల పాడి, ఆకుల ఎరువు (Leaf Mould)

తోట వనికి అందులోనూ, ఆలంకారపు మొక్కలకి, పువ్వులకు కుండీలలో పెంచడానికి ఆకుల పాడి చాలా యుక్తమైన ఎరువు. కుండీలలో వేసే మిశ్రమంలో (Potting mixture) ఆకు పాడి అనేక రకాల మొక్కలకి తప్పనిసరిగా వేయాలైన పదార్థం. దీన్ని వేయడం చేత మట్టి గుల్లబారి జిగురు పోతుంది. తేమ ఎక్కువకాలం నిలుస్తుంది. అయినా నీళ్ళు బాగా ఇంకిపోతాయి.

మంచి ఆకు పాడిని తయారు చేసుకోవాలంటే రాలిన ఆకులను చేర్చి పెట్టి 6 అంగుళాల లావుకి (మందానికి) విస్తరించజేసి, దీనిపైన 1-2 అంగుళాల మందానికి తోట మట్టిని వేయాలి. ఈ విధంగా సుమారు 2-3 అడుగుల ఎత్తుకు గుట్టగా చేస్తే ఒక సంవత్సరములో ఈ ఆకులు క్రుళ్ళి నల్లబారుతాయి. పాడి పాడిగా అవుతుంది. ఒక సంవత్సరముకన్నా ముందుగా అవసరమయితే ఈ గుట్ట క్రుళ్ళి ముగ్గడానికి సమపాళ్ళు నత్రజని, పాస్పరం, పొటాష్ ఉండే కృత్రిమ ఎరువుని ఈ గుట్ట చేసేటప్పుడు ఇందులో కలపాలి ఉంటుంది.

#### పోషకాల కొరతల చిహ్నం

ఆకు, పండు, పువ్వులలో ముఖ్యంగా కనిపించే పోషక కొరతల చిహ్నాల్ని క్రింద పట్టిక రూపంలో ఇవ్వబడింది. ఆకులు పెరుగుదల లేక క్రుంగి పోతే ఆకులు వసువు రంగులో ఉంటాయి.

వసుపు రంగుంటే	-	నత్రజని కొరత
నురగ రంగుంటే	-	పొస్ఫేటు లేదా పొటాషియం కొరత
కాలానికి ముందుగానే రాలిపోతుంటే	-	N.P.K. మూడు కొరవడినాయి. (నత్రజని, పాస్పరం, పొటాషియం)
దట్టమైన ఆకువచ్చి కాండంలావుగావుంటే	-	నత్రజనాంశం ఎక్కువ
తెల్ల బారుంటే	-	సున్నం ఎక్కువ
దట్టమైన ఆకు పచ్చరంగులో ఉండి,	-	సున్నపు కొరత
ఆకులలో చుట్టుకొని ఉంటే		
ఉబ్బి వసువవుని రంగులో	-	పొటాషియం కొరత
గుంటలుంటే (టోమాటో రంగులో ఉంటే)		
తెల్లబడుంటే	-	నత్రజని కొరత
చిత్తనం, దుంప, చాలా నిదానంగా	-	నీరు నత్రజనాంశం ఎక్కువ, పొస్ఫేటు తక్కువ
పెరుగుతూ బలుస్తూంటే		
బలిసుంటే	-	పొటాష్ కొరత
వేరుగడ్డ (దుంపలు) తక్కువై	-	అస్సత్వం, నీరు నిలువ ఉండడం, గట్టి నేల, సున్నం తక్కువ,
చిన్నవిగా ఉంటే		పొస్ఫేటు తక్కువ.

## అనుబంధం

### 4.6 చిత్రం.

ఏయే రసాయనిక ఎరువులను కలపాచ్చు, వేటిని కలుపరాదు అనే విషయాల్ని తెలియజేస్తుంది.

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. పొటాషియం మ్యూరేట్.             | 2. పొటాషియం సల్ఫేట్.              |
| 3. అమ్మోనియం సల్ఫేట్.             | 4. కాల్షియం అమ్మోనియం నైట్రేట్.   |
| 5. పొటాషియం, సోడియం నైట్రేట్.     | 6. కాల్షియం నైట్రేట్.             |
| 7. కాల్షియం సైనామిడ్.             | 8. యూరియా                         |
| 9. సూఫర్ ఫాస్ఫేటు (ట్రీవల్ సూఫర్. | 10. అమ్మోనియం ఫాస్ఫేటు (మోన్ డై)  |
| 11. బేసిక్ స్లాక్.                | 12. రెనానియ ఫాస్పేట్.             |
| 13. హైవర్ ఫాస్ఫేట్.               | 14. కాల్షియం కార్బోనేట్ (సున్నం). |

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	□	□	□	⊗	⊗	⊗	⊗	□	□	□	□	□	□	□	-
2	□	□	□	⊗	⊗	⊗	⊗	□	□	□	□	□	□	□	-
3	□	□	□	□	⊗	⊗	■	□	□	□	■	■	⊗	□	-
4	⊗	⊗	□	□	⊗	⊗	■	⊗	⊗	⊗	■	⊗	□	□	-
5	⊗	⊗	⊗	□	□	□	⊗	⊗	⊗	⊗	□	□	⊗	□	-
6	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	□	⊗	⊗	■	■	⊗	⊗	⊗	⊗	-
7	⊗	□	■	■	⊗	⊗	□	⊗	■	■	□	□	□	□	-
8	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	□	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	-
9	□	□	□	⊗	⊗	■	■	⊗	□	□	■	■	■	■	-
10	□	□	□	⊗	⊗	■	■	⊗	□	□	■	■	■	■	-
11	□	□	■	■	□	⊗	□	⊗	■	■	□	□	□	□	-
12	□	□	■	⊗	⊗	⊗	□	⊗	■	■	□	□	□	□	-
13	□	□	⊗	□	□	⊗	□	⊗	■	■	□	□	□	□	-
14	□	□	■	□	□	⊗	□	⊗	■	■	□	□	□	□	-

4.6



ఈ ఎరువులను కలపాచ్చు.



ఈ ఎరువులను వేయడానికి ముందే మాత్రం కలవవచ్చు.



ఈ ఎరువులను కలవనేకూడదు. ఎముకల పొడిని అన్ని ఎరువుల జతకీ చేర్చవచ్చు.

## తోట ఉపకరణాలు - Garden Tools

తోట పని పాఠాలలో సంవత్సరానికి ఒకసారి పెంచే పైరువంటిది కాదు. సంవత్సరానికి మూడు నాలుగు పంటలను వండించే తీవ్ర కృషి, తోట పని అనే వ్యవసాయం సంవత్సరమంతా జరిగేది కృషి అవుతుంది. పంటలను సరిచేయడం, మట్టిని కెడకడం, ఏరు వేయడం, ఎరువులు పూడ్చడం (పాతడం), ఎరువులు కలవడం, విత్తనాలను చల్లడం, మొక్కల్ని నాటడం, కలుపు తీయడం, మొక్కల్ని రోగాలు, కీటకాల బారి నుండి రక్షించడం, మొక్కల్ని ఒక హద్దులో పెట్టుకోవడం, ఫల, పుష్పాలను వృద్ధి పరచడం, పళ్ళని, పుష్పాలను, కాయల్ని కోయడం, కొమ్మల్ని విడదీయడం, విత్తనాలు తీయడం, మొదలైన పనులు ఎడతెరిపి లేకుండా తోటలో ఏదో ఒకపని చేస్తూనే ఉండాలి. ఈ పనులను సమర్థవంతంగా, శీఘ్రంగా, ఎక్కువ శ్రమ లేకుండా చేయడానికి, పనులకు సరిపోయే విధంగా గట్టి ఉపకరణాలుండాలి. అప్పుడే తోటపనులు జయప్రదమవ్వడమే కాకుండా, ఉల్లాసంగా కూడా ఉంటాయి.

తోట పనుల కృషిని ముఖ్యంగా ఆరు (6) రీతులుగా విభజించవచ్చు. అవి :

1. పూర్వ కృషి (Preparatory Cultivation) - మట్టిని విత్తనాటే నాటికి సిద్ధపరచే పనులు - త్రవ్వడం, కుప్పల్ని ఏరి, శుభ్రపరచడం, చదును చేయడం, కాలువలు త్రవ్వడం ఇత్యాదిగా గల పనులు.
2. విత్తు నాటడం (Sowing and Planting) లేదా మొలకల్ని పాతడం.
3. అంతర లేదా మధ్య కృషి (Inter-cultivation) పైరు మొలకల్లోచ్చాక లేదా మొక్కలు పాతిన తర్వాత కోత కోసంత వరకు, నడిపే కలుపు తీయడం, ఏరు వేయడం, కెడకడం, కత్తిరించడం. ఇత్యాది పనులు.
4. కోత కోయడం, పైరు కోత.
5. నవ్య సంరక్షణ.
6. నీళ్లు పారించడం, ఇంకించడం, మొదలుగా గల పనులు.

తోట విస్తీర్ణం పెంచే మొక్కలకు అనుగుణంగా పనిముట్లను, ఉపకరణాలను ఎన్నుకోవాలి. పెద్ద తోటైతే, పూర్వ కృషికి పెద్ద పనిముట్లు, ఎత్తేదానికి, తోడడానికి ఉపయోగించే ఉపకరణాలు కావల్సి వస్తాయి. లేకపోతే పనులు నిదానమవుతాయి. అంతేకాకుండా చేతితో పనులు శ్రమతో కూడిన పని, దాంతో తోటపని అసంతృప్తిగా ముగియాలని వస్తుంది. పూర్వ కృషికి దున్నే దానికి, పూడ్చడానికి నాగలి వంటి ఉపకరణం కావల్సి వస్తుంది.

నాగళ్ళలో చాలా రకాలున్నాయి. చెక్క నాగలి, ఇనుప నాగలి, రేకు నాగలి.

చెక్క నాగలి : దీనిలో మట్టిని ఎత్తివేసే షీటు ఇనుపదే అయినా, దిండు (కర్ర - దండం) ఇరుసు, పిడి మొదలైనవి (చూడండి చిత్రం - 5.1) చెక్కతో చేసినవి. ఈ నాగలి మట్టిని గోకడానికి, గీరడానికి తప్ప,

ఇనువ నాగలులాగ శ్రవ్యలేదు. సామాన్యంగా చెక్క నాగలి చాలా తేలికైనది. కాని ఉత్తర కర్నాటకలో ఎక్కువ బరువైన చెక్క గొడ్డళ్ళు (వీటిని రెండుపు అని కూడా అంటారు) ఉన్నాయి. అక్కడి, ఎర్రమట్టికి, నల్ల రేగడి మట్టికి యుక్తమైనవి.

#### 5.1 రెండు రకాల చెక్క నాగలి (ఎ.బి.)

మనం మట్టిని దున్నడానికి, ముఖ్యంగా నాలుగు ఉద్దేశ్యాలు ఉన్నాయి. అవి . 1. అణగి ఉన్న మట్టిని సడలించి, గుల్ల పరచి, గాలి, నీరు దిగేటట్టుగా చేయడానికి, 2. వెనుకటి మొక్కల చెత్తా చెదారాలను, కలుపును వేరుతో పీకి పారేసి, నేలను శుభ్రపరచడం, 3. మట్టి క్రింది పొర పైకి తెచ్చి, దానికి ఎండ, గాలి తగిలేట్టు చేసి, అందులో ఉన్న సస్యపోషకాలను మొక్కలకు అందించే రూపానికి రూపొందించడం. 4. రోగాణువులనూ, పురుగు పుట్రలను పొరద్రోలి, దోలలను ఏరిపారేసి, సూర్యరశ్మి ద్వారా వాటిని నాశనం చేయడం.

చెక్క నాగలితో ఈ నాల్గు ఉద్దేశాలు పూర్తికావు. చెక్క నాగలి, చెక్క సాధనం ఫ్లేడ్ V-ఆకారపుది తెరలను, కలుపులను కత్తిరిస్తూ పోతుంది. రెండు నాగలి చాలుల మధ్య దిండు గట్టిపడి అలాగే మిగిలిపోతుంది. (చిత్రం - 5.2).


#### 5.2 చెక్క నాగలితో దున్నితే రెండు నాగలి చాలుల మధ్య (a, b) దిండు అలాగే మిగిలిపోతుంది.

ఈ గడ్డలను పగలగొట్టడానికి నేలను 5-6 సార్లు దున్నవలసి వస్తుంది. ఈ విధంగా చేస్తే ఖర్చు, శ్రమ అంతేకాకుండా ఎక్కువ కాలం కూడా పడుతుంది. పొలాలలో నాగలి మట్టిని త్రిపుక పోవడం చేత క్రింది పొరలు పైకి రావడానికి రోగాణువులు, పురుగు పుట్రలు బయట వడదానికి సాధ్యం కాదు. మురికి, కలుపు సడలి శుభ్రపడుతాయే తప్ప క్రింద మట్టి పైకిరాదు. పై మట్టి క్రిందికి పోదు. ఈ కారణాల చేత మొదటిసారి దున్నడానికి చెక్క నాగలి అంత తృప్తికరమైన ఉపకరణం కాదు. కాని పాతిన మట్టిని శుభ్రపరచడానికి, విత్తునాదే వరుసలను చేయడానికి, మొలకల మధ్య అంతర కృషి జరపడానికి, కొద్ది మట్టిని ఏరి వేయడానికి, మొలకలు చాలని చోట పూరించడానికి దేశీయ నాగలి సమర్థవంతమైన పనిముట్టు.


ఇనువ నాగలిలో గునపం వంటిదే (గుల్ల) కాకుండా, మట్టిని త్రిపుడానికి రెక్క (మోర్ట్ బోర్డు) ఉంటుంది. అంతేకాకుండా L-ఆకారపు తెరలుగా (రేకులుగా) మట్టిని కత్తిరించడానికి, దున్నిన మట్టిని నాగలి లోపలికి వడకుండా ఉండడానికి ల్యాండ్ సైడ్ (Landside) అనే ఇనువ పట్టి ఉంటుంది. (చిత్రం 5.3) నాగలి బాగా తిరగడానికి కత్తిరించడానికి, కొన్ని పోష ఏర్పాటులుంటాయి.

ఈ భాగాలుండటం చేత, ఇనువ నాగలిని ఉపయోగిస్తే నేలను లోతుగా దున్నవచ్చు. మట్టిని త్రిపువచ్చు. కలుపు మురికిని క్రింద భాగం నుంచి పీకి, మూసి వేయవచ్చు. పురుగు పుట్రలను, రోగాణువులను దులీపి, నాటిని ఎండపెట్టవచ్చు. చదును పరచవచ్చు. దున్నే ఖర్చు, శ్రమలను తక్కువ చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా నేలను తర్వాతి సైరుకు త్వరగా సిద్ధపరచవచ్చు. తోటమాలి మామూలు నాగలినే ఇష్టపడితే, 5-6 సార్లు దున్నవలసి రావడంతో, కాలపొరణమై సకాలానికి సైరును వేయడానికి కష్టమవుతుంది. కొన్ని సార్లు సైరును వేయడానికి ఏలుకాదు.







5.1



5.2



5.3



5.3 ఇనుప నాగలి భాగాలు : 1. షేరు, 2. రెక్క (మోల్డ్ బోర్డు) 3. రెండు పిడులు (ఇనుపని లేదా చెక్కని) 4. ఈసు, బీము, మైసూరు, కోలార్ మిషన్ నాగలులలో మెస్టర్ మొదలైన తేలికైన (బరువు లేని) నాగళ్ళులలో చెక్కని, బరువైన నాగళ్ళలో ఇనుపవి. 5. కోల్చరు, దట్టంగా అల్లుకొని ఉన్న మొక్కల క్రింది భాగాలను కోసి వేరు కత్తరించడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. 6. పెద్ద నాగళ్ళలో చక్రం ఉంటుంది - నాగలి ఆడకుండా ఉపయోగించడానికి, 6a. చక్రాన్ని పైకి, క్రిందికి దించడానికి ఉపయోగించే సాధనం, 7. నాగలితో వచ్చే వరుసను దక్కించే బ్రెడ్ లీనితో నాగలిని పశువులంత ఎత్తుకు సరిచేయవచ్చు. 8. ల్యాండ్ సైడు.

తోట నేలను లోతుకు దున్నాల్సి వస్తుంది. తోటలో మురికి, చెత్త, చెదారం, కలుపు ఎక్కువగా ఉండటం చేత పురుగు పుట్రల బాధలు ఎక్కువగా ఉండటం చేత, తోటమాలి మొదటిసారి దున్నేప్పుడైనా ఇనుపనాగలిని ఉపయోగించడం యుక్తం.

ఇనుప నాగళ్ళలో అనేక రకాలుంటాయి. వీటిలో మన దేశంలో ఎక్కువగా వాడుకలో ఉన్న వాటి బొమ్మలను (చిత్రాలను) 5.4లో చూపబడింది.

5.4 వివిధ రకాల నాగళ్ళు 1. కోలార్ మిషన్, 2. కొంకణం (కొక్కిలాంటిది), 3. మలైవాడు నాగలి, 4. మేస్టర్ నాగలి, 5. మైసూరు నాగలి దీనికి షేరుకు ముందు కర్రు (తగడు పీటు) ఉంది. ఇతర నాగళ్ళలాగ అప్పుడప్పుడు షేరును మార్చాల్సిన పనిలేదు. ఈ కర్రును మాత్రం ముందుకు త్రోయాల్సి వస్తుంది. 6. సాబూల్ నాగలి.



5.5 చక్రపు నాగలి - చక్రపు సావటం - (disc-plough - Disc-harrow) (గుండ్రని బిళ్ల నాగలి) (గుండ్రని బిళ్ల సావటం).

షేరు (Share నాగేటికి కర్రు - blade of the plough) ఇది నాగలి యొక్క ముఖ్య భాగం. వాడియైన మొనదేలిన ఈ భాగం మట్టిలో దిగి నేలను కత్తిరిస్తుంది. ఈ కారణం చేత ఈ భాగమే ఎక్కువ అరిగే భాగం. దీని కొన బ్లేడ్లాగ నేల వైపు దిగుంటుంది. నేలను అడ్డంగా కోసి, నాగలి తెచ్చే మట్టిని క్రింది మట్టి నుండి వేరు చేసి పైకి త్రోస్తుంది.


రెక్క - (మోల్డ్ బోర్డ్ - Mould Board అచ్చుపోతబిల్ల వంటిది) (రూపిత బిల్ల). ఇది చుట్టుకొన్నట్టుండే భాగం నాగేలు కట్టి కత్తిరించిన మట్టి ముక్కలను (పాడిని) నాగేటి చాలు ఎత్తి కుడివైపున చాలు పైన వెంటనే గలగబా నెట్టుతుంది. ఈ విధంగా త్రవ్వినప్పుడు మట్టి గడ్డలు, పాడి ఏర్పడుతాయి. అంటే నాగేటి చాలు నుంచి మూడు పనులు ఏకకాలంలో జరుగుతాయి. మట్టి క్రింది పొర పైకి వస్తుంది. తల క్రిందులుగా అవుతుంది. పాడి ఏర్పడుతుంది. ప్రక్క వరుసలో క్రింది భాగంతో సహా తేలిన కలుపు, మురికి మూసుకుపోతుంది.

ల్యాండ్ సైడ్ (Land side) పెద్ద మట్టి గడ్డలు అడ్డుపడటం. ఇది మిగిలిన భాగపు మట్టిని దున్నిన భాగానికి పడేటట్టుగా వేసి అడ్డు అనవచ్చు. అంతేకాకుండా, నాగలి ఆడకుండా కత్తిరించడానికి సహాయపడుతుంది.

పిడి : సామాన్యంగా ఇనుప నాగలికి రెండు పిడులను జోడిస్తూంటారు. దీనితో నాగలి వేగానికి ఎక్కువగా కదలకుండా హద్దులో పెట్టుకోవచ్చు.



5.4



5.5

5.6

దూలం (దూలం - Beam) ఇది చెక్కిన యుండొచ్చు, లేదా ఇనుపదై యుండొచ్చు. రోతుకు పెట్టెట్లున్నది నాగలి దూలం ఇనుపదై యుండాలి.

**బ్రెడల్ లేదా క్లెవిస్ : (Bridle or Clevis కల్లెం లేదా పార)** ఇది ఇనుప నాగలి దూలపు కొనలో జోడించబడిన భాగం. దీనితో నాగలి అడ్డును, రోతును, వెడల్పునూ హెచ్చు తగ్గులు చేసుకోవచ్చు.

ఇదికాకుండా, కొన్ని పెద్ద బరువైన ఇనుప నాగళ్ళలో నాగలి నేరుగా ఉపయోగించేటట్టుగా గాలిని, నేలను కత్తిరించి నాగటికట్టు సులభంగా వేసేటట్టు కౌల్టర్ (Coultter) - అనే తీక్షణమైన మొనదేరిన లావు కర్రని పొందుపరుస్తారు.

ఈ రెక్క నాగళ్ళను ప్రారంభించడానికి లేదా మొదలు పెట్టడానికి రెండు క్రమాలున్నాయి. 1. నేల మధ్య ఒక చాలు ఏర్పరచి, దాని చుట్టూ దున్నడం. దీన్ని విభజించి దున్నడం (Splitting) అని అంటారు. కారణం మధ్య భాగం విభజింపబడడం. దీన్నే కర్నాటకవారు పదవ వరసల వ్యవసాయం అని అంటారు. ఈ విధంగా దున్నిన తెగలన్నీ భూమిలోని మధ్య రేఖ వైపు చాలుట చేత భూమి మధ్య భాగం అంచుకన్నా కొద్దిగా ఎల్లం (గుంట) అవుతుంది. 2. నేల అంచు నుంచి, బయలుదేరి, మధ్యకు వస్తుంది. దీన్ని డిబ్బు చాలు (గుట్ట కూర్చే వరుస) వ్యవసాయం అనవచ్చు. (Gathering, సేకరణీకరణ వ్యవసాయం) ఈ విధంగా దున్నితే మధ్య భాగం కొద్ది ఎక్కువై పైకి ఎక్కి, అంచు భాగం తగ్గుతుంది.

ఈ రెండు క్రమాలలోనూ దేన్ని అనుసరించినా, నేల బాగా పడునై, గుల్లబారుతుంది. అందుచేత, అనుక్రమంగా ఒకసారి విభజీకరణంగా దున్నడం ఇంకొక సారి, డిబ్బుచాలుగా దున్నడం చేస్తూంటారు.

3. చక్ర నాగలి (Disc plough or Disc harrow) లేదా చక్రపు సాపటం :


ఇందులో గుల్ల, రెక్క మొదలైన వాటికి బదులుగా తీక్షణమైన మొనదేరిన ఉక్కు చక్రాలు ఉంటాయి. (చిత్రం 5.6).

5.6 ఇంకొక రకపు చక్రసాపటాలు.

దీనిలో 4 చక్రాలుంటాయి. ఈ చక్రాల దిక్కును కొద్దిగా మార్చడానికి లీవర్ (Lever - మీట) లేదా మీటరోలు (సన్నెరోలు) ఉంటుంది. చక్రాలను నడిపినప్పుడు (చక్రాలను త్రిప్పినప్పుడు) మట్టిని కత్తిరించడమే (ఖండించడం) కాకుండా, త్రిప్పి కలిపి, పొడి చేస్తుంది. కాని ఈ నాగలితో రోతుకు, (పల్లెనికి) దున్నడానికి సాధ్యం కాదు. గట్టి దుబ్బు (జొన్న, చెఱెకు మొదలైన వాటి దుబ్బు) ఉండే నేలను దున్నడానికి ఈ చక్రపు నాగలి సరైనది. పప్పులను కత్తిరించి, మట్టిలో చేర్చడానికి ఇది అనుకూలమైంది. ఈ పనిముట్లు బరువుగా ఉండడం చేత ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది.

**గుంటి, మడకలు (Harrows or Cultivators)**

దున్నిన తర్వాత నేలను విత్తనం నాటడానికి లేదా మొక్కలు నాటడానికి సిద్ధపరచడానికి, పెంటని శుభ్రపరచాలి. మట్టిని పొడి చేయాలి. గడ్డలను పగల గొట్టాలి. మట్టి ఉంటే - ఎక్కువ తేమలేకుండా



15

ఎండిపోకుండా ఉంటే సావటం కట్టివేల్చుటను ఉపయోగించి (సావట సేద్యాన్ని ప్రారంభించి) పొడి చేయవచ్చు. ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత మట్టిని చదును చేయడానికి, గుడ్ల బరచడానికి కూడా ఈ పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తారు. అంతేకాకుండా, చెల్లాచెదురుగా ఉన్న దుబ్బును, కలుపును, గడ్డిని, కొమ్మల్ని, రెమ్మల్ని ఈ పరికరం శుభ్రపరుస్తుంది.

**కట్టివేల్చులోనూ (సేద్య పరికరాలలోను) అనేక రకాలు :**

అన్ని కట్టివేల్చులోనూ సామాన్యంగా తగరపు షీట్లు (Tines) ఉంటాయి. ఈ షీటుల సంఖ్య, ఆకారం వివిధ రకాలు. కొన్ని అద్ద చంద్రాకృతిలో ఉంటాయి. కొన్నింటికి చివర వివిధ రకాల విడి భాగాలను చేరుస్తూ (జోడిస్తూ) ఉంటారు, అరిగిన భాగాలను బదులుగా కొత్త భాగాలను నట్లు, బోల్టులు (Nuts and bolts - కమ్మీ (గడియ, మేకు)లతో బిగిస్తే, కొన్నింటిలో షీట్లు స్థిరమైనవి. వాటి అంతరాన్ని మార్చడానికి సాధ్యం కాదు. మరి కొన్నింటిలో ఈ షీటుల అంతరాన్ని ఎక్కువగానూ, తక్కువగానూ చేసుకోవచ్చు అనగా పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు.

ఈ షీటులను (చక్రాలను) తట్టలను చెక్కుకో, ఇనుముకో, దిండుకో, గుండ్రని కర్రకో చేరుస్తారు. గుండ్రని కర్రకు చేర్చులాగానే, దూలపు పీడి మొదలైనవి ఉంటాయి.


దక్షిణ కర్నాటకలో సామాన్యంగా ఉపయోగించేది కోలార్ మిషన్ కట్టివేల్చర్ (Kolar Mission Cultivator) ఇందులో ఆరు (6) అద్ద చంద్రాకృతి స్థిర షీట్లను (చక్రాలని) కర్రకు జోడిస్తారు. ఇది సుమారు 90 సెం.మీ. వెడల్పు వని చేస్తుంది.

తోట వసులలో చాలా సరైనది, చాలా వసులకు పూర్వ కృషి, అంతర కృషి వసులకు ఉపయోగించే ఒక ఉపకరణం ఫ్లానెట్ జానియర్ వరో (ఫ్లానెట్ జానియర్ పాఠ) రకపు కట్టివేల్చర్ (చిత్రం 5.8). ఇందులో ఇనుము కట్ట లేదా అడ్డవట్ట (అడ్డు కర్రలు) దిండులోకి ఏడు స్థిర షీటులను చేరుస్తారు (అతికిస్తారు). ఈ షీటులకు వివిధ ఉద్దేశ్యాలకు వివిధ రీతుల వసులను చేసేడి భాగాలను, జోడించవచ్చు. ఈ విధంగా జోడించి, ఈ ఉపకరణాన్ని మట్టి చేరవేయడానికి (earthing up) నాటడానికి లేదా విత్తు వేయడానికి, వరుసలు చేయడానికి, మట్టి కెదకడానికి, మట్టిని పొడి చేయడానికి, విత్తు చల్లడానికి సిద్ధపరచడానికి ఉపయోగించడానికి వీలవుతుంది.


ఈ కట్టివేల్చు కొన్ని వసులను మన దేశపు నాగళ్ళు చేస్తాయి. వ్యవసాయపు ఉపకరణాలలో వివిధ రకాలున్నాయి. (చిత్రం 5.9) పెద్ద నాగళ్ళ వంటి ఉపకరణాలలో 7½ - 10 సెం.మీ. వెడల్పైన, సుమారు 90 సెం.మీ. పొడవు ఉక్కు అడుగు భాగాల ఒక చెక్కు కర్ర (దిండు) జోడిస్తారు. దీన్ని ఉత్తర కర్నాటకలో ఎర్ర రేగడి నేలలో నాగళ్ళకు బదులుగా ఉపయోగిస్తుంటారు. చిన్న కుంటె, పెద్ద కుంటె లాగే ఉంటుంది. కానీ, క్రింది భాగం మాత్రం చిన్నదిగా ఉంటుంది. మొలకల మధ్య చాలు చేయడానికి, మట్టిని కెలకడానికి (సడలించడానికి) కలుపు తీయడానికి అనుకూలమైంది. పెద్ద కుంటెలో క్రింది భాగాన చీలికుంటుంది (అంటే L - ఆకారపు రెండు క్రింది భాగాలు జోడించుంటారు) దీన్ని లేత పైరులో కలుపును తీయడానికి ఉపయోగిస్తారు. చిన్న కుంటెలో అడుగు భాగానికి బదులుగా, ఇనుప చిప్పలను పెడుతారు. ఇది మట్టిని కెలకడానికి, కలుపు తీయడానికి అనుకూలమవుతుంది. కొన్ని కుంటెలను చిత్రం 5.9 లో చూడవచ్చు.




§ 13



§ 14




§ 15



α







§ 10



§ 11



§ 12



5.8 ప్లాన్ బ్ జానియర్ రకం కట్టివేటరు. దీనికి అనేక రకాల షీటులను - దున్నడానికి, ఏరు వేయడానికి, కలకడానికి, ఇత్యాది పనులకు ఉపయోగించే షీటులను జోడిస్తారు. కొన్నింటిని చిత్రంలో చూడవచ్చు.

5.9 (a - e) వివిధ రకాల నాగలి వంటి కుంటి రకాలు - a. 6 షీట్లు చిన్న కుంటిలు - మట్టిలో వరుసలు వేయడానికి, b. చిన్న కుంటి, చాలుల మధ్య త్రవ్వడానికి, c. రెండు షీట్లు చిన్న కుంటి, d. ఎడమవైపు వున్న కుంటి అడుగు భాగంలో మధ్య అంతరముంది. చాలు ప్రక్కనున్న కలుపులను తీయడానికి ఉపయోగిస్తారు. e. పెద్ద కుంటి.

మట్టిని గుల్లబరచడానికి కొన్ని రకాల సావబాలను (Harrows) ఉపయోగిస్తారు. వీటి వళ్ళు లేదా షీటులు ఇనుపవి. వీటిని ఉపయోగిస్తే, మట్టి గుల్లబారడమేకాకుండా, కొద్దిగా చదును కూడా అవుతుంది. సామాన్య కొడవలి గొడ్డలి మొదలైన వాటి చిత్రాలు 5.10 నుంచి 5.14లో చూడవచ్చు.

5.10 కొన్ని రకాల ముళ్ళు సావబాల షీటులను చెక్క దిండుకు జోడించి దేశీయ సావబాలను తయారు చేసుకోవచ్చు.

5.11 చిత్రం - ఒక రకం బండ్ ఫార్మర్

5.12 దేశీయ నాగలికి రెక్క జోడించి రిడ్జర్ (Ridger) పై బోదులుగా చేసుకోవచ్చు - ఏరు వేయడానికి.




5.13 పై అంతు రెక్క - ఏరు వేయడానికి.

5.14 పెంట ఏరడానికి, రెండు రకాల కొనలు - ఎ. ఎడమ వైపు ఉక్కు షీటు జోడించబడింది. (త్యరగా అరగకుండా ఉండడానికి) బి. కుడి కొనకు ఇనుప మేకులను జోడించివారు.

విత్తనాలను కుప్పలుగా (గుంపుగా ఒకచోట చేర్చడం) చేరుస్తారు. వీటిళ్ళలోనూ కొన్ని రకాలున్నాయి. (చిత్రాలు 5.15 - 5.17) బొన్నల కుప్ప (కూర్పు) ఇత్యాదులు. మొలకల అంతరానికి తగినట్లుగా సాలుల అంతరాలను చేస్తారు. సామాన్యంగా తోటలో దాన్యపు మొలకల్ని పెట్టరు. ఒక వేళ పెట్టినా విత్తనాలు చల్లడానికి బదులుగా, పైరును నాటి పెంచడమే వారికి పరిపాటి. అందుచేత కుప్పల విషయమై ఈ పుస్తకంలో ప్రస్తావన చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ రాగులు మొదలైన సాలు విత్తనాలు నాటవలసి వస్తే, గొట్టంను ఉపయోగించుకోవచ్చు. సర్ది అంటే వెదురు లేదా చిన్న బొంగు గొట్టం. దీని క్రింది భాగాన్ని మట్టిలో దిగేట్లుగా ఏటవాలుగా కోసి మొనదేల్చి (Sharpened) ఉంటారు. పైన ఒక తగరపు బుడ్డి వంటిదానిని చిక్కించి దాని ద్వారా విత్తనాలను వదులుతారు (చల్లతారు). ఈ గొట్టాన్ని దేశీయ నాగలికి కట్టి నాగలి సాలులో విత్తనాలు వేస్తారు.

తోటలో పెంచే మొక్కల విత్తనాలు ఎక్కువ పెరగవు కాబట్టి మొక్కల మధ్య ఎక్కువ అంతరాన్ని పెట్టి (ఎక్కువ అంతరముండేటట్లుగా) పెంచాల్సి రావడంతో, విత్తు నాటడం చేతితో నాటడమే యుక్తం. దీనిని విత్తుట (విత్తు నాటుట) నాటే విత్తునాటుట (విత్తనాలను వేయడం లేదా విత్తనాలను సాతి నాటడం), (విత్తు జల్లటం, విత్తు నాటటం Dibbling) అనె్వు. దీనికన్నా ఉత్తమమైన క్రమం దీజాలను (విత్తనాలను) నారు (ఒడ్డులు - సస్య పోషణ - Nursery) పోసి, మొక్కల్ని మొలకెత్తించి నాటడం.





S.18

పై తెలిపిన ఉపకరణాలన్నీ ఎత్తు చేయడానికి ఉపయోగించేవి. వళ్ళు తోటలు మొదలైన పెద్ద తోటలకు కావల్సిన ఉపకరణాలు. కాని చిన్న తోటలకు, పెరటి తోటలకు చిన్న ఉపకరణాలు - చేతి ఉపకరణాలు (Hand tools) ఉన్నాయి. వీటిలోనూ అనేక రకాలున్నాయి. ముఖ్యమైన కొన్నింటిని (చిత్రం 5.18, 1.15) లలో సూచించబడ్డాయి.

5.15 మైసూరులో ఉపయోగించే నాలుగు షీటుల (తాళ) గొట్టు.

5.16 రెండు షీటుల (తాళ) గొట్టు.

5.17 నాలుగు షీటుల మొనదేలిన గొట్టు.

5.18 1-6 చిన్న తోటకు (పెరటి తోటకి) అవసరమైన చేతి ఉపకరణాలు. 1. స్పేడు (పాట), 2. ఫోర్కు, 3. డ్రాహూ, 4. డచ్ హా, 5. రేకు, 6. షావెల్లు.

5.18 (7-15) 7. బ్రోవర్, 8. త్రిశూల, 9. పురిగూటి, 10. రేక్, 11.11a. 11b. వివిధ రకాల పని ముట్లు, 12. కత్తెర, 13. వంపు కత్తెర, 14. అలకగోలు, 15. మట్ట.


### చిన్న ఉపకరణాలు (Small Tools)

పెద్ద తోటలలో నాగితో చేసే పనులను, వ్యవసాయాన్ని (సేద్యాన్ని), చిన్న తోటలలో పాట మొదలైన వాటి ద్వారా చేసుకొంటారు. ఈ పనినే తవ్వడం (గుంతల తవ్వకం) అని అంటారు. త్రవ్వడానికి కూడా నాలుగు ఉద్దేశాలున్నాయి. 1. నేలను సడలించడం (గుల్లి బరచడం), 2. మట్టిని కలవడం, 3. తిరగవేయడం, 4. దుబ్బులను కలుపును లేపి, మూయడం. కీటకాల్ని, రోగాల్ని ఎండలో ఎండేటట్లు చేయడం (రోగాల్ని కీటకాల్ని ఎండ సహాయంతో పారద్రోలడం).





గుంతలు త్రవ్వడానికి ఉపయోగించే ఉపకరణాలు : పాట,, మమ్మటి (సనిక) లేదా ఆకు పాట, పికాక్స్ గడ్డపాట, ముళ్ళ గరిట (ఫోర్కు - Fork), పాట (Spade). షఫ్ట్ క్ల, డేశంట్ ఓక్స్ క్ల, పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తారు. మైసూరు, పాండ్య జిల్లాలలో ఎక్కువగా గుంటల్ని సనిక (మమ్మటి)తో గుంతలను చేస్తారు. దీన్ని మమ్మటి అనే వ్యవహరిస్తారు.


నేల చాలా గట్టిగా ఉంటే లేదా గడ్డి అల్లుకొని ఉంటే గడ్డపార (Pickaxe) తో తవ్వతారు. పాశ్చాత్య దేశాలలో ఎక్కువగా ముళ్ళ గరిట (Fork) ను పాటను (Spade) ని ఉపయోగిస్తారు. ఇతర ఉపకరణాలకంటే వీటిని ఎక్కువగా నిలబడే ఉపయోగించాలి. సామాన్యంగా మనదేశ ఉపకరణాలన్నీ నడుము వంచి లేదా వంగి ఉపయోగించాలి. చిన్నపటి నుంచి ఈ అలవాటు లేనివారికి ఈ ఉపకరణాలను ఉపయోగించడం (వాడడం) చాలా శ్రమతో కూడిన పని. కాని అలవాటైన వారికి ఈ పని చాలా సులభం.

గడ్డపాట, ముళ్ళ గరిటతో మట్టిని గుల్లిబరచవచ్చు. పాట, గడ్డపాట, అడుగు నుంచి మట్టిని పీకి, పై భాగాన్ని కొట్టి దున్ని, పెల్లలను పగలగొట్టవచ్చు. కాని, ఈ ఉపకరణాలతో మట్టిని (కలవడానికి) త్రవ్వడానికి సాధ్యం కాదు. ఈ విధంగా మట్టిని త్రవ్వడానికి పాట ఎక్కువ అనుకూలంగా ఉంటుంది.



5.22





5-23

పాతల్ పని నిదానంగా జరుగుతుంది. అడుగు భాగాన్ని రోతుగా త్రవ్వడానికి, బలంగా కొట్టాలి. కాని పాత, ముళ్ళ గరిటెలు దింపడానికి, చేతి బలం మాత్రమే కాకుండా, కాలి బలం కూడా ఉపయోగించాలి. (చిత్రం 5.19) వీటిపైన కాలు ఊని, ఎక్కి వీటిని రోతుకి దించాలి.

5.19 షావెలు (మట్టిని ఎత్తి పోయడానికి) మొనదేలిన పాత, కూచు గరిట (నిలబడి పనిచేయడాని కుపయోగించేసాధనం).

కొన్నింటల్లో ఈ విధంగా కాలు ఊనడానికి ఒక పెడల్ను (రికాలు) కలిపుంచారు. (చిత్రం 5.20) బంకమట్టి ఉన్న చోట మొనదేలిన అలుగుతో పాతను ఉపయోగిస్తారు.

5.20 వివిధ పాతలు రోతుతో దింపడానికి వీలుగా పాతను తొక్కి ఊనడానికి మూడు రకాల పెడల్లు (తొక్కుడు పెడల్లు) ఉన్నాయి.

పాతల్ సుమారు 8-10 అంగుళాల రోతు (20-25 సెం.మీ.) త్రవ్వవచ్చు. గంటకు సుమారు 20 చదరపు మీటర్ల (సుమారు 22 చదరపు గజాలు) కఠినమైన నేలను త్రవ్వవచ్చు.

పాత దిగేడు రోతు పాత బరువును అనుసరించి ఉంటుంది. బరువున్న కొద్ది ఎక్కువ రోతుకు దిగుతుంది. మమ్ముటిలలోనూ కొన్ని రకాలు - కొన్నింటికి పిడి ఉంటుంది. మరి కొన్నింటికి - మైసూరు మమ్ముటికి, పిడి ఉండదు. కొన్నింటికి చిన్నకాడ, కొన్నింటికి పొడవు కాడ, కొన్ని పాతల అడుగు పొడవుగా వుంటుంది. కొన్ని వెడల్పుగా ఉంటాయి. (చిత్రం 5.21).

5.21 వివిధ రకాల మమ్ముటీలు. కొన్నింటికి హంస పిడులు (Swan-necked).

త్రవ్వడానికి, మట్టిని కలపడానికి, పిడి యుండే మమ్ముటి ఎక్కువ అనుకూలం. అడుగున ఎక్కువ రోతుకు త్రవ్వవచ్చు. దిబ్బలను త్రవ్వడానికి (సవరించడానికి) అలంకారప్రాయంగా కత్తిరించడానికి, లేదా ఏటవాలుగా మట్టిని త్రవ్వడానికి పిడిలేని మైసూరు మమ్ముటీ అనుకూలంగా వుంటుంది.

బంగాళా దుంపలు మొదలైన దుంపల్ని తీయడానికి, రెండు వళ్ళు (ముళ్ళు) ఉన్న మమ్ముటీ రూపంలో ఉన్న పాతను నీలగిరి వైపు ఉపయోగిస్తారు.


చిన్న పాదులలో పనులు చేయడానికి లేదా స్త్రీలు పని చేయడానికి చిన్న పోర్చులను (త్రిశూల) గడ్డ పాతలుంటాయి. (చిత్రం 5.22 - 5.23) వీటితో కూర్చునే పనులు చేయవచ్చు.

5.22 త్రవ్వే ఉపకరణాలు. గడ్డపార (పిక్యాక్స్) కర్ర పిడి ఉన్న గొడ్డలి. మూడు ముళ్ళు (వళ్ళు) గొడ్డలి.


5.23 ముళ్ళ గొడ్డళ్ళు, త్రిశూల గొడ్డళ్ళు వివిధ రకాలు.

పెంటల్ని బద్దలు కొట్టడానికి చెట్టు చుట్టూ (గుచ్చి) మట్టిని తీయాలి. దీనికి గొడ్డలికి పొడవైన పిడిని వేస్తే, ఎక్కువ వంగకుండానే పెంటల్ని కొట్టవచ్చు.


త్రవ్వడం అయిన తర్వాత, పెంటల్ని చదును చేసిన తర్వాత, మట్టిని లేచు చేయడానికి, సారవంతం




5.24



5.25 A




i



ii

5.25-C



5.25-B

187B

చేయడానికి, చదును చేయడానికి, కెడకడానికి, కెలకడానికి, కలుపు తీయడానికి, ఏరు చేయడానికి, అనేక రకాల చేతి ఉపకరణాలు ఉన్నాయి. చేతి పండ్ల రోల (Rake - రేకు) (5.24 చిత్రం).

#### 5.24 గొర్రులు లేదా రేకులు

గడ్డి పీకడానికి ఉపయోగించే గడ్డ పాట, చెత్తా చెదరాన్ని గుచ్చే కొక్కె పాట, వరినారు, డచ్ పాట మొదలైనవి (చిత్రం 5.25A). వీటిలో కొన్ని తోటమూలకు పరిచయమయ్యే ఉంటాయి. కాని అవరిచితమైన ఉపకరణాలే ఎక్కువ. 5 లేదా 6 లాష్ కల్టీవేటర్ (చిత్రం 5.25B) ఈ లాష్ను ఒక రంధ్రానికి చిక్కించి స్క్రా నట్టులతో బిగిస్తారు. రంధ్రానికి ఒక పాడపు కర్రని కడతారు. దీనిని లాగి పని చేయాలి. చేతి పాట (Hand hoe)లలో రెండు రకాలున్నాయి. లాగే పాటలు, దువ్వే పాటలు (Draw hoes). రాసే పాటలు, త్రోసే పాటలు (Push hoes) (చిత్రాలు 5.25C).

#### 5.25 A కల్టీవేటర్లు.

#### 5.25 B వివిధ రకాల చేతి పాటలు.

5.25 C ఒక చక్రం, రెండు చక్రాల పాటలు, పీటులుగా జోడించు భాగాలు, ఈ పాటలను త్రోస్తూ పని చేసుకొంటారు.


దువ్వే పాటలు గట్టి మట్టిని త్రవ్వడానికి ఇత్యాది పనులకు అనుకూలంగా వుంటుంది. కాని చేతికి శ్రమ ఎక్కువగా ఉంటుంది. త్రోసే పాటలు సడలిన మట్టి యుక్తంగా ఉంటుంది. త్రోసేటప్పుడు మైనపు ముద్దల్ని రాసుకుంటే (ఉపయోగిస్తే) పని చాలా సులభంగా అవుతుంది. ఈ చేతి పాటలను ధాన్యాల (పైరుల) సాలుల మధ్య మట్టిని కెలకడానికి కలుపును పైకి తేవడానికి, మట్టి సాలులవైపు లాగడానికి ఉపయోగించవచ్చు. దీనికి పాడవైన పిడి ఉండటం చేత నిలబడే పనులను చేయవచ్చు. వీటి అడుగు క్రింది భాగం వలువగా మృదువుగా ఉండటంతో పనులను ఎక్కువ శ్రమలేకుండా, ముగించవచ్చు. ఈ పాటల అడుగు భాగం సుమారు 10 నుంచి 30 సెం.మీ. (4 నుంచి 12 అంగుళాలు) పాడవుగా ఉంటుంది. 6 అంగుళాలది (15 సెం.మీ.) యుక్తమైనది. వంగిన అడుగు సరిగా ఎన్నుకోవాలి. సుమారుగా పనిచేయడానికి వీలైయ్యేట్టుగా వంగి వక్రం ఉండాలి.

ఒక రకపు చేతి పాటలను దువ్వే (రాసే) పాటలవలె లాగవచ్చు. త్రోసే పాటలాగే త్రోయవచ్చు. (చిత్రం 5.25 B చూడండి). దీని క్రింది భాగాన్ని ఒక ప్రేలాడే కర్రకు చేర్చి ఉంటారు (కర్రకు జోడిస్తారు). రెండు దిక్కులలోనూ పనిచేయడంతో ఇది ఉపయుక్తమైన ఉపకరణం (ఉపయోగకరమైన ఉపకరణం).


సాలుల అంతరం ఎక్కువగా లేనిచోట మట్టిని కెడకడానికి (కెలకడానికి) మూడు లాష్ గ్రబ్బరు (Grabber) లేదా బాణాకారపు అడుగున్న కల్టీవేటర్ (ఏరేటర్) ఉపయోగించవచ్చు. వీటిని ఇతర రకాల ఉపకరణాలను, చిత్రం 5.26లో చూడవచ్చు.

#### 5.26 వివిధ రకాల చేతికల్టీవేటర్లు - మట్టిని కెలకడానికి.





5.26



5.27



5.28

మన దేశంలో కలుపు తీయడానికి, కెలకడానికి, చాలా అనుకూలమైన ఉపకరణాలున్నాయి. అవి వరవాని, లేదా కుర్చి, (చిత్రం 5.27) దీని నిర్మాణం సరళంగా వుంటుంది. పనులు సమర్థవంతంగా చేసుకోవచ్చు. కాని కూర్చుని పని చేయాలి.

విత్తు నాటడానికి కూడా అన్ని రకాల ఉపకరణాలున్నాయి. కాని వీటిని మనదేశంలో ఎక్కువగా ఉపయోగించడం లేదు. అందుచేత వీటిని మనవారు తయారు చేయడం లేదు. వీటిని చిత్రం 5.28 a & b లలో చూడవచ్చు. వీటి మూల నిర్మాణం ఈ రీతిగా ఉంటుంది. విత్తనాలను నింపడానికి ఒక స్పష్టమైన గుండ్రని ఆకారపు గిన్నె లేదా డబ్బా ఉంటుంది. దీన్ని ఒక చక్రానికి తగిలిస్తారు (చేరుస్తారు). చక్రాన్ని కావలసినంత దూరానికి, సాగించినప్పుడు చక్రానికి చేర్చికట్టిన డబ్బా క్రిందున్న రంధ్రం తెరచుకొని విత్తనాలు క్రిందకి పడతాయి (క్రిందకి దిగుతాయి). విత్తనాల సాులను చేయడానికి ఒక కర్రను, విత్తనం నాటిన తర్వాత మట్టిని మూయడానికి రెండు ఉక్కు అడుగు పళ్ళులను జోడించి యుంటారు. దీని మూల నిర్మాణం, తయారు చేసిన వ్యక్తులు, వివిధ రీతులలో వీటిలో కొన్నింటిని మార్చడం చేస్తూంటారు. మన దేశంలోనూ కూలీల కొరతుంది. ఖర్చు ఎక్కువైనప్పుడు ఈ రకపు చేతి ఉపకరణాలు వాడుకలోకి రావచ్చు.

5.27 వరవారులు, కుర్చీలు - కలుపు పీకడానికి (తీయడానికి) గడ్డిని చెక్కడానికి, కెలకడానికి.


5.28 a. ఎద్దులకు కట్టి (డిల్లు), విత్తనం నాటడానికి, b. చేతితో త్రోసుకుంటూ వెళ్ళే (డిల్లరు).

తోట పనులలో కత్తిరించే (Pruning) పనులు చాలా ముఖ్యమైనవి. చాలా కాలం మొక్కలనూ, తీగలనూ, కంచెలను కత్తిరించకుండా ఉంటే పళ్లు, మొక్కల రూపం పాడవుతుంది. కొత్త చిగురు చిగురించదు. పువ్వులు ఎక్కువగా వికసించవు. కావల్సినంత (చాలినంత) పళ్లు, కాయలు ఇవ్వవు.

ఈ కత్తిరింపు పనులు సమర్థవంతంగా సాగడానికి యుక్తమైన ఉపకరణాలు కావాలి. రెమ్మలు కొమ్మలు, నార రాకుండా ఉండేటట్లుగా, అడ్డదిడ్డంకాకుండా, కత్తిరించాలి. లేకపోతే పనులు నిదానమవ్వడమే కాకుండా, కత్తిరించేటప్పుడు అయిన లొత్తలు త్వరగా ఆరవు (మానవు). రోగాలు, కీటకాలు లోపల చేరడానికి అవకాశమేర్పడుతుంది. అందుచేత, కత్తిరించే ఉపకరణం చాలా (sharp) పదునుగా ఉండాలి. మంచి ఉక్కుతో చేసినదిగా ఉండాలి. చాలా కాలం చక్కగా ఉండేటట్లుగా ఉండాలి. తక్కువ ఖర్చుతో వచ్చే ఉపకరణాల వల్ల పనులు పాడవుతాయి, వృధాశ్రమ డబ్బు దండగవుతుంది.

కత్తిరించడానికి ఉపయోగించే కత్తెర్లు ఏవి అంటే సీకేసర్స్ లో (అంటుగట్టుడానికి కత్తిరించే అడకత్తెర, Secateurs) కత్తిరించే బాకు (Pruning Knife) కత్తిరించే రంపం (Pruning Saw) పీయర్స్ shears (ట్రీప్రానర్ (Tree Pruner).




వీటిలోనూ కొన్ని రకాలున్నాయి. సీకేసర్స్ లో కొన్ని రకాలు. అదేవిధంగా అంటుగట్టే కొమ్మలను కత్తిరించే కత్తెర్లోనూ రంపాలలోనూ, ఏ రకాన్ని గ్రహించాలన్నా గమనించవలసిన అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అవి - ఇవి ఎప్పుడూ మొనదేలి షార్ప్ గా ఉంటాయా ? త్వరగా త్రుప్పువట్టేవా ? కావా ? ఎక్కువ కాలం మన్నికలు చూపాయా ? విడి భాగాలు స్ప్రింగ్ మొదలైనవి దొరకుతాయా?. కొద్దిగా డబ్బు ఎక్కువైనా ఎక్కువ కాలం మన్నికకు వచ్చే కత్తెరులను కొనడం యుక్తం.



5.29



5.30



5.31



5.32



5.33

189A

గడ్డి పరుపు (Lawn)లో గడ్డిని అప్పుడప్పుడు కత్తిరించడానికి గడ్డి వాముకత్తర (Lawn mower)నే ఉపయోగించాలి. చిన్న గస్తీ పరుపులను షీర్పుతో లేదా కత్తిరతో కత్తిరించవచ్చు. గడ్డి వాముల కత్తిరల చిత్రాలను చిత్రం 5.29 లో చూడవచ్చు.

5.29 రకరకాల (వివిధరకాలైన) లాన్ మోయర్లు (గడ్డి కత్తిరించే యంత్రాలు).

ఇందులో మొనదేలిన పరుసైన (Sharp) కత్తులను చక్రానికి జోడిస్తారు. చక్రం దొగ్గేటప్పుడు కత్తి కూడా తిరిగి కత్తి క్రింది భాగపు మధ్య చిక్కుకొన్న గడ్డిని కత్తిరించుకుంటూపోతుంది. దీని వాడుక రాబోయే అధ్యాయంలో ఈ కత్తెగ్గ స్రస్థావన వచ్చినప్పుడు వివరింపబడింది. గడ్డి పరుపుల నిర్వహణకు ఉపయోగించే ఇతర ఉపకరణాలు (చిత్రం 5.30లో) చూపించ బడ్డాయి.

5.30 గడ్డి పరుపుల నిర్వహణలో ఉపయోగించే కత్తులు, బ్రిమ్మరులు.

పిలకల్ని నాటడానికి, అంటు గట్టడానికి, విశేష రకాల చాకులున్నాయి. పిలకలకు మొగ్గలకు వాడే చాకులున్నాయి. (Budding knives). కోతకు (కత్తిరించడానికి) కొడవలి (Sickle) వదిలేస్తే ఇంకో రకపు విశేష (ప్రత్యేక) ఉపకరణాలు అంత ఎక్కువగా అవసరం రావు. కొడవలి మంచి ఉక్కుతో చేసినదై ఉండాలి. అడుగు భాగం త్వరగా మొండి అవ్వకూడదు. కొడవలిలో కొన్నింటికి రంపపు అడుగు ఉంటుంది. నార ఎక్కువగా ఉన్న ధాన్యపు పైరుల కోతకు ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా త్వరగా మొండవ్వదు. చిత్రం 5.31, పలు రకాల కొడవళ్లు చూపించబడ్డాయి.


5.31 వివిధ రకాల కొడవళ్లు.

తోట వనికి ఉపయోగపడే ఉపకరణాలు అనేక రకాలైనా, ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క గుణం ఉంది. అన్ని రకాల ఉపకరణాలు తోటమాలులకు అవసరం లేదు. కొన్ని ముఖ్యమైన ఉపకరణాలు (వరికరాలు) ఉంటే చాలు. అవి ఏవంటే, సర్రపాట, చిన్న పాట, ఆకు గొడ్డలి, (5.32, 5.33) పూర్వ కృషి పనులకు కావల్సి వస్తాయి.


5.32 గొడ్డలి, (మమ్ముటీ) పాట, ఒకటి అడుగు భాగాన్ని కెలకడానికి, ఇంకోకటి అడుగున ఉన్న మట్టిని ఎత్తడానికి.

5.33 చేతి (మమ్ముటీలు) పాటలు.

నిలబడి పని చేసేటైతే వీటి బదులు ముళ్ల గరిటె వంటి గొడ్డలి (ఫోర్కు - Fork) పాట, (స్పేడు - Spade) (మొనదేలిన పాట) మధ్య కృషికి చేతి త్రిశూల పాట (త్రిశూలం) (కరిణ - బ్రోవర్ - లాపీ) లాపీ, (5.34) గోర లేదా దువ్వేకర (Rake - వండ్లకోల / పళ్ల కోల / ముళ్ల కోల) ముళ్లకోల డచ్ చేతి పాట (గడ్డపాట) (Dutch hoe) (చిత్రాలు 5.35, 5.36 & 5.37a & b) మొక్కల్ని నాటడానికి డిబ్లర్ (Dibbler) గుంట త్రవ్వడానికీ చెక్క గునపం (చెక్కతో ఒక కొన మొనదేలి ఉండటం గునపం).




5.34




5.35




5.36




5.37



5.37 b



5.38



5.39 a



5.39 b



5.40



5.41

5.34 చేతి బ్రాళీలు - మట్టి ఎత్తడానికి.

5.35 మూడు రకాల (మమ్మాటీలు) పాజలు సాలు మధ్య మట్టిని కెలకడానికి.

5.36 వివిధ రకాల గునపాలు.

5.37 a గునపాలనుపయోగించే రీతి a. మొనదేలిన గునపాలను మొక్కలను నాటడానికి ఉపయోగించరాదు. ఆ విధంగా చేస్తే మొక్కల వేర్ల క్రింది భాగం డ్రాల్ల పడుతుంది. X. తప్పు పద్ధతి ✓. మంచి పద్ధతి.

5.37 b మట్టిలో గుంట త్రవ్వకం గునపంతో గుంట చేసి మొక్కను పెట్టి b. 1 - 1½ అంగుళం దూరానికి మట్టి త్రవ్వకం చెట్టువైపు త్రోస్తే d. గుంట తీసిన మట్టితో వేరుకు, మట్టికి సంవర్ధం ఏర్పడుతుంది. చివరిసారిగా చేసిన గుంటలో నీటిని వదిలితే e. మట్టి కణాలు కుదురుగా కూర్చుంటాయి.

కోతకు, కత్తిరించడానికి కొడవలి, ముచ్చలు (5.38) సాలు కట్టడానికి, పాదులు చేయడానికి, దిబ్బలుచేయడానికి (Garden line and pegs - గూదాము) కావాలి. కొలబద్ద, సస్యరక్షణకు ఒక స్ప్రేయర్ (Sprayer - చల్లే యంత్రం) (Duster - దుమ్మును చల్లే యంత్రం) పిచికారి (Syringes) నీళ్లు పోయడానికి నీటి క్యానులు (చేతి బకెట్టులు).

5.38 ముచ్చు, కొడవళ్లు.

5.39 a. వివిధ రకాల నీటి తొట్టెలు, పువ్వులు, గిన్నె (బాదామి ఆకారపు ఇత్తడిది) పై నున్న బిరడాని త్రిప్పితే నీళ్లు పైకి ఎక్కి తుషారులుగా (జల్లులుగా) పడతాయి. మట్టి లోతుకు పోదు.

5.39 b. వివిధ రకాల నీటి తొట్టెలు (నీటిని పోసి పాత్రలు) దానికి చేర్చిన రెండు రకాల పెద్ద రంధ్రం (చిల్లు/ నోరు) చిన్న రంధ్రపు రోసు (Rose - చిత్రం 5.39).

ఇవి కాకుండా మట్టిని, ఎరువును తీసివేయడానికి చేతి బండ్లు (చిత్రం 5.40) ఆకు పొడి మొదలైన ఎరువులను అడించడానికి, జల్లించడానికి (చిత్రం 5.41) ఈ పరికరాలు కూడా కావాలి.

5.40 వీల్ బ్యారో - చక్రపు బ్యారో - చేతి బండి, చెత్తను నింపి పారపోయడానికి, మట్టి, ఎరువులను మోసుకొని రావడానికి ఇంకా అనేక పనులకు చేతి బండి చాలా సహాయంగా ఉండటమే కాదు, శ్రమని తగ్గిస్తుంది.

5.41 మట్టి, ఎరువు, ఆకు పొడి, ఇసుక జల్లించే తోట జల్లెల్లు.

ఈ ప్రధాన లేదా ముఖ్య ఉపకరణాలను కొనేటప్పుడు కొన్ని అంశాల్ని జ్ఞాపకం వుంచుకోవాలి. అవి:

1. పాట ఎక్కువ బరువు ఉండకుండా, ఎక్కువ తేలికగానూ ఉండకుండా, మధ్యస్థంగా ఉండాలి.
2. ఎక్కువ బరువుంటే ఆయాసం, తేలికగా ఉంటే పని సాగదు. త్రిశాలపు పళ్లు (ముళ్లు) గుండ్రనివిగా అంతగా మొనదేలినవిగాకుండా ఉండాలి. (గుండ్రని పళ్లుండాలి). తట్టిన, చప్పచైన పళ్లు ఉన్న త్రిశాలం చూడడానికి బాగుంటుంది. కాని పని సమర్థవంతంగా జరగదు. కరణం గుండ్రంగా ఉండాలి. మొనదేలినదిగా

ఉండకూడదు. ఉపకరణాల పీడ ఎక్కువ బరువు ఉండకూడదు. త్వరగా చీలకూడదు, త్వరగా విరిగిపోకూడదు. ఉబ్బిత్తువుండకూడదు, ముడులు ఉండకూడదు. ముడులుంటే చేతిలో బొబ్బలు ఏర్పడతాయి. వంకరగా ఉండకూడదు. మొరటుగా కూడా ఉండకూడదు. పాట, స్పార్క్ పిడుగు ఆకారంలో ఉండాలి. అప్పుడు పట్టుకోడానికి, దూర్చడానికి, చేతని ఆదంబడానికి వీలుగా వుంటుంది.

### ఉపకరణాలను జాగ్రత్తగా వాడుకోవడం లేదా కాపాడడం (Maintenance)

మంచి పరికరాలను కొంటే చాలదు. వాటిని సమర్థవంతంగా వాడటం, ఉపయోగించడం మాత్రం తెలిస్తే చాలదు. అవి చాలా కాలం ఉండేటట్టుగా, మొనదేలి, పదునుగా (Sharp) చక్కగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి.

వని అయిన తర్వాత పరికరాలకు అంటుకున్న మట్టిని తడిసి అలాగే వదిలేయకుండా, శుభ్రపరచి పెట్టాలి. మట్టిని తడిసి తుడువకుండా అలాగే వదిలేస్తే, వాటిని తర్వాత శుభ్రపరచటం కష్టం. కొన్ని సందర్భాలలో తుప్పు కూడా పట్టవచ్చు. మొండిగా అవ్వచ్చు. చాలా మంది వొళ్ళ బద్దకం చేత వని అయిన వెంటనే శుభ్రపరచకుండా ఉపకరణాల్ని ఒక మూల గుట్టగా వేస్తారు. ఈ గుట్ట నుండి, కావలసిన ఉపకరణాలను బయటికి తీయడానికి, గొలుసులాగ అల్లుకొని ఉండే పరికరాల్ని విడదీయడానికి, శ్రమ, కాలవ్యయం అవుతుంది. ఈ విధంగా ఒకదానితో మరొక ఉపకరణం చిక్కుకొని పోయినప్పుడు విడదీసేటప్పుడు ఉపకరణాలు వంకర పోవచ్చు, లేదా విరిగి పోవచ్చు. అడుగు భాగం సొట్టలు పడవచ్చు. కాడలు విరిగి పోవచ్చు. అందువేత ప్రతి ఒక ఉపకరణాన్ని ఒక సరైన చోట ఉంచాలి. తగిలించేటైతే మేకులు కొట్టి వాటిని తగిలించాలి. ఉపకరణాల రంధ్రాలు పెద్దవి అవ్వకుండా, చూసుకోవాలి. ఏ ఉపకరణాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడే పెట్టాలి. ఉపకరణాల్ని వాటి స్థలంలో పెట్టడానికి ముందు వాటిని శుభ్రపరచి అతర్వాత వాటిని నిర్దేశించిన స్థలాలలో పెట్టాలి. శుభ్రపరిచిన తర్వాత, పొడి గుడ్డతో తుడిచి. నూనె రాసి, శుభ్రమైన చోటులో పెట్టాలి. వీటిని శుభ్రపరచడానికి వీటిని పెట్టే స్థలంలో నూనెను, చిరిగిన బట్ట ముక్కలు (చిరిగిన బట్టలు) నూనెలో అద్దిన గోనె సంచి ముక్కలను, పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా చేస్తే ఉపకరణాలు చాలా చక్కగా ఉండటమే కాకుండా, మొనదేలి చక్కగా పని చేస్తాయి. రెపెర్లు (మరమ్మత్తులను) వెంట వెంటనే చేయిస్తూ ఉంటే ఈ ఉపకరణాలు చాలా కాలం ఉపయోగించు కోవచ్చు.



## తోటపనులు (Garden Operations)

తోటపని సంవత్సరమంత జరిగెడి తీవ్ర కృషి. ఈ తోటపనుల పని, వాటిని ఎప్పుడు ఏవిధంగా చేసుకోవాలనే విషయాల్ని తోటమాలి తెలుసుకొని ఉండటం మంచిది. వెనుక చెప్పినట్లుగా తోటపనులను కొన్ని దశలుగా వర్గీకరించుకోవచ్చు.

1. పూర్వ కృషి : విత్తనం లేదా విత్తనాలను, మొక్కల్ని మంచి నేలను లేదా క్షేత్రాన్ని తయారు చేసుకొనే పనులు.  
ఇవి ఏవంటే - దున్నడం లేదా త్రవ్వడం, గుంటలు చేయడం, మట్టి మిశ్రమాన్ని తయారు చేయడం, పాదులు చేయడం, చెత్త చెదారం తీయడం, మట్టిని పొడి చేయడం, మట్టిని చదును చేయడం. ఉండగా (Roller) లేదా బల్ల (Plank) కొట్టడం. నీటి కాలువ, చిన్న కాలువలను చేయడం, విత్తు చల్లడం లేదా మొక్కల్ని వరుసలో నాటడం లేదా నారు తీయడం, నేలను శుభ్రపరచడం, లేదా మట్టిని శోధించడం, ఎరువులను, మందులను మొక్కలకి వేయడం - లేదా పాదులలో పొతడం.
2. విత్తు నాటడం : విత్తనాలను విత్తడానికి సిద్ధపరచడం, పరిష్కరించడం (ఔషధాలను వేయడం) గట్లను, పాదులను సిద్ధపరచడం విత్తనాల తట్టలను నింపడం. నారుపోయడం, నీరు పోయడం, విత్తు నాటడం, నారులను నాటడం.
3. నాటిన తర్వాత కృషి : (After-cultivation) మధ్య లేదా అంతర కృషి (Inter-cultivation) విత్తుట (నాటిన తర్వాత పెరుగుదలకు మధ్య, లేదా అంతరంలో జరిపెడి పనులు). పైరును వలుచు చేయడం (Thinning), ఖాళీలను పూరించడం (Filling gaps), గుల్ల పరచడం (Hoeing), కెలకడం (Harrowing and Hoeing), కోత కోయడం. మొక్కల వరుసలకు (సాలుకు) మట్టిని వేయడం (ఒత్తుగా ఉండేటట్లుగా) (Earthing up), పై ఎరువును వేయడం (Top dressing), ద్రవ ఎరువుని పోయడం - ఆకుల ద్వారా పోషకాల్ని చిలకరించి పోషకాలను అందివ్వడం - వల్ల పోషణ (Foliar feeding or spraying) మొక్కలకి ఎరువును వేసి, ఆధారాలను నాటి, మొక్కలను నిలపడం (Staking), పేరులను రాసి అంటించడం (Labelling).
4. మొక్కల్ని రక్షించడం (సస్య సంరక్షణ - Plant Protection) : కంచెలు వేయడం, గాలికి కొట్టుకు పోకుండా అడ్డు వేయడం లేదా గాలి దూరకుండా పొరదోలే ఏర్పాటు చేయడం, ఎండిపోకుండా నీరు గట్టడం. రోగాలు అంటుకుండా, పురుగులు పట్టుకుండా మట్టిని ఔషధాలతో జాగ్రత్తగా మొక్కల్ని - - - - - సంరక్షించే మట్టి క్రమాలను (Preventive or Prophylactic Measures) అనుసరించడం, ఎండి సంరక్షించడానికి చిలకరించడం (Spraying) దుమ్ముని జల్లడం (Dusting) ఎలుక, పక్షికాలను ఎదురించడానికి విషమిశ్రిత పదార్థాలను ఏర్పాటు చేయడం.

5. సమరిక చేయడం (Pruning - ఖండనం) మొక్కల్ని ఒక హద్దులో పెంచడానికి మొక్క వికసించేటట్టుగా (నిరోధించడం. చచ్చినా లేదా అధికమైన రెమ్మలను చిగురు, మొగ్గలను కత్తిరించి మొక్కల్ని సమవరచడం (ఖండించడం).

6. కోత : ఆకులు, గింజలు, పువ్వులు, కాయలు, వండ్లు కోయడం, దుంపలను గడ్డలని శ్రవ్య తీయడం.

7. మార్పు చేయడం : పాత మొక్కల్ని కొత్త కుండలలో, చోట్లలో నాటడం, అంటుగట్టడం, కొమ్మల్ని విత్తనాలను చేర్చిపెట్టడం, మొక్కల్ని రక్షించడం, గుణాలను కాపాడడం.

8. సస్యోత్పాదన : (Plant Propagation) తోటలోని మొక్కల్ని వృద్ధి చేయడం అంటే వేరు వేరు చేయడం, అంటు గట్టడం, కొమ్మల్ని నాటడం, మొలకలను వేరుగా నాటడం, పిలకల్ని వేరు చేయడం, విత్తనాలను తయారు చేయడం వీటిని కాపాడడం మొదలైనవి.

ఈ ఒక్కొక్క తోటపనిని సకాలంలో సామర్థ్యంతో సమర్థవంతంగా చేస్తే మన తోటమూలులు ఇతర దేశీయ తోటమూలులవలె, తోటపనులలో సమర్థవంతమైన ఫలాన్ని పొంది జయప్రదం కాగలుగుతారు. ఈ తోట పనులను సమర్థవంతంగా సాగించడానికి కావల్సిన కొన్ని సలహాలు ఈ క్రింద సూచించబడ్డాయి.


## 1. పూర్వ కృషి (మొక్కలు నాటడానికి పూర్వం చేపట్టే పనులు) :

దున్నడం : పెద్ద తోటలలోని మట్టిని శ్రవ్య చదును చేయడంకన్నా, దున్నడం యుక్తం. తక్కువ ఖర్చు, శ్రమ. శ్రవ్యకాలంతగా దున్నడం ఒప్పుగా ఉండకపోవచ్చు. కాని లాభం, మిత వ్యయాల దృష్టిలో పనివాళ్ల అభావం (పనివాళ్లు దొరకపోవడం) వల్ల పెద్ద తోటలలో దున్నడం అనివార్యమైన పని. సరియైన పదార్థాలను, మొక్కల్ని సరైన అదునులో పాతే, దున్నడం కూడా శ్రవ్యకమంతే ఒప్పు అవ్వడానికి సాధ్యమవుతుంది.


దున్నడం ఒక కళ. దానికి అభ్యాసం, అనుభవం కావాలి. నాగలిని ఉపయోగించే రీతిలోనే ఉపయోగించాలి. అంటే నాగలిని సరైన రీతిలో లేకుండా, గుట్టలపైనగానీ, వెనుకభాగం కానీ తోకలాగ, రాకుండా దున్నాలి. తగినట్టుగా దున్నడానికి ముందుగా పేరు (కరు) చక్కగా ఉండా, సమసిండా అని చూసుకోవాలి. సమసివుంటే (గట్టిపడుంటే) నాగలి మట్టిలో దిగదు. అదే విధంగా రెక్కలు శుభ్రంగా లేకపోతే మట్టి తిరగదు. నేలలను కొన్ని పాడవు బోదెలుగా విభజించవచ్చు. ఒక పట్టిని పడవలాగ వరుసచేసి బాకు దింపాలి. వక్కనున్న మట్టిని వరుసగా బయటకు వచ్చేటట్టు చేయాలి.

ఈ విధంగా చేస్తే, నేల మట్టం చెడదు (చిత్రం 6.1). నాగలిని నేరుగా నడిపించాలి. ఒకే సమయంలో, విస్తరణకు నడిపించాలి. అప్పుడు మట్టిగడ్డలు మిగలకుండా మట్టి అన్ని పొరలలోనూ గుల్లబారి, మట్టి చెల్లా చెదునై, మట్టి బాగా కలిసిపోతుంది. చెల్లా చెదారం, పొట్టు, కొమ్మలు, పుల్లలు మట్టిలో కల్పిపోయేటట్టుగా దున్నాలి. అయినంత వరకు మొక్కల్ని గిల్లకుండా, పాడవ్వకుండా తగిన క్రమంలో దున్నాలి.

6.1 నేలను ఇసుక నాగలితో దున్నేటప్పుడు కొన్ని కొండ్రలుగా విభజించి, ఒక్కొక్క భాగాన్ని వంపుగా దున్ను కొండ్రలు వేస్తూ పోవాలి. 1. తప్పి పోకుండా వరుస దున్నడం. 2. వంగిన వరుసలో (ఉచ్చిన చిత్రపు పటం) సాలు కుడి అంచునుంచి బయలుదేరి ఎడమ వైపు తిరుగుతూ మధ్యకు రావాలి. 1.2.3...చిత్రాలు.



6.1



6.2

చిన్న తోటలలో దున్నడానికి బదులుగా త్రవ్వడం చేయడం పరిపాటి. సామాన్యంగా తోట మట్టిని లోతుగానే త్రవ్వుతారు. దీనికి కొన్ని కారణాలున్నాయి. తోటలో పెంచే అనేక మొక్కల వేర్లు లోతుకు దిగగలిగినవి. ధాన్యాల వేరు వలె పై పొరలలోనే బొంతలాగ వేర్లు పెరిగిడివికావు. అందుచేత తోటలో మొక్కల్ని లోతులో వేరు వ్యాపించడానికి మట్టిని లోతుగా కదల్చాలి. రెండవది అనేక తోట మొక్కలు పొలాల్లో పెరిగే వాటికన్నా ఎక్కువకాలం ఉండేవి. దీనికి మట్టి పై పొరలలో ఉన్న సస్య పోషకాలు చాలవు. లోతులోనున్న పొరల సస్య పోషకాలూ వీటికి లభించేటట్లు చేయాలి. ఈ పొరలోని పోషకాలు సస్యాలకు అందివ్వడానికి, వాటికి, ఎండ, గాలి, వర్షాల సంపర్కం కావాలి. అందుచేత, ఈ పొరలను దున్నడం లేదా త్రవ్వడం ద్వారా పైకి తెచ్చి, పైనన్న మొక్కలకి అందేటట్లుగా దీన్ని ప్రకృతి శక్తులకు అతీతంగా తేవాలి. అంటే లోతుగా త్రవ్వి మట్టిని బాగా కలపాలి. మూడోది తోట పెంపకానికి, అందులోనూ దుంపలకు, గడ్డలకు, గెణుసులకు (క్రుళ్ళేటటువంటివి), త్రవ్వి, నీటిని బాగా చల్లాలి. లోతుగా త్రవ్వడంచేత మట్టి క్రింది పొరలు సడలి, వాటి ద్వారా నీళ్ళు బాగా ఇంకిపోతాయి. నాలుగవది - తోట పెంపకాలు వదులై పొవుగా పెరగాలంటే, వాటికి నీరు ఎక్కువగా కావాలి. ఈ నీటికోసం వాటి వేర్లు నీటిని వెదుకుతూ లోతుకు దిగుతాయి. దీనికి కారణం లోతులోనున్న పొరల తేమ పై పొరల తేమవలె త్వరగా ఆరిపోదు. తోట మట్టిని పై పైకి త్రవ్వి, మొక్కలు పెడతే, వేర్లు పై పొరలలో పెరిగి వ్యాప్తి చెందుతాయి. ఈ వేర్లకు కావల్సినంత నీరు లభించక, మొలక సోలిపోవల్సి వస్తుంది. అదే లోతుగా పాతుకొని విస్తరించడం చేత ఈ రకపు నీటి ఎద్దడికి మొక్కల పొల్పడపు. మొక్కల వికాసం కుంటువడదు. ఐదవది : క్యారెట్టు మొదలైన మొక్కలు మట్టిని లోతుగా త్రవ్వకుండా ఉంటే అప్పుడు ఈ గడ్డలు క్రింద భాగాన చీలికలు చీలి గడ్డల (దుంపల) రూపం చెడి వాటికున్న గిరాకీ తగ్గుతుంది. ఈ కారణాలచేత, తోటమాలి తోట మట్టిని లోతుకు త్రవ్వ సంప్రదాయాన్ని పెట్టుకొని ఉన్నాడు.

ఈ లోతు గుంట త్రవ్వడాన్ని పెద్ద గుంటని (అగడ్డ) న్యవహరిస్తారు. పెద్ద అగడ్డలలో ముఖ్యంగా రెండు క్రమాలున్నవి. మొదటిది (Trenching) కందకం లేదా అగడ్డని త్రవ్వి అగడ్డ చేయడం - రెండోది సాదా అగడ్డ (Simple digging).

**తోట అగడ్డల క్రమం : (చిత్రం 6.2)**

6.2 తోట అగడ్డ క్రమం (Trenching) మట్టిలో ముఖ్యంగా మూడు పొరలు. 1. సారవంతమైన పై మట్టి. 2. సారవంతం కాని క్రింది మట్టి. 3. మట్టి క్రింది భాగపు పొర. తోటలో గుంతలను త్రవ్వేటప్పుడు పై మట్టి పైనే, క్రింద మట్టి క్రిందే ఉంటుంది. కాని కలపాలి (తిప్పాలి). మట్టి క్రింది భాగాన్ని కదల్చాలి. దీనికోసం ఈ క్రమం యుక్తమైనది. 1) 60 సెం.మీ. లోతున్న పై మట్టిని దున్ని, పటపు (చిత్రపు) చినరకు సాగించి. 2) అర్థ కందకపు క్రింది మట్టి పొరను దున్ని లాగి, 3) మట్టి క్రింది భాగాన్ని సడలించి (కదల్చి) 4) B క్రింది భాగపు మట్టిని త్రిప్పి (కలిపి) A పైన నింపి 5) Cని సడలించి (కదల్చి) 6. Dలో నున్న పై మట్టిని త్రవ్వి, కలిపి B పైన వేసి, E క్రింది మట్టిని త్రవ్వి కలిపి, C పైన వేసి, ఇదే విధంగా తర్వాత వరుస కూడా చేయాలి. (ఇదే విధంగా ముందువరస).

1. 60 సెం.మీ. వెడల్పుగ గునవంతో లోతుగా కందకం లేదా గుంట త్రవ్వడం, తోడిన మట్టిని వేరే చోట వేయాలి. 2. ఈ కందకపు అర్థ భాగంలో, మరొక గునవం అంత లోతుకి మట్టిని తోడి దీన్ని జెరడు

మట్టితో కలపకుండా ప్రత్యేకంగా గుట్ట చేయాలి. 3. ఈ కందకపు క్రింది భాగాన్ని త్రిప్పుకుండా, కలపకుండా సడలించాలి. 4. ఈ విధంగా కదిపిన అర్థ కందకానికి వక్కనున్న అర్థ కందకపు క్రింది భాగపు మట్టిని త్రవ్వి, వేరే మట్టితో నింపాలి. 5. ఇప్పుడు ఖాళీ అయిన, ఈ అర్థ కందకపు క్రింది భాగాన్ని తీయకుండా, కలపకుండా, సడలించాలి. 6. ఇప్పుడు రెండవ కందకాన్ని తోడాలి. ఒక గునవపు లోతుకు రెండవ కందకాన్ని తోడి, ఈ మట్టిని మొదటి కందకంపై ఆ మొదటి అర్థ భాగంపైన కలిపి లాగాలి. 7. ఇంకొక గునవపు లోతుకు రెండవ కందకాన్ని తోడి మొదటి కందకపు రెండవ అర్థ భాగాన్ని నింపాలి. 8. అదే విధంగా త్రవ్వుతూ, నింపుతూ, తర్వాత వరుసలు నింపాలి. ఈ క్రమం చదవడానికి, కొద్దిగా స్త్రీప్రంగా ఉండొచ్చు. చిత్రం 6.2 ద్వారా ఈ క్రమం స్పష్టమవుతుంది. 1, 2, 3..... ఇవి కందకాలు. మొదటిది, రెండోది ఇత్యాదిగా A, B, C, D, E, F,.....ఇవి మట్టి క్రింది భాగాలు. క్రింది భాగపు మట్టి, పై మట్టి (ఒక గునవపు లోతు) మట్టి పొరలు, 1వ చిత్రపు భాగంలో మొదటి కందకం తోడినప్పుడు నేల ఏ విధంగా ఉంటుందో చూపబడిన చిత్రం. 2వ భాగంలో రెండవ కందకపు మట్టి ఎక్కడ వేయాలనేది సూచించబడింది. 3వ భాగంలో మూడవ కందకపు మట్టిని ఎక్కెడెక్కడ వేయాలనేది సూచిస్తుంది. 4వ చిత్రంలో మొదటి కందకపు మట్టిని ఏ విధంగా వేయాలి అనేది సూచిస్తోంది. 5, 6 పొరలు ఏ విధంగా ఎదురు బొదురుగా పెట్టాలనేది సూచించే చిత్రాలు.



ఈ పెద్ద అగడ్తలో పై మట్టి పైనే, క్రింది మట్టి క్రిందే ఉంటుంది. కాని స్థలం మాత్రం మారుతుంది. ఈ విధంగా మారేటప్పుడు మట్టి సడలడమే కాకుండా, పొడిగా అవుతుంది. చెత్త చెదారాలు మూసుకుపోతాయి. మట్టి కొద్దిగా కలగాపులగం (మార్పు చెందుతుంది) అవుతుంది. మట్టి క్రింది భాగం వదులై నిల్లు ఇంకాడానికి వేళ్లు క్రిందకు దిగడానికి అనుకూలమవుతుంది.

పెద్ద అగడ్తలను చేసేటప్పుడు వశువాది ప్రాణుల ఎరువును లేదా కంపోస్టును పై పొర జతలో కలపాలి. ఈ పెద్ద అగడ్త మార్గి కాలక్రమేణ దానిపైన వేసిన మట్టి పొడి చేయడానికి బదులు, గుట్టలు గుట్టలుగానే ఎండడానికి వదలవచ్చు.



సూచన - మట్టి తడిగా ఉన్నప్పుడు పెద్ద అగడ్త చేయరాదు. ఆ విధంగా చేస్తే, మట్టి బురద అవుతుంది. మట్టి కణాల విన్యాసం చెడుతుంది (నాశనమవుతుంది).

సాధారణ అగడ్త : లేదా చిన్న అగడ్త (Simple digging) సామాన్యంగా పెద్ద అగడ్తలను రెండూ, మూడు సంవత్సరానికి ఒకసారి తీస్తూ చేస్తుంటారు. ఈ అగడ్తలకు ఎక్కువ ఖర్చు, శ్రమ. అంతేకాకుండా ప్రతియొక్క మొక్కకు, ప్రతియొక్క సారి, పెద్ద అగడ్తలు అవసరం లేదు. అనేక మొక్కలకి చిన్న లేదా సాధారణ అగడ్త - సుమారు 25 సెం.మీ. లోతు అగడ్త చాలు. ఈ అగడ్తల క్రమం ఈ క్రింది విధంగా ఉంటుంది. (చిత్రం 6.3).

6.3 సాధారణ లేదా చిన్న అగడ్త : సన్నికల్లు, (సనికలరాయి) అంత లోతుకు 60 సెం.మీ. లోతుకు (గుండ్రాయంత లోతుకు) త్రవ్వి మట్టిని ఒకవైపు గుట్టగా వేసి, వక్కనున్న పై మట్టిని త్రవ్వి కలిపి లాగి కందకాన్ని (గుంటని) నింపి, ఒక కందకపు నిండి వుంటే మరొక కందకం ఏర్పడుతుంది. ఈ విధంగా నింపుతూ త్రిప్పుతూ కలుపుతూ మును ముందు (తర్వాతి) వరుసలను మట్టితో నింపాలి.



6.3




6.4



1

2



3

4

6.5

**సాధారణ బోదులు చేయు విధానం :**

1. 25సెం.మీ. వెడల్పు 60 సెం.మీ. లోతుకు ఒక కందకాన్ని తోడి, ఈ మట్టిని పట్టెపై వైపున వేయాలి.
2. ఈ కందకపు క్రింద భాగాన్ని కొద్దిగా సడలించడం లేదా కెలకడం (కదల్చడం).
3. కందకపు ముందు భాగాన్ని త్రవ్వి, మొదటి కందకాన్ని నింపాలి.
4. రెండవ కందకాన్ని మూడవ కందకపు మట్టితో, మూడవ కందకానికి నాల్గవ కందకపు మట్టితో ఈ విధంగా కందకాన్ని లోడుతూ వెనుకటి కందకాన్ని నింపుతూ రావాలి.
5. చివరి కందకానికి మొదటి కందకపు మట్టిని తెచ్చి నింపాలి.

సాధారణ అగడ్తలను గునవ సాధనం లేదా ఫోర్కు లేదా స్పేడ్ (పార, మమ్మటి)లతో చేయవచ్చు. ఈ విధంగా కందకాల్ని నింపేటప్పుడు, అకులను, అలముల్ని, కొమ్మల్ని, పుల్లల్ని ఏరి, మట్టిని శుభ్రపరచాలి. అగడ్త వేసే కాలంలో గుట్ట ఎరువును మట్టిలో వేల్చవచ్చు. దీనికోసం ఎరువును నేలపైన వేసి, ఆ తర్వాత అగడ్తని చేయాలి. అప్పుడు ఎరువు మట్టి క్రింద వేరు వ్యాపించే పారలకు వేరుతుంది.

పెద్ద అగడ్తకు, చిన్న అగడ్తకూ మధ్యస్థమైన ఒక క్రమముంది. దీన్ని మధ్యస్థ అగడ్తని, రెండో అగడ్తని అనవచ్చు (Double digging or bastard trenching). ఇది పెద్ద అగడ్త అంత శ్రమతో కూడినది కాదు. చిన్న అగడ్తంత సులభమైనది కాదు. ఈ అగడ్తల క్రమం ఈ క్రింది విధంగా ఉంటుంది. (చిత్రాలు 6.4, 6.5).

6.4 మధ్యస్థ అగడ్త చిత్ర రూపం.

6.5 మధ్యస్థ అగడ్త (Mock Trenching, Bastard Trenching, Double digging).

1. అగడ్త పై మట్టిని తీసి, కందకం తోడి, 2. క్రింది మట్టి "A" సడలించి, (వదులు వేసి), 3. "B" పై మట్టిని త్రవ్వి కలిపి (త్రప్పి) "A" పైన వేసి 4. "D"ని త్రవ్వి, కదిపి (త్రప్పి) "C" పైన వేళ్ళి, అదే విధంగా తర్వాతి వరుసలు చేయాలి.

**మధ్యస్థ బోదులు చేయు విధానము :**

1. చిన్న అగడ్త వలె సుమారు 20 సెం.మీ. లోతుకు, 60 సెం.మీ. వెడల్పుగా ఒక కందకాన్ని తోడి దీని మట్టిని పట్టె యొక్క పై భాగాలలో వేయాలి.
2. ఈ కందకపు క్రింది భాగాన్ని 25 సెం.మీ. లోతుకు సడలించాలి (కదల్చాలి) కాని మట్టిని తీయకూడదు ఉన్నచోటే వదిలేయాలి.
3. మొదటి కందకపు ముందరి భాగాన్ని 20 సెం.మీ. త్రవ్వి, ఈ కందకాన్ని రెండవ కందకపు మట్టిని తోడి దీనితో నింపాలి.
4. రెండవ కందకపు క్రింది భాగాన్ని 25 సెం.మీ. లోతుకు సడలించాలి (కదల్చాలి).

5. మూడవ కండకాన్ని తోడి రెండవ కండకాన్ని నింపాలి. మూడవ కండకపు క్రింది భాగాన్ని 25 సెం.మీ. రోతుకు సడలించి, నాల్గవ కండకాన్ని నింపాలి. ఇదేవిధంగా ఒక అగడ్తని మూస్తూ, మరొక అగడ్తని సడలిస్తూ కండక మట్టిని నింపాలి.

ఈ మధ్యస్థ అగడ్తను చేస్తే, పెద్ద అగడ్తను 3-4 సంవత్సరాలకోసారి చేస్తే చాలు.

**పెంటుని సరి చేయడం (పెంటుని శుభ్రపరచడం)**

దున్నడం లేదా అగడ్తలు త్రవ్విన తర్వాత రెండోపని పెంటుని శుభ్రపరచడం. మూగి మ్రుగ్గిన లేదా అగడ్తలో తోడిన పెంటు, విత్తునాటే కాలానికి ఎండకు ఎండి, వర్షంలో తడిసి, గాలికి క్రుల్లి శిథిలం అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని సులభంగా వగలగొట్టవచ్చు. పెద్ద తోటలలో కల్టేవేటర్ ద్వారా పెద్ద గుట్టని పొడి, పొడి చేయవచ్చు.

**మట్టిని చదును చేయడం (మట్టిని గట్టి పరచడం - Consolidation) (మంచి మట్టిని ఒకటిగా చేయడం)**

మ్రుగ్గిన లేదా త్రవ్విన మట్టి సడలుతుంది (వదులు అవుతుంది). మట్టి కణాల మధ్య డొడ్లగా చెత్త చెదారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇటువంటి మట్టిలో విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి కావల్సినంత జలాంశం లభించదు. అంతేకాకుండా ఈ డొడ్లలో (గుల్లలో) గాలి బాగా దూరడం చేత, ఉన్న కొద్దో, గోస్తో జలాంశం త్వరగా ఇంకిపోతుంది. అందుచేత మొలకలు సమద్దవంతంగా పెరగడానికి, వదులు చేసిన మట్టిని, విత్తనాలకు తేమ అంటుకొనేటట్టు కొద్దిగా చదును చేయాలి (మట్టిని అదమాలి).

మట్టిని చదును చేయడానికి రాళ్ల దొడ్లి (Stone roller) లేదా చెక్కుల రోలరునో బరువైన పలకనో మట్టిపైన దొడ్లించాలి (Rolling). పలక ఎక్కువ బరువు లేకుండా ఉండటం చేత దానిపైన ఎక్కి నిలబడి, దొడ్లిస్తూ ఉంటారు.

చిన్న తోటలలో దొడ్ల పలకలను కట్టడానికి వీలుకాదు. అటువంటి చోట్ల నేలను మృదువుగా త్రొక్కి మట్టిని గట్టి పరచాలి.


**మట్టిని పారతో గోకడం (Harrowing) (మట్టిని వదులు చేయడం)**

మట్టిని గట్టి పరచిన తర్వాత విత్తనం నాటడానికి సిద్ధపరచడానికి మట్టిపై పారను  $1\frac{1}{2}$  -  $2\frac{1}{4}$  సెం.మీ. మట్టిని మృదువుగా పార కదిలించి వదులు చేయాలి. ఈ పనిని పెద్ద తోటలలో పారతో నేలను గుల్ల వరచాలి. చిన్న తోటలలో చిన్న పారలతోను లేదా దువ్వే కర్ర (రేకు - Rake) (చిత్రం 5.24 చూడండి)తో గోకవచ్చు. ఈ విధంగా చేస్తే, గుట్టని లాగడానికి, విత్తనాలు వరుసలో వేయడానికి వరుసలు వేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. దువ్వే కర్ర మట్టిని గోకడానికి మాత్రమేకాదు, వెనుకకు, ముందుకీ మట్టు ప్రక్కలకు మట్టిని కదిలించి మట్టి గుల్లలను చదును చేయడానికి పనికి వస్తుంది..


**బోదులను వేయడం (Forming Bunds) :**

పెద్ద తోటలలో నేలను బోదులుగా విభజిస్తారు. ఈ విధంగా విభజించడానికి పెద్ద సాులు తీయవలసి వస్తుంది. ఈ విధంగా బోదులు చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క పట్టిని చదును చేయడం సులభమవుతుంది. ఇటువంటి





6.7



6.6

తోటలలో బోదులు చేయడానికి యంత్రం (Bund former) వాడతే వనులు త్వరగా అవుతాయి. ఈ యంత్రంలో రెండు ఉక్కు తగడులతో చేసిన రెక్కలు ఉంటాయి. (చిత్రం 6.6) ఈ రెక్కలను దిండుకు ఏటవాలుగా పెడతారు. దీన్ని నడపినప్పుడు (త్రోసినప్పుడు) రెక్క నోరు మట్టిని లేపి చిన్నదైన రెక్క తోక ద్వారా త్రోస్తుంది. అప్పుడు మట్టి అణిగి గట్టు లేస్తుంది.

6.6 గట్టు నెత్తే ఉపకరణం (యంత్రం).

రెండు బోదెలను ప్రక్క ప్రక్కన లేపితే (త్రోస్తే) మధ్యలో నాలుగా (పడవ వలె) నీటి కాలువ అవుతుంది. (చిత్రం 6.7) కొన్ని మొక్కల్ని బోదెల పైన (పుంజ) పెట్టాల్సి వస్తుంది. అటువంటి బోదులను ఈ సాలుల నుంచి సులభంగా రూపొందించుకోవచ్చు.

6.7 రెండు బోదులను (పుంజలను), నాగలితో ప్రక్క ప్రక్కన లేపితే మధ్య నీటి కాలువ (దొన్న వరసలు లేదా సాలు వరుసలు) ఏర్పడుతాయి.

చిన్న తోటలలో బోదులు తీయడానికి దండు కర్రలను లేదా దువ్వే మమ్ముటీని (డ్రాహూ - Draw hoe) (చిత్రం 5.25 - B) చేతి సామానులను ఉపయోగిస్తారు. ఈ విధంగా చేయడానికి ఈ పనిమ్ముట్లని ఏటవాలుగా పట్టుకోవాలి (చిత్రం 6.8).

6.8 డ్రాహూతో మట్టిని లాగి దిండును ఎత్తడం.

బోదె ఎత్తడం (బోదె కట్టడం - Ridging) లేదా గట్టు కట్టడం

చెరుకు మొదలైన ఎన్నో మొక్కల్ని గట్టులలో నాటాల్సి వస్తుంది. పెద్ద తోటలలో ఈ రకపు గట్టులను కట్టడానికి రిడ్జర్ (Ridger) అనే రెండు రెక్కలున్న నాగలిని ఉపయోగిస్తారు. ఈ నాగలి త్రోసినప్పుడు మట్టి రెండు ప్రక్కలలోను వడుతుంది. ఈ నాగలి పొర దగ్గరే మరొక సాలును చేస్తే ఆ మట్టి మొదటి పొర మట్టిలో చేరి గట్టుగా అవుతుంది. గట్టులలో మొలకల్ని నాటి కాలువలలో నీరు నింపడానికానికి వీలవుతుంది. (చిత్రం - 6.9) మొక్కల అంతరం ఎక్కువగా ఉంటే రిడ్జర్ తో గట్టు కట్టడం కష్టం. అప్పుడు బదులుగా నాగలి ఉపయోగించి గట్టుని ఏర్పాటు చేస్తారు. రిడ్జర్ లేకుండా ఇనువ నాగలితో గట్టుని కట్టవచ్చు. ఈ విధంగా చేయడానికి నాగలిని ఉపయోగించి బోదులను తీయాలి. పునా పై నుంచి క్రింద భాగం వరకు అదే బోదెలో నాగలి మెసుకకు త్రిప్పాలి. అప్పుడు బోదెల రెండు వైపులను మట్టి వడుతుంది. ఈ బోదెల సమీపంలోనే మరొక బోదెను ఇదే రీతిలో రెండుసార్లు నాగలిని (త్రోలి) ఉపయోగిస్తే రెండు సాలుల మధ్య గట్టు ఏర్పడుతుంది. చిన్న తోటలలో, పెరటి తోటలలో, గట్టును కట్టడానికి, గునపం, పొర, లేదా మమ్ముటీని ఏటవాలుగా పెట్టి ఉపయోగించవలసి వస్తుంది.

పిత్తుట, నాటుట


పిత్తుట : పిత్తనాలు బాగా మొలకెత్తడానికి ముఖ్యంగా నాలుగు అనుకూల పరిస్థితులుండాలి. 1. చికటి, 2. తేమ, 3. వేడి, 4. గాలి.



6.8



6.9



6.10

అనేక రకాల విత్తనాలు వెలుతురులో మొలకెత్తవు. మొలకెత్తడానికి కావల్సినంత చీకటి కావాలి. ఈ కారణం వల్ల వేలితో విత్తనాలను పూడ్చడం లేదా మట్టితో చిక్కుడు విత్తనాలు మూయడం - కొన్ని చోట్ల వరిని విత్తనాలకోసం మొలకెత్తిన వాటిని కోయకుండా వదలడం, మనం చూస్తూనే ఉంటాం. విత్తనాలను తడిసి, తడిసిన విత్తనాలను, చీకటి ప్రదేశంలో వేసి దానిపైన గోనెసంచిన మూస్తారు. ఈ విధంగా చేస్తే విత్తనాల మొక్కకు కావల్సిన చీకటి లభిస్తుంది.

విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి తేమకావాలి. ఈ తేమని, విత్తనాలు మట్టి కణాల ద్వారా పొందుతాయి. ఈ విధంగా పొందడానికి విత్తనాలకీ, మట్టి కణాలకూ దగ్గర సంబంధాన్ని ఏర్పరచాలి. ఈ రకపు సంపర్కాన్ని ఏర్పరచడానికి మట్టిని పాడివేసి, విత్తనాలు చల్లిన తర్వాత బల్ల కొట్టి మట్టిని చదును చేస్తారు.

విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి కావల్సినంత వేడి కావాలి. ఈ వేడి (ఎండ) మట్టిలో చాలినంతగా లభించక పోవటం చేతనే చలికాలంలో విత్తనాలు నాటరు. మన దేశంలో వైశాఖలో (వైశాఖ - జ్యేష్ఠ) కొయ్యడానికి (కోతకి) వచ్చే పంటకు సంక్రాంతి - జనవరి 14వ తేదీన గడిచిన తర్వాత విత్తునాటాలి. నవంబర్ - డిశంబర్ లెల్లో మట్టిలో మొలకలకు కావల్సిన వేడిమి ఉండదు. సంక్రాంతి సమయానికి మట్టిలో ఉష్ణం క్రమేణా ఎక్కువ అవుతూ ప్రారంభమవుతుంది.

కొన్ని రకాల మొక్కలకి అవి పెరగడానికి, ఫలించడానికి కావల్సినంత కాలావకాకాన్ని లభించేటట్టు చేయడానికి వాటి విత్తనాలను చలికాలంలోనే నాటి, నారు తీయవలసి వుంటుంది. ఈ విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి కావల్సిన వేడిని (ఎండని) అందించడానికి ఆ మొలకల పాదులలో గుజ్జుపు లద్దినీ వేసి, మూస్తారు. వెనుక తెలిపినట్టుగా గుజ్జుపు లద్దీ ఎక్కువ వేడిని కలిగుంటుంది. వీటి లావం (వేడి) పాదులద్వారా మట్టికి ఎక్కువతుంది. మట్టి వేడిబడుతుంది. మొలకెత్తే విత్తనాలకు కావల్సిన వేడిని అందిస్తుంది. ఇటువంటి ఒట్టు పాదులను, లావపు పాతి, వేడిమి పాతి (Hot bed), ఎండ పాదులు, వెచ్చటి ఒట్టు (పాదు) అని వ్యవహరిస్తారు. అలంకారపు మొక్కల కుండీలలో వేరు మొలకెత్తిన జేయడానికి కూడ ఇటువంటి లావపాదులను లేదా గుడారాలను పాదులారు. (చిత్రం 6.10) పాశ్చాత్య దేశాలలో ఇటీవల లాపానిచ్చే P.V.C. మూసిన కేబులును (తీగ) మట్టిలో క్రింది భాగాన్ని పాతు తారు. దీని ద్వారా విద్యుచ్ఛక్తి ప్రసరించినప్పుడు మట్టికి వేడి ఎక్కువతుంది. దీన్ని సాయక వార్మింగ్ కేబుల్ (Soil Warming Cables) అని అంటారు.

6.9 నాగలితో బోదెలను చేయడం.

విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి కావల్సిన గాలి (ప్రాణవాయువు) కావాలి. విత్తనాలు సజీవాలు. శ్వాసిం చే పదార్థం - అందులోనూ మొలకెత్తేటప్పుడు ఎక్కువగా శ్వాసిం చే (ఊపిరాడే) పదార్థం. అందుచేత, ఈ విధంగా శ్వాసింపడానికి మట్టిలో చాలినంత గాలి ఉండాలి. గట్టినేలను వదులుచేసి (దున్ని) లేదా త్రవ్వ సులభంగా మట్టి కణాల మధ్య వాయువు దూరేటట్టుగా చేయడం.

6.10 వేడి పాదు 1. గాజు మూత, 2. మట్టి, 3. గుజ్జుపు లద్దీ (ఎరుపు).

ఈ నాలుగు అనుకూలాలు విత్తనాలు నాటే బీజ క్షేత్రంలో (Seed bed) లేకపోతే, మొలకలు నాశనమవుతాయి. పూర్వ కృషి యొక్క ఉద్దేశ్యం మట్టిలో ఈ రకపు అనుకూలాలను కల్పించడం. విత్తనాలు

ఎంత రోతుకు విత్తికే ఈ అనుకూలాల విత్తనాలకు లభిస్తాయి. సామాన్యంగా విత్తనాలు నాటి రోతు ఆ విత్తనపు మందానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. బీజపు గాత్రం ఎంత ఉందో, దానిపై మూసిన మట్టి పొర లావు (మందం) అంతే ఉండాలి అనేది విత్తనాలను నాటడంలో ఉంటే సామాన్య నియమము. అందుచేత, ఆవాలు, గొర్రులు వంటి, పెటూనియ (Petunia) పోర్టులక (Portulaca) పాపి (Poppy) మొదలైన సూక్ష్మ విత్తనాలను పొరదానికి బదులుగా చల్లి అడుగు మట్టి నుంచే, శుభ్రమైన మట్టితో మూయాలి.

కొన్ని మొక్కల్ని ఈ నియమానికి వ్యతిరేకంగా రోతుగా పాలాలి. ఉదా : గోరు చిక్కడు, డబల్ బీన్సు మొదలైన వాటిని 7½ సెం.మీ. రోతుకు, బఠాణి, తోట కందులు ఇత్యాదులను 2¼ - 5 సెం.మీ. రోతుకు పాలాలి. ఎందుకంటే ఈ రకపు విత్తనాలు మొలకెత్తేటప్పుడు మట్టిని పైకి త్రోస్తాయి. కొన్ని కాయగూర విత్తనాలను ఎంత రోతుగా పాలాలనే విషయం ఈ క్రింది పట్టికలో సూచించ బడింది.

½ సెం.మీ. లేదా దానికన్నా తక్కువ - ముల్లంగి, టర్నిప్.

సుమారు 1 సెం.మీ. - క్యాబేజి, క్యారెట్టు, లీకు, లెట్యూసు, ఉల్లిపాయలు.

సుమారు 2¼ సెం.మీ. - బీబీరూట్, స్పెనాచ్.

సుమారు 5 సెం.మీ. - బఠాణి, తోట కందులు ఇత్యాదివి.

సుమారు 6-8 సెం.మీ. - గోరు చిక్కడు, కొన్ని రకాల బఠాణీలు (అలస్యంగా పెరిగేది).

ఏ విత్తనాలను ఎంత రోతులో నాటాలనే విషయం మొలకలను పెంచే వద్దతిని గురించి వివరించేటప్పుడు తెలుప బడుతుంది. విత్తనాలను నాటడంలో (విత్తడంలో) నాల్గు క్రమాలు ఉన్నాయి. 1. చల్లడం (చల్లుట - Broadcasting) 2. వరుసలలో (సాలులో), చల్లడం - సాలు చల్లిక - వరుస చల్లిక, 3. వరుసలలో విత్తనాలను పెట్టి నాటడం లేదా. పాతే విత్తు (Dibbling) 4. మట్టి కుప్పలలో విత్తడం (విత్తనాన్ని కూల్చడం) - కూల్చే విత్తు (Drilling or drill sowing).

1. చల్లుట : విత్తనాలను పిడికిడిలో తీసుకొని చూపుడు వేలు, బొటను వ్రేలు మధ్య దోగ్గిస్తూ తేలికగా పలుచగా వడేటట్లు చల్లాలి. ఈ క్రమాన్ని తోటలలో ఎక్కువగా అనుసరించరు. వచ్చి ఎరువు విత్తనాలను, చిన్న మడులలో ఆకు విత్తనాలను, ఈ రీతిలో చల్లుతారు.

2. సాలు చల్లిక : నాగలి లేదా చేతి గరిటతో సాలులో (వరుసలో) విత్తనాలను చల్లవచ్చు. చిన్న ప్లాటలో మొనడేలిన వట్టిగా చేసి (సన్నని గట్టు చేసి) చల్లాలి. ఈ విధంగా విత్తిన (విత్తు నాటిన) పైరును ముందు పీకి, పలువ చేయాలి (వదులు చేయాలి). సామాన్యంగా కూరగాయలు, పువ్వుల విత్తనాలు ఎక్కువ వెల, అందుచేత ఈ విధంగా విత్తు చల్లి, పీకి, నిలువ చేసి, కొద్దిగా పలువ చేయడం యుక్తం.

3. నాటే విత్తు : విత్తనాల వరుసలలోనో, గట్టులలోనో సరియైన దూరానికి ఒకటి లేదా రెండు, మూడు విత్తనాలను నాటి, విత్తడం. ఈ క్రమంలో ఎక్కువ విత్తనాలు కావల్సి రావు, పీకి, దావాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక మొక్కకీ, మరొక మొక్కకూ కావల్సిన (ఉండాల్సి) అంతరం ఉండటం చేత, పైరంతటికీ నీళ్లు, పోషకాలు, వెలుతురు, గాలి లభించి, మొలకలు సాంపుగా, సాగసుగా పెరిగే అవకాశముంది. విత్తనాలను చేతితో పాతడం

చేత ఒకే సమయేన లోతులో విత్తును నాటవచ్చు. అందుచేత మొలకలు నాశనమవువు. వరుసలో ఖాళీలుండవు. పాతేటప్పుడు, పాత, నశించిన, క్రుచ్చిన, రోగపూరితమైనవాటిని ఏరి పారేయటకు సాధ్యమవుతుంది. ఈ కారణాల చేత చిన్న తోటలకు ఈ నాటి (వేసే) విత్తన క్రమమే ఉత్తమం, అనుకూలమైన పద్ధతి.

4. కూరే పద్ధతిలో విత్తనాలు నాటడం - విత్తుకూరే పద్ధతి - పెద్ద తోటలలో విత్తనాలను కూరి చల్లే పద్ధతి యుక్తం. విత్తు వేసే పద్ధతి ఎక్కువ శ్రమం - నిదానం. చిన్న తోటలకూ ఒప్పైన (సరిపడే) చేతికూరే (Hand drills) పద్ధతిని పాశ్చాత్య దేశాలలో ఉపయోగిస్తున్నారు. (చిత్రం 5.28) మనలో ఇప్పుడు అరుదుగా అనుసరిస్తున్నారు.

కూరే పద్ధతిలో మట్టిలో కూరిన తర్వాత పైరును వలచు/తేలిక పరచవలసిన అవశ్యకత ఉంది. చిన్న తోటలలో చిన్న పాదులలో వరుస విత్తులు చల్లడం దాని క్రింద తెలిపిన రీతిలో చేయడం మంచిది. (చిత్రం 6.11) కొలబద్దతో వరుసలు (సాలులు) ఎంత దూరంలో.

6.11 డ్రాహోతో విత్తును నాటడానికి సాలు (వరుస) చేయడం.

హందాలో రెండు వైపుల గుర్తు పెట్టుకొని గుర్తుకోసం వెదురు కడ్డీలను నాటడం, ఆ తర్వాత ఎదురు బదురు కడ్డీలకు తోట దారం (Garden line) కట్టాలి. చూపైన కర్రతో లేదా కర్ర ముక్కతో విత్తనాలకు నూక్తమైన (యుక్తమైన) లోతుకు వరుసలను చేయాలి. వరుసలను ఒకేసారి చేయడానికి బదులు కొద్ది కొద్ది దూరానికి ముందుకు వెనుకకు చేయడం మంచిది. ఈ విధంగా చేసిన వరుసలు కొద్దిగా వెడల్పుగా ఉండటం చేత విత్తనాలు సరిగా కూర్చుడానికి అనుకూలమవుతుంది. మొనదేలిన కడ్డీ సాలులు కొసిన జాతి విత్తనాలకు ఇతర రకాల చిన్న విత్తనాలకు సరైనది. లావు విత్తనాలకు మొనదేలిన కర్ర బదులు మొండీకర్రలలో వరుసలను తీయడం మంచిది. విత్తనాలు నాటిన తర్వాత లేదా చల్లిన తర్వాత ప్రక్కనున్న వరుసలలోని మట్టితో అద్ది విత్తనాలను మూయాలి.

విత్తనాలను మంచి అడుసులో చాలినంత, తేమలో (తడిలో) నాటాలి. ఎక్కువ తేమ ఉంటే విత్తనాలు క్రుచ్చిపోతాయి. తక్కువ తేమ ఉంటే చాలినంత జలాంశం లభించక మొలక మొలకెత్తదు. కాలికి, లేదా కర్రలకు మట్టి అంటుకుంటే ఎక్కువ తేమ ఉందని గ్రహించాలి. బంక మట్టిలో విత్తనాటడానికి తగిన వదును లభించడం కష్టం. అందుచేత ఈ మట్టి రకాల గురించి ఎక్కువ జాగ్రత్తలను వహించాలి.

వరుసలను ఎంత దూరంలో ఉండేటట్టు చేయాలన్నది కొద్దిగా స్థిరమైన విషయం. చాలా దూరంగా ఉంటే, వేల వర్షం అవుతుంది. ప్రక్కనే ఉంటే, మొక్కలకు కావల్సినంత (చాలినంత) నీరు, గాలి, వెలుతురు, పోషకాలు లభించక ఇబ్బందవుతుంది. మంచి ఫలితాన్ని పొందడానికి మొలకలు నాటే వేలలో నిండుగా ఉండాలి. మొక్కలు ఒత్తుగా ఉండాలి. అయితే ఒకదానితోనొకటి తాకకుండా (తగలకుండా) ఉండాలి. మొక్క మట్టు ప్రక్కలకు 30 సెం.మీ. పెరుగుతుంది అనుకుంటే, అప్పుడు వరుస యొక్క అంతరం 60 సెం.మీ. ఉంటే చాలు. వరుస మధ్య అంతరం పెరిగే మొలకలకు అనుగుణంగా మట్టి ఫలానికి అనుకూలంగా ఉండాలి. ఫలవంతమయ్యే మట్టిలో మొక్కలు వ్యాప్తి చెంది, సాంపుగా, మనోహరంగా వ్యాపించి పెరగడం చేత ఇటువంటి వరుసల మధ్యాంతరం కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండాలి. సారంలేని మట్టిలో వరుసలు కొద్దిగా దగ్గర దగ్గరగా ఉండాలి.

చేతితో అడించి కెలకడానికి, చదును చేయడానికి, మొలకలని గిల్లడానికి (కలుపు తీయడానికి) ఏరి వేయడానికి, వరుసల (సాలుల) మధ్య అవకాశముండాలి. సాలులు, దగ్గర దగ్గరుంటే ఈ విధంగా చెయ్యి అడించినప్పుడు మొక్కల ఆకులు రెమ్మలు విరిగిపోవచ్చు. మొక్కలను విస్తరింపజేసేటప్పుడు, మొక్కల గురించి ప్రస్తావించేటప్పుడు ఎటువంటి మొక్కలకీ ఎంత అంతరం యుక్తమనేది సూచించబడింది. దాన్ని గ్రహించి, తడవగుణంగా మొక్కల్ని వేంచాలి. కాని భూ ఫలాల్ని, పాతే విత్తనాల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ అంతరాన్ని ఎక్కువ, తక్కువ చేసుకోవాలి.

సాలులలో కూడా విత్తనాల్ని కొద్దిగా దూర దూరంగా వేయడం మంచిది. ఒత్తుగా చల్లితే, లేత పైరులో ఇబ్బంది ఏర్పడి, పెరుగుదల కొద్దిగా చెడుతుంది. వరుస చేసేటప్పుడు ఎక్కువ మొక్కలను పీకివేయాల్సి వస్తుంది. తోటలో తయారు చేసుకొన్న విత్తనాలైతే పరవాలేదు. కాని హైబ్రిడ్ విత్తనాలకు ఎక్కువ వెలుండటం చేత, కొన్ని విత్తనాలను వ్యర్థపరచడం అనుచితం.

చిన్న విత్తనాలను - పొగాకు, పెటూనియ, అంటరైసమ్, పాపి, పోర్ట్ మొదలైన మొక్కల విత్తనాలను నాటడం కొద్దిగా క్లిష్టతరం. వీటిని నాటేటప్పుడు ద్రేళ్ళ నందుల ద్వారా జారిపోతాయి. అందుచేత ఈ రకపు విత్తనాలను మట్టి లేదా మృదువైన ఇసుక జతలో బాగా కలిపి (మిశ్రమం చేసి) గుంటలలో (రంధ్రాలలో) విత్తనాలను వేస్తే, దూర దూరంగా పడతాయి.

చిన్న వరుసలలో (సాలులలో) ఇటువంటి విత్తనాలను నాటడానికి ఒక సులభ ఉపాయముంది. లావైన కాగితాన్ని (దశపరి కాగితాన్ని పాత పోస్ట్ కార్డును) రెండుగా మడిచి, గీతలో V - ఆకారానికి వచ్చాక ఇందులో కొద్దిగ విత్తనాలు పోసి, చూపుడు వేలుతోనో, లేదా ఎడమ చేతి నుంచి కుడి చేతి మణికట్టును కొద్దిగా తట్టడం చేతనో, కాగితం నుండి రెండు, మూడు విత్తనాలు రాలి క్రిందకి పడతాయి. ఈ విధంగా చల్లేటప్పుడు (రాల్చేటప్పుడు) కాగితాన్ని ఆయినంత వరకు నేల లేదా విత్తనాల తట్ట (Plate) లేదా కుండీకి దగ్గరగా పెట్టుకొని చల్లడం ప్రారంభించాలి. లేకపోతే, ఈ సన్నని మృదువైన విత్తనాలు గాలిలో ఎగిరి, చేసిన ఎరసలో రాలకపోవచ్చు. విత్తనాల ప్యాకెట్ మూతను మూసి, చిన్న రంధ్రం చేసి విత్తనాలను చల్లవచ్చు.

విత్తనాలు చల్లిన / నాటిన తర్వాత మట్టిని మూయడం

విత్తనాలను నాటిన తర్వాత కాలుతోనో, చేతితోనో మట్టిని వరుసలకు ఒత్తుగా విత్తనాలను మూయాలి. విశాలమైన తోటలలో చెత్తా చెదారంతో (డొల్లతో) చేసిన ఎరువు మట్టిని వేసి మూయడం పరిపాటి. చిన్న తోటలలో కావల్సి వస్తే, వెదురు తాటను తీసి మట్టితో పాడిచేసి కలిపి దానితో మూయవచ్చు. విత్తనాటేటప్పుడు త్రొక్కిన చోట గుంట పడవచ్చు. నాటిన కూడా విత్తనాలు వేసిన తర్వాత ముయ్యాలి. లేకపోతే, ఆ గుంటలలో నీళ్ళు నిలువవచ్చు.

తోటలో విత్తనాలను చల్లే పద్ధతి మంచిదా లేదా వరుసలలో నాటే పద్ధతి మంచిదా ? ఏది సరైనది ?

విత్తనాలను చల్లే పద్ధతికన్నా, సాలులలో విత్తనాలను నాటే పద్ధతి మంచిది (మేలైన పద్ధతి). సాలు విత్తనాలు నాటే పద్ధతిలో ప్రతి యొక పైరుకూ చాలినంత నీళ్ళు, వెలుతురు, పోషకాలు లభించి, మొలకలు

ఏవుగా పెరగడానికి వీలౌతుంది. విత్తనాలు చల్లే వద్దతిలో విత్తనాలు అన్నీ ఒకే రోతుకు రాలవు. కొన్ని పైన తేలి ఎండిపోతాయి. మరికొన్ని రోతుకు దిగిపోయి క్రుచ్చిపోతాయి. ఈ విధంగా అవ్వడంతో మొలకలు ఒకే సమంగా సాగవవు. నేలలో ఖాళీలు (gaps) ఎక్కువ అవ్వచ్చు. సాబులలో నాటితే అన్నీ ఒకే సమ రోతులో వడతాయి. తరువాయి కృషి (అంతరి కృషి) అంటే కలుపు తీయడం, మట్టిని కెడకడం (కలగల వరచడం) ఏరి వేయడం, సమరించే పనులు, సరైన ఉపకరణాలను (వస్తువులను, వదాల్లాలను) ఉపయోగించి, సులభంగా, సమర్థవంతంగా, మొలకల్ని పెంచడానికి వీలవుతుంది. సాబు మధ్య కాలువ లేదా దారిని త్రవ్వి, నీటిని నాశనం కాకుండా, అన్ని మొక్కలకీ లభించేటట్టు, పారేట్టు చేయాలి. విత్తనాలను చల్లినప్పుడు, నీటిని సాయ్యాలి. మట్టి సరిగ్గా లేకపోయినట్లైతే, పల్లంలో నీళ్లు నిలిచి, విత్తనాలకు నీళ్లు సారకుండా, విత్తనాలు ఏక ప్రకారంగా (ఒకే విధంగా) పెరగవు. సాబులలో విత్తనాలు నాటినప్పుడు విత్తనాలు క్రుచ్చిపోవడమో, ఎండిపోవడమో చాలా తక్కువగా జరుగుతుంది. ఈ కారణాల చేత తోటలో మొక్కల్ని సాబులో విత్తనాలు నాటి పెంచడమే సమర్థవంతమైనది, ఎక్కువ శ్రమ లేని శ్రమ.

**వలచు వరచడం (గుల్ల బరచడం) శుభ్రపరచడం**

మొలకలు మొలకెత్తడం ముగిసిన తర్వాత, పైరును వలచబరిచి శుభ్రపరచాలి. ఎండిన, విత్తులేని నాటిన మొలకల్ని, రోగపు మొక్కల్ని వలచు (శుభ్ర) పరిచేటప్పుడు వాటిని ఏరి, పీకిపారేయాలి. పైరును ఒకసారి శుభ్రపరిచే బదులు, మూడు సార్లు చేస్తే బలీష్టమైన, ఆరోగ్యమైన పైరులను మిగుల్చుకోవచ్చు. చివరిసారిగా వేసే పైరు చాలినంత దూరంలో నిలబేటట్టుగా శుభ్రపరచాలి, సరిచేయాలి. వివిధ ధాన్యాల, మొక్కల పెరుగుదలకు ఉండవలసిన అంతరాలు తర్వాత తెలుపబడుతాయి.

తోటకి నీళ్లు వేసిన/పోసిన తర్వాత లేదా వర్షం కురిసిన ఒకటి రెండు రోజులైన తర్వాత పైరులను శుభ్రపరచాలి. లేకపోతే, మొలకలు క్రింది నుండి మొలకెత్తలేవు. పై భాగం మొదట చిగురించవచ్చు. తేమ చాలా ఎక్కువగా వుంటే అడ్డుగా ప్రక్కనున్న గడ్డి చిగురించి పైకి వస్తుంది. పైరును శుభ్రపరిచేటప్పుడు దాని చుట్టూ మట్టి కొద్దిగా వదులవ్వడం చేత మిగిలిన పైరు వేరుకు మట్టి తోటి సంవర్ధం తక్కువ అవ్వడం చేత మిగిలిన పైరు చుట్టూ ఉన్న మట్టిని మెత్తగా తొక్కాలి. లేదా అదమాలి (నొక్కాలి).

విత్తనాలు మొలకెత్తకుండానో, లేక క్రుచ్చి పోవడం చేతనో తోటలో కొన్ని చోట్ల ఖాళీ స్థలం (తెరిపి) ఏర్పడవచ్చు. కొంత భాగం బీడుగా వుండిపోవచ్చు.

తోటలో వంట నమ్మద్దిగ (తోటనిండా) మొక్కలు ఎక్కువగా వ్యాపించాలంటే మొలకకు పెట్టే మొక్కల సంఖ్య చాలినంతండాల్సి. ఈ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటే పైరు ఒత్తుగా వుండి అన్ని మొక్కలు బాగా పెరగలేవు. తక్కువైతే నేలలోని ఎరువు, నీరు, శ్రమ వ్యర్థం అవుతాయి. అందుచేత ఖాళీ ఏర్పడిన స్థలాలలో విత్తనాలను గాని, మొక్కల్ని గాని వుం: (మళ్ళీ) నాటి ఆ స్థలాలను నింపాలి. విత్తునాటిన 8-10 రోజులైన తర్వాత ఖాళీ స్థలాలలో విత్తనాలను మరోసారి వేయడం ఒక శ్రమం. 3-4 వారాలైన తర్వాత ఖాళీ స్థలంలో ఈ పాడు నుండి మొక్కల మొలకలను తీసి, నింపాలి. అన్ని విత్తనాలను ఈ విధంగా ఒకసారిగా వేసి, పెంచి ఒకటిగా నాటడానికి సాధ్యం కాదు. చిక్కడు మొదలైన అనేక ద్విదళ (లెగ్యుమిన్)లను ఈ విధంగా నాటలేము. మరొక శ్రమం



శుభ్రవరిచినప్పుడు పైరును ఖాళీ స్థలాలలో నాటడం. విత్తుతో సహా తెచ్చి నాటడం, అయితే ఈ పనిని విత్తు నాటిన 8-10 రోజులలోనే చేపట్టాలి. అప్పుడే మొలకలు ఏక ప్రకారంగా (ఒకసారిగా) కోయడానికి వస్తాయి.

నాటడం

తోటలో అనేక ధాన్యాలను నేరుగా మట్టిలో నాటి పెంచడానికి బదులు ఒకటిగా విత్తనాలు ఒకచోట నారు పోసి, కొద్దిగా మొలకెత్తిన తర్వాత వాటిని అనువైన చోట నాటి మొక్కల్ని, మొలకల్ని పెంచవచ్చు. ఈ విధంగా నాటేటప్పుడు నారు రాకపోతే అపాయము నిజమే. అయినా కొన్ని కారణాల చేత ఈ క్రమమే, విత్తనాలను నాటి పెంచే క్రమం కన్నా ఉత్తమమైంది. చాలా చిన్న స్థలమైనందున ఎక్కువ జాగ్రత్తతో ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించి, పుష్టికరమైన లాపైన మొక్కల్ని (పుష్టికర మొక్కల్ని) పెంచవచ్చు. నాటేటప్పుడు బలీష్ఠమైన ఎరువు (చెల్తా చెదరాన్ని) నింపిన పైరులనే ఎన్నుకొని నాటవచ్చు. నాటేటప్పుడు మొక్కల పెరుగుదలకు యుక్తమైన అంతరంలో పైరును పెట్టాలి. నాటిన నేలలో ఖాళీలు ఏర్పడడం తక్కువ. ఖాళీలు నింపాల్సిన అవసరం లేదు. ధారుడ్యమైన మొక్కలనే నాటుట చేత, మొలకలు కూడా ధృఢంగానే ఉంటాయి. లేత మొలకలు/మొక్కలు ప్రతీకూలంగా లేనిచేత కాపాడవచ్చు.

విత్తనాలు సూక్ష్మంగా వుంటే ఉదా : పెటూనియ, గ్లాక్సినియ, బెగోనియ ఇత్యాదివి నేరుగా నేలలో నాటడానికి సాధ్యం కాదు. దీనికి కారణం వీటి విత్తనాలకు నేలలో పెరగడానికి, మొలకెత్తడానికి, కావల్సిన అనుకూల పరిస్థితిని కల్పించడం సాధ్యం కాదు. ఇటువంటి విత్తనాలను ఒత్తుగా, ఒకసారిగా విత్తు జల్లి, మొలకలు రానిచ్చి, అనుకూల వాతావరణంలో నాటాలి.

నారు పోసి పెంచే జాతులు

విత్తనాలు ఎక్కువగా వుంటే, లేదా విశాలమైన పెద్ద తోటలకు కావలసిన వస్త్రే (ఉదా : పొగాకు) వాటిని పాదులలో ఒకసారిగా నారుపోసి, నారుపాదులను క్రమబద్ధంగా, జాగ్రత్తగా సిద్ధపరచాలి. విత్తన మొలకల పెరుగుదలకు అనుకూలమైన క్షేత్రంలో (నేలలో) బంక (జగటు) ఉండకూడదు. అంటే బీటి కణాలు, బంకనిచ్చే కణాలు ఎక్కువగా ఉండరాదు. అలాగని, అందులో ఇసుకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత వహించాలని లేదు. గోడు, ఇసుక, సావయవ ఎరువు, సరైన కొలతలలో కలపాలి. ఈ విధంగా ఉంటే నీళ్లు నిలువవు. తేమ త్వరగా ఆరిపోదు. గాలి దూరడానికి, (పారడానికి) వేడి వ్యాపించడానికి అనుకూలం అవుతుంది. మొక్కల మృదు వేరులు సులభంగా దిగి, వ్యాపించడానికి, అవకాశముంటుంది. మొక్కలను నారు కోసం మొలకెత్తించేటప్పుడు, బంక ఎక్కువగా లేక పోవడంతో, వేరులు ఎక్కువగా తెగిపోవు.

అందుచేత నారు పాదును ఒక అడుగు (30 సెం.మీ.) లోతుగా త్రవ్వి, వదులు చేయాలి - నీళ్లు బాగా ఇంకడానికి ఈ విధంగా త్రవ్విన మట్టిని కొంతకాలం ఎండ పెట్టాలి. అప్పుడు అందులో పున్న పోషకాలు అందించే రూపానికి రావడానికి, కీటక రోగాలుపులు నాశనం అవ్వడానికి వీలవుతుంది. ఈ విధంగా ఎండలో మాగబెట్టిన తర్వాత పెంటలను ముక్కలు చేసి, మట్టిని పొడిచేసి, కంప, కొమ్మలు, పుల్లలు, రాళ్లు ఏరి బంకను తొలగించడానికి కావలసినంత ఇసుకను బాగా కలిపి, జల్లించి, ఆకు అలముల ఎరువును సాత పేడ, లద్దెల ఎరువుతో కలపాలి. ఆ తర్వాత పాదులను బాగా కలపాలి (త్రిప్పాలి). లేదా కొత్తగా కట్టాలి. కొంతమంది

ఉమ్మడి నారు మడులను నేల సమానికి చేసి చుట్టూ విన్ను గట్టును కడతారు. ఇది ఆకులకు ఆకు మొక్కలకి సరిపోతుండే తప్ప, విత్తనాలను చల్లడానికి సరిపోదు. మడులను ఎత్తుగా చేసి - సుమారు 6 అంగుళాల (15 సెం.మీ.) ఎత్తుకు ఎత్తడం మంచిది. ఈ విధంగా చేస్తే, రెండు మడులు మధ్య ఉండే కాలువ, నీటి కాలువ కాకుండా, నీటిని దింపే కాలువ కూడా అవుతుంది. ఈ కాలువలలో నీటిని పారించినప్పుడు మట్టి ప్రక్కకు పైకి వుండటం చేత ఎక్కువ నీటిని పారిస్తామనే భయం ఉండదు. నీళ్లు నిలవడానికి అవకాశం లేదు. పై నుంచి నీళ్లు వచ్చిననూ అధికమైన నీరు ఈ కాలువను చేరుతుంది. అంతేకాకుండా, ఎత్తు చేసిన మడుల నుంచి మొక్కలను సులభంగా వేరులతో పీకి ఎత్తవచ్చు. (చిత్రం 6.12) ఎత్తుగా చేసిన తర్వాత మడులను వలకతో కొంచెం అదిమి (అణగద్రొక్కి) దానిపైన ఆకుపొడిని జల్లించి విత్తన నాటడానికి సిద్ధపరచాలి. విత్తనాలను ఈ మడులలో వరుసలలో నాటడం యుక్తం. విత్తనం నాటిన తర్వాత మరింత ఆకు పొడిని జల్లించి, వలకతో మెల్లగా అదమాలి.

6.12 నారుపోసి పాదుల తయారీ.

ఉమ్మడి పాదులను పశువుల బాధ లేకుండా, ఎండ, గాలి, వర్షాల నుంచి సులభంగా కాపాడగలిగిన చోట నీటి సౌకర్యం సమీపంలో ఉండేటట్లుగా ఎన్నుకోవాలి. నారుగా వేసి విత్తనాల పైజా, మనకు కావల్సిన మొక్కల సంఖ్యను అనుసరించి వేస్తారు. కాని పాదు యొక్క వెడల్పు 4 అడుగుల కంటే (సుమారు 1% మీటరు) ఎక్కువగా పెట్టుకోవాలి. ఈ వెడల్పు ఉంటే, పాదులను రెండు వైపుల నుంచి కలవడానికి, మొలకలను పీకడానికి, నీళ్లు చల్లడానికి, పోయడానికి, ఔషధాలను చల్లడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. పాదుగును మాత్రం మొక్కల సంఖ్యకు అనుగుణంగా ఎక్కువ, తక్కువలు చేసుకోవచ్చు.

పాదుల ప్రక్కలు తగిపోకుండా ఇటుకలను బోడించడం మంచిది. కాని మట్టిలో చాలినంత బంక గోడు ఉంటే ఇది అవసరం. మొలకలు వచ్చేంత వరకు, పాదులపైన ఎండిన గడ్డిని కప్పి, చీకటి అయ్యేట్లు చేయాలి. మొలకలు మొలకెత్తిన వెంటనే గడ్డిని తీసిపారేయాలి.


పాదులలో కలుపు లేకుండా ఉండేటట్లుగా అప్పుడప్పుడు కలుపుని తీసివేస్తూండాలి. నీటిని క్రమంగా నీటి తొట్టె (వాటర్ క్యాన్ - Water can) చిల్లుల (జల్లెడవంటి) ద్వారా తుంవర్లను చల్లాలి. నారు పాదు సులభంగా మొలకెత్తేట్లుగా ఉపయోగించాలి. ఈ పాదులకు చిల్లుల ద్వారా నీటి తుంవర్లను, తుంవర్లుగా చల్లుతుంటారు. (చిత్రం 5.39). ఈ విధంగా నీరు చల్లడం చేత లేత మొక్కలకి నీటి దెబ్బ తగలదు. అంతేకాకుండా పాదు మట్టి జరగదు, నీరు ఎక్కువై గజిబిజిగా బురద కాదు.

నీటి సౌకర్యం బాగుంటే రెండు మడుల మధ్య సుమారు అర్థం ఎత్తు నీటిని కడితే, క్రింద నుండే నీళ్లు ఎక్కుతుంది. ఇది పై నుంచి నీటిని చల్లడం కన్నా ఉత్తమమైన మార్గం.


కొన్ని సందర్భాలలో మొలకెత్తడానికి క్రింద వేడిని ఇవ్వాలి వస్తుంది. ఆ విధంగా చేయడానికి, వేడి పాదులను (Hot beds) నిర్మించాలి (చేయాలి). దీనికి సాధారణ నారు పాదులకూ ఉండే భేదమేమిటో, పాదుల క్రింద వేడిని ఉత్పత్తి చేసే గుడ్డపు లద్ది లేదా బిరుసుగా క్రుళ్లుతున్న ఎరువు పొరను వేసి దానిపైన పాదును చేయాలి. ఈ వేడి (తాపం) అరకుండా ఉండడానికి పాదుపైన ఒక చదరపు చెక్కిను పెట్టి, దానిపై




6-11



6-12



6-13



6-14

గాజా లేదా ఫ్లాస్టిక్ షీట్‌ని మూయాలి (మూతను పెట్టాలి). ఈ రకపు వేడి పాదులను చిత్రం 2.40, 41, 6.10లో చూడవచ్చు. ఈ రకపు వేడి పాదులు వేడి కొరత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాలలోనూ, దేశాలలోనూ ఉపయోగిస్తుంటారు. మన దేశంలో ఇటువంటి వేడి పాదులను చలికాలంలో విత్తనాలు చల్లడానికి, సులభంగా మొలకెత్తని విత్తనాలను మొలకెత్తిన జేయడానికి, ఎక్కువ ఖరీదైన విత్తనాలు, మొక్కల్ని వాన, గాలుల నుండి రక్షించడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు.

కొందరు నాటిన పైరు నుంచి త్వరగా ఫలితం దక్కుతుందని అంటారు. ఈ అభిప్రాయానికి ఆధారం లేదు కాని కొన్ని జాతుల మొక్కలను నీరు పోసి నాటడానికి కొద్దిగా అనుకూలమవుతుంది. ఈ మార్పు నుంచి (Transplanting shock) ఎక్కువ తీగ వేర్లు (ఆహారాన్ని పీల్చుకొనే వేర్లు) ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఈ విధంగా అని మట్టి నుంచి ఎక్కువ పోషకాలను పొంది, ఘనంగా (గొప్పగా) పెరుగుతుంది. ఇది కోసు (క్యాబేజీ) జాతి మొక్కలకూ కొన్ని పువ్వుల మొలకలకు అన్వయిస్తుంది. ఈ మొలకల్ని రెండుసార్లు నాటతారు. మొదట బట్టి నుంచి పాదులలోనూ, తర్వాత పాదులనుంచి నేలపైన (నేలలో) నాటతారు. మొదట లేత మొక్కల్ని చాలా లేతగా ఉన్నప్పుడే, రెండు లేదా నాలుగు ఆకులు వచ్చిన తర్వాత నాటతారు. దీనిని మొక్కని నాటడం (pricking) (గుచ్చడం) దూర్చడం అని అంటారు. ఈ విధంగా గుచ్చి మొక్కని నాటిన తర్వాత, అక్కడ కొత్తవైనవి, ఎక్కువ వేర్లు మొలకెత్తుతాయి. అంతేకాకుండా మొక్కలు విస్తరించి వ్యాపించడానికి సహాయమవుతుంది. ఈ విధంగా మొక్కలు నాటిన తర్వాత అటుపోట్లను బాగానే ఎదుర్కోగలవు. అంతేకాకుండా గాలి ప్రతికూలాలని ఎదుర్కోగలవు.

మొక్కల్ని నాటాలంటే అవి చాలా లేతగా ఉన్నప్పుడే నాటాలని చెప్పడమైంది. అప్పుడు ఈ మొలకలు చేతి ప్రేళ్ళతో వట్టుకోడానికి దొరకడం కష్టం. అందుకోసం ఒక గ్రుచ్చే కర్రని (Pricking out stick) ఉపయోగించాలి. ఒక కర్రని తీసుకొని, ఒక కొనలో చప్పుగా (చదునుగా) అయ్యేట్టుగా చేసి, చప్పుగా చేసిన చదును 3-4 మిల్లీ మీటర్ల వెడల్పుగా, ఉండేట్టుగా మొనదేల్చాలి. ఈ కొనకు మధ్య V - ఆకారపు కట్టు చేయాలి. ఈ మొన గలిగిన కర్రని మట్టిలో ఊని, V - కట్టు (కోత) మధ్య మొక్కని చిక్కించుకొని, లేపాలి (చిత్రం 6.13) ఈ (గ్రుచ్చే కర్రకు చిన్న పిడి కూడ ఉండాలి.

6.13 గ్రుచ్చి మొక్కను నాటి క్రమం 1. వేలుతో వట్టుకొని త్రవ్విన గుంటలో కూర్చోపెట్టి, గుంట చుట్టూ గ్రుచ్చాలి. 2. కర్రని మొనదేల్చి (షార్ప్ - Sharp) చేసి చివరన V - ఆకారంగా కత్తిరించి, దీని మధ్య మొక్కల్ని చిక్కించుకొని తీసి నాటాలి. 3. మొనదేలిన కర్ర, 4. పాత నిబ్బు వంచి, దాని నోటికి చిక్కించి, మొక్కల్ని లేపి ఉపకరణంగా వాడవచ్చు.

ఈ పిడితో మొక్కని పాదులో సరిగ్గా ఎక్కువ దెబ్బ తగలకుండా కూర్చో పెట్టచ్చు (పాతవచ్చు).

మొక్కల్ని నాటి ఈ పద్ధతిని అనుసరించాలంటే వీలుపడే పువ్వుల మొక్కలు ఈ క్రింద పేర్కొనబడినాయి. 1. అంటిరైనుమ్ (Antirrhinum) ఆస్టర్ (Aster) బాల్సమ్ (Balsam + కరణ కుండలం) క్యాలాండూల (Calendula) కాలియోలేరియ (calceolaria) డయాంతస్ (Dianthus) 4 ఆకులు వచ్చాక పినరేరియ (Cineraria - విత్తనపు ఆకు) వెలువలికి వచ్చేటప్పుడు, ఆ తర్వాత 2 సార్లు జర్బీర (Gerbera) ప్యాన్సి (Pansy) ఫ్లాక్స్ (Phlox) పెటూనియ (Petunia) సాల్వియ (Salvia) వర్బిన (Verbena) - రెండు సార్లు.

విత్తు నాటడంలోగాని, మొక్కల్ని నాటడంలోగాని కొన్ని ముందు జాగ్రత్తలను అనుసరించాలి. నారులను తీయడానికి ఒకటి రెండు రోజులకు ముందుగానే మట్టి తడిసేటట్టుగా నారు మడులకు విత్తనాల తట్టుకు (Seed pan) నీటిని వేసి మడుల మట్టి తడిసిన తర్వాత నారులను తీయాలి. ఆ విధంగా చేస్తే, నారు విరిగి పోదు, తెగిపోదు. వాటి సూక్ష్మ వేర్లు తెగిపోవు. మట్టి కణాలు వేరుకు అంటుకొనే బయటకీ (వెలుపలికీ) పస్తాయి. నాటడానికి చాలినంత తేమ ఉండి, సారవంతమైన నేలలో నాటాలి. నాట్లు రోజు ప్రాధున లేదా సాయంకాలపు సమయాన నాటాలి. అప్పుడు మొక్కలు వాడిపోవు. చిన్న తోటలలో నాటే మొక్కల్ని నీడలో నాటాలి. లేదా నీడ వడేటట్టుగా చేయడం మంచిది.

### మొక్కల్ని నాటే క్రమం (Planting out, Transplanting)

తోటలో పెంచే రాగులు, వరి మొదలైనవి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నాటితే పెరిగెడి మొలకలు కావు. నీటికి ఎక్కువ జాగ్రత్త, నాజూకు అత్యవసరమవుతాయి. నాటిన మొక్క మొలకెత్తాలంటే మొక్క మొక్క మృదు వేర్లకూ, మట్టి కణాలకూ దగ్గర సంవర్కం ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రం ఈ వేర్లు మట్టి కణాల చుట్టూ ఉన్న పోషకాలను పీల్చుకొని, సోలిపోకుండా, నిలువగలుగుతాయి. ఈ సంవర్కాన్ని ఏర్పరచడానికి కర్రను ఆధారంగా కట్టి (మొనదేలిన కర్రను ఊని) గుంట చేసి, మొక్కల్ని ఆ గుంటలోపల కూర్చోబెట్టి తర్వాత అదే కర్రతో మొక్క నుండి 25 సెం.మీ. దూరానికి చుట్టూ మట్టిని గుచ్చాలి. ఈ విధంగా గుచ్చినప్పుడు మట్టి, మొక్కల వేర్ల వైపు జరిగి, గుంట మూతబడుతుంది. మొక్క నేరుగా నిలబడుతుంది. మొక్కల వేరులకూ, మట్టికీ సంవర్కం ఏర్పరుస్తుంది. కొందరు నాటిన మొక్క పైన నీటిని పోస్తారు. ఈ విధంగా నీళ్లు పోయకూడదు. సరైన పద్ధతి ఏమిటంటే, చివరిసారిగా గ్రుచ్చినప్పుడు ఏర్పడెడి గుంటలకు కొద్దిగా నీటిని పోయ్యాలి. (ఏప్రెల్ 5.37 a & b చూడండి). ఈ విధంగా నీటిని పోస్తే మొక్కలు కదలవు. మృదు వేరులకు నీళ్లు లభిస్తాయి. నాటిన తర్వాత వేసే (పోసే) నీటికి మొక్క చిగురించే నీళ్లని అంటారు. చిగురింపజేసే నీటిని పోసేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్త వహించాలి. బిందెతో మొక్క తలపైన పోసి అభ్యాసం చాలా వెడ్డ పద్ధతి.

(గుచ్చి నాటే క్రమం (Pricking) ఈ క్రమాన్ని మొక్కల మొదటి నిజ ఆకులు (బీజ పత్రం లేదా ఆకు) మొలకెత్తినప్పుడు, విత్తనాలు మొలకెత్తినప్పుడు, మొదట వచ్చేది బీజ దళం, అంకుర దళం (రక్షక పత్రాలు Cotyledons). ఇవి కూడా పచ్చగ పుండేవు. కాని ఇవి, కృత్రిమ (అబద్ధపు/అనత్యపు) ఆకులు. నిజమైన ఆకులు కావు. ఈ బీజదళాల మధ్య నుంచి వచ్చేడి (మొలకెత్తేడి) ఆకులే నిజమైన పత్రాలు. ఇటు వంటి రెండు లేదా నాల్గు ఆకుల మొక్కలు చాలా సూక్ష్మమైనవి. వేరులు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అందుచేత దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా, తీసి నాటవల్సిన చోట జాగ్రత్తగా గ్రుచ్చాలి. సీసపు కడ్డీకన్నా కొద్దిగా లావుగా వున్న ఒక ముక్క యొక్క చివరను (కొనను మొనదేల్చి గ్రుచ్చే కొమ్మగా కర్రగా) పెట్టుకోవాలి. మరొక కర్రని (ముక్కని) చిన్నదిగా చదునుగా చేసి, దాని కొనలో (చివరలో) క్రింద V - ఆకారపు కత్తిరింపు (కట్ - Cut) చేసి, లేపే (తీసే) కర్రతో లేపి, ప్రత్యేకంగా వేరే చోట పెట్టుకోవాలి. వెంటనే, నాటే పాదులో లేదా కుండీలలో గ్రుచ్చే కర్రతో మొక్కల వేరులున్నంత లోతుకు (పల్లంగా) గుంటని చేయాలి. మొక్కల్ని వాటి నిజ ఆకులతో పట్టుకొని, గుంటలలో వేరు మాత్రం గుంటలో దోగట్టుగా కూర్చాలి (గుచ్చి పెట్టాలి). (గుచ్చే కర్రతో, మొక్క చుట్టూ

1-2 పెం.మీ. దూరానికి మట్టిని గ్రుచ్చాలి. అప్పుడు ఆ మట్టి మొక్కల వేరుల (వేళ్ల) వైపుకు జరిగి మొక్క నిలువుగా నిలబడేటట్లు చేస్తుంది. లేపే కర్రతోనే మొక్కని V - ఆకారపు కత్తిరింపు మధ్య చిక్కించుకొని, కర్రనే ఏడిగా చేసుకొని ముక్కల్ని గుంటలలో (కూర్చోబెట్టవచ్చు) పెట్టచ్చు. (చిత్రం 6.13).

(గ్రుచ్చి నాటేటటువంటి క్షేత్రం (వేల) - పాదులుగానీ, కుండీలుగానీ, తట్టులుగానీ (Pans) లేదా పెట్టెలుగానీ (box) ఈ మృదు (లేత) మొక్కల పెరుగుదలకు యుక్తమై ఉండాలి (అనుకూలంగా ఉండాలి). ఈ క్షేత్రానికి గోడు మట్టి, కొద్దిగా లావుగా వున్న ఇసుక, అకుపాడి, కలిపి (వేర్చి) జల్లించి నింపాలి. 7 భాగాలు గోడు మట్టిని, 2 భాగాలు సుమారుగా లావుగా వున్న ఇసుకను, 3 భాగాల అకు పాడిని (వత్ర పాడిని) దాని జతలో కొద్దిగా ఎముకల పాడి, లేదా గోరసీ పాడి, సూపర్, పొదాషియం సల్ఫేటు చేర్చడం (కలవడం) మంచిది. 2 భాగాలు తూకం గోరసీ పాడి లేదా ఎముకల పాడి, 2 భాగాల (తూకం) సూపర్, 1 భాగం పొదాషియం సల్ఫేటు మిశ్రమం చేయాలి. 2 కిరోసెనాయిల్ టీన్ను మట్టి మిశ్రమానికి పావు (1/4) పొండు ఈ మిశ్రమాన్ని చేర్చాలి. ఇంగ్లాండులో ఈ రకపు మిశ్రమాన్ని జాన్ ఇన్నెస్ పాటింగ్ కంపోస్ట్ నం. 1 అని అబారు (John Innes Compost No. 1). పై తెలిపిన మిశ్రమం ఇంచుమించు ఈ 3.1 మిశ్రమాన్ని పోలుంటుంది.

ఈ రకపు మిశ్రమాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి, నీలుకాకపోయినట్లైతే, 3 భాగాలు అకు పాడి, 1 1/2 భాగాల ఎర్ర మట్టి, 1 1/2 భాగాల ఇసుక చేరిన మిశ్రమాన్ని ఉపయోగించవచ్చు.

నారులు ఈ క్షేత్రంలో ఎక్కువ కాలం ఉండవు కాబట్టి ఈ క్షేత్రంలో 3 అంగుళాల ముందానికి ఈ మిశ్రమాన్ని నింపాలి. కుండలలో, పెట్టెలలో, తట్టులలో, తొట్టెలలో విత్తనాలు చల్లి, నారును పెంచవచ్చు లేదా నాటవచ్చు. దీని గురించి ముందు తెలుపబడుతుంది. (చూడండి కుండ కృపి).

**మొక్కలు నాటిన తర్వాత చేయవలసిన తోట పనులు (After or Inter Cultivation)**

విత్తనాలు నాటిన తర్వాత, లేదా మొక్కల్ని నాటిన తర్వాత, కోత కోసే వరకు తోటలో అనేక రకాల పనులను చేస్తూనే ఉండవలసి వస్తుంది.

1. ఖాళీలను నింపడం. దీని గురించి ఇంతకు ముందే తెలవడమైనది.

2. వలువ వరచి శుభ్రం చేయడం, కొన్ని సమయాలలో విత్తనాలను చల్లాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు పైరు చాల దగ్గర దగ్గరగానే పెరుగుతుంది. వరుసలో విత్తనాలు నాటడంతోనూ ఈ విధంగానే అవుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా జతయిన పైరులకన్నింటికీ చాలినంత నీళ్లు కావాలి. అంతేకాకుండా, పోషకాలు తగినంతగా లభించక పోవడంతో, పైరును వలచబరిచి చదును చేసి, శుభ్రపరచాల్సి వస్తుంది. రాగులు పెంచే పొలాలలో కుంటితో కడులుస్తూ కలుపు తీస్తూ తోటను, పొలాలను శుభ్రపరుస్తారు. కాని తోట మొక్కల పెంపకంలో ఈ విధంగా కుంటితో జరిపించడం జరగదు. అందువేత మనుష్యులని ఏర్పాటు చేసి చేతితో ఎక్కువైన పైరును పీకి పోరేయిస్తారు.

3. మొలకలు వచ్చిన తర్వాత, మొలకల మధ్య అక్కడక్కడ మట్టి గ్రుచ్చుతూ ఉండాలి. ఈ విధంగా తెలకడానికి ముఖ్య కారణాలు రెండు ఉన్నాయి. 1. కలుపును గిట్టి పారేయడానికి, 2. గట్టి పడిన మట్టిని గుల్ల బరచడానికి.

కలుపులను నాశనం చేయడం విషయం తెలుసుకోడానికి “సస్య సంరక్షణ” అధ్యాయాన్ని చూడండి. కెలికి, గిట్టి పీకడంతో కలుపులు నాశనమవుడమే కాకుండా, మట్టి యొక్క పై పొరపైన, వర్షం కురిసో, నీళ్లు పారడం చేతనో ఏర్పడే బురదను పోగొట్టవచ్చు. బురదని అలాగే వదిలేస్తే, నీళ్లు క్రిందకి దిగడానికి అడ్డు తగులుతుంది. కెలికినప్పుడు బురద పోవడమే కాకుండా, నేల కొద్దిగా గుల్లిబూరుతుంది. గాలి, నీరు రెండు మలభంగా చలిస్తాయి. కొద్దిగా మాత్రం కలుపులను తీసి వేసిన మట్టి కొద్దిగా కదిలి, నీళ్లు క్రింద భాగానికి పారకుండా అడ్డుపడుతుంది. ఎంతో మంచి తోటమాలలు ప్రతిసారి వర్షం కురిసిన తర్వాత, మట్టి ఆరిన తర్వాత 2-3 తడులు నీళ్లు కట్టిన తర్వాత కూడ మట్టిలో కలుపు ఉండనీ, ఉండకపోనీ, కర్రతో మట్టిని గ్రుచ్చే సంప్రదాయాన్ని పెట్టుకొని ఉన్నారు. చిన్న షేత్రాలలో, కుండీలలో ఈ క్రమాన్ని అనుసరించడానికి వీలవుతుంది. అంతేకాకుండా మంచిది కూడా. పెద్ద షేత్రాలలో మట్టిని కెలకడానికి, సడలించడానికి, కుండాని (గొడ్డలి) గడ్డిని కత్తిరించి ఏరి పారవేసి గొడ్డలి లాంటిది (కుండా చిత్రం 5.9). సరళ రకాల సాధనాలను ఉపయోగిస్తూంటారు. చిన్న షేత్రాలలో ఒకటి, రెండు గాలి గొడ్డళ్ళను ఉపయోగించవచ్చు. (చిత్రం 5.8, 5.25 c) లేదా డచ్ వో పరికరాలను ఉపయోగించవచ్చు. (చిత్రాలు 5.28, 5.27) ఈ కెలికే శ్రమమూ, ఖర్చు తప్పించుకోడానికి ఒక ఉపాయముంది. అదేమిటంటే మొక్కల వరుసల మధ్య మట్టిపైన ఏదో ఒక రీతిలో ఒక ఎండిన (పొడి) బోదులను రూపొందించడం. ఈ రకపు రక్షణ కప్పును (మూతను మల్చు) (Mulch) అని అంటారు. కత్తిరించిన ఎండు గడ్డి లేదా పచ్చ గడ్డి లేదా ఆకులు అలములు, వరి విత్తనాలు పొట్టు (తవుడు)ను మొదలైన వాటిని మల్చు పారగా ఉపయోగించుకోవచ్చు (కవువచ్చు). ఇటీవల కాలంలో పాశ్చాత్య దేశాలలో ఈ పై పదార్థాలకు బదులుగా నలుపు ప్లాస్టిక్ షీటులను (వెలుతురు దూరకుండా షీటు క్రిందున్న కలుపులు నాశనమవుడానికి నలుపు షీటు) మొక్కలన్న చోట మాత్రం రంధ్రం (చిల్లి) చేసి నేలపైన (షేత్రం పైన) కప్పుతారు (మూస్తారు). ఈ షీటు వల్ల నేలపైన ఉన్న తేమ ఆరడానికి వీలుకాదు. వర్షపు నీళ్లు, పోసిన నీళ్లు, ఆ షీటుకు చేసిన రంధ్రాల ద్వారా మొక్కను చేరుతాయి.

మల్చు మూత ద్వారా కొన్ని లాభాలున్నాయి. 1. మల్చు మట్టి తేమను త్వరగా, ఎండేటట్టుగా చేయదు. మట్టి తేమ ఆరడానికి ఎండ, గాలి కారణం (వేరు నుంచి పీల్చుకొన్న నీటి విషయము వేరే, ఇది ఆవశ్య క్రియ, (చూడండి సస్య నిర్మాణం జీవన విధానం). కాని ఈ మల్చు పొర క్రింద మట్టిని వేడి నుంచీ, గాలి నుంచీ రక్షిస్తుంది. అయినందున మల్చు వేసిన షేత్రం, పొదు లేదా కుండీలు నీటిని నిలుపుకొని అందివ్వవచ్చు. నీటి ఖర్చు కొంచెం తక్కువ అవుతుంది. 2. మల్చు పొర కలుపులను మట్టి రానీయకుండా చేస్తుంది. మల్చు పొర ద్వారా దానికి చాలినంత, వెలుతురు లభించక, అవి అలాగే అణగిపోతాయి. 3. ప్రుగ్గిన పదార్థం కాలక్రమేణా క్రుచ్చినప్పుడు కొంచెంగా సావయవ పదార్థం, కొంచెం పోషకాలు లభిస్తాయి. కొందరు ఎండిన కంపోస్టులను సశువు గొట్టరం (ఎరువును) మల్చుగా వేస్తారు. (మల్చుగా వరుస్తారు). ఈ విధంగా చేస్తే మల్చుకు మల్చు అవుతుంది. ఎరువుకు ఎరువు అవుతుంది.

తోట్టలలో పాదులలో పెంచతగిన మొక్కలకు మల్చు చాలా మంచిది. కారణం దీని తేమ త్వరగా ఆరుట చేత ఈ క్రమాన్ని మన తోటమాలలు అనుసరించాలి. పురోగమిస్తున్న దేశాలలోని తోటమాలలు మల్చు క్రమాన్ని సర్వ సాధారణంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. మనంత శుష్క వాతావరణం లేకపోయినా, ఎండ

(వేడి) లేకపోయినా, వారు మళ్ళు కప్పే క్రమాన్ని అనుసరించేటప్పుడు మనం దీన్ని తప్పనిసరిగా ఉపయోగించడం యుక్తం.

4. మొక్కలకు వేరు వేయడం లేదా మట్టిని గుల్లబరచడం (నడలించడం) : మొక్కలు పెరిగినంతనే మొక్కలు గట్టిగా నిలబడడానికి, మట్టిని క్రిందకు త్రోసి, ఆధారాన్ని (ఆసరా) ఇవ్వాలి. అనేక కూరగాయల మొక్కలకు ఈ క్రమం చాలా అవసరం. ఈ విధంగా మట్టిని నొక్కితే, మొక్కలు గాలిహోరును తట్టుకోగలవు. వేర్లు తెగిపోవు, మొక్కలు గాలిలో కదలక నిలబడటం చేత వాటి ఆరోగ్యమూ, ఫల సంపద నమ్మద్దిగా ఉంటుంది.

అరటి, చెఱకు మొదలైన వాటికి ఎక్కువ మట్టిని బోదే వేయాలి. ఈ విధంగా బోదే వేయడానికి రెండు రెక్కల ఇనుప నాగలులు ఉపయోగిస్తే వనులు త్వరగా సాగుతాయి. ఇటువంటి సాధనలను రిడ్జర్ (Ridger) అని అంటారు (చిత్రం 5.13) ఒంటి రెక్క నాగలితో బోదే వేయాలి. కాని ఆ విధంగా వేయడానికి సాబులో (వరుసలో) 2 సార్లు ఎదురుబదురు దిక్కులలో రిడ్జర్ ని ఉపయోగించాలి. ముందు వెళ్ళేటప్పుడు కుడివైపుకు, వెనుకకు తిరిగేటప్పుడు ఎడమ వైపుకు మట్టిని త్రోస్తుంది.

చిన్న తోటలలో కూరగాయల తోటలలో ఒకటి లేదా రెండు గాలి కుంటిని (Single wheel or double wheel) (చిత్రం 5.25) రిడ్జర్ వేరు భాగాన్ని వేర్చి కుంటిని త్రోసి బోదే వేయాలి. లేదా డ్రా హోరును (చిత్రం 6.8) లాగి మట్టిని వరుసగా త్రోయ్యాలి. లేదా చేతి పారతో బోదే వేయాలి.

5. పై ఎరువును వేయడం (Top dressing) రసాయనిక ఎరువును, అందుకోనూ నత్రజని ఎరువును ఒకేసారి వేస్తే, నీరు పోసినప్పుడంతా పోషకాలు కొంచెం కొంచెంగా కరిగి క్రింది పొరలకు ఇంకి, నాశనం అవుతుంది. లేదా మొక్క లేతగా వున్నప్పుడు వాటి వేరులు ఎక్కువగా వ్యాపించకుండా ఉండటం చేత వేసిన పోషకాలనన్నింటిని గ్రహించలేవు. అందుచేత నత్రజని ఎరువును రెండు, మూడుసార్లు పై ఎరువుగా వేయాల్సి వస్తుంది. (చూడండి - సస్య పోషణ ఎరువులు పైన ఎరువులు వేయడం).

కొన్ని మొక్కలకు ఎరువును నీటిలో కరిగించి, చల్లొచ్చు. దీన్ని పత్ర పోషణ అని అంటారు. దీన్ని 10-15 రోజులకు ఒకసారి చిలకరించాలి. (చూడండి ఎరువులు వేయడం, పత్ర పోషణ - Foliar spray).

6. ఎరువు వేయడం, కడ్డీలను ఊతగా పెట్టడం (Staking) : మొక్కల్ని నిలబెట్టడం : ఇది ఆలంకారిక మొక్కలకి, కూరగాయల మొక్కలకి అత్యవసరమైన వని. ఇవి కొద్ది అవధి మొలకలు. అందుచేత వీటి కాండాల దారు రోపల చెట్టు పెరిగే అవకాశం లేదు. అందుచేత ఈ మృదు మొలకల మొక్కలు త్వరగా వడిపోతాయి. పడ్డ మొక్కలలో ఫలం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. పువ్వుల మొక్కలలో పువ్వులు లేచి వికసింపి కనబడడానికి వీటికి ఎరువులు వేయాల్సి వస్తుంది. కర్రలను సరిగ్గా ఊని కడతే మొక్కల సౌందర్యం పువ్వుల వైభవం ఎక్కువ అవుతుంది. కర్రల నాణాకుగ, గట్టిగా, గుండ్రంగా, నయంగా ఉండాలి. ఇవి మొక్కల కన్నా ఎత్తు ఉండకూడదు. ప్రాముఖ్యంగా కనిపించకూడదు. అకులతో మూసుకు పోయేట్లు కర్రని నాటాలి. వీలైతే కర్రలకు వచ్చని రంగు పూస్తే, మంచిది.



కర్రలను పెదురు లేదా గాజాతో నేరుగా చీల్చి, సరిగా కత్తిరించి, చీలికను తీసి, నునుపు చేసి, క్రింద భాగాన్ని మొనదేల్చి, మొలకెత్తే కాలానికి ముందే కట్టం కట్టి ఒక దారిని ఏర్పరచుకొని ఉంచుకోవాలి. పువ్వు మొగ్గతోడిగిన తర్వాత, ఈ పనులను మొదలు పెట్టడం సరైన వద్దలి కాదు.

గ్లాడియోల్స్, డేలియ మొదలైన దుంప పెరుగుదలకు, మొలకలు పోతేటప్పుడు కర్రలను పెట్టాలి. మొక్క పెరిగిన తర్వాత నాటితే దుంపలకు దెబ్బ తగలవచ్చు.

స్వీట్ పీ (పువ్వు బరాణి) మొదలైన గుంపుగా పెరిగేడి, పైకి ప్రాకెడి మొక్కలకు అక్కడికక్కడే కర్రని నాటడమే కాకుండా, అడ్డు కర్రలను బిగించాల్సి ఉంటుంది.

7. పేరు వీటి లేదా లేబిల్ రాయడం (Labelling) : తోటలో, అందులోనూ అలంకారపు తోటలో, మొక్కల జాతి, వైరిటీ (ప్రభేదం) మొదలైన వాటిని రాసేది సత్సంప్రదాయం. పాశ్చాత్య దేశాలలో అన్ని చోట్లా ప్రాస్తున్నారు. పేరు లేని మొక్క యజమాని లేని కుక్క అక్కడి ప్రజలకు నచ్చదు. పేరు రాసిన చీటీ పెట్టడం చేత జ్ఞానార్జన మాత్రమే కాదు, జాతులను, ప్రభేదాలను, గుర్తించడానికి, వేరే వేరే జాతులను తెప్పించడానికి అనుకూలం. ఈ సంప్రదాయాన్ని మన తోటమాలలు గుడ్డిగా అనుసరిస్తున్నారే తప్ప, మన తోటలకుగానీ, మన తోటమాలలకు గానీ పూర్వ పరిచయం లేదు.

8. మొక్కల రక్షణ (Plant Protection) : కష్టనాడి డబ్బుపోసి, ఎరువులు వేసి, పెంచిన మొక్కల్ని వాటి శత్రువుల బారి నుండి ఆనగా వివరితమైన వర్షాలు, ఎండలు, గాలి, కలుపులు, కీటకాలు (పురుగులు), రోగాలు, వషులు, కోతులు, దొంగల బారి నుండి రక్షించలేక పోతే ఫలితం చేతికందదు. మొక్కల రక్షణ విత్తునాటిన నాటి నుండి కోత కోసి, సేకరించేంత వరకు సర్వం సరిగ్గా జరుగుతూనే ఉండాలి. ఈ రక్షణ వివరాలు “సస్య రక్షణ” అనే అధ్యాయంలో ఇవ్వబడినవి.

9. ఖండనం (Pruning) : ఇది తోటలో అందులోనూ అలంకారపు మొక్కలు, పళ్ల తోటలో ముఖ్యమైన పనులలో ఒకటి. ఇటువంటి మొక్కల్ని యుక్తమైన విధంగా ఖండనం (కోయటం) చేయకపోతే, తోట నుంచి సంపూర్ణ ఫలితం, లాభాన్ని పొందలేము. అందుచేత ఈ విషయం సుదీర్ఘంగా “మొక్కల ఖండన” అనే అధ్యాయంలో వివరించబడింది.

10. నీళ్ళను పోయడం (Irrigation) : దీని గురించి ఈ అధ్యాయంలోనే చాలా స్థూల వివరణ ఇంతకు ముందే యివ్వబడింది. ఎక్కువ వివరాలు వళ్ళ, కూరగాయలు గురించి తెలిపేటప్పుడు (ముందు రాబోయే అధ్యాయంలో) తెలుపబడుతుంది. అలాగే కోయడం, అమ్మడం, తోట ఉత్పన్నాలు వాటి పరిష్కారాలు, సేకరించే వివరాలు ఆయా మొక్కల పెంపకాలను గురించి తెలిపేటప్పుడు వివరించబడతాయి.

11. సస్యోత్పాదన (Plant propagation) : ఇది ప్రతి తోటలోను జరగాల్సిన పని. అంతేకాదు ప్రతి తోటమాలి స్పష్టంగా తెలుసుకొని ఉండాల్సిన విషయం. ఆ విధంగా చేయకపోతే మన తోటలు ఎప్పటికీ పండవు. మన తోట పనులు జరగవు. అందుచేత ఈ విషయాన్ని అనేక చిత్రాలతో సహా “సస్యోత్పాదన” అనే అధ్యాయంలో చర్చించినాము.

## నీళ్లు మరియు సస్య జీవనం

నీరు మొక్కలకి అత్యవసరమైన పదార్థం. సస్య నిర్మాణం, సస్య క్రియ, సస్యారోగ్యం, ఫలోత్పత్తి వీటి అన్నింటిలోనూ నీళ్లు పాత్ర ప్రధానమైంది.

మొక్కల శరీరపు చాలా భాగాలు జలమయమే. జీవ కోశాల జీవరసాల బహు భాగాలు జలపూరితాలే. నీళ్లు తగినంత ప్రమాణం (కొలతలో) లభించకపోతే జీవకోశాల వృద్ధి, సస్యాల పెరుగుదల కుంచించుకు (తగ్గి) పోతుంది. ఆకులు మొదలైన అంగాలు వాడిపోతాయి. క్రమేణ సస్య క్రియలు నిలిచి పోతాయి.

సస్య పోషణ జరిగేది నీటి ద్వారానే. మట్టిలో ఉండే ఖనిజ పోషకాలు - నత్రజని, భాస్వరం (పాస్ఫరస్), పొటాషియం మొదలైనవి వేరులకు లోపల వెళ్ళడానికి, అవి మట్టి కణాల చుట్టూ ఉండే నీటి పారలో కరగాలి (చూడండి సస్యశ్రేణి). లేకపోయినచో అవి మొక్కలకి అందివ్వ జాలవు. అదే విధంగా సస్యపోషకాలు వేరు ద్వారా కాండ భాగాలకు, కాండం నుంచి వేరు భాగాలకి వెళ్ళేది ప్రవ రూపంలోనే.

వేరుల ద్వారా పీల్చుకొన్న నీళ్లంతా మొక్కలకి అవసరం లేదు. అధికమైన నీళ్లు పత్ర రంధ్రాల ద్వారా వెలువరికి వెళ్ళిపోతాయి. (చూడండి - సస్య జీవనం - ఆకుల పనులు). ఇది చాలా అవసరమైన పని (అత్యవసర క్రియ). మొక్కలకి నీటి కొరత ఏర్పడినప్పుడు జల నష్టాన్ని తక్కువ చేసుకోవడానికి పత్ర రంధ్రాలు చిన్నవవుతాయి. లేదా పూర్తిగా మూసుకు పోతాయి. ఈ విధంగా అయితే, ఆకులు గాలిలోని కాల్షిన్‌డై ఆక్సైడును గ్రహించ జాలవు. (చూడండి - సస్య జీవనం - కిరణ జన్య సంయోగ క్రియ - ద్యుతి సంశ్లేషణం). చాలినంత కాల్షిన్‌డై ఆక్సైడు లేకపోతే, సస్యహార తయారవడం నిలిచిపోతుంది. ఈ కొరత చాలా కాలం లేదా పదే పదే ఉంటే మొక్కల పెరుగుదల, ఫలోత్పత్తి, సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది.

అందుచేత మొక్కల నిర్మాణం, పోషణ, వృద్ధి, ఆరోగ్యం, ఫలసామర్థ్యం, సమర్థవంతంగా జరగడానికి మొక్కలకు నీటిని అందివ్వాలి. ఈ నీరు మొలకెత్తడానికి, పెరగడానికి, వృద్ధి చెందడానికి, మొక్క యొక్క ప్రతి పనికి కావల్సి వస్తుంది. ఇది లేకుండా మొక్కలు బ్రతక లేవు.

సస్య జీవనానికి కాకుండా, సస్య శ్రేణిలో జరిగే అనేక కృషి పనులకూ, నీళ్లు కావాలి. మట్టిలో విత్తు నాటడానికి సిద్ధపరచడానికి నడిపించే పూర్వ కృషి పనులకు మట్టిలో చాలినంత తేమ ఉండాలి. (చూడండి - సస్యశ్రేణి, పూర్వ కృషి - చదును) విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి, మొక్క పెరగడానికి, నీళ్లు కావాలి. చిన్న మొక్కలకంటా నీళ్లు అత్యవసరం. ఎందుకంటే ఇవి పెద్ద చెట్లవలే నీటి అభావం తట్టుకోలేవు. చాలినంత వేరులు లేకపోవడం చేత, నీటికి అప్పుడప్పుడు నీటిని పోస్తూండాలి. అంతేకాకుండా, మొక్కలు త్వరగా సొంతంగా (బీజపు భ్రూణాహారం ముగిసి ముందే, అయిపోవడానికి ముందుగా) పెరగడానికి అని ఎక్కువ పోషకాలను పీల్చుకోవాలి. దీనికి మట్టిలో చాలినంత జలాంశం ఉండాలి.

మొక్కల ద్వారా ఎక్కువ లాభాన్ని పొందడానికి, ఎరువులను వేస్తే మాత్రం చాలదు. సాధారణంగా మరు ప్రదేశపు నేలలు ఎక్కువ పోషకాలతో ఉంటాయి. అయినా ఈ నేలలో పెరగడానికి ఉన్న జలాంశం తక్కువ. దీనికి కారణం నీటి అభావం (కొరత). అందుచేత మట్టిలో కావల్సినంత జలాంశముంటే తప్ప, ఖర్చు పెట్టి,

శ్రమ పడి, దానికోసమే రసాయనిక ఎరువులను వేయడానికి వెనుక ముందు ఆలోచించాల్సి వస్తోంది. నీటి సరఫరా సమర్థవంతంగా ఉంటే రసాయనిక ఎరువుల పోషకాలు లోపలికి చేరుతాయి. దాని ద్వారా మొక్కల పెరుగుదల ఫల ఉత్పన్నాలు అధికమవుతాయి.

కొన్ని మొక్కలు పెరిగిన తర్వాత కొంతవరకు, తాత్కాలికంగా నీటి కొరతను భరించగలవు. ఉదాహరణకు 2 - 2½ - నెలల జొన్నలు నీటి కొరతను (ఇమాన్సి) కొద్దిగా ఎదిరిస్తాయి. అప్పుడు దాని ఆకులు సుష్ణంగా (గుండ్రంగా) జడంగా ఉండి పోతాయి. కాని ఏ మొలకలకైనా పువ్వులు వికసింపి, కాయలు కాసే కాలంలో నీటి అవశ్యకత ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఆ కాలంలో మట్టిలో చాలినంత జలాంశ లేకపోయినట్లైతే, ధాన్యాలు, పలాలు పుద్ది చెందలేవు. బల్లిపైత నొందపు (బలియలేపు). సస్య జీవనంలో ఈ పువ్వు, కాయల కాలమే పెద్ద విశేషమజిలి (Grand phase). ఈ స్థాయిలో అవి నీటిని అధికంగా గ్రహిస్తాయి. మొక్కలు చేతికి అంది వచ్చేది, లేనిది ఆ కాలపు వర్షం లేదా నీటి సరఫరా మీద ఆధారపడి వుంటుంది.

తోట నీటాశ్రయంతో పెరిగేది మొక్కలలో ఫలోత్పత్తి ఎక్కువగా వుంటుంది. ఆ మొక్కలకి సదా సర్వ కాలాలలోనూ, వేరులకు, కాండాలకూ చాలినంత నీళ్లు లభించడంతో, వాటి పెరుగుదల సంతృప్తికరంగా వుంటుంది. నీటి సౌకర్యం ఉంటే మొక్కలు ఎంత ఎక్కువగా ఫలాన్నిస్తాయనే విషయం ఈ క్రింది పట్టికలో సూచించబడింది.

వ.నెం.	మొక్కలు	పొలంలోని మొక్కల సాధారణ ఫలోత్పత్తి (పౌండ్లు)	నీటి సరఫరా సంతృప్తికరంగా ఉండే మొక్కలిచ్చే ఫలోత్పత్తి (పౌండ్లు)
1.	జొన్నలు	700-800	1500-1600
2.	రాగులు	900	2000-2500
3.	వేరు శనగలు	1000	2000
4.	మిరపకాయలు	250	1500
5.	పొగాకు	500	1500

అంటే నీటి సౌకర్యం ఉంటే, మొక్కలలో ఫలోత్పత్తి రెండు, మూడింతలు ఎక్కువగానే ఉంటుంది. (సాధారణ ఫలోత్పత్తికన్నా రెండు, మూడింతలు ఎక్కువ ఫలోత్పత్తిని చేస్తుంది).

ప్రతి నేలలోనూ, తోటలోనూ నీటి సౌకర్యం ఉంటుందని చెప్పలేము. బంక మట్టిలో, నల్ల రేగడి నేలలో నీటి వనతి, నీటావిరి చాలా తలనొప్పి వ్యవహారం. ఇసుక, గోడ మట్టి సామాన్యంగా నీరావరికి యోగ్యమైనవి. ఇసుక గోడు (ఒండ్రు మట్టి) అతి శ్రేష్ఠమైంది. కాని, ఈ మట్టి క్రింద భాగంలో 1½ - 1¼ మీ. లోతులో అభేద్యమైన పారుంటే, రాళ్లుంటే, నీళ్లు ఇంకక, మట్టిలో తేమాంశం ఎక్కువై, మొక్కలు నాశనమవుతాయి.

ఇకపూరితాలైన భూమి (ఉప్పున్న నేల) నీరావరికి యోగ్యమైంది కాదు. నీరు పోస్తే, భూమి లోని లవణాలు (ఉప్పు) కరిగి మొక్కల్ని నాశనం చేస్తాయి.

ఏ మట్టైతే బాగా నీరును పీల్చుకోగలుగుతుందో, ఆ ఇంకిన నీళ్లు మొక్కలకు చాలినంత తేమాంశాన్ని మిగిల్చి ఇవ్వగలుగుతాయో, అటువంటి మట్టి నీరావరికి యోగ్యమైంది. నీళ్లు పోసిన 24 గంటలలో సుమారు 60-90 సెం.మీ. లోతుకు నీటిని ఏ మట్టైతే పీల్చుకోగలుగుతుందో అది నీరావరికి యోగ్యమైంది. కొన్ని భూములలో బంక మిశ్రిత మట్టిలో అదే అవధిలో 30 సెం.మీ. లోతుకు నీళ్లు ఇంకవు. క్రిందకు దిగవు. ఈ లోతుకన్నా క్రిందున్న మొక్కలకు పోసిన నీళ్లు ఉపయోగపడవు. ఇంకా ఇసుక మట్టిలో నీళ్లు చాలా త్వరగా పేరులకు అందనంత వేగంగా క్రిందకు దిగి ఎండిపోవడమో, ఇంకి పోవడమో జరుగుతుంది. దాంతో ఆ నీళ్లు కూడా మొక్కలకు అందవు (చిత్రం 6.14).

6.14 నీరు ఏ మట్టిలో ఎన్ని అడుగుల లోతుకు (వల్లానికి) ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో దిగుతుంది అనే విషయాన్ని సూచించే చిత్రం 1', 2' ... నీళ్లు దిగే తీరు, A. బంక మట్టిలో, B. గోడు మట్టిలో, C. ఇసుకలో. త్వరగా దిగిపోయేది ఇసుకలో, నిదానంగా దిగేది బంకమట్టిలో.

వేర్ల సమూహం ఉన్న మట్టి పొరలలో అభేద్యమైన పొర ఉంటే పేరులు కూడా వ్యాపించవు. పై పొరలకు జేడు ఎక్కుతుంది (జిగురు, ఇత్యాదులతో పై పొర గట్టి పడుతుంది). అదే విధంగా ఈ పేరుల సమూహం పెరిగే వైపు, రాళ్ళు, ఒండ్రు ఇసుక ఉంటే నీళ్లు త్వరగా ఆవిరై నాశనమై పోతాయి. మొక్కలకు చాలినంత నీళ్లు లభించకపోవచ్చు.

నీళ్లు భూమిలో బాగా ఇంకిపోక పోతే, ఆ నీళ్లు పోవడానికి కాలవలను శ్రవ్య ఆ నేలను నీరావిరికి అనుకూలమైన నేలగా మార్చుకోవచ్చు. మొదటి రెండు సంవత్సరాలు ఎక్కువగా నీటిని పోసి, అందులో హానికరమైన లవణాలు కరిగి, ఇంకి, నీటికాలువలో చేరేటట్టుగా చేయాలి. ఈ విషయమై ఎక్కువ వివరాలు పళ్ల తోటల వ్యవస్థలను వివరించేటప్పుడు (ముందు రాబోయే అధ్యాయంలో) తెలుపబడతాయి.

భూములకు నీటిని సరఫరా చేయడం

జలాశయాలు, చెరువుల ద్వారా నీటి గొట్టాల సహాయంతోనూ, చెరువులకు ఇత్యాది జలాశయాలకు కాలువల ద్వారానో, బావులకు చిన్నకాలువలు శ్రవ్య, దాని ద్వారా తోటలకు, భూములకు నీటిని సరఫరా చేయొచ్చు. తోటలలో ఉన్న కాలువల నీళ్లు మొక్కలకు అందుబాటులో లేకపోతే వాటి నీళ్లు వ్యర్థమవుతాయి. తోటలలో కాలువలకన్నా పైవులను ఉపయోగించడం మంచిది. ఇటీవల కాలంలో పాలిథిన్ పైవులు అతి చౌక ధరలో లభించడంతో నీటిని తోటమూలల్లో జోడించుకొని తోటలో ఏ వైపు, ఏ చెట్టుకు నీళ్లు కావల్సి వస్తే, వాటికి నీళ్లు పెట్టవచ్చు. ఈ పైవులను కొనలేనివారు కాలువను రెండు వైపుల ఇటుకలతో కట్టి, వీలైతే సిమెంటునుపయోగించి, నీళ్లు వ్యర్థం అవుతుండా చూసుకోవాలి. బావి నీళ్లనుపయోగించే వారంతా నీళ్లు కొద్దిగా కూడా నాశనం కాకుండా చూసుకోవాలి. ఇది సాధ్యం కాకపోతే, ప్లాస్టిక్ షీట్లను కాలువలకు వేసి, దానిపైన నీళ్లు పారే వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.

క్రింది నుంచి పైకి నీళ్లు తోడడానికి మనలో మూడు రకాల వ్యవస్థలున్నాయి. 1. ఏతం, 2. కపిల, 3. పంపు. ఉత్తర భారత దేశంలో ఈ విధంగా చేయడానికి పర్షియన్ పీలును వాడుతారు. ఇదేరకపు చిన్న రహతు (Rahats)లను మన వ్యవసాయ కార్యాలయము వారు తెప్పించి, అందరికీ పంపిస్తున్నారు.

ఈ నీళ్లు ఎత్తే సాధనాలలో ఆత్యంత సరళమైంది, ఎక్కువ సులభమైంది, ఏతం. పొడవైన ఒక వెదురు బొంగునో, సర్వే చెట్టు యొక్క కర్రనో, ఒక చీలికైన కర్రపైన (రాతిది/చెట్టుది) ఊగేటట్టు పెట్టి, ఒక చివర బరువుని (రాయి, లేదా కలిపిన మట్టి ముద్దని) పెట్టి మరొక చివర వెదురు కడుతారు. వెదురు చివర క్రింద అడే పాత్రని కడతారు. వెదురును వంచి బావిలోవలకు పెడతారు. పాత్రలో నీళ్లు నిండిన తర్వాత పైకి లాగుతారు. వెదురు (బొంగు) యొక్క ఇంకొక్క కొన బరువు చేత పాత్ర పైకి సులభంగా ఎక్కుతుంది. పాత్రను దోర్లించినప్పుడు అందులోని నీరు కాలువలో పడుతుంది. ఈ నీటిని తోటకు పారిస్తారు. ఈ పని ఇంకొంచెం సులభంగా చేయడానికి మరొక చీలిన కర్రపైన దాన్ని వట్టుకొని పాత్రని దింపేటప్పుడు బావి నుండి ఎత్తేటప్పుడు బరువున్న వైపు అడుగున పెడుతూ ఉంచారు.

ఏతం నుంచి 20 అడుగుల లోతున బావి నుంచి, నీళ్లను తోడవచ్చు. ఒక పాత్రలో (బానలో) 2-6 గ్యాలన్ల నీళ్లు పట్టుతాయి. ఒక గంటకి 20 అడుగుల లోతు నుంచి సుమారు 2,000 గ్యాలన్ల నీళ్లను తోడవచ్చు.

కపిల నిర్మాణం కూడా సరళమైంది. అంతేకాకుండా దీని సామర్థ్యం ఎక్కువ. ఒకసారికి 40-50 గ్యాలనుల నీళ్లను లేదా గంటకి 3,500 గ్యాలన్ల నీళ్లను తోడి చేయగలుగుతుంది.

పంపులు : యుద్ధానంతరం బావి నుంచి నీరు తోడడానికి నూనె లేదా విద్యుత్ పంపుల వాడుక రోజు రోజుకి ఎక్కువ అవుతోంది. పంపులు సామాన్యంగా, లోతులేని (దిగుడు బావులు) బావులకు అంత ఉపయోగముండదు. చిన్న పంపైనా గంటకి 3-4 వేల గ్యాలన్ల నీటిని తోడుతుంది. దిగుడు లేదా లోతు లేని బావులు ఇంత నీటిని అందివ్వలేవు. పెద్ద పంపులు గంటకి 10-11 వేల గ్యాలన్ల నీటిని (3-4 కపిలల అంత) తోడి సామర్థ్యం కలిగి వుంటాయి. అందుచేత, బావుల లోతు, వెడల్పు, నీటి వనతి మానుకొని పంపులను చేయడం మంచిదేనా అని నిర్ధారించుకోవాలి. చిన్న బావులకు ఏతం సరిపోతుంది. సుమారు 30 అడుగులకన్నా ఎక్కువ లోతుంటే, జల వనతి బాగుంటే దానికి పెద్ద పంపు జోడించవచ్చు.

**నీళ్లను భూములకు పారించడం**

భూములకు నీటిని అనేక రీతులలో పారిస్తారు. ఆచరణలో ఉన్న ముఖ్యమైన క్రమాలు ఈ క్రింద ఇవ్వబడినది. 1. ఏకంగా పారించడం (Flooding) 2. సాలులలో (వరుసలలో) (Furrow Irrigation / నీటిని పారించడం) 3. పాడులకు పాయ్యడం (Basin Irrigation) 4. మడులకు నీటి సరఫరా చేయడం (Basin cum flood Irrigation).

భూములకు నీటిని చల్లే వద్దతి నీటి వసతులు లేనివారు అనుసరించే వద్దతి. కాని చెరువు, బావి, కోనేరులున్నచోట ఈ వద్దతి అసాధ్యం. అనుసరించడానికి కష్టతరమైంది. ఈ చల్లే వద్దతి ద్వారా ఎక్కువ నీళ్లు పొడవుతాయి. నీటిని చల్లి తీరాలంటే అక్కడికక్కడే చిన్న గుంటలను త్రవ్వ నీటికి నీళ్లు వదిలి తట్టల ద్వారానో, బిందె వంటి పాత్రలతో ఎత్తి చల్లవచ్చు. ఈ విధంగా చేస్తే తడి మిగలదు. తేమ త్వరగా ఎండి, నేల త్వరగా చదునుగా అవుతుంది.

సాలు (వరుసలకు) నీటి సరఫరా : సాలులలో పెంచే కూరగాయలు, బంగాళా దుంచలు, రాగులు, మొదలైన వాటికి పారించే నీటి సరఫరా మంచిది. మొలకలకు నీళ్లు సాఫీగా పారడానికి కాలువలను ఎక్కువ లోతు లేకుండా

త్రవ్వతారు. ఈ కాలువ నీటికి అడ్డువేసి, సాులకు వదలాలి. సాులలో నీళ్లు నిండిన తక్షణం నీటిని ప్రక్కనున్న సాులకు త్రిప్పాలి. ఈ విధంగా అన్ని సాులకు ఒకటైన తర్వాత మరొక దానికి నీటిని కట్టాలి.

పాదుల క్రమాన్ని వళ్ల, కూరగాయల తోటలలో అనుసరిస్తారు. (చిత్రం 6.15) మొక్కల, లేదా చెట్ల సాులు (వరుస) మధ్య నీటి కాలువ ఉంటుంది. మొక్కల, చెట్ల చుట్టూ పాదులు తీసి, కాలువ నుంచి పాదులకు అన్నింటికి నీటిని పారిస్తారు.

6.15 నీటిని గుండ్రని పాదులకు పారించే క్రమం.



మడులకు నీరు సరఫరా క్రమంలో నేలను చిన్న చిన్న పాదులుగా విభజిస్తారు. ప్రతి మడిలోను మట్టిని బాగా సమ మట్టానికి తెస్తారు. ఒక మడికి నీరు పారించి అది నిండిన తర్వాత ప్రక్క మడికి నీటిని వదులుతారు. రెండు మడుల మధ్య నీటి కాలువ ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, తెల్లగడ్డలు, అకు కూరలు మొదలైన వాటికి ఈ క్రమాన్ని సామాన్యంగా అనుసరిస్తుంటారు. ఇందులోనూ కొద్దిగా నీళ్లు వ్యర్థమవుతాయి. ఎక్కువ నీళ్లు నిలిచిపోయేట్టుగా ఉండకూడదు.

నీళ్లను భూమిలో పారించడం చేత మట్టి కణాల కుదురు చెడుతుంది. కణాలు తలక్రిందులై, ఒకదానితో మరొకటి చేరుకుంటుంది. గాలి, నీరు దూరకుండేట్టుగా పై పొర లేదా త్రుప్పు Crust గడ్డపొర ఏర్పడుతుంది. ఈ పొరను అప్పుడప్పుడు త్రవ్వతూండాలి.

ఈ అనుకూలాన్ని తప్పించడానికి, అమూల్యమైన నీళ్లు వ్యర్థమవుకుండా ఉండడానికి అమెరికా మొదలైన విదేశాలలో ఉప (Sub-Irrigation) నీటి సరఫరా క్రమాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. నేలలో అక్కడికక్కడే వెడలైన కొద్దిగా, లోతున్న మడులను త్రవ్వి, క్రింద నీళ్లు ఇంకిపోకుండా, బంక లేదా, సిమెంటును పూసి, లేదా ప్లాస్టిక్ షీట్ ని వేసి (వరచి) మడులను నీటితో నింపుతారు. నీరు నిదానంగా చుట్టు ప్రక్కల మట్టిని తడుపుతుంది. మట్టి తేమాంశాన్ని గ్రహించి, వేర్లకు అందిస్తుంది. నీరు అచిరే నాశనమయ్యే అవకాశం లేదు.

విదేశాలలో మరొక క్రమాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. ఇది చల్లై లేదా తుషార నీరావరి (Sprinkler Irrigation). నేలపైన ప్లాస్టిక్ పైపులను అక్కడికక్కడే జోడించి, అక్కడ చల్లై ఉపకరణాల్ని (Sprinklers) జోడించి, పైపులో నీటిని వదులుతారు. ఈ నీళ్లు వర్షం లాగా చుట్టు ప్రక్కలా పడతాయి. పైపుకు నీళ్లు ఒత్తిడితో రావడానికి దీన్ని ఒక పంపుకు జోడించాలి.

పెరటి తోటలలో నీళ్లు పారించడానికి హోప్ పైపులను, నీటి తొట్టెలను (Water cans) లేదా బిందెలను ఉపయోగిస్తారు. బిందెల నుంచి నీటిని పోసి క్రమం చాలా చెడ్డ వద్దతి. ఈ వద్దతి చేత ఎక్కువ నీళ్లు నాశనం (పాడు) అవ్వడమే కాకుండా, మొక్కలకు హాని కలుగుతుంది. దీనికి కారణం అనేక మొక్కలకి నీళ్లు స్నానం (తడి) జరుగదు. అవి నీటిని అపేక్షించడమనేది వేర్ల వలయలో, పై భాగపు కొనలలో కాదు. అంతేకాకుండా బిందె నుంచి నీళ్లను పోసేటప్పుడు మట్టి తగ్గుతుంది (ప్రక్కకు జరిగిపోతుంది).



నీటి తొట్టెలు (బకెట్లు, వాటర్ క్యాన్స్) ద్వారా మొక్కల క్రింద భాగానికి మాత్రం నీళ్లు పోయవచ్చు. (పువ్వులను తీసిన తర్వాత). ఒత్తుగా పెరిగేడి మొక్కలకి గడ్డి పరుపులకు పువ్వులతో సహా నీటిని పోయ్యవచ్చు. వివిధ రకాల నీటి తొట్టెలు పువ్వులు (నీటిని చిమ్మునవి) చిత్రాలు 5.39 a & b లలో చూడవచ్చు. (6.16 చిత్రం.)

6.16 చల్లడం, లేదా తుషార నీరావరి (Sprinkler Irrigation).

హోస్ ద్వారా వేయడం చాలా సులభం. నీరు నాశనం కాదు. కాని దీనికి కొళాయి ఉండాలి. కొళాయి సౌకర్యం లేకపోతే, నీటి తొట్టెల సహాయంతో నీటిని సరఫరా చేయాలి.

మొక్కలకు నీటిని ఎప్పుడు వెయ్యాలి? పై భాగాన్ని తడవకుండా, నీటిని వేసేట్టుయితే ప్రొద్దునగానీ, సాయంకాలంగానీ వెయ్యాలి (పొయ్యాలి). వేసవి కాలంలో ప్రొద్దున్నే పోయడం మంచిది. నీటిని వరుసగా తొట్టెల పువ్వులకు, మడులకు వేసేట్టే, సాయంకాలం పొయ్యాలి. ఎందుకంటే ఆకులపై నిలిచే నీటి తుంపర్లు వేడికి (ఎండకు) భూతద్దంలాగా పనిచేసి సూర్యరశ్మిని కేంద్రీకరించి ఆకులను కాల్చవచ్చు. సాయంకాలం పోస్తే, ఈ రకపు భయం ఉండదు. కాని చలికాలంలో సాయంకాలం ఆకుపైన నీళ్లు నిలుస్తే ఈష్టు, బూజు వట్టిటటువంటి రోగాలు వస్తాయనే భీతుంటుంది.

ఆకు మొక్కలకి (foliage) అప్పుడప్పుడూ అందులోనూ వేసవికాలంలో ఆకుపైన సిరంజాతోన్, ఫ్ట్రాతోన్ నీళ్లు చల్లితే, దానిపైనున్న దుమ్ము పోయి తళ తళ మెరుస్తూంటాయి.

నీరావరి విషయమై ఎక్కువ వివరాలు రాబోయే అధ్యాయంలో మొక్కల గురించి వివరించేటప్పుడు విశదపరచబడుతుంది.



## విడవ అధ్యాయము

### కుండీల కృషి (Pot Culture)

తోటలో ఎన్నో కార్యాలకు (పనులకు) కుండీలనువయోగించాల్సి ఉంటుంది. విత్తనాలు వేసి నారు తీయడానికి, సన్నటి నారును గ్రుచ్చి, మొక్కలు నాటడానికి, చెట్లను పెంచడానికి, అంటుకట్టి మొక్కలని తయారు చేయడానికి కుండీలనువయోగిస్తారు. పాదులు మొదలైన వాటి నుండి మట్టిని త్రవ్వి మెరుగువరచి, సారవంతమైన మట్టిలో విత్తనాలను చల్లడానికి/నాటడానికి సిద్ధపరుస్తారు. ఆ మట్టిని కుండీల నిండా నింపి సిద్ధపరచాలి. కుండీలోని మట్టిని మనకు ఇష్టమొచ్చిన రీతిలో మార్చుకోవచ్చు.

కుండీలలోని మొక్కలను నేలలో పాతితే, వాటి శోభ, సౌందర్యం చూడడానికి అవి పాతిన చోటుకే వెళ్లి చూడాల్సి ఉంటుంది. అదే కుండీలలోని మొక్కల్ని ఆ విధంగా వెళ్లి చూడాల్సిన అవసరముండదు. మనకు కావల్సిన చోటుకు వాటిని తెచ్చుకోవచ్చు. లేదా తీసుకెళ్లవచ్చు, మార్చుకోవచ్చు. ఇంటిలోపలికి, వరండాకి, డాబాపైకి, కిటికీలలోకి, మెట్లపైన, మేడపైన కుండీలను తీసుకెళ్ళడమే కాకుండా వాటిని మనకు ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో రంగు రంగు పువ్వులలో సమానత్వం ఉండి, వైవిధ్యత, పూరకత చూసి జితవరమకోవచ్చు.

నీటి సౌకర్యం ఎక్కువగా వుంటే, ఎక్కువ చెట్లను కుండీలలో పెంచుకోవచ్చు. కుండీలలోని చెట్లను వాన, ఎండ, గాలి మొదలైన వాటిద్వారా ఎదురయ్యే ప్రతికూలాల నుండి కాపాడుకోవచ్చు. కాబట్టి బయలులలో బ్రతకలేని బోగోనియా, గ్లారీనియా, క్యాక్టస్ మొదలైన సుకుమారమైన, కోమలమైన మొక్కలను కుండీలలో పెంచుకోవచ్చు. అదేవిధంగా కోమల సస్యాలు బతికేంత వరకు, బలం వచ్చేంత వరకు కుండీలలో పెట్టి పెంచుకోవచ్చును. వాటిని ఎల్లప్పుడూ చూసుకుంటూండవచ్చు. కొన్ని జాతుల అలంకార మొక్కలకి వగటి వేడిమి (ఎండ) అవసరమవుతుంది. మధ్యాహ్నపు ఎండ చెడును చేస్తుంది. ఇటువంటి మొక్కల్ని కుండీలలో పెంచితే ప్రాద్దున ఎండకు పెట్టి మధ్యాహ్నపు ఎండనుండి కాపాడవచ్చు.

కొన్ని కుండీలలో అనేక రకాల మొక్కల్ని పెంచుకోవచ్చు. కొన్ని రకాలు నేలమీద కన్నా కుండీలలో బాగా పెరగవచ్చు.

కుండీల కృషి చేత గృహ సస్యాలను (House Plants) ఇంటి గోడలపైన, కొనలలోనూ, మేజాలపైన అలంకారస్థాయిగా అమరేస్తే మొక్కల అందం, పువ్వుల రంగు, పరిమళం, గదిలో వ్యాపిస్తుంది. ఆశక్తివరులు, అంగవికలరూ, రోగులు, తోటల సుఖాన్ని తమ గదులలోనే అనుభవించవచ్చు. గార వేసిన లేదా సీమెంటు, రాళ్లు పజిచిన నేలపైన, గోడలపైన, ప్రక్కన పెట్టాలంటే, కుండీలకు హోల్డరును జతచేసి, పెట్టొచ్చు.

గోడలపైన, మేడలపైన, చూరులపైన తగిలించి మొక్కల్ని అలంకార వస్తువులుగా పెంచుకోవచ్చు. తోట పెంచడానికి స్థలం లేదని అనుకోవాల్సిన పనిలేదు. చిన్న ఇంటిలో నివసించేవారు, పట్టణ వాసులు, మేడలపై నివసించేవారు, అడ్మిట్టలో నివసించేవారు అందరూ కుండీల ద్వారా నర్సరీలా తోటలను తయారు చేసుకోవచ్చు. పువ్వు ప్రదర్శనలలో పాలువంచుకోడానికి, కుండీలలోనే మొక్కల్ని పెంచాల్సి వస్తుంది.

కొందరు నేలపైన మొక్కలు పెరిగినంత బాగా కుండీలలో పెరగవని భావిస్తుంటారు. నేలపైన మొక్కల వేర్లు విశాలంగా వ్యాప్తి చెంది, విశాల స్థలంలో ఉండడం చేత విస్తారంగా ఆహారాన్ని పొంది సాంపుగా పెరుగుతాయి. నిజమే, కాని అదే మొక్కల్ని అంతేకాలంలో అంతే సాంపుగా లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ అందంగా ఫలభరితంగా కుండీలలో పెంచుకోవచ్చు. ఎంతోమంది పెంచుతున్నారు. దీనికి కారణం, కుండీలలోని మట్టి కృత్రిమమైనది, మన మనస్సుకు తోచినట్టుగా కావల్సిన రీతిగా రూపొందించుకోవచ్చు. అందుచేత కుండీలలో మొక్కలు నేలపై పెరిగేది మొక్కలకన్నా తక్కువ రకానికి చెందినవని భావించనక్కరలేదు. అంతేకాకుండా దానికన్నా ఇంకా ఉత్తమంగాను, ఉండడానికి సాధ్యమౌతుంది. అలాగని కుండీలలోని మట్టిలో పోషకాల్ని ఎరువు రూపంలో ఎంతకావల్సి వస్తే అంత నింపుకోవచ్చు అనికాదు. ఆ విధంగా నింపితే మొక్కలు మరణిస్తాయి, మట్టిలో మితిమీరిన పోషక వదాల్కలుంటే మట్టి నుంచి వేర్లకు చేరడానికి బదులుగా, సిగ్గు కుండీ మట్టిని చేరి, మొక్క నాశనమవుతుంది.

ఈ విధంగా తోట వసులలో కుండీలలో మొక్కలు పెంచడం అనేక రీతులుగా అనుకూలమైంది. అవనరమైనదీను. కుండీలలో పెంచే మొక్కలు అన్ని కృత్రిమమైనవని మనం సదా గుర్తించుకోవాలి. వాటి వేళ్లు వ్యాపిస్తూ పెరగలేవు. కుండీలోని మట్టి తేమ, పోషకాలు, చాలా త్వరగా ఖర్చైపోతాయి. అందుచేత కుండీలలో మొక్కలు ఫలవంతంగా, విజయవంతంగా, పెంచుకోవాలంటే తగు జాగ్రత్తలో ఉంటూ, తోట పెంచకాన్ని చేయాలి వుంది. తోటవని కృత్రిమ కార్యక్రమమయితే కుండీలలో మొక్కలు పెంచడం ఇంకా కృత్రిమమవుతుంది. ఎందుకంటే మట్టికాకుండా, మొక్కలు పెరగడానికి వాతావరణం కూడా - వేడి (ఎండ) తేమ, వెలుతురు ఈ అంశాలన్నీ మనస్సులో పెట్టుకోవాలి. పెరగడానికి కావల్సిన విధంగా ఎక్కువగానో తక్కువగానో చేసుకోవచ్చు. కుండీలు :

కుండీలను బంకమట్టి (జేడుమట్టి)లో కాల్చి తయారు చేస్తారు. కాల్చినా వీటిలో కావల్సినంత కణాంతరాలు ఉండడం చేత నీటిని పీల్చుకోడానికి, నీటిని నిలువచేసుకోడానికి సాధ్యమవుతుంది.

కుండీని బాగా కాల్చుండాలి. అర్థం కాల్చిన కుండీ త్వరగా చీలిపోతుంది. బాగా కాలిందా లేదా అనే విషయం కాల్చగా వచ్చే రంగును బట్టి తెలుసుకోవచ్చు. కొందరు రంగుపూసి, అర్థం కాలిన కుండీలను అమ్ముతుంటారు. గోటితో కొడితే ఘంట శబ్దమిచ్చే కుండీలే బాగా కాల్చిన కుండీలు. కుండీల ప్రక్కన సొట్టలు గుంటలు లేకుండా నేరుగా వుండాలి. సొట్టలుంటే మొక్కలను పాతడం చాలా కష్టమవుతుంది. కుండీకున్న చిల్లు లావుగానూ, ఏకనమంగా వుండాలి. కుండీలనోరు (మూతి) క్రింది భాగం కన్నా అగలంగా వుంటుంది (విశాలంగా). ఈ విధంగా ఉండడంచేతనే, కుండీలలో మొక్కల్ని సులభంగా నాటడానికి, బయటకు తీయడానికి సాధ్యమవుతుంది. అందుచే కూజాలలోను, కూజా ఆకారాల వంటి కుండీలలో మొక్కల్ని పెంచరాదు. ఇవి, చూడడానికి అలంకారప్రాయంగా వుండినా, పెంచడానికి తగినదికాదు. కావల్సి వస్తే చిన్న కుండీలలో మొక్కను పెంచి, వీటిని ఆకారపు మట్టి కుండీలలో పెట్టవచ్చు. క్రింది భాగాలు బాగా వుండి, నోరు పై భాగం విశాలంగా వుంటే మొక్కల పెరుగుదలకు కావల్సినంత మట్టిని నింపడానికి సహాయకారిగా వుంటుంది.

సామాన్యంగా కుండీల నోటి (పై భాగం) వ్యాసం (వెడల్పు) కుండీలలోతు ఒకటిగానే వుంటుంది. కాని విత్తనాలు నాటడానికి వెడల్పు నోరు (30 సెం.మీ.లకు) తక్కువ ఎత్తున (సుమారు 10 సెం.మీ.)





సీడోహిన్, విత్తనాల తట్టలను తయారు చేస్తారు. వర్షిన, పోర్ట్‌లాక్ (Portulaca) మొదలైన, విస్తరించి పెరిగిడి మొక్కలు సుమారు 35-40 సెం.మీ. నోరు, 10-12 సెం.మీ. వ్యాసం కొలతలున్న కుండీలలో పెంచుతారు. అంటుగట్టుడానికి, చింత గింజలు, మామిడి బొక్క (బెంక), జామకాయ, బీజపు మొక్కలను (స్టాకులను) చిన్న నోరున్న కుండీలలో పెంచుతారు. వీటిని మామిడి బొక్క, చింత బొక్క అని బెంగుళూరు వైపు వ్యవహరిస్తారు. కొన్ని కుండీలను ప్రేలాడదీయడానికి అనుకూలంగా తయారు చేస్తారు (ప్రేలాడే కుండీలు) ఆర్కిడ్ మొదలైన వాటిని పెంచడానికి ప్రేలాడే కుండీల ప్రక్కలలో సన్నని రంధ్రాలను చేసుంటారు. వీటిని ఆర్కిడ్ చోకి అంటారు.

కుండీల కంఠం, బలంగా వుండేటట్టుగా లావుగా (మందంగా) తయారు చేస్తుంటారు. కొన్నింటికి అంచుంటుంది. కంఠం బయటికి చాచుంటుంది. వీటిని విత్తనానికి ఒక చోటు నుండి ఇంకొక చోటుకి సాగించడానికి చాలా సులభం. కాని ప్రదర్శనలలో కుండీలు ఒత్తుగా జోడించే ప్రమేయముండటంచేత, ప్రదర్శన కొరకు పెంచే మొక్కల్ని కంఠం లేని కుండీలలో పెంచడం మంచిది. చిత్రం 7-1లో వివిధ రకాల కుండీలను చిత్రించియున్నారు. ఎత్తయిన బోరియ నోరు అర్థ భాగం ఉంటే దాన్ని అర్థ బోకి (బెంగుళూరు వైపు కుండీలను బోకి అని వ్యవహరిస్తారు). అదే వ్యాసంతో ముప్పావుంటే ముప్పావు బోకి అని వ్యవహరిస్తున్నారు (Half pots and three quarter pots).

కుండీలను అనేక సైజులలో తయారు చేస్తారు. ఇంగ్లాండు మొదలగు చోట్ల ఈ సైజులకు పేరు పేరు పేర్లుంటాయి. ఒక నిర్దిష్ట ప్రమాణంలో (కొలతలో) బంక మట్టి నుంచి సన్నని/చిన్న కుండీలను ఎక్కువ సంఖ్యలోనూ, పెద్ద కుండీలను, కొద్దిపాటి సంఖ్యలోనూ చేయాల్సి వుంటుంది. ఈ సంఖ్యను అనుసరించి కుండీల సైజుని ఈ క్రింది విధంగా విభజించియున్నారు.

సైజు పేరు (Size Name)	కుండీల పొడవు (అంగుళాలలో)	కుండీల లోతు (అంగుళాలలో)
60*లు 60's చిన్న / సన్నం	2¾	3
60ల (మధ్యమం)	3	3¾
60ల (పెద్దవి)	3½	4
60ల పొడుగు లాంగ్ బాప్స్	3	4
54ల 54's సన్నని / చిన్న	4	4½
54ల 54's పొడవు	3½	4½
48ల 48's	4¾	5
40ల 40's	4½	5½
32ల 32's	6¼	6
28ల 28's	7	7
24ల 24's	7½	8
16ల 16's	8½	9
12ల 12's	10	10

\*60, 54, 48లంటే ఒక నిశ్చయైన మట్టి మద్ద (Cast) నుంచి 60, 54, 48 కుండీలను తయారు చేయవచ్చు అని అర్థం.



7.1

ఈ క్రింది పట్టికలో యింకను వివరించబడింది. (లోతు అంగుళాలలో)

వ్యాసం లోతు			వ్యాసం లోతు		
థింబల్ (Thimbles)	2	2	16's	8½	8
థంబ్స్ (Thumbs)	2½	2½	12's	11½	10
60's	3	3½	8's	12	11
48's	4½	5	6's	13	12
32's	6	6	4's	15	13
24's	8½	8	2's	18	14

పాశ్చాత్య దేశాలలో ఇప్పుడు సైజును నోటి వ్యాసానికి అనుగుణంగా 2 అంగుళాలతోపాటు - 10 అంగుళాల పాటు - అని వ్యవహరిస్తున్నారు.

ఆ సైజులు : 2", 3", 4", 5", 6", 8", 9", 12", 16", 18". (7.1 చిత్రం.)

7.1 వివిధ రకాల కుండీలు a. అంచులేని కుండీ, b. అంచు బయటికి వాచున్న కుండీలు, c. వట్టె కుండీలు, d. అలంకారపు అంచుగల కుండీ, e. పొడవు కుండీ - చింత లేదా పిండి కుండీలు, f. అర్థ బోకి (Half pot), g. బోజనం తట్టు, h. అర్చిడ్ కుండీలు.

బెంగళూరు మట్టు ప్రక్కలా, మునుపు కుండీల వెలకు అనుసరణంగా సైజులను కాసు బోకి, అర్థబా బోకి, అజా బోకి, రెండణాల బోకి, నాల్గణాల బోకి అనేవారు. ఇప్పటికీ బెంగళూరులోని తోటమాలలు ఇదే పేరుతో వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇది అసర్వనామంగా స్థిరపడిపోయినది. కానీ ఇటీవల కుండీల వ్యాసము ననుసరించి 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 అంగుళాల కుండీలు, అని పిలుస్తున్నారు.

కుండీల తయారు చేయుటలోని రహస్యం (గుట్టు)

వివిధ సైజుల కుండీలలో ఎంత మట్టి నింపవచ్చునే విషయం తెలుసుకుంటే కుండీల రహస్యం బట్టిబయలువుతుంది. ఒక కిరోపిన్ డబ్బా నిండా ఉండే మట్టి (½ ఋషల్, 4 గ్యాలన్లు లేదా 18 లీటర్ల మట్టి) మూడు అంగుళాల 50 కుండీలను నింపవచ్చు. 4½ అంగుళాల కుండీలైతే 25 కుండీలలో నింపవచ్చు. అదే 7 అంగుళాల కుండీలైతే కేవలం 10 కుండీలకు మాత్రమే చాలుతుంది. అంటే 7 అంగుళాల కుండీలలో 3 అంగుళాల కుండీలు 5 దాంట్లో వట్టే మట్టి ఉంటుంది. రెండింటిలోనూ ఒకేరకపు మట్టి మిశ్రమాన్ని నింపితే 7 అంగుళాల కుండీల మట్టిలో 3 అంగుళాల కుండీల మట్టిలో ఉండే దానికన్నా 5 రెట్లు ఎక్కువ సస్యపోషకాలుంటాయి. అందుచేత 7 అంగుళాల కుండీలో పెరిగేదే చెట్టు, ఎక్కువ పోషకాలుండటం చేత ఎక్కువ ఏవుగా పెరిగి ఎక్కువ ఫలమిస్తుంది. పువ్వులు కాయలు, పళ్ళి రూపంలో ఇదే ఫలితాన్ని హెచ్చు తగ్గులుగా చిన్న సైజు కుండీలలోనూ పొందడానికి సాధ్యమవుతుంది. అయితే అప్పుడప్పుడూ నీటిలో పోషకాల్ని (రసాయనిక ఎరువుల రూపంలో) అందిస్తూ వుండాలి. ఇది కుండీల కృషి రహస్యం. చిన్న కుండీలు ఎక్కువ ఫలవంతం కావడానికి మట్టి మిశ్రమాన్ని, ఎక్కువసార్లు పోషకాలను, నీటిని చేయాలి. పెద్ద కుండీలకు యిన్నిసార్లు

వేయవలసిన అవసరము లేదు. ఈ కారణాల వేతనే దీర్ఘ కాలపు మొక్కల్ని పెద్దకుండీలలోనూ, తక్కువ అవధి మొక్కల్ని చిన్న కుండీలలోనూ పెంచడం పరిపాటి.

పోశ్యాత్వ దేశాలలో అనేక రకాల మొక్కల్ని మనం ఇక్కడ 9 లేదా 12 అంగుళాల కుండీలలో పెంచెడి మొక్కల్ని వాళ్లు 4½-5 అంగుళాల కుండీలలో మనంత బాగా లేదా మనకన్నా ఎక్కువ బాగా పెంచుతున్నారు. ఈ విధంగా పెంచడానికి వెంట వెంటనే పోషకాల్ని, నీటిరువుల రూపంలో వేస్తుంటారు. వాళ్లు ఈ విధంగా చిన్న కుండీలలో అనేక చెట్లను పెంచడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా స్థలప్రభావం. అక్కడ మొక్కలు పెరిగే కాలం, కొన్ని నెలలు మాత్రమే. సుమారు మార్చి నుండి అక్టోబరు వరకు. మిగిలిన కాలంలో ఎక్కువ చల్లగా వుంటుంది. వెలుగు తక్కువగా ఉంటుంది. అందువేత వాళ్లు సంవత్సరములో ఎక్కువ కాలంలో లేదా ఆ కాలంలో మొక్కల్ని పెంచడానికి ఇళ్లలో, గాజుతో ఏర్పరచిన చిన్న పచ్చని ఇళ్లలో (Glass House, Green House) అట్టల్ని జోడించి (తేర్చి) సూరారు మొక్కల్ని పెంచాలి. ఆ ఇంటికి కావల్సిన ఉష్ణం (నిప్పు పొయ్యి, గ్యాస్ ఫ్లేమ్) కిరోసిన్ నూనె దీపం, విద్యుత్ దీపం - ట్యూబ్ లైట్ ఇత్యాదుల ద్వారా ఉండేటట్లు చూస్తారు. ఈ వ్యవస్థకి ఖర్చు ఎక్కువ. ఆ ఖర్చు ద్వారా సంపూర్ణ లాభాన్ని పొందడానికి చిన్న కుండీలలో సూరారు మొక్కల్ని పెంచుతారు.

చిన్న కుండీలలోనూ, పెద్ద కుండీలలోనూ, కుండీల మట్టిలోని పోషకాలు త్వరగా ఖర్చయిపోతాయి. దీనికి కారణం నేలపై పెరిగే చెట్లకన్నా కుండీలలో పెరిగే చెట్లకు ఎక్కువ నీటిని వేయాలి. ప్రతిసారి నీటితో పోషకాలు కొంచెం కొంచెంగా కరిగి ఇంకే కుండీలోని పలుచని రంగ్రాం ద్వారా వెళ్లిపోతాయి. అందువేత నేలపై పెరిగే మొక్కలకన్నా కుండీలలో పెరిగే మొక్కలకి ఎక్కువ సారవంతమైన మట్టి మిశ్రమాన్ని నింపడమే కాకుండా వడే వడే పైసిన ఎరువుల రూపంలో పోషకాలను సరఫరా చేస్తుంటారు. ఈ విధంగా పోషకాలు అందివ్వకపోతే కుండీల కృషి జయప్రదం కాదు.

## పెట్టెలు (Boxes, Flats)

విత్తనాల ద్వారా మొక్కల్ని పెంచడానికి, చిన్న మొక్కల్ని గ్రుచ్చి నాటడానికి (Pricking) కుండీలకు బదులుగా చెక్క పెట్టెలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ పనులకు గుండ్రని నోరున్న కుండీలకన్నా ఆ ఆకారపు పెట్టె మేలైనది. వీటిల్లోని మట్టిని, చదును చేయడానికి అణగడ్రొక్కడం చాలా సులభం. వీటిలో, విత్తనాలను వరుసగా వేయవచ్చు. ప్రతి వరుసకీ పేరు రాసి పెట్టిన చీటి పెట్టాలి. మొక్కల్ని వరుసగానూ, ప్రతిసారి ఒకే అంతరం ఉండేటట్లు గ్రుచ్చవచ్చు. పెట్టెలను దగ్గరగా జోడించి, గాజుతో లేదా ప్లాస్టిక్ షీట్ రక్షణ ఇవ్వవచ్చు. ఉపయోగం లేనప్పుడు ప్రక్కగా ఒకదానిపైన మరొకటి పేర్చవచ్చు.

సామాన్యంగా ఈ పెట్టెలను జాజికాయ ప్యాకింగ్ కేసుల సహాయంతో తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి వెడకుండా కొన్ని శీలీంధ్రహారులున్న లేవనాన్ని దానికి పూయాలి. క్రింద భాగాన్ని పలక మధ్య నీళ్ళు ఇంకడానికి చిల్లు పెట్టాలి.




ఈ పెట్టెలను ఏ విధంగా మట్టితో నింపాలనే విషయం చిత్రం 7.2లో చూపబడింది. మొదట క్రింద భాగపు కన్నుము పెంకుడు చిట్టలతో మూయాలి. ఆ తర్వాత 1-2 పొరలుగా చిన్న పెంకులు వేయాలి. వేసి

దానిపైన ఆకులు, తగరు, గుంజా వేయాలి. దానిపైన మట్టి మిశ్రమాన్ని నింపాలి. నింపిన తర్వాత ఒక వలకతో నోటి (మూతి) పైన వేసిన మట్టిని మాత్రం తొలగించాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని మట్టవలకతో (చిత్రం చూడండి) కొద్దిగా సర్దాలి. 8¼ పాదపు టేకు కొయ్య పెట్టెను బీజాలకు యుక్తమై, రోతుకు ఒత్తి, వరుసచేసి, దాంట్లో బీజాలను చల్లాలి, లేదా పూడ్చాలి. ఆ తర్వాత మట్టి పెట్టెపైన మట్టి మిశ్రమాన్ని వరుసలలో ముగ్గువేసినట్టుగా చల్లి విత్తనాల్ని మూయాలి. మట్టి కొద్దిగా మట్టవలకతో విత్తనాలకి సంవర్కం జరిగేటట్టుగా ఆదమాలి. ఆ తర్వాత చిన్న రంధ్రములున్న స్పేయర్ తో బాగా తడిసేటట్టుగా విత్తనాలు మట్టి కదలకుండా చిలకరించాలి. కుండీలలోని మట్టి

కుండీలను నింపడానికి ఉపయోగించే మట్టి విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి, మొక్కల పెరుగుదలకి, తగినదిగా ఉండాలి. ఇసుకతోకూడాకొని నీరు బాగా ఇంకేటట్టుగా ఉండాలి. అంటే కావల్సినంత తేమని మిగిల్చుకొని పెట్టుకొని ఉండాలి. పాడి పొడిగా ఉండాలి. గడ్డకట్టరాదు. ఈ విధంగా ఉంటే ఆ మట్టిలో నీరు, గాలి, వేడి, సులభంగా దూరి కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు అనుకూలంగా వుంటుంది. అటువంటి మట్టిని నింపి మొక్కలు లావెక్కి శక్తివంతంగా చేయడానికి, మొక్కలు ఊరడానికి, సులభంగా మొలకెత్తడానికి, చేతికి అందిరావడానికి, ఈ భౌతిక లక్షణాలే కాకుండా మట్టి పుల్లగా (ఆఫ్లత్వంతో) ఉండకూడదు. ఇరంగానూ ఉండకూడదు. తటస్థంగా వుండాలి. మొక్కల విత్తనాలలో, రోగాణువులు గానీ కీటకాలుగానీ ఉండరాదు. దీని జతకి నశ్రజని, భాస్వరం (ఫాస్ఫరస్) పొటాష్ పెరగడానికి కావల్సిన కొలతలలో ఉండాలి. ఇతర పోషకాల కొరత ఉండరాదు.

ఇటువంటి మట్టిని తయారు చేసుకోడానికి సావయవాంశంతో కూడిన పొడి గూడు మట్టి (Loam) ఇసుక, క్రుల్లిన ఆకులు, ఎరువులు కావల్సి ఉంటుంది. ఇంగ్లాండు మొదలైన దేశాలలో తోటమాలలందరికీ ఒకే ఫలవంతమయిన మన్నువుంటుంది. మంచి గుణ లక్షణాలున్న మట్టి మిశ్రమాన్నే (నీరు దీన్ని సాయర్ కంపోస్టు అని అంటారు) ఉబ్బుకుండా ఈ పదార్థాలను నిర్దిష్ట ప్రమాణంలో (కొలతతో Standard) ఏర్పరచున్నారు. ఈ రకపు మట్టి మిశ్రమాన్ని జాన్ ఇన్స్ కంపోస్ట్ (John Innes Compost, J.I.Compost) అని అంటారు. దీంట్లో రెండు విధాలు 1. బీజాలు వేయడానికి, భూమిలో గుచ్చడానికి 'J.I.' సీడ్ కంపోస్టు అని, చెట్లని పెంచడానికి పాటింగ్ కంపోస్ట్ (J.I.S.) అని వ్యవహరిస్తారు. ఈ రెండు రకాలు మిశ్రమాలలోనూ గూడ, ఇసుక, పీట్ (Peat) (జేగు ప్రదేశాలలో నూరారు సంవత్సరాలనుండి ఆకులు ఇల్లాదివి క్రిందపడి, క్రుల్లి నల్లబడి (మృగ్గీనిశ్వం) ఉంటుంది. మన దేశంలో కొన్ని చోట్ల పీటునిచ్చే మట్టి పున్ననూ అది మార్కెట్టులో లభించదు. దీనికి బదులుగా మనము బాగా క్రుల్లిన సరైన ఆకుపొడిని ఉపయోగించుకోవచ్చును. J.I. సీడ్ కంపోస్టులో 2 భాగాల గూడు మట్టి, 1 భాగం ఇసుక (సుమారు లావుగా/మందంగా) 1 భాగం పీట్ ఉంటుంది.

ఈ మిశ్రమాన్ని కుండీలలో నింపడానికి కొన్ని దినాలకు ముందు 2 కిరోసన్ టీన్ల మిశ్రమాన్ని (1 బువర్ల) 1½ టెన్సు సూపర్ పాస్ఫేటును ¾ టెన్సు సున్నం కలుపుతారు. సుమారు మొక్కల వేళ్ళ అభివృద్ధికి సున్నం మట్టిలోని ఆఫ్లం (పులుపు)ను పాగొట్టడానికి మిశ్రమంలో రోగాణువులు ఉండకుండా ఉండడానికి గోడుని వేయించి క్రిముల్ని శుభ్రపరుస్తారు. మనం ఈ కంపోస్టును పొలంలో మట్టి మిశ్రమాన్ని తయారు



7.2

7.2



చేయడానికి 2 భాగాల మంచి గోడు మట్టి (లేదా పాత తోటలోని మట్టిని) 1 భాగం నది ఇసుక, 1 భాగం ఆకుల పొడిని కలిపి సూపర్ సున్నం చేర్చాలి. అలాగే గోడును ఆకు పొడిలోని క్రిములను శుభ్రపరచాలి. కొన్ని పొలాలలో ముందుగానే J.I. పాటింగ్ కంపోస్ట్ లో కొలత 7 భాగాల గూడు మట్టి 2 భాగాలు లావైన ఇసుక 3 భాగాల పీటు (ఆకు పొడి) ఉంటుంది. ఈ మిశ్రమంలో మొక్కలు పెరగడం చేత దీనికి కొన్ని పోషక ఎరువులను కలపాలి. ఈ ఎరువు మిశ్రమాన్నీ జె.బి. బేస్ (J.I. Base) అని వ్యవహరిస్తారు.

7.2 చిత్రం a, b, c, d, e.

a. బీజాల పెట్టెలకు మట్టిని నింపి బీజాల్ని వేయాలి. పెట్టె క్రింద వలక చిల్లు పైన i. బోకి మొక్కల్ని బోర్లవేసి, ii. ఆ తర్వాత నన్నని బోకి వలుకులను వేసి, iii. దానిపై ఆకు పొరలను వ్యాపింపచేసి w మట్టిని నింపాలి. (w)

b. మట్టిని ఒక వలకతో లాగి, చదును చేయాలి.

c. మట్టిని అదమడానికి రెండు రకాల దిమ్మినలు, గుండ్రని దిమ్మిన కుండీలకు : చదునైనది పెట్టెలకు.

d. దిమ్మినతో మట్టిని చదును చేయాలి.

e. నన్నని పట్టితో వరసలుగా విభజించాలి.

7.2 చిత్రం f, g, h, i.

7.2 f. బీజాన్ని వరుసలలో పెట్టె కుండీలలో వేసి ద్రేళ్ళతో (గుచ్చి) నాటాలి.

g. విత్తనాలను విత్తనాల ప్యాకెట్ తోనే చల్లాలి.

h. విత్తనాలపైన మట్టిని జల్లించాలి. నీటిని చల్లాలి.

i. పెట్టె పైన గాజు వలకను మూయాలి.

ఈ మిశ్రమంలో 2 భాగాల తూకం గోరసీ పొడి (Hoof and horn meal) నత్రజని 2 భాగాల సూపర్ ఫాస్ఫేటు, 1 భాగం పొటాషియం సల్ఫేటు ఉంటుంది. ఈ ఎరువు మిశ్రమాన్ని మొక్కల్ని నాటడానికి ఒకటి రెండు వారాలకు ముందే రెండు కిరోసిన్ టిన్నుల మట్టి మిశ్రమానికి 4 టెన్సులంత సున్నాన్ని చల్లి, బాగా కలపాలి.

కొన్ని మొక్కలకి 4 టెన్సుల (+ ¼ టెన్సు సున్నం) ఎరువు మిశ్రమం కలిపితే చాలు. కానీ ఏవుగా పెరిగిడి మొక్కలకి రెండు లేదా మూడింతలు ఎరువు మిశ్రమం కావల్సి వస్తుంది. వీటిని క్రమంగా J.I.P<sub>2</sub> మరియు J.I.P<sub>3</sub> కంపోస్టు అంటారు. ఈ రకపు J.I. కంపోస్టులను పోలినట్టి (పీటు బదులుగా ఆకుపొడి) కలిపితే మన కుండీల కృషి నిర్దిష్టం, సత్ఫలితాన్ని ఇస్తుందనడంలో సందేహం లేదు.

## మొక్కల కొమ్మల కత్తరింపు (Pruning)

సంస్కృత, అలంకారపు తోటలలో మొక్కలను అప్పుడప్పుడు కత్తరిస్తూంటారు. ప్రతి తోటమాలి ఏ ఏ మొక్కలని, ఏ ఏ ఉద్దేశ్యం కోసం, ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా కత్తరించాలనే విషయాలను స్పష్టంగా తెలుసుకొని ఉండాలి. ఈ విషయాలు స్పష్టంగా తెలుసుకొని ఉండకపోతే తోట ఫలాల్ని, ప్రయోజనాల్ని తోటమాలులు సంపూర్ణంగా పొందలేరు.

మొక్కల్ని నీడకోసం, పువ్వుల కోసం, పళ్లకోసం, వాటి ద్వారా లభించే నూనె, నారు, మొక్కలు, రసాలు, కణ్ణులు మొదలైన ఎన్నో ఉత్పన్నాల కోసం పెంచుతారు. ఈ ఉద్దేశ్యాన్ని నెరవేర్చుకోడానికి అప్పుడప్పుడు మొక్కలు కత్తరించాల్సి వస్తుంది. మొక్కల్ని కత్తరించడానికి గల ముఖ్య ఉద్దేశాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

### 1. మంచి నీడనివ్వడానికోసం కత్తరించడం

చిన్న చెట్లు నెమ్మదిని, నీడని ఇవ్వవు. మొక్క సోందర్యాన్ని కూడా పెంచవు. ఈ మొక్కలు చెట్లున్న చుట్టూ, ఇళ్ళు, ప్రదేశాలు వెల ఎక్కువవుతుంది. అంతేకాకుండా, అందం కూడా రద్దీంచవుతుంది. నీడ కోసం పెంచే చెట్లను అప్పుడప్పుడు కత్తరిస్తూంటే చెట్ల రెమ్మలు విరగడం తగ్గుతుంది. బలవడే ఎక్కువకాలం బ్రతుకుతుంది. వీటి ఉపయోగాలు ఎక్కువ.

### 2. తీవ్రగాలిని అడ్డుకోడానికి, కొమ్మల కోసం కత్తరింపు

ఏకాంతం కోసం (Privacy) గాలిని అడ్డుకోడానికి, పెద్ద, కూరగాయలు, తోట, ఎరువుల గుండీ, మొక్కల్ని, చెట్లని ఎత్తుగా, పెంచి, హద్దులో పెట్టుకొని, అలంకారికంగా ఉండేటట్టుగా వీటిని పెంచాలంటే వీటిని అప్పుడప్పుడు కత్తరిస్తూంటారు. తీగలు విస్తరించి పెరగడానికి, కంచెలు, గాలినడ్డుకొనే మొక్కలు దట్టంగా పెరగడానికి, క్రింద నుంచి రెమ్మలు, చీలికలు, కొమ్మలు ఏకసంచి, విస్తరించడానికి కత్తరింపు సహాయకారిగా ఉంటుంది.

### 3. మొక్కల, చెట్ల, రూపాన్ని అందంగా అమర్చడానికి (అలంకారంగా రూపొందించడానికి) కత్తరింపు

మొక్కలు, చెట్లు అడ్డదిడ్డంగా ఒక ప్రక్క వలుచగా, మరొక ప్రక్క ఒత్తుగా, పై భాగం బరువై పెరుగు తుంటాయి. ఇటువంటి మొక్కల్ని చెట్లకు చక్కటి రూపాన్ని తేవడానికి, వీటికి అనుకూలమైన అనురూపాలతో (Symmetry) సౌష్ఠవం తీసుకురావడానికి (అందాన్ని తీసుకొని రావడానికి) వాటిని అప్పుడప్పుడు కత్తరిస్తూంటారు.

### 4. పువ్వుల సంఖ్య, మందం (గాత్రం) పుద్ది పరచడానికి (పెంచడానికి) కత్తరింపు

గులాబీ మొదలైన అనేక పువ్వుల మొక్కల కొత్త రెమ్మలపైన పువ్వులు, మొగ్గలు మొలకెత్తుతుంటాయి. కొత్త చిగురులు చిగురించడానికి, రెమ్మలు మొలకెత్తింపజేయడానికి, వీటిని అంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి

లేదా రెండుసార్లో కత్తరించాలి. డేలీయ మొదలైన మొక్కలు అనేక పువ్వులను విసకించవేసే స్వభావాన్ని (కలిగి వుంటాయి). ఈ విధంగా ఎక్కువ పువ్వులు వికసింపజేయడానికి అవకాశం ఇస్తే ప్రతి పువ్వుకు చాలినంత ఆహారం లభించకుండా, పువ్వుల స్వరూపం చిన్నదవుతుంది. ఎక్కువైన పువ్వుల మొగ్గల్ని గిల్లి వేస్తే, కొన్ని పువ్వులు, మొగ్గలు మిగిలి అవి పెద్దవిగా చక్కగా పెరిగి, అందంగా ఉంటాయి. వర్షిన, ఫ్లాక్సు మొదలైన పువ్వుల మొక్కల, చెట్లనిండా, అన్ని చోట్ల, అన్ని వైపుల పువ్వులు వికసింపేటట్టుగా చేయడానికి రెండు మూడు సార్లు కొనలను కత్తరించి, రెమ్మలని విస్తరించి పెరిగేటట్టుగా చేయాలి. ఈ కొనలను (తుంపి, గిల్లి) వేయడం కూడా ఒక రకపు కత్తరింపే అవుతుంది.

#### 5. ఫలాలను పెంచడానికి (వృద్ధిపరచడానికి) కత్తరింపు

చక్కటి కండగల ఫలాలను (వళ్ళను) పొందడానికి, పళ్ల చెట్లను సంవత్సరానికి ఒకసారో లేదా వందర ద్రాక్ష (బీజరహిత ద్రాక్ష) మొక్కల్ని సంవత్సరానికి రెండుసార్లో, కత్తరించవలసి వుంటుంది. అంతే కాకుండా, ఎండిన మొక్క, రోగప్రభువైన రెమ్మల్ని (రోగహారిత రెమ్మలు) అప్పుడప్పుడే కత్తరిస్తూంటే, మొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకొని, నాటి జీవిత కాలాన్ని పెంచవచ్చు (వృద్ధిపరచవచ్చు).

ఈ మొక్కల ఎత్తు, రూపాలు హద్దులో పెట్టుకొంటే మందులు చల్లడానికి, పళ్లను కోయడానికి, సహాయమవుతుంది.


#### 6. ఉత్తమ చెక్కసామానుల కోసం కత్తరింపు

చెక్కసామానులను తయారు చేయడం కోసం చెట్టు కత్తరింపు. టేకు మొదలైన చెట్లకు ఇది అన్వయిస్తుంది. ఈ రకపు చెట్లు, నేరుగా, నిట్టనిలువుగా - ముదులు, గడ్డలు, బొబ్బలు లేకుండా ఎత్తునకు పెరిగితే వాటి చెక్కకు గిరాకి ఎక్కువ. చెట్ల ఊడలు, కొమ్మలు, అడ్డులేకుండా, ఏక ప్రకారంగా పెరగడానికి అప్పుడప్పుడు రెమ్మలను కత్తిరించాల్సి వుంటుంది.


మొక్కలకు, చెట్లకు కత్తరింపెందుకు ? (మొక్కలకు చెట్లకు కత్తరింపు అవసరమా ?)

కత్తరించడం అంటే కేవలం రెమ్మల్ని కత్తరించి వేయడం కాదు. మొక్కల్ని, చెట్లని బోడి చేయడం కాదు. మొక్కల కొన్ని భాగాలను, మిగిలిన భాగాల పెరుగుదల కోసం, ఫలోత్పత్తి కోసం, ఉత్పన్నతకు, ప్రయోజనాలను రెట్టింపు చేయడానికి ఒక క్రమ పద్ధతిలో కత్తిరించో, త్రుంచో, గిల్లి జంటల్ని నిడదెయడం మొదలైన అన్ని క్రమాలకు కత్తరింపు అనే పదం అన్వయించుకోవచ్చు. కత్తరించే భాగం రెమ్మలు మాత్రమే కానవసరం లేదు. వేళ్ళు, కొనలు, మొగ్గలు, పువ్వులు ఏవయినా కావచ్చు.

కత్తరించవేది మొక్కల శ్రేణిని అనుసరించే ఒక ఆరోగ్యకరమైన పని. మొక్కల స్వభావం, పెరుగుదల, క్రమం, సన్నివేశాలకు సరిపోయే లేదా లొంగే రీతిని కత్తరింపు ద్వారా పొందడం. మొక్కలు డొక్కా మొక్కలను తట్టుకోగల శక్తిని పొందుతాయి. ఋతు లక్షణం అనుసరించి, ఎక్కువ, తక్కువ కాకుండా మొక్కల భాగాలను తీసివేయడమే నిజమైన, సమర్థవంతమైన కత్తరింపు. చేతికి, కత్తెరకి దొరకన సస్యభాగాలను కత్తరిస్తే, మొక్కలని కత్తరించనట్లవ్వదు. ఏ రెమ్మలను కత్తరిస్తే, ఏ కొనలను త్రుంచితే, ఏ మొగ్గను గిల్లివేస్తే, మొక్క




8.1: a



8.1: b



8.1: c



ఆరోగ్యం, రూపం, పెరుగుదల, ఉత్పన్నశక్తి ఎక్కువ అవుతుందో అనే విషయాల్ని గుర్తుపెట్టుకొని, తర్వాత మొక్కల్ని కత్తరించాలి.

చిత్రకారుడు ఏ రీతిని ఎంత లావుగా గీస్తే, ఏ రంగు వేస్తే, పలువ వేస్తే, లేదా గాఢంగా చక్కటి రంగులు వేస్తే, చిత్రం ఎంత అందంగా ఉంటుందని ఆలోచించి, చిత్రాన్ని చిత్రీకరిస్తాడో అదేవిధంగా కత్తరించే ముందు, అట్టి ఆలోచనలు తోటమాలలకు ఉండాలి. అందువలనే ఈ పనిని అతి జాగ్రత్తతో చేయాల్సి ఉంటుంది.

కత్తరింపు జాగ్రత్తతో చేయాల్సిన పని మాత్రమే కాదు. కాలవ్యయపు పని కూడా అవుతుంది. ఎందుకంటే రెమ్మరెమ్మను, మొగ్గమొగ్గను, ఆలోచించి, అవసరమైతేనే కత్తరించాలి. దీనికి ఎక్కువ కాలం పడుతుంది.

సమర్థవంతం, పరిణామకారకమైన కత్తరింపుకు, మొక్క జీవనపు వ్యవధి, వాటి స్వభావం, పెరుగుదల క్రమం మొదలైన విషయాలలో తోటమాలలకు అనుభవం ఉండాలి. పరిచయమూ ఉండాలి. ఎందుకంటే కత్తరించే క్రమం, కాలం, ఉద్దేశ్యం ఒక్కొక్క మొక్క జాతిలోనూ ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. అన్ని మొక్కల్ని ఏకరీతిలో ఒకే కాలంలో కత్తరించకూడదు.

**కత్తరింపుల పారిభాషికాలు (Technical Words used in pruning)**

కత్తరింపు క్రమాలను వివరించేటప్పుడు కొన్ని పారిభాషిక పదాలను ఉపయోగిస్తారు. ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది. వీటి అర్థాలను సరిగ్గా జ్ఞాపకం పెట్టుకొని ఉండాలి. వీటిలో కొన్ని ఈ క్రింద స్పష్టపరచ బడ్డాయి.

8.1 a. కత్తెర. కత్తరింపులో ఉపయోగించే పారిభాషిక పదాలు


ఒక చెట్టు యొక్క మూల స్వరూపం (Structure) లేదా ఒక చెట్టు యొక్క నిర్మాణం, 1. తల్లి వేరు లేదా మూల ప్రధాన వేరు (Tap root), 2. ఉపవేరు, పార్శ్వ వేరు, ప్రక్క వేరు (Lateral roots) 3. తల (పై) భాగం (Crown) 4. తలపైభాగపు సదరు (పీలక మొక్క - Crown Sucker) వేరు, 5. పీలక వేరు (Root sucker) 6. చెట్టు మొదలు (బోదె) 7. మొలకెత్తిన క్రింద భాగం చివరి (కొన) క్రాను. (Wide angle strong branch union or crotch) - 8. నిర్ఘంబి (Water sprout, Water shoot), 9. కోణంలో బలస్థశాఖోప శాఖలు లేదా రెమ్మల సమూహం (గుంపు) (Narrow angle branch), 10. స్కాఫోల్డ్ (ట్రాంప్), 11. ఫెడర్, 12. అంటుకొన్న కొమ్మలు, రెమ్మలు (union or crotch), 13. చెట్టు క్రింద నుండి మొలిచే ముఖ్యాంశాలు లేదా చీలికలు, 14. రెమ్మలు.

సెకండరీ బ్రాంచు (Secondary branch) ద్వితీయ శాఖ, ఉప రెమ్మలు పారువ రెమ్మ నుంచి మొలచే చీలికల రెమ్మలు. స్పూరు Spur వాచే సన్నని - చీలికల రెమ్మలు కొమ్మలు ఎక్కువగా పెరిగిడి చీలిన చిన్న రెమ్మలు. ట్రంకు (Trunk - ప్రకాండం) క్రింద నుంచి రెమ్మలు మొలచే వరకు చీలికలు లేని చెట్టు బోదె.

వాటర్ స్ప్రౌటు (Water Sprout : నీటి రెమ్మ) ప్రధాన శాఖనుంచో లేదా పారువ రెమ్మల అసాధారణ మొగ్గల నుంచో కత్తరించిన గాయం దగ్గర నుంచో ఎక్కువ చెల్లా చెదారాలచే, త్వరగా, బాగా పెరిగిడి చీలికలు.



8-2 I



8-2 II



228A

8-2 III

టీగ్గు (Twig - సున్న కొమ్మ - చిన్న కొమ్మ, రెమ్మ) ప్రస్తుతానికి మొగ్గలు గుప్తంగా ఉన్న లేదా పెరుగుదల తాత్కాలికంగా నిలిచిన చిన్న రెమ్మ, కొమ్మ

డిహోర్నింగ్ (Dehorning) ముఖ్య శాఖల కత్తిరింపు చెట్టు యొక్క ముఖ్య శాఖలను కత్తిరించే క్రమం.

**హెడ్డింగ్ బ్యాక్ -(Heading Back)**

పై భాగాన్ని కత్తిరించడం, మొక్కల ప్రథమ శాఖలను కత్తిరించడం. థినింగ్ ఔట్ (Thinning Out) వలువబడడం లేదా కొమ్మల చీలికలను అది మొలచిన క్రింద భాగం దగ్గర కత్తిరించడం (రెమ్మలు మొలచిన చోట క్రింద నుంచి కత్తిరించడం).

ట్రైనింగ్ (Training) : ట్రీమ్ చేయడం, మొక్కని కావలసిన ఆకారంలో లేదా రూపానికి వచ్చేట్టుగా పెంచడం. కొన్ని రకాల ట్రైనింగ్ రీతులను 8.2, 1-3 చిత్రంలో చూపబడ్డాయి. ఈ రీతులను బోడి, (మోడు) చెట్ల రూపంలో అనుసరిస్తారు.

8.2 I మోడు చెట్లను ట్రైన్ చేసే కొన్ని రకాలు. A. ఎస్పాలియర్, B. వినకక్రాకారం, C. శంఖు ఆకారం.

8.2 II మొక్కని ట్రైన్ చేసే కొన్ని రకాలు. a. స్టాండర్డ్, b. అర్చ్ స్టాండర్డ్, c. మోటు, d. ఫ్రెంచ్ రీతి (L', Arcure) e. శంఖులాగ, f. కార్డన్ (Cordon), g. ఎస్పాలియర్ (Espalier).



8.2 III. గాబ్లెట్ క్రమం (Goblet Training) ఈ రీతులను మోడు చెట్ల రూపంలో అనుసరిస్తారు.

**కత్తిరింపు, మొక్క ప్రతి క్రియ (Pruning Response)**


సామాన్యంగా మొక్క పెరిగి పెద్దదైన వెంటనే ఆ మొక్క పెరుగుదల విధానం మార్పు చెందుతుంది. మొక్క చిన్నదిగా ఉన్నప్పుడు దాని అన్ని భాగాలకు కూడా చాలినంత నీరు, పోషకాలు. వెలుతురు లభిస్తుంది. కాని పెద్దదైన తర్వాత మొక్క యొక్క ప్రతి భాగం ఇతర భాగాలలో పాటు వెలుతురు కోసం, పోషకాల కోసం, నీళ్ల కోసం ఒకదానితో ఇంకో కటి పోటీపడతాయి. మొక్కలు చక్కగా పెరగడానికి ఈ పోటీ పెరగకుండా అడ్డుకోవాలి. మొక్కలన్నింటి భాగాలకు నీళ్లు, గాలి, వెలుతురు, పోషకాలు లభించాలి. అంటే, కత్తిరింపు క్రమాన్ని అనుసరించాలి. దీని ద్వారా మొక్క బాగా పెరగడమే కాకుండా, మొక్కలలో ఉన్న పోటీ తగ్గుతుంది.

మొక్క చివరి భాగాలలో ఉన్న మొగ్గ బాగా పెరిగిడి స్వభావం గలది. దీనికి కారణం ఏమిటంటే తుది మొగ్గలలో వృద్ధివోందే ద్యోతక పదార్థాలు (Growth Substances) హోర్మోనులు (Hormones - రక్త ప్రసారాన్ని వృద్ధిచేసి, శక్తినిచ్చే కొన్ని గ్రంథులు) ఉంటాయి. ఇవి పై మొగ్గలలోనే ఎక్కువగా మిగిలి క్రింది మొగ్గల వైపుకు రాకపోవడంతో వాటి వృద్ధికి ఉత్తేజం లభించదు. ఈ కారణం చేత తుది మొగ్గలను త్రుంచినప్పుడు ద్యోతక పదార్థాలు క్రింద మొగ్గల వైపు కారి (పారి) అవి చిగురిస్తాయి.

సామాన్యంగా మొక్కలలో కత్తిరించిన కొత్త చిగురులు చిగురుస్తాయి. (8.3) కత్తిరించిన భాగాలకు దూరంగానున్న భాగాలలో ఈ మార్పు తక్కువ. ఈ ప్రతి క్రియను గులాబులలో స్పష్టంగా చూడవచ్చు. కత్తిరించిన భాగం దగ్గర ఉండే మొగ్గ చిగురించి పువ్వు వికసిస్తుంది. మొక్కలలోని అన్ని భాగాలు చిగురించాలంటే అక్కడక్కడ రెమ్మలను మొదలైన వాటిని కత్తిరించాలి.



8.3



8.4



మొక్క పై భాగాన్ని ఎక్కువగా కత్తరిస్తే (అంటే (Heavy or hard pruning) అనునర్థం) పువ్వుల, కాయల వృద్ధికన్నా, కాండం, రెమ్మ, ఆకులు మొదలైన వృద్ధికన్నా, అలైంగిక భాగాల పెరుగుదలలే ఎక్కువగా ఉంటుంది. వేరులను ఎక్కువగా కత్తరిస్తే, మొక్కకి వేరు నుండి లభించే పోషకాలు తక్కువై మొక్కల పై భాగపు పెరుగుదల కుంటుపడుతుంది. ఫలములు, పువ్వులు మొలకెత్తవు. కాయలు రావు. సాంపుగా, పచ్చగా పెరుగుతుండే, మొక్కల వేరులను కత్తిరించడం ద్వారా ఈ రకపు అలైంగిక భాగాల పెరుగుదలను వృద్ధి చేసి, చిగురింప జేయవచ్చు.

8.3 కంచె మొక్కల్ని వివిధాలుగా కత్తిరించడం ద్వారా అవి వివిధ రూపాలలో పెరుగుతాయి. పై వరుసలో కంచె మొక్కలను కత్తిరించే నాలుగు అంతస్తులను చూపబడింది. (నాలుగు స్థానములను చూపబడింది) క్రింద వరుసలో 1. నిర్దిష్ట ఆకారం లేని కంచెలో, 2. ఒత్తుగా పెరిగివున్ననూ క్రింద, పైన వెడల్పులో ఎక్కువ వృత్తాన్ని లేదు, 3. పై భాగం ఎక్కువ, క్రింది భాగం తక్కువ, 4. క్రింది భాగం వెడల్పుగా ఉండి, పై భాగం చిన్నదిగా ఉండడం.


ఆకు కొనలు గిల్లి వేస్తే - దీన్ని తోటమూలులు తలకొట్టడం, తలను త్రుంచడమని వ్యవహరిస్తారు - ప్రక్కల నుంచి రెమ్మలను పెరిగి పోతాయి. ఫ్లాక్సు, వర్నిన, డేలీయ, చామంతి మొదలైన మొక్కలు నిండుగా గుబురుగా పెరగడానికి - అంటే ఆనేక ప్రక్క కొమ్మలు రెమ్మలు చిగురించడానికి ఈ విధంగా పై భాగపు ఆకు కొనలను త్రుంచి వేస్తారు. కత్తిరింపు చేత ప్రేరేపితమైన వృద్ధి, ఋతు ఋతువుకూ, స్థల స్థలానికి, మారుతుంటుంది. ప్రతి ఋతువుకూ ప్రతి స్థలానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకతవుంటుంది. ఆకులు రాలే చెట్లలో, (deciduous plants) ఒక కాలంలో - వసంత ఋతువులో, వృద్ధి చాలా చురుకుగా సాగుతుంది. మరికొన్ని కాలాలలో - చలికాలంలో వృద్ధి స్తవ్రం అంటే మందంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో అటువంటి మొక్కల్ని కత్తిరించామా, కొత్త చిగుర్లు చిగురించవు. అదే చలికాలపు చివరలోనో, వసంతకాలంలోనూ, వేసవి లేదా వానాకాలంలోనో, కత్తరిస్తే చాలా త్వరగా కొత్త చిగురులు చిగురుస్తాయి. అదే విధంగా వెలుతురు ఉండే మొక్క, నీడలో ఉండే మొక్క కన్నా కత్తిరించిన తర్వాత బాగా చిగురుస్తుంది.

కత్తిరింపు గాయం మానేట్టు చేయడం కత్తిరించే రీతికి, గాయపు ఆకారానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. సామాన్యంగా పడవ ఆకారపు గాయం త్వరగా ఆరిపోతుంది (చిత్రం 8.4).


8.4 చిత్రం, గాయాలు అడ్డుదిడ్డంగా ఉండే గాయం త్వరగా ఆరదు. పడవ ఆకారంలో ఉంటే త్వరగా మానుతుంది.

పువ్వులు వికసించడం, కత్తిరింపు కాలానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. చలికాలంలో కత్తరిస్తే, పువ్వులకన్నా రెమ్మ, కొమ్మలు ఎక్కువగా పెరుగుతాయి. వేసవి కాలంలో కత్తరిస్తే, రెమ్మ, కొమ్మలకన్నా పువ్వులు ఎక్కువగా పెరుగుతాయి.

బిరుసుగా కత్తిరించడం చేత కొన్ని సందర్భాలలో పువ్వులు వికసించవు. దానికి బదులుగా అలైంగిక భాగాలు ఎక్కువగా పెరుగుతాయి.



8.5



8.6

## కత్తరించే విధానాలు (Pruning Methods)

### 1. మొక్క పై భాగాన్ని త్రుంచడం లేదా కత్తరించడం (Heading back) చిత్రం 8.5.

8.5 మొక్కల్ని చెట్లను ట్రీమ్ చేయడానికి పై భాగాన్ని కత్తరించాలి. వలుచబరచాలి. ఇక్కడ పై భాగాన్ని కత్తరిస్తే ప్రతి క్రియ సమమనేది చూపబడుతోంది. అడ్డగీతలు - కత్తరించే చోటు, చుక్కల గీతలు - ఈ విధంగా కత్తరించినప్పుడు చిగురించే మొలకలు.

మొక్క యొక్క ఏ భాగాన్నయినా కత్తరిస్తే, దాని సమీపపు భాగంలో చిగురు చిగురిస్తుంది, అనే విషయం ఇంతకు ముందే చెప్పబడింది. ఒక రెమ్మ మధ్యలో కత్తరిస్తే, కత్తరింపు క్రింద మొగ్గలు చిగురిస్తాయి. అనేక సమయాలలో 2, 3 రెమ్మలు చిగురిస్తాయి. ఈ స్వభావాన్ని, ప్రతి క్రియను ఉపయోగించుకొని, మొక్కలు హద్దులో ఉండేట్టుగా పెంచుకోవచ్చు. కాండం సుమారుగా 15-20 సెం.మీ. అంగుళాల ఎత్తుకు పెరిగినప్పుడు దానిపై భాగాన్ని అడ్డానికి కత్తరిస్తే, క్రింద నుంచి 4 నుంచి 9 రెమ్మలు చిగురించి, మొలకెత్తుతాయి. ఈ ఉపరెమ్మలు పెరిగిన తర్వాత వాటి పై భాగాన్ని కత్తరిస్తే ఒక్కొక్క రెమ్మ నుంచి, మరో 4 నుంచి 9 చీలికల మొలకలు మొలకెత్తుతాయి. ఈ విధంగా మొక్క నిండుగా, ఒత్తుగా పెరుగుతుంది. కంచెగా వేసే మొక్కలను హద్దులలో దట్టంగా పెంచడానికి ఈ కత్తరింపు క్రమాన్ని అనుసరిస్తారు.

### 2. వలుచబరచడం (Thinning Out) చిత్రం 8.6

8.6 మొక్కల్ని, చెట్లను వలుచబరిచినప్పుడు జరిగే ప్రతిక్రియ ఏమిటి ? ఈ క్రమంలో రెమ్మ క్రింది కత్తరింపులు చేయాలి. అప్పుడు కొమ్మలు చిగురించవు. కత్తరించిన రెమ్మలు చిగురించి, చీలికలుగా చిగురిస్తాయి. ఈ క్రమంలో కొన్ని రెమ్మలను అవి చిగురించిన వైపు కత్తరిస్తూంటే అదే సందర్భాలలో ప్రక్కనున్న మొగ్గలు చిగురించి, రెమ్మలను మొలకెత్తిస్తాయి.

పై భాగాన్ని త్రుంచినప్పుడు మొక్క ఎత్తు తగ్గుతుంది. కాని వలుచబరిచినప్పుడు మొక్క కొద్దిగ ఎత్తునకు పెరుగుతుంటుంది. ఎక్కువ ఎత్తుకు పెరగలేదు. దీనికి కారణం వలుచబరిచినప్పుడు ప్రక్కనున్న కొమ్మలు చురుకుగా పెరగడంతో ప్రధాన శాఖకు ఎక్కువ నీళ్ళు, పోషకాలు లభ్యమవుతాయని వాలా కష్టం. అందువేత అది ఎత్తుగ పైకి పెరుగుతూ పోలేదు.

సామాన్యంగా, కత్తరింపు పనులలో ఒకే మొక్కలో ఈ రెండు రకాల కత్తరింపుల విధానాలను - పై భాగం కత్తరించడం, 2. వలుచబరచడం - రెండింటినీ అనుసరించాలి. అందులోనూ కంచెగా వేసే మొక్కలలో ఇది చాలా ముఖ్యమైంది. ఎందుకంటే కంచే మొక్కలు ఒత్తుగా పెరగడంతో రెమ్మలలో ఊగులాట ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొన్ని రెమ్మలకు చాలినంత నీళ్ళు, వెలుతురు, పోషకాలు లభించక మరణిస్తాయి. ఇటువంటి వాటిని కత్తరించి వేయాలి. దీనితోపాటు, ఎక్కువైన కొన్ని ఉపరెమ్మలను కత్తరించాలి. అప్పుడు కొత్త చిగురు చిగురించడానికి అవకాశమేర్పడుతుంది.

### 3. ఒరటు కత్తరింపు (మొరటు కత్తరింపు) (Heavy or Hard Pruning)

ఈ విధానంలో పెక్కు రెమ్మలను మొత్తంగా తోడిగా వేస్తుంటారు. ఈ కత్తరింపు యొక్క ముఖ్యోద్దేశం మొక్క ఎత్తును తగ్గించడం, మొక్క క్రింద భాగం నుండి ఎక్కువ రెమ్మలను చిగురింపజేసేట్టు మొక్కని చురుకు చేయడం - దీని కోసం క్రింద భాగం నుంచి కొద్దిగా పైకి రెమ్మలను కత్తరిస్తారు.

ఈ రీతిలో కత్తరించడం చేత మొక్కలలో ఎక్కువ ఆకులున్న రెమ్మలు మొలకెత్తుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ విధంగా మొలకెత్తే రెమ్మల కాండం త్వరగా పెరుగుతుంది. లేత మొక్క కాండమును చక్కబరుస్తుంది. చిరు చిగురుల రెమ్మలను చిగురింపజేయడానికి ఈ క్రమం అనుకూలం. ఈ ఒరటు కత్తరింపును చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. లేకపోతే చెట్టు చచ్చిపోతుంది. కొన్ని మొక్కలైతే ఈ ఒరటు కత్తరింపులను భరించలేవు. అందుచేత ఈ క్రమాన్ని అన్ని మొక్కలలో అనుసరించరాదు. మొక్క జాతి, ఋతువు, పెరుగుదల విధానం మొదలైన వాటిని గమనించి ఈ కత్తరింపు విధానాలను అనుసరించాలి.

### 4. సులభంగా కత్తరింపు చేయడం (Light Pruning)

ఈ క్రమంలో చిన్న రెమ్మల కొనలను వానితోపాటు సీసపు కడ్డీలంత మందంలో ఉన్న కొన్ని రెమ్మలను మాత్రమే కత్తరిస్తారు. ఈ విధంగా కత్తిరేస్తే, పెద్ద, ప్రధాన రెమ్మల పోషక సామగ్రి ఇంకామించు అంతా మిగిలి, వికసించని మొగ్గలకూ, కొనలకు చురుకుగా చిగురించడానికి, వికసించడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఈ కత్తరింపును మొక్క సువ్తంగా ఉన్నప్పుడు లేదా చిగురించేటప్పుడు జరిపితే, మొగ్గలు మూసుకుని పోవడానికి అనుకూలం. కొత్త మొలకల ద్వారా మొగ్గలు వికసించజేయడమే ఈ సులభ చిన్న కత్తరింపు ఉద్దేశం. ఈ రకపు కత్తరింపును ఆవరించేటప్పుడు మొక్క చక్కదనం, చౌకట్టు చెడకుండా, చౌకట్టుపు రెమ్మలు కత్తరించకుండా ఉండేట్టు చూసుకోవాలి.


### 5. మధ్యమ లేదా మిత కత్తరింపు (Moderate or Medium Pruning)

మొక్కను ఒరటుగానో, పలుచగానో కత్తరించకుండా, ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా మితంగా కత్తరించే క్రమమిది. (ఎ = ఎడమ, కు = కుడి). 8.7 చిత్రం.

a. ఒరటు, మధ్యమ, పలుచగా కత్తరింపు (Hard, Moderate, Light) గులాబీ మొక్కలలో ఒరటు కత్తరింపు ఎడమవైపు చిత్రంలో ఎక్కడెక్కడ కత్తరించాలో సూచించబడింది. కుడివైపు కత్తరించిన మొక్క ఈ క్రమానికి కొత్తదిగా వాటిన హైబ్రిడ్ టీ గులాబీలలో అనుసరిస్తారు. పాలియంపటి గులాబీలను ఈ విధంగానే కత్తరించాలి.

b. మధ్యమ కత్తరింపు, ఎడమవైపు ఫ్లారిబండ్ గులాబీ, పెద్ద పొడగా పెరిగి ఎక్కువ పువ్వులు వికసించేయడానికి నల్లని గీతలు గీసిన చౌక కత్తరించాలి. కుడివైపు కత్తరించిన తర్వాత ఏవిధంగా పుంబుందో సూచిస్తున్న చిత్రం.

c. మధ్యమ కత్తరింపు, సుమారుగ పెరుగుతున్న కొన్ని సంవత్సరాల హైబ్రిడ్ గులాబీ చెట్టును మితంగా కత్తరించాలి. ఎడమవైపు కత్తరించడానికి ముందున్న రూపం. కుడి కత్తరించిన తర్వాత రూపం.



d. చిన్న కత్తరింపు, మొగ్గ నుండి పెరుగుతున్న హైబ్రిడ్ గులాబీ చెట్టును (టీ గులాబీ) చిన్నగా కత్తరించాలి. ఎడమ వైపు కత్తరించడానికి ముందున్న రూపం కుడి కత్తరించిన తర్వాతి రూపం.

e. చిన్న కత్తరింపు, తీగలై పైకి పెరిగిడి కాంబ్లర్ గులాబులలో ఒకటి రెండు పెద్ద రెమ్మలను అనేక సన్నని, చిన్న, చీలికల కొమ్మలను కత్తరిస్తే చాలా. ఈ రకపు కత్తరింపు చేత మొక్కలకి దెబ్బ తగలడం అవురూపం. కత్తరింపు యొక్క ప్రతిక్రియ చాలినంతపుంటుంది.

#### 6. మొగ్గ త్రుంచడం (Thumbnail / or Finger Pruning)

ఈ క్రమంలోని చిత్రాలు 8.8, 8.9, 8.10.

8.8 చిత్రం. తీగల లాటి మొక్కల కత్తరింపుని స్టాపింగ్ అని అంటారు. అంటే కొన్ని రెమ్మలను పెరిగిడి తల్పాన్ని నిలువడం అని అర్థం. కార్నేషన్ లో కత్తరించడానికి బద్ధులుగా పెరిగిడి కొనలను త్రుంచుతారు. ఎడమవైపు మొదటి సారి బాణం ఉన్నవైపు త్రుంపితే మొక్కలో చీలికలు చిగురిస్తాయి. కుడివైపు మళ్ళా చూపించిన వైపు త్రుంపితే మొక్క దట్టంగా పెరిగి పువ్వులతో విరాజిల్లుతుంది.

8.9 చిత్రం. చామంతిలో నిలుపుటకు గుర్తువేసిన కొనలను గిల్లాల్లి. మొక్క పెరిగిన తర్వాత మరొకసారి కొనలను త్రుంచాలి. మొక్క అడ్డంగా నిండుగా పెరుగుతుంది.


8.10 చిత్రం. కొన్ని మొక్కలలో పెద్ద పువ్వులు పుష్పించడానికి కేవలం కొన్ని వికసించే మొగ్గలను మాత్రం ఉంచుకోవాలి. మిగిలినవాటిని గిల్లివేస్తారు. ఇది కూడా ఒకరకపు కత్తరింపే. ఎడమవైపు, కార్నేషన్ లో మొగ్గను గిల్లుట, కుడివైపు చామంతి మొక్కలో మొగ్గను గిల్లుట.

ఈ క్రమంలో మొక్క యొక్క చివరన ఉన్న సన్నని చిన్నవైన వికసించే మొగ్గలను చిగుళ్ళను గోరుతో, ప్రేలితోనో గిల్లివేస్తారు. ఈ కారణం చేత మొగ్గల సంఖ్య తక్కువై, మిగిలిన మొగ్గలు బాగా చిగురించి పెద్ద పువ్వులుగా వికసించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఇది కూడా ఒక రకపు చిన్న కత్తరింపు విధానం.

#### 7. కొమ్మలను విడగొట్టడం కొమ్మలను కత్తరించడం (Dehoming)

8.11 చిత్రం. చెట్ల పెద్ద రెమ్మలను కత్తరించి కర్రలను విరగగొట్టి ఎడమవైపు కొద్దిగా కూడా స్థలం వదలక కత్తరించినది సరైన పద్ధతి. కుడివైపు కొద్దిగా స్థలం వదలి కత్తరించినది తప్పు పద్ధతి.

కొన్ని పళ్ల చెట్ల రెమ్మలు చాలా ఎత్తుకు పెరుగుతాయి. అటువంటి రెమ్మలను అప్పటికప్పుడే కత్తరించడానికి కాని వాటి నుంచి పళ్లను కోయడం కోసంకాని, వాటిపైన ఔషధాన్ని చల్లడానికి గాని కష్టమవుతుంది. దీన్ని సరిచేయడానికి పాడవుగా పెరిగిన రెమ్మలను కొమ్మలను కత్తరించవలసి వస్తుంది. దీన్ని కొమ్మ కత్తరింపు లేదా కొమ్మ విరగగొట్టడం అని వ్యవహరిస్తారు. చెట్టు యొక్క అన్ని కొమ్మలను ఏక కాలంలో కత్తరించరాదు. ఒకటైన తర్వాత మరొకటి, కొన్ని సంవత్సరాలు లేదా కొన్ని నెలలలో ఈ పనులను ఆచరించాలి.



ఈ విధంగా సకాలంలో కత్తరించాలనేందుకు తగిన కారణాలున్నాయి. కత్తరించిన తర్వాత మొక్కకు గాయం తగులుతుంది. వసంత కాలంలో గాయం మానడానికి 4-5 నెలలు పడుతుంది. అదే వసంత కాలానికి కొంచెం ముందుగా కత్తరిస్తే, ఈ ఋతువు ముగిసేటప్పటికి మొక్క తేరుకొని వసంత కాలపు ద్యోతక, ప్రేరక పరిస్థితిని ఉపయోగించుకొని కొత్త చిగురు చిగురిస్తుంది. అదే విధంగా శరత్కాలంలో కత్తరిస్తే అనంతరం వచ్చే చిగురు చలికాలాన్ని, ఆ కాలపు ఎండిన పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి అశక్తమై చెట్టు ఎండిపోతుంది. ఈ విధి సామాన్యమైన గులాబీ మొదలైన మొక్కలకి అన్వయించదు.

మొక్కలు పెరిగే కాలంలో, ఎండ లేదా వడగాలి కాలంలో కత్తరించరాదు. కొత్తగా నాటిన మొక్కలను కత్తరించరాదు.


ఏ మొక్కని ఏ కాలంలో కత్తరించాలనే విషయాలు వచ్చే అధ్యాయంలో సూచించబడినవి. సామాన్యంగా పెప్పెలంటే ఏ మొక్క, ఏ కాలంలో పుష్పిస్తుంది? పువ్వులు వెనుకటి సంవత్సరపు రెమ్మ నుంచి వికసిస్తాయా? లేదా కొత్త రెమ్మనుంచే వస్తాయా తెలుసుకొని, కత్తరించే కాలాన్ని నిర్ధారించవచ్చు. వసంత కాలంలో - ఫిబ్రవరి, మార్చిలో పుష్పాలు పుష్పించే మొక్కలు సామాన్యంగా వెనుకటి సంవత్సరం పెరిగిన రెమ్మల నుండి వికసిస్తాయి. వీటి పువ్వుల మొగ్గలుగా వసంత కాలానికి ముందే పూర్తిగా వికసించి, సుప్తమై యుండి, వసంతకాలం ముగిసిన వెంటనే చిగురులు వదలుతాయి. వీటిని అప్పుడు కత్తరిస్తే - పువ్వుల మొగ్గలనే కత్తరించినట్లే అవుతుంది. అందుచేత ఈ రకపు మొక్కలను పువ్వులు పుష్పించే కాలమైన తర్వాత కత్తరించాలి.

కాని కొత్త రెమ్మలనుంచే పువ్వులు పుష్పించే, హై డ్రాంజయ, మందార, మల్లె, గులాబీ మొదలైన వాటిని కొత్త చిగురు రెమ్మలు చిగురించేటట్టుగా చలికాలంలో లేదా వసంత కాలపు ప్రారంభంలో డిశెంబర్, ఫిబ్రవరిలో కత్తరించాలి.

### కత్తరించేటప్పుడు అనుసరించ వలసిన అంశాలు


1. కత్తరించడం చక్కగా కత్తరించాలి. కత్తరించేటప్పుడు కొద్దో గొప్పో పిలకలు వదలకూడదు. రెమ్మలను వచ్చడయ్యేట్టు చేయకూడదు. తొడిమ కత్తరించరాదు. ఈ విధంగా చేస్తే, రోగాలుపులు కత్తరించడం చేత ఏర్పడిన గాయం ద్వారా లోపలకు చేరడానికి అనుకూలమవుతుంది. చక్కగా, నీటుగా కత్తరించడానికి కత్తిని చాకుని, కత్తెరలను మొక్కలను కత్తరించడానికి ఉపయోగించే ఉపకరణాలన్నింటిని, చాలా చురుకుగా పొరుగు ఉండేటట్టు పెట్టుకోవాలి. చెట్ల రెమ్మలను రంపంతో కోసిన తర్వాత, పిలకలు, లాట మిగలకుండా, చాకుతో చక్కబరచాలి. ఈ విధంగా చక్కబరిచినప్పుడు అయిన గాయాల త్వరగా మానులాయి. నీటుగా కత్తరించినప్పుడు తొడిమల క్రిందున్న రేంజియం పొరకు హాని కలుగదు. అవి వృద్ధిచెంది గాయాలను త్వరగా మానేట్టు చేస్తాయి.
2. అలోగ్యంగా ఉండే మొగ్గ లేదా కణుపులకు కొద్దిగా పైన కత్తరించాలి. దీనికి కారణం వృద్ధి కారక కోశాలు ఈ స్థలాలలో గాయం త్వరగా మాన్చి కొత్త చిగురును వృద్ధి చేస్తాయి. కత్తరింపును కణితమైన ఎదురుచైపు 45° కోణం ఉండేటట్టుగా ఏటాలుగా కత్తరించాలి. (చిత్రం 8.13, 1 నుంచి 5 వరకు).





8.13

8.14



### 8.13 కత్తరించేటప్పుడు కత్తెరతో ఏ విధంగా కత్తరించాలి ?

మొగ్గపైన ఎక్కువ స్థలం వదలి ఏటవాలుగా కత్తరించండి. 2. మొగ్గపైన ఎక్కువ స్థలం వదిలి ఏటవాలుగా కత్తరించాలి (ఇది తప్పు), 3. మొగ్గపైన ఎక్కువ స్థలం వదలడమే కాకుండా అడ్డంగా కత్తరించి ఉంది. ఇది కూడా తప్పు, 4. కత్తరింపు కూసు కూసుగా కత్తరించివుంది. ఈ గాయం మానదు. ఈ భాగం రోగానికి అనుకూలమవుతుంది. ఇది కూడా తప్పు. 5. కత్తరింపు కణుపు పైనే కత్తరింవబడింది. కణుపుకు చాలా అపాయం. ఇది కూడా తప్పు, (1) మొగ్గకు కొంచెం పైకి 45° కోణంతో ఏటవాలుగా కత్తరించారు. ఇదే సరైన పద్ధతి.

3. వృద్ధి ప్రక్రియ : తుది మొగ్గలచే ఎక్కువగా ఉంటుంది. కత్తరింపు స్థలంలోని మొగ్గ సామాన్యంగా త్వరగా పెరుగు తగిన మొగ్గ. అందుచేత కొత్త మొలక రెమ్మలు మొదలైనవి ఏ దిక్కులో కావాలో ఆ వైపు తిరిగి ఉండే మొగ్గ పైన కత్తరించాలి. చిత్రం 8.14.

8.14 రెమ్మ పెరిగే దిక్కును మనమే నిర్ధారించవచ్చు. a. కుడివైపున కణుపు పైన కత్తరింవ బడింది. రెమ్మ కుడిపైపుకు పెరుగుతుంది. (చుక్కల గీత), b. ఎడమ వైపు మొగ్గ పైన కత్తరిస్తే మొక్క ఎడమవైపుకు పెరుగుతుంది.


మొక్క నుంచి కొద్దిగా పైకి కత్తరిస్తే, ఆ భాగం గూటంలాగ నిలబడుతుంది. రోగాణువులకు అనువుగా అవుతుంది. లేదా వాడుతూ వస్తుంది.

కత్తరింపు మొగ్గపై వాలితే లేత మొగ్గ పైన వడి మొగ్గ క్రుళ్లువచ్చు. కత్తరింపును మొగ్గకు అతి సమీపంలో కత్తరిస్తే, మొగ్గ రోవలీ భాగంలోకి గాలి దూరి, మొగ్గ వాడవచ్చు. చాలా ఏటవాలుగా కత్తరిస్తే, గాయం ఎక్కువై, ఆరకుండా రోగానికి అవకాశమివ్వవచ్చు. (చిత్రం 8.13)

4. కత్తరించినప్పుడు కత్తరించిన వైపు మొగ్గకు ఎక్కువ ఉత్తేజం లభిస్తుందని చెప్పబడింది. పై మొగ్గలకు ఉత్తేజం లభించక, అవి చిగురించవు. వీటి నుంచి చిగురు చిగురించడానికి ఆ మొగ్గల పై భాగపు కాండానికి చిన్న అంటు కట్టాలి. వీటి ద్వారా పున్న పుష్పింపజేయాలంటే ఈ కత్తరింపును మొగ్గల క్రింద కాండం పై భాగాన కత్తరించాలి.

5. అవసరం లేని లేదా, రోవల పెరుగుతున్న రెమ్మల కొమ్మల చీలికలు అవి మొలచిన క్రింది భాగాన కత్తరించాలి. ఈ విధంగా చేస్తే, మొక్క మధ్య భాగం తెరుచుకొని ఆ భాగానికి గాలి, ఎండ తుంపర్లు అనుకూలంగా వుండడంతో మొక్క ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈ విధంగా కత్తరించేటప్పుడు దుబ్బు లేదా బలిసిన, ఎండిన వాటిని వదిలేయరాదు. అందుచేత రెమ్మ లేదా కొమ్మలు కత్తరించేటప్పుడు ముఖ్యంగా రెమ్మలకు సమాంతరంగా కత్తరించాలి (చిత్రం 8.6).

6. రోగజ్వరే ఉన్నప్పుడు, రెమ్మలను కత్తరించేసేటప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్న భాగము వరకు కత్తరించాలి. సామాన్యంగా రెమ్మలను ఒత్తుగా కొమ్మలను కత్తరిస్తే, కత్తరించిన గాయం త్వరగా మానుతుంది. అదే విధంగా మొగ్గనుంచి పెరుగుతున్న మొక్కలలో కత్తరింపు గాయం త్వరగా మానుతుంది.



8.15



8.16A.

8.16B.



8.17

7. పెద్ద రెమ్మలను మూడు స్టాయిలలో కత్తరించాలి. (చిత్రం 8.15) మొదటి రెమ్మ బరువు తక్కువ చేయడానికి రెమ్మల దూరపు భాగాలను కత్తరించాలి. బరువైన రెమ్మలైతే వాటిని పై రెమ్మలను పగ్గంతో కట్టి, కత్తరించి క్రిందకు దింపాలి. రెండవ స్టాయిలో పెద్ద రెమ్మ బరువును మరింత తగ్గించాలి.

మూడవ స్టాయిలో ఈ రెమ్మను కూడా చిగురించే వైపు కత్తరించాలి. ఈ పనిని మచ్చుకత్తితో చేయాలి. లేదా రంపంతో కొయ్యాలి.

8. కత్తరింపు గాయాన్ని వాటికి రోగాలు అంటకుండా తారుతోనో, White Leadతోనో, సీసంతోనో, అవిశి నూనెతోనో లేదా శిలీంధ్రహారితోనో చేసిన మలాముతో ('పెస్ట్‌తోనో') ముయ్యాలి.



9. కత్తరింపు పనిని ఆలోచించి, జాగ్రత్తగా ఏయే భాగాలు ఏవర కత్తరించాలనే విషయాన్ని మొదట నిర్ధారించుకొని, ఆ తర్వాతే కత్తరించాలి. మొదట త్రుంచిన మొక్క ఎండిన, రోగప్రభుత్వం కొమ్మలను ఏ కారణం చేతనూ మిగల్చకూడదు. (కత్తరించకుండా వదిలివేయరాదు).

కత్తరించేటప్పుడు తాత్కాలిక చేయకూడదు. మధ్యలో వదలి వేయకూడదు. రెండవ మొక్కను కావలసిన రీతిలో బ్రెయిన్ చేయడానికి తగినట్లుగా కత్తరించాలి. దీనిని పెంచే కత్తెర అని అంటారు (Training cuts). ఈ విధంగా చేయడానికి అవశ్యకమైన భాగాలను వదిలేసి ఎటువైపు కొత్త చిగురును చిగురింపజేయాలనేది నిశ్చయించుకొని, మొక్కని కత్తరించాలి. ఈ భాగాలకు మరే భాగాల ద్వారా పోటీ రాకుండా ఆ భాగాలను కత్తరించాలి. మూడోది మొక్క లేదా చెట్టు రూపాన్ని తీర్చి దిద్దడం - దిద్దే కత్తరింపు, బలం లేని కాడలు కొమ్మల కొనలు (8.16 A) తీసి వేయాలి.

8.16 A ఎడమవైపు బలమైన కొమ్మ, ఇందులో కాండపు దారు రెమ్మతో ముందుకొస్తుంది. కుడివైపు కాండం దారులు, కాడలు రెమ్మలు చురుకుగా పచ్చగా లేవు. కాబట్టి ఇది నిర్బల కాండం (కొమ్మ). ఈ దిద్దడం యొక్క ముఖ్యోద్దేశ్యం - దీనిని ఒక కొనలో ఒకవైపు కత్తరించడం ద్వారా, చిన్నదిగా మోడు చేయడంతో లేదా అడ్డానికి మార్చి (8.16B) నిలబెట్టడం చేత సాధించుకోవచ్చు. మరొక రకపు దిద్దటం, అదేమిటంటే మొక్క లేదా చెట్టు ఎత్తును తగ్గించడం. ఈ దిద్దే కత్తరింపును 2-3 స్టాయిలలో చేయడం.

8.16 B రెమ్మల దిక్కును మార్చుకోడానికి మరొక క్రమం - ఎడమవైపు రెమ్మను వంచి బేపుని కట్టాలి. కుడివైపు అడ్డంగా వెళుతున్న రెమ్మను నిలుపుగా పెంచడానికి ఒక కట్టను సాలి రెమ్మను నేరుగా నిలిపి, రిబ్బను కట్టాలి. ఈ మూడు రకాల సవరింపును చేసిన తర్వాత సాధారణ కత్తరింపును ప్రారంభించాలి. మొదటి మూడు కత్తరింపులలో ఎక్కువ రెమ్మలు, కొమ్మలు మొదలైన వాటిని కత్తరించి వేస్తే, సాధారణ కత్తరింపును తర్వాత సంవత్సరానికి చేయడం మంచిది. ఈ కత్తరింపులో వీటి కొమ్మలను (లేత కొమ్మలను) అయినంతవరకు అడ్డంగా పెరిగేట్లుగా చేయడానికి లంబంగా పెరుగుతున్న రెమ్మలని కత్తరించాలి. ఇటువంటి రెమ్మలు ఔషధాలను పల్లడానికి అడ్డుపడడమే కాకుండా, వాటి పెరుగుదల, పరిశక్తియు తక్కువ.

చివరగా, మొక్క అన్ని భాగాలకు బాగా వెలుతురు ప్రసరించేటట్లు, ఔషధాలను పల్లడానికి అనుకూలంగా ఉండేటట్లు కొత్త చిగురు, పెరుగుదలను తగ్గించేటట్లు మొక్కని పలుచవరచాలి. ఈ విధంగా చేసేటప్పుడు పళ్ళు ఎక్కువగా పెరగడానికి రెమ్మల సంఖ్యను తక్కువ చేయాలి. ఈ పలుచ కత్తరింపును చెట్టును



8.18

తుది నుంచి ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత క్రింది భాగాలను పలుచబజవడం సులభమైనందున అక్కడనుంచే ప్రారంభిస్తే, మంచిది.

కత్తరింపు ఉడ్డేశాన్ని పూరించడానికి, కత్తరింపు పనులను సమర్థవంతంగా సత్ఫలితం లభించేటట్లు చేయడానికి ఆకు నిండినప్పుడే, పళ్ళు పండినప్పుడే మొక్కల్ని, చెట్లను బాగా పరిశీలించి, ఏ రెమ్మల ఒత్తుగా ఉన్నాయి, ఎక్కడ పలుచగా ఉన్నాయి ఏ రెమ్మ పండ్లను ఇవ్వలేదు అనే విషయాలను గుర్తించి, వాటికి లేబల్ (Label) వేయడం మంచిది. ఎందుకంటే, ఆకులు రాలినప్పుడు, పళ్ళుకాసి ముగిసిన తర్వాత మొక్క రూపం వేరేవిధంగా కనిపిస్తుంది. అప్పుడు అనువయక్త భాగాలను గుర్తించడం కష్టం. ఇటువంటి భాగాలను మొదటే గుర్తించి పెడితే, కత్తరింపు సులభమవ్వడమే కాకుండా, సమర్థవంతంగాను అవుతుంది.

కొందరు తోటమాలలు కత్తెర చేతిలో ఉండగా అప్పుడప్పుడు కత్తరించే పనిని నిలిపి వేయలేరు. ఈ విధంగా మొక్కల్ని వదలే వడే కత్తరించడం హానికరం. అవసరం అయితే, కత్తరించాల్సిన భాగాలను గుర్తుపెట్టుకొని, వచ్చే సంవత్సరం కత్తరించవచ్చు.

**కత్తరించడానికి ఉపయోగించే ఉపకరణాలు**

సమర్థవంతంగా కత్తరింపు పనులను సాగించడానికి వాటికి తగిన ఉపకరణాలు ఉండాలి. అవి ఏవిటంటే 1. కత్తరించే చాకు : మంచి హద్దు (దెంపర్)లో పెట్టుకొని ఉక్కుతో చేసిన పదునైన చాకు చాలాకాలం పడుచుగా ఉండటమే కాకుండా, విరిగిపోదు. త్వరగా త్రుప్పు పట్టదు. రెమ్మలను కత్తరించేటప్పుడు చాకుని ఊని మన వైపు ఏటవాలూ లాగడంతో చాకు క్రింది భాగం కొద్దిగా వంగుంటే మంచిది. (8.17 చిత్రం). చాకుకు పీడిగా చక్కనైన ఫ్లాస్టిక్ మొదలగు వాటిని ఉపయోగిస్తారు.


**8.17 వివిధ రకాల కత్తరించే చాకులు**

పెద్ద రెమ్మలను కత్తరించేటప్పుడు జారుతుంది. కాని వీటికి జింక కొమ్ముల పీడిని జోడిస్తే, పట్టు బాగా దొరుకుతుంది, జారదు. అడుగు మూయని కోసే చాకును కత్తరించడానికి ఉపయోగించవచ్చు. కాని పై భాగాలను కత్తరించేటప్పుడు ఇది హఠాత్తుగా ముడుచుకొని పోతుంటుంది. అందుచేత మూయడానికి వీలులేని పీడులున్న చాకు కత్తరింపు పనికి ఎక్కువ ఉచితమైంది. అంతేకాకుండా ఇది సులభంగా పీడి నుండి సడలదు. గట్టిగా ఉంటుంది. కత్తరించడం సులభం.

కత్తరింపు పనులకు చాకు సుమారు 10 సెం.మీ. పొడవు, 2 సెం.మీ. వెడల్పు ఉంటే అనుకూలం. మృదువుగా ఉండే కొమ్ములను కత్తరించడానికి మొగ్గ చాకులు - బడ్డింగ్ చాకును ఉపయోగించవచ్చు.

**2. సెకాచర్ : కత్తరించే అంటు కత్తెర 8.18 చిత్రం**

**8.18 వివిధ రకాల సెకాచర్లు (అంటుకత్తెరలు) కత్తరించే భాగం పచ్చడవ్వకుండా, ముక్కలు మిగలకుండా శుభ్రంగా కత్తరించే అంటుకత్తెరను ఉపయోగించాలి. అంటుకత్తెరలు అనేక రకాలు. కొన్ని కుమ్మరి కుండలలాగా అంటే కత్తెర ఒకవైపు చప్పగాను, మరొకవైపు మొనదేలి కూసుగ ఉంటుంది. చప్పటి వైపున పైన నేరుగా కత్తరిస్తూంటుంది. మరి కొన్నింటిలో రెండువైపులా పడుచుగా ఉంటాయి. క్రింది భాగం క్రమంగా**



చిన్నదై యుండవచ్చు. లేదా ఒకే మందంలో తగ్గకుండాను ఉండొచ్చు. కొన్ని సెకాటర్లలో క్రింది భాగం చిలుక ముక్కులాగ ఉండవచ్చు. వీటిలో ఏది సర్వోత్తమమైందని చెప్పడం కష్టం. ప్రతి యొక రకంలోనూ కొన్ని అనుకూలాలున్నాయి. అదేవిధంగా అనానుకూలాలు కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు చిలక ముక్కు కత్తెరతో కత్తరింపు చాలా శుభ్రంగా కత్తరించవచ్చు. కొత్తదిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చాలా చక్కగా కత్తరిస్తుంది. కాని కాలక్రమేణ దాని కొనలు వంగి, చిక్కకొని పోతుంటాయి. అంటే కత్తరింపు సాఫీగా జరగదు. రెండోవైపు వదులుగా ఉంటే, కొన్ని గట్టి రెమ్మలను కత్తరించేటప్పుడు క్రింది భాగం వంకరై, ఒకదానిపైన మరొకటి ఆనకుండా పోవచ్చు. అంతే కాకుండా ఒక్కొక్క తోటమాలి ఒక్కొక్క రకపు కత్తెరను ఉపయోగిస్తూ, అదే చాలా ఉత్తమమైన కత్తెరని చెప్పుకోవడం కూడా సామాన్యంగా జరుగుతుంటుంది.

కాని ఏ కత్తెరనుపయోగించినా, దాన్ని సదా పదునుగా పెట్టుకోవాలి. మొండి కత్తెరలతో కత్తరించినప్పుడు త్వరగా మానని గాయాలు అవుతుంటాయి. కత్తెరలు తుప్పుపట్టకుండా, పని అయిన వెంటనే నూసి లేదా జిడ్డును పూసి అలవాటు చేసుకోవాలి.

3. పొడవైన పిడివున్న కత్తెర (Long handled pruner) : పైకి పెరిగిన రెమ్మలను కత్తరించడానికి పొడవైన పిడియున్న కత్తెరనుపయోగిస్తారు. దీని పిడి 2-3 మీటర్ల పొడవు వుండటంచేత ఈ పై భాగాలను కత్తరించడానికి నిచ్చిన అవసరం లేదు. ఈ పిడుల చివర ఒక సెకాటరును చేర్చుంటారు. సెకాటర్ కు ఒకవైపు పొడవైన, బలమైన తీగను కలిపి కట్టుంటారు. ఈ తీగ ఇంకొక కొనను పిడికి జోడిస్తారు. ఈ పిడిని తీసినప్పుడు కత్తెర నోరు తెరుచుకుంటుంది. లాగినప్పుడు కత్తెర మూసుకుని రెమ్మను కత్తరిస్తుంది. (చిత్రం 8.19).


8.19 పై నున్న రెమ్మలను కత్తరించడానికి అనుకూలమైన పొడవైన పిడులున్న కత్తెరలు.

4. కత్తరించే అంపం : అనేక నమూనాలలో చెట్లను కత్తరించేటప్పుడు లావైన రెమ్మలను కత్తరించాల్సి వస్తుంది. ఈ పని చాకుతోగాని, కత్తెరలతోగాని సాధ్యం కాదు. అప్పుడు అంపాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఈ అంపం పచ్చని చెట్లను కత్తరించాల్సి రావడంతో, ఎండిన చెట్లను కత్తరించే అంపాన్ని దీనికి ఉపయోగించకూడదు. ఉపయోగించరు. పచ్చటి చెట్లను కత్తరించడానికి ఉపయోగించే అంపపు పళ్ళు కొద్దిగా వేరే రీతిలో ఉంటాయి. కొన్ని కత్తరించే అంపాలలో పళ్ళు U - ఆకారంలో ఉంటాయి. ఈవిధంగా ఉండడంతో పచ్చని చెట్లను త్వరగా కోసి వేయవచ్చు (చిత్రం 8.20).

8.20 వివిధ రకాల కత్తరించే అంపాలు. a. నీడనిచ్చే చెట్ల రెమ్మలను కోసే అంపం. b. పళ్ళు రంపం : పళ్ళు పదునుగా ఉండే అంపం పచ్చని రెమ్మలను కోయడానికి అనుకూలం. c. వంగిన అంపం రెండురకాలు. క్రింద వైపునున్న అడుగు భాగాన్ని మార్చవచ్చు. సన్నని చిన్న రెమ్మలను కోయడానికి ఈ అంపం అనుకూలంగా ఉంటుంది. d. చాకు వంటి రంపం : సన్నని, చిన్న రెమ్మలు కత్తరించడానికి అనుకూలం, e. ఒరటు పళ్ళున్న చిన్న రంపం.

కత్తరించడానికి అంపాన్ని ఉపయోగించేటప్పుడు మొదట రెమ్మల క్రింది భాగంలో కొద్దిగా కోసి, అంటుగట్టి, ఆ తర్వాత పై భాగం నుంచి ఈ అంటుగట్టిన వైపు కోస్తూ రావాలి. ఈ విధంగా చేస్తే బరువు చేత





8.21



8.22

రెమ్మ వడేటప్పుడు జతలో తొడిమను కత్తరించి లాగుకొనిపోదు. తొడిమ కత్తరిస్తే గాయం ఆరకుండా కుళ్ళి పోవచ్చు. అంతంలో కోసిన భాగాన్ని వదులైన కత్తితో చక్కబరచాలి. గాయంపైనపైబ్ లెడ్ పెయింట్ ను వూయాలి.

5. పెద్ద కత్తెర : మొక్కలను వివిధ రూపాలలో తేవడానికి ఇతర పనులను చేయడానికి పెద్ద కత్తెరలుపయోగిస్తే కత్తరింపు పని త్వరగా సాగుతుంది. అదేవిధంగా కంచెలను కత్తరించడానికి ఈ పెద్ద కత్తెర చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. లేత కొనలను త్వరగా ఆయాసం లేకుండా కోసేయవచ్చు. (చిత్రం 8.21).

8.21 వివిధ రకాల పెద్ద కత్తెరలు : (Shears) చిన్న గడ్డి పరుపులను కత్తరించడానికి తగినవి. చిన్న కత్తెరలు 8.22 చిత్రంలో చూపబడ్డాయి.

8.22 చిన్న కత్తెర (దుప్పటి కత్తరించే కత్తెర వంటిది) చిన్న గడ్డి పరుపుల కత్తరింపుకు యోగ్యమైంది.

### కత్తరింపు ద్వారా కలిగిన గాయాలకు చికిత్స (Treatment of Pruning Wounds)


కత్తరించేటప్పుడు కొమ్మలకు, మొక్కలకు, చెట్లకు గాయాలవుతాయి. సాధారణంగా గాయపు దగ్గరనున్న కాండపు రేణియం పొర చిగురించి, ఈ గాయాలు సహజంగానే మానిపోతాయి. ఈ సహజ క్రియ జరిగేటట్టుగా ఈ క్రియను ప్రేరేపించ జేయుటకు మనం కొన్ని క్రియలను అనుసరించవచ్చు.

ఈ క్రమంలో మొదటిది, కత్తరించేటప్పుడు ఈ రేణియం పొర చెడకుండా, చెడరకుండా, చక్కగా, కొమ్మ వుప్పడి కాకుండా, కత్తరించగలిగే కత్తెరతో కత్తరించాలి. ఈ విధంగా చక్కగా, పదునుగా కత్తరించడానికి కత్తరించే పనిముట్లను ఎప్పుడూ చాలా పదునుగా, శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.


కేబియం పొరకు లంబంగా కత్తరిస్తే, కేబియం నుండి గాయాన్ని మాన్పే పొర లంబంగా గాయపు మధ్యవైపు పెరిగి దాన్ని మూసేస్తుంది. అడ్డు అడుపు లేకుండా ఈ విధంగా మూసుకోవడానికి గాయపు శరీరం అడ్డ దిడ్డంగా లేకుండా అయినంత తరకు చదునుగా ఉండాలి. గాయం సరిగ్గా మానితే, కొన్ని సంవత్సరాలానంతరం గాయాన్ని కూడా అసలు గుర్తుపట్టలేము (8.23 చిత్రం).

8.23 పెద్ద గాయాలకు సీమెంటు వూయడం మంచిది. నీళ్ళు దిగకుండా కుళ్లకుండా ఈ గాయం మానుతుంది. 1 భాగం సీమెంటు, 2-3 భాగాలు ఇసుక కలిపి తొట్టలో దింపాలి. కాండంలో నీళ్ళు, పోషకాలు సాగే నాళాలు కాండానికి సమానాంతరంగానే ఉంటాయి. కేబియం పొర వృద్ధి కూడా కాండానికి సమానాంతరంగానే ఉంటుంది. అందుచేత కత్తరించేటప్పుడు గాయం కూడా రెమ్మకు సమానాంతరంగానే ఉండేట్టుగా కత్తరించాలి. (చిత్రం 8.24).

8.24 2. పెద్ద రెమ్మలను యీ విధంగా కత్తరించరాదు, 3. రెమ్మల క్రింది భాగాన్ని కొఱ్ఱురారు. ఆ విధంగా కొస్తే, రెమ్మల బరువుచే రెమ్మ, ముఖ్య కాండం విరిగి క్రిందపడుతుంది. ఈ గాయంతో చెట్టుకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది. 1. రెమ్మను క్రిందనుండి అంటే తొడిమ, కాండం నుండి దూరంగా కత్తరించరాదు. ఈ తొట్టె రోగస్థైతి, చెట్టుకు అపాయం తెచ్చేటట్టుగా ఉండరాదు. సరియైన క్రమం అనుసరించాలి. అవి మొదట బరువు తగ్గించడానికి 9. 16వ చిత్రంలో సూచించినట్టుగా రెమ్మను చిన్నదిగా చేసి, ఆ తర్వాత కాండాన్ని కత్తరించాలి.



8.23



8.24



8

240A

అయినంతవరకు ఈ గాయం చిన్నదిగా ఉండాలి. రెండవది : గాయాలకు గాయం మానే మలాములను పూయాలి. ఈ మలాములు గాయంపై క్యాంస్ (జిడ్డు - మందం) పెరగడానికి ప్రేరకంగా ఉండాలి. రోగాణువులను నాశనం చేసేవిగా ఉండాలి. రోగాణువులు లోపలకు పోకుండా గాయాన్ని చక్కగా మూసేయాలి. మలాముపార ద్వారా నీళ్ళు దూరకూడదు. ఎక్కువ కాలం గాయంపైన నిలచేటట్టుగా ఉండాలి. మలాము గట్టిగా ఉండకూడదు. ఇటువంటి మలాములన్నింటినీ కలిపి చేసిన మలాం లేదు, కాని క్రింద వివరించిన మలాములు, ఔషధాలు కొన్ని గుణాలను మాత్రం కలిగిఉన్నాయి.

1. పాదరు బై క్లోరైడ్ (లేడా) కార్బోషిఫ్ సల్ఫిమేట్ : గాయాలను రోగాణువుల నుంచి కాపాడడానికి కత్తరించే ఉపకరణాలను క్రమశుద్ధి చేయడానికి వాడతారు. దీని బదులుగా స్పిరిట్ ను ఉపయోగించడం మేలు.

2. క్రియోసోల్ కార్బాలిక్ ఆమ్లం : ఇది ఎక్కువ ఫలితాన్నిచ్చే పదార్థం. రోగాణువులను చంపడమే కాకుండా, అవి లోపలికి పోకుండా రక్షిస్తుంది. కాని ఇది మన చర్మంమీద పడితే చర్మం కాలుతుంది. అదే విధంగా మొక్కల, చెట్ల అంగాంశాలను కూడా కాలుస్తుంది. తొబ్బలలో గాయాలకు పూయడానికి, కుళ్ళిన రెమ్మలను తీసి లోపల భాగానికి పూయడానికి యోగ్యమైంది.

3. బోర్డ్ మిశ్రమం, అవిసె నూనె : ఒక భాగం బోర్డ్ మిశ్రమం, ఒక భాగం అవిసె నూనె చేసి, మలాము తయారు చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఇది మంచి శిలీంధ్రహారి. నీళ్ళు దీని ద్వారా అంత ఎక్కువ దూరపు. చాలా చౌక. కానీ ఈ మలాము కొన్ని నెలలు మాత్రమే ఫలితాన్నిస్తుంది. మళ్ళీ పూయాల్సి ఉంటుంది. ఈ మలామును ఇంటిలోనే తయారు చేసుకోవచ్చు.

4. వైల్ లెడ్ పెయింట్ : దీనితో గాయాన్ని బాగా మూసినా, మూసిన గాయం మాగడం చాలా నిదానం. అంతే కాకుండా, అప్పుడప్పుడూ పూస్తుండాలి. రోగాణువులను చంపే శక్తి లేదు.

5. షెలాకు : అరగును (లక్క) అల్కహోలుతో కరగించుకొని పూయాలి. ఇది రేంజియం పొరను బాగా కాపాడుతుంది. అనుకూలమైన మలాము.

6. తారు : తారులలో అనేక రకాలున్నాయి. కొన్ని అనుకూలం. మరికొన్ని అననుకూలము.

7. ఆస్ఫాల్ట్ పెయింట్ (Asphaltum Paint) : (తారువంటి నల్లని పదార్థం) చాలా ఉత్తమమైన మలాము. దీనితో పాటు షెలాక్ చేరేస్తే, ఇంకా అనుకూలం అవుతుంది. అనేక చెట్ల గాయాలకు పూసే మలాము తయారు చేయడానికి ఇదే ఆధారమైన పదార్థం.

ఇవి కాకుండా మార్కెట్ లో ఈ వస్తుల కోసమే సరైన మలాములు ఉన్నాయి. వీటిని తయారు చేసేవారి సూచనలు అనుసరించి ఉపయోగిస్తే, ఎక్కువ ఫలితాన్నిస్తాయి.

### ప్రత్యేక కత్తరింపు విధానాలు (Special Pruning Methods)

అలంకారపు మొక్కలను కత్తరించే విధానాలు : అలంకారిక మొక్కలు పెంచేది వాటి పువ్వుల, ఆకుల అందచందాల కోసం, రూపం కోసం. వీటిని కాపాడుకోవడానికి లేదా వృద్ధి పథకానికి ఈ మొక్కల్ని అప్పుడప్పుడు

కత్తరిస్తాండాల్. ఈ వనిని సమర్థవంతంగా నడవడానికి ఆయా మొక్కలు పెరిగిడి క్రమం, స్వభావం, పువ్వు వికసించే రీతిని బాగా తెలిసిపెట్టుకొని ఉండాలి.

అలంకారపు మొగ్గలు ఆరోగ్యకరంగా ఉండేందుకు ఏ విధంగా కత్తరించాలి. 1. చచ్చిన, ఎండిన, చీలిన, విరిగిన, ముక్కలైన, రాసుకుంటూ ఉండి, క్రుళ్లిపోతున్న, రోగజ్వలన భాగాలను మొదట కత్తరించి వేయాలి.

2. గాలి, వెలుతురు ప్రసరించేట్టుగా రెమ్మలను వలుచబరచాలి. అప్పుడు పురుగు పుట్ర, రోగాలు మొదలైనవి మొక్కల్లో కుదురుకోవడానికి అవకాశముండదు. అంతేకాకుండా, వలుచబరచిన మొక్కల అన్ని భాగాలకు పడేటట్టుగా టెషడాలను చల్లవచ్చు.

3. మొక్క పై భాగం నుంచి, కొన్ని మొక్కల వేర్లు వరకు విస్తరించి చాలా సాంపుగా పెరుగుతూంటుంది. ఇంత దట్టంగా ఉన్న పై భాగానికి తర్వాత కావల్సినంత నీరు, పోషకాలను, వాటి వేర్లు అందించలేకపోవచ్చు. అటువంటి సందర్భంలో పై భాగాన్ని వలుచబరిచి తీరాలి. ఈ విధంగా చేయడంతో మరొక అనుకూలం కూడా ఉంది. చివరి భాగాలకు పోతున్న పోషకాలు క్రింది భాగాలకూ లభించి, అవి మొగ్గనుంచి పెరగడానికి అవకాశం లభిస్తుంది. క్రింది రెమ్మలు అందులోనూ అడ్డంగా పెరిగిడి రెమ్మలు పొడవుగా పెరిగిడి రెమ్మలకన్నా తక్కువ నీటిని గ్రహిస్తాయి.

అలంకారపు మొక్క రూపాన్ని అందంగా తీర్చి దిద్దడానికి ఏ విధంగా కత్తరించాలి ?

సామాన్యంగా ప్రతి మొక్క జాతికీ దానికంటూ ప్రత్యేకమైన ఒక ఆకారం, రూపం ఉంటుంది. ఈ రూపాన్ని మార్చి మనకు ఇష్టమైన రీతిలోకి మార్పుకోడానికి ఆ మొక్క స్వభావాన్ని, కుశలతను గురించి నిరంతరం గమనించాలి. టోపియ (Topiary) సస్య అలంకారపు కళ - మొక్క - పొదలు మొదలైన వాటిని, పళ్లెల, మృగాల ఆకారంలో కత్తరించి పెంచేకళ. ఈ రకపు పనులకంటా ఇది చాలా అవసరం (కత్తరింపువని). మొక్కల రూపాలను మార్చడానికి, వాటి వృద్ధి కాలంలో చాలాసార్లు కత్తరించాలి. కొనలను కత్తరించి, ప్రక్క రెమ్మలను మూయడం. ఒకే రెమ్మ నుంచి అనేక చీలికల, రెమ్మలు వచ్చేట్టుగా మొగ్గలను త్రుంచుతారు. కావల్సిన దిక్కులో రెమ్మలు పెరిగేట్టు, వేరే దిక్కులో పెరుగుతున్న రెమ్మలను కత్తరించడం, రెమ్మలను వంచడం మొదలైన రీతులలో మొక్క రూపాన్ని మార్చవచ్చు. ఈ కత్తరింపులో మొక్క యొక్క ప్రతి భాగం మరుగుగా చిగురించి మొలకలు పెరిగేట్టుగా చూసుకోవాలి. ఏ భాగం గుల్ల అయినా మొక్క రూపం చెడుతుంది.

అలంకారపు మొక్కలలో పువ్వుల ఉత్పత్తిని పెంచడానికి ఏ విధంగా కత్తరించాలి ?

1. కొన్ని మొక్కలలో బిరుసుగా కత్తరిస్తే, అనేక పువ్వులు మొగ్గలు కూడా కత్తరింపుకు గురౌతాయి. అలా జరగడంతో పువ్వుల సంఖ్య తగ్గుతుంది. కాని వికసించిన పువ్వు గుత్తులు, పువ్వులు, పెద్దవిగా ఉంటాయి.

ఈ రకపు కత్తరింపు అన్ని మొక్కలకు అన్వయించదు. ఈ బిరుసు కత్తరింపు చేత రెమ్మ, అకు చీలికలుగా చీలడం సర్వ సామాన్యంగా జరుగుతూంటుంది.

2. మొగ్గలను త్రుంచడంతో, కొనలను గిల్లడంతో కార్నేషన్, చామంతి, సాక్సు, వర్షిన మొదలైన పువ్వుల మొక్కలలో ఎక్కువ పువ్వులు పుష్పిస్తాయి. కాని వీటి మందం మాత్రం కొద్దిగా తక్కువ అవుతుంది.

పుష్పింతే మొగ్గలలో ప్రక్కనున్న మొలకల్లే మొగ్గలను తుంచడంతో పువ్వుల సంఖ్య తక్కువై, పువ్వుల మందం పెరుగుతుంది. డేలీయ, గులాబీ మొదలైన వాటిని పువ్వు ప్రదర్శనలలో ప్రదర్శించడానికి ఈ విధంగా చేస్తారు.

పువ్వుల మొక్కలను కత్తరించకుండా ఉంటే, లేదా కొద్దిగా కత్తరిస్తే, పువ్వుల సంఖ్య కొద్దిగా ఎక్కువై, పువ్వుల మందం తక్కువ అవుతుంది.

వాడిన పువ్వులను విత్తనాలు రాకమునుపే తీసిపారేస్తున్నారు లేదా కత్తరిస్తున్నారు. వికసింపే అవధిని పెంచుకోవచ్చు. ఇదికూడా ఒక రకపు కత్తరింపే అవుతుంది. విత్తనాలు వచ్చిన తర్వాత మొక్కలు, తమ పోషకాలను ఈ విత్తనాలు బలవడానికి, పెరగడానికి వాటివైపు మరలిస్తాయి. కొత్త పువ్వులను ఇవ్వవు. విత్తనాలు వచ్చి, బలీసిన వెంటనే మొక్కల జీవన చరిత్ర కూడా ముగిసే స్థాయికి వస్తుంది. అందుచేత కొత్త పువ్వులు పుష్పించవు.

పువ్వు పొదల కత్తరింపు : (చిత్రం 8.25)

8.25 పొదలను కత్తరించే రీతి : ఎడమవైపు వలను చేయవలసినది. కుడివైపు పై భాగం కత్తరించవలసిన రెమ్మలను చుక్కల గీతల ద్వారా సూచించబడింది. కత్తరింపు అనువుగా పువ్వు పొదరులను కొన్ని వర్గాలుగా విభజించుకోవచ్చు.

1. వెనుకటి సంవత్సరపు మొక్కల కొన్ని పువ్వులను పుష్పింపజేస్తాయి. ఇటువంటి పొదలను పువ్వులను పుష్పింపజేసిన తర్వాత కత్తరించాలి.
2. కొన్ని ఈ సంవత్సరపు మొక్కలే పువ్వులను వికసిస్తాయి. ఇటువంటి వాటిని పువ్వులు మొగ్గ తొడిగి పుష్పించడానికి ముందే వసంతకాలపు ఆదిలో కత్తరించాలి.
3. కొన్ని పొదలు సతత హరితాలు. వీటిని ఎక్కువగా కత్తిరించాల్సిన అవసరం లేదు.

ఏ యే పొదలను, ఆలంకార మొక్కలను ఎప్పుడు ఏ విధంగా కత్తిరించాలి అనే విషయాలను తర్వాత అధ్యాయంలో వివరించడమైనది.

పచ్చ చెట్ల కత్తరింపు

పచ్చ మొక్కల కత్తరింపులో రెండు స్థాయిలున్నాయి. మొదటిది లేత మొక్కలకు అన్వయిస్తుంది. రెండోది బలీసిన, ఎక్కువ సంవత్సరాల ప్రాచీన మొక్కలకు చెందింది. మొదట కొన్ని సంవత్సరాలలో, లేత మొక్కలలో కత్తరింపు యొక్క ఉద్దేశం, మొక్క రూపాన్ని బ్రీమ్ చేయడానికి - పొదలాగ గాని, వినన కట్టి ఆకారం లోగాని, తీగల పైనగాని, స్తంభాలపైనగాని లేదా తీగల జల్లెడ వంటి వందిరపైన గాని, తాళు కొద్ది ఎత్తుగా, నేరుగా ఉండి, తర్వాత పై భాగం నిండుగా ఉండేటట్టుగా పెంచే మొక్కల్ని స్టాండర్డ్ మొక్కలని అంటారు. ఈ విధంగా బ్రీమ్ చేయడానికి కొన్ని మొక్కలను దిగుసుగా కత్తిరించాల్సి రావచ్చు. కొన్ని రెమ్మలను పొట్టిగా చేయాల్సి రావచ్చు.

అంటుగట్టిన తర్వాత లేదా మొలకలు వేసిన తర్వాత ఒక సంవత్సరం లేదా ఒక ఋతువు పెరిగిన ముక్కిని మేడన్ (Maiden) లేదా కన్న మొక్క అని వ్యవహరిస్తారు. ఈ మేడన్ మొక్కని పొదగా పెంచేట్లుంటే

(చలికాలంలో) సుమారు 60 సెం.మీ. పొడవును వదిలి, కాండాన్ని ఒక కణుపుపైన కత్తరించాలి. మరుసటి సంవత్సరానికి మొక్క పలు కొమ్మలు రెమ్మలను చిగురింపజేస్తుంది.

మొలకల నుండి పెరుగుతున్న 3, 4 కొమ్మల్ని ఏరుకొని, మిగిలిన వాటిని కత్తరించి వేయాలి. ఇవే తర్వాతి మొక్క యొక్క ప్రథమ శాఖలు. (సారుచ శాఖలు - Scaffold branches) అవుతాయి. అందువేత ఈ కత్తరింపు వనిని చాలా జాగ్రత్తగా వేయాలి. అవి పెరిగేడి దిక్కు మొదలైన విషయాలను బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి.

క్రింద నుండి మొలకెత్తే రెమ్మలను గిట్టి వేయాలి. ఈ విధంగా చేయడంతో, మొక్క లేదా చెట్టు కాండం ముందు లావై, పుష్టిగా పెరిగి వెడల్పుగా వ్యాపించే శాఖలతో సురూపంతో పెరగడానికి అనుకూలమవుతుంది.

కొన్ని పళ్ళు చెట్టును 1.25 మీటరు కాండం పెరిగిన తర్వాత, కొన్ని 1.75 మీటరు పొడవు కాండం పెరిగిన తర్వాత పై తెలిపిన క్రమాన్ని ఆచరించాలి. ఇది మొదటి స్థాయి.

రెండో సంవత్సరం ఉపశాఖ ఏరుకొని, మిగిలినవాటిని కత్తరించాలి. మరింత సారుచ రెమ్మలను సారవంతమైన సరిఅయిన కొమ్మల్ని ఏరుకోవాలి.

మూడవ సంవత్సరం మరికొన్ని ఉపరెమ్మలను ఏరుకోవాలి. తర్వాత చెట్టును మొదటి నిర్మలం చేయగల లేదా చిక్కులు, ఇబ్బందులు తెచ్చే భాగాలను కత్తరించాలి.

సమాంతరంగా పెరుగుతున్న రెమ్మలు ఒకవైపు వాలుతున్న కొమ్మలు, గాలి వలన వికారంగా పెరిగిన రెమ్మలు, శక్తి సలింపినవి, విరిగిన, వీలిన లేదా రోగస్థ రెమ్మలు ఈ రకపు ఇబ్బంది కలుగజేసే భాగాలను కత్తరించి వేయాలి. ఆ తర్వాత మొక్క రూపాన్ని కాపాడడానికి, ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు, ఫలాలు ఫలించడానికి, చేయవలసిన క్రమాల్ని అనుసరిస్తూండాలి.

ఏ పళ్ళు మొక్కలను, ఎప్పుడు, ఏ రీతిలో కత్తిరించాలనే విషయాలను తర్వాత అధ్యాయంలో చూడవచ్చు. పళ్ళు మొక్కలను కత్తిరించేటప్పుడు ఒక ముఖ్య అంశాన్ని మరువకూడదు. వీటిలో రెండు రకాల మొగ్గలుంటాయి. వృద్ధి అయిన లోవలి మొక్క, యొక్క మొగ్గ, ఇంకా ఫల మొగ్గ (Fruit bud) ఈ రెండింటిలోనూ కొద్దిగా సన్నని, చిన్నవి ఎక్కువ పదునుగా ఉండి, కాండానికి అంటుకొని ఉంటాయి. సమాంతరంగా ఉంటాయి. ఫల మొగ్గలు, కొద్దిగా పెద్దవి కాండం నుంచి సుమారు లంబంగా వెలువలకు చాచి ఉంటాయి. అనేక సమయాలలో గుంపులు గుంపులుగా ఉంటాయి. ఈ గుంపును స్పర్ (Spur) అంటారు.

వృద్ధి చెందిన మొగ్గల లోవల కాండపు మూలం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇదే వెలువలకు వచ్చి, రెమ్మలుగా పెరుగుతుంది. ఈ మొగ్గ వే దిక్కులో పెరుగుతోందని చూసుకొని కత్తిరించాలి, ఏ దిక్కులో పెరగాలి అనే విషయాలను గమనించి ఆ మొగ్గపైన కత్తరించాలి.

సామాన్యంగా పళ్ల చెట్లు, అవి సుప్రంగా ఉండే కాలంలో - చలికాలంలో కత్తిరించాలి. బేరికాయ, సపోట ఒక సంవత్సరం పైన వయసయిన రెమ్మలలో ఫలమిస్తుంది. కొత్త రెమ్మలుగా కత్తరిస్తే, రెమ్మలు మొలకెత్తుతాయే తప్ప, ఫలితాన్ని యివ్వవు.

## సస్య సంరక్షణ (మొక్కల సంరక్షణ) (Plant Protection)

మొక్కలను శాస్త్రోక్తంగానూ శ్రద్ధతో మాత్రమే పెంచితే వాలదు. మంచి జాతికి (శ్రేష్ఠ జాతికి) చెందిన మొక్కలను తెచ్చి నాటితే వాలదు. ఈ శ్రద్ధ, అసక్తి, ప్రీతి ఇవి ఫలవంతం కావాలంటే, మొక్కలను విత్తునాటిన నాటి నుండి అవి జీవింపినంత కాలం, శత్రు బారి నుండి రక్షిస్తూ ఉండాలి. ఈ శత్రువులు గుంపులు, గుంపులుగా వచ్చినా, లేదా ఒకటి రెండుగా వచ్చినా వాటిని ఎవ్వుటికప్పుడు తొలగిస్తూండాలి. వీటిని తొలగించాలంటే కావలసిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని తోట పెంపక క్రమాన్ని సక్రమంగా నిర్వహించాలి, నిర్వహించాలి. ఈ పనులు చేసేటప్పుడు ఎటువంటి ఏమరుపాటుగానీ, బద్ధకంగానీ వుండకూడదు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముందుగా నాటడంకానీ, లేక సకాలంలో నాటకపోవడంగానీ చేయకూడదు.


మొక్కలకు అనేక రకాల శత్రువులుంటాయి. మొక్కలకు కీడు కలిగించే ఈ శత్రువులను ఆరు (6) రకాలుగా విభజింపవచ్చు. అవి.

1. వైసర్గిక వైసర్గియాలు : ఎక్కువగా ఎండలు కాయడం లేకపోతే అసలు ఎండలు, వానలు లేకపోవడం. ఎక్కువగా వర్షం కురియడం లేకపోతే విపరీత గాలి, దుమ్ము ఉండడం. వీటి వల్ల మొక్కలు ఎండిపోవడమో, కుళ్ళిపోవడమో, విరిగి పోవడమో లేదా అసలు మొలకెత్తకుండా పోవడమో, పెరగక పోవడమో జరుగుతూంటుంది.
2. వ్యజాతి శత్రువులు : గడ్డి మొలకెత్తడం, వరాలంట (విజాతి) మొక్కలు మొలకెత్తడం మొదలైనవి.
3. ప్రాణులు : బొద్దింకలు, పంది కొక్కులు, ఉడతలు, పందులు, పక్షులు, కోతులు, ఆవులు, గేదెలు, మేకలు, గొట్టెలు, ఇత్యాదివి.
4. క్రిమి కీటకాలు : తేనెటీగలు, గొంగళి పురుగులు, నల్లులు, పేడపురుగులు, చీడ పురుగులు, చెదలు ఇత్యాదివి.
5. రోగాలు : (a) పోషక పదార్థాల కొరత వల్ల, నీరు నిలవడం చేత వచ్చే రోగాలు. పురుగు కాటువల్ల క్రమంగా నశించడం ఇత్యాదివి. (b) సస్యాను (Bacteria - బ్యాక్టీరియా), శిలీంధ్రం (Fungus), వైరస్ (Virus) కారక రోగాలు.
6. మానవుల చేత ఏర్పడేవి : రాళ్ళు రప్పలు, పుండ్లు, పురుగులు విధ్వంసకాలు (Vandals), పూజాపునస్కారాల కోసం, మరొకరి ఇంటి నుంచి పువ్వుల్ని కోయడం (గిల్లడం), ఏం చేస్తున్నామనే విషయం తెలియక పిల్లలు గిల్లి వేయడం, ఇత్యాదివి.





9.1



9.2

ఈ శత్రువుల నుంచి మొక్కల్ని చిగురించిన వాటి నుంచి క్రమంగా వృద్ధిచేసేటప్పుడు అన్ని కాలాల్లోనూ ఇబ్బందులు, కష్టాలు ఆపాయాలు ఉండనే ఉంటాయి.

ఈ శత్రువుల నుండి రక్షించి కాపాడుకొనే క్రమానికే 'సస్య సంరక్షణ' అని అంటారు. ఈ క్రమాలను ఈ క్రింది విధంగా స్థూలంగా వివరించవచ్చు. వివిధ రకాల తోటల గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు వీటి గురించి అక్కడ వివరించడమైనది.

1. నైసర్గిక వైవరీత్యం నుంచి మొక్కల్ని కాపాడుకోవడం చాలా కష్టం. కానీ తోట మట్టా గాలిని అడ్డుకొనే అడ్డు గోడలను కట్టడమో, లేదా కంచలను చెట్ల ద్వారా పెంచడమో చేయాలి. లేత మొక్కలకు, నీడ పడేటట్లు చేయడమో లేదా ఎండ తగలకుండా ప్లాస్టిక్ షీట్స్ ని ఆ మొక్కలకి కట్టి గాలి, ఎండ, వానల బారి నుంచి కొంతలో కొంతవరకు రక్షించుకోవచ్చు. పాశ్చాత్య దేశాలలో కరుడుగట్టిన చలి, వర్షాల బారి నుండి రక్షించడానికి మొక్కలను సంరక్షించు కోవడానికి వాటిని పెప్పడనం ఇచ్చే గాజు ఇళ్ళలో (Heated Green Houses) పెంచుతారు. మన దేశంలో ఈ రకపు వాలావరణం లేకపోవడం చేత, ఈ రకపు ఏర్పాటు మనం చేసుకోవవలసినది లేదు. అయినా గాలి దెబ్బ తగలకుండా, ఎండ దెబ్బ తగలకుండా అతి కోమల మొక్కలను పెంచడానికి వీలయిన గాజు ఇళ్ళని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.

2. న్యజాతి శత్రువుల బారి నుండి మొక్కలను కాపాడుకోవడం : న్యజాతి శత్రువులలో రెండు రకాలు. గడ్డి పెరగడం, వరాలంట సస్యాలు (Parasites). మామిడి చెట్టు మీద పెరిగేదానిని నాశనం చేసే రోరాంథస్ (Loranthus - బదనిక), జొన్న మొక్కల వేళ్ల పైన పెరిగి దాని చెత్తను మ్రగ్గేట్టు చేసే స్ట్రీగ (Striga), తెల్ల చెత్త (వేళ్ల ద్వారా ఏర్పడిన చెట్ల చెత్త) పొగాకు, ప్రాకే ఓరోబాంకి Orabanche - బోడి చెట్టు - నిప్పు చెట్టు (మండిన చెట్టు), కొన్ని ద్విదళాల చెట్లు, పైన పెరిగే డోడర్ (Cuscuta - కన్యక - బదనిక) మొదలైనవి వరాలంటాలు. ఇవి మొక్కల భాగాలపైన (చిత్రం 9.1) పుట్టి జీవిస్తాయి.

9.1 ఉప జీవి సస్యాలు (ఉప జీవి మొక్క) ఆశ్రయ సస్యపు వేరు నుంచి సస్య రసాన్ని పీల్చుకొంటుంది. ప్రకాండమై యుండవచ్చు. (చిత్రం 9.2) వేరుని వాటి రసాన్ని పీల్చుకొని గ్రహించి ఆశ్రయ చెట్లను నిర్మలం చేస్తుంది.

9.2 ఉప జీవి సస్యం ఆశ్రయ సస్యపు కాండం నుంచి సస్య రసాన్ని గ్రహిస్తుంది (పీల్చుకొంటుంది).

కొన్ని సమయాలలో అవి మొక్కల్ని నాశనం చేస్తుంటాయి. వీటి బాధను తొలగించడానికి వీటిని చూసిన వెంటనే ఏర్పేస్తుండాలి. ఆ విధంగా చేయకుండా ఉంటే అది పెరిగి పెద్దదై వాటి బీజాల్ని ఉత్పత్తి చేసే చుట్టు ప్రక్కల వ్యాపిస్తుంది. మామిడి చెట్టు పై పెరిగే, బదనికను ఏరి వేయడమే కాకుండా, అది పెరిగిడి రెమ్మ ముఖ్యంగా కవలలైతే (చిలికలు కలిగుంటే) దాన్ని కొట్టేయాలి. కొట్టి వేసిన వేళ్లకు ప్రాకే చిలికల్ని కూడా చూసిన వెంటనే పీకేయాలి.

విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి అవకాశాన్ని ఇవ్వరాదు. ఈ తెల్ల చెట్ల గడ్డి బెడద ఎక్కువగా ఉంటే ఆ పెరుగుదలను అరికట్టడానికి రెండు మూడు సంవత్సరములు ఆ నేలను అలాగే వదిలివేయడం ఉత్తమం. ఈ చెత్త చెఱకుకు కూడా అంటుకోగలదు. చెఱకు పెరిగిన తర్వాత గడ్డి పెరగడం చేత, ఈ గడ్డిని కొద్దిగా తొలగించవచ్చు. పొగాకుకు పెట్టే నిప్పు వద్దలి, ఈ గడ్డిని తొలగించే వద్దలిలోనూ అనుసరించవచ్చు. దీని విత్తనాలు పొగాకు విత్తనాలకన్నా నూత్నమైనవి. చాలా కాలం నేలలో (భూమిలో) మిగిలిపోతూ వుండవచ్చు. అందుచేత ఈ మొక్కల విత్తనాలు విడవక ముందే చాలాసార్లు ఏరివేస్తూ ఉండాలి.

గడ్డి మొలకలు : మొక్కల వరమ శత్రువు. స్వజాతి శత్రువు అయినందున తోటమాలి స్రీతితో పెంచే మొక్కలకి ఎక్కువ కీడు చేస్తుంది. మొక్కలు మృదువైనవి కోమలమైనవి అయినప్పుడు ఇవి వృద్ధి చెందకుండా గడ్డి మొలకలు పెరిగి మట్టిలోని పోషక పదార్థాల్ని గ్రహిస్తాయి. దాంతో ఆ మొక్కలకి సకాలంలో నీరు పోషక పదార్థాలు అందడం కొరవడుతుంది. గడ్డి మొక్కలు చాలా దృఢమైనవి. నీరు లేకుండా, పోషక పదార్థాలు లేకుండా కొంతకాలం బ్రతకగలవు. శ్రేష్టమైన మొక్కలు నీరు పోషక పదార్థాలు లేకపోతే వెంటనే నశిస్తాయి. గడ్డి మొక్కలపేర్లు ఎక్కువ రోతుగా విశాలంగా వ్యాపించి నేల లోపల నీటిని పోషక పదార్థాల్ని ఎక్కువ మోతాదులో దోచుకోగలవు. వీటికి రోగాలు, రొండ్లులు తక్కువ. ఇవి త్వరగా పెరిగి, త్వరగా వండి విత్తనాల్ని చాలా రోతులోకి దూరంగా సులభంగా వెదజల్లుతాయి. అందుచేత వీటి సంతానానికి కొరత ఉండదు. వీటి విత్తనాలు కూడా నేలలోపల కొన్ని సంవత్సరాల కాలం ఒదిగి గుప్తంగా ఉండి, మొలకెత్తడానికి అనుకూల పరిస్థితి కోసం వేచి వుండగలవు. విత్తనాలు కూడా అసంఖ్యాకంగా ఉంటాయి. త్వరగా మొలకెత్తగలవు. ఈ కారణాలచేత ముద్దుగా పెంచిన కోమల మొలకలకు విరోధుల్ని మొలకెత్తనియకుండా ముందుగానే వాటిని అడ్డుకొనే ఏర్పాట్లు చేయాలి.

గడ్డి మొక్కలున్న చోట మృదు మొక్కలు అసలు మొలకెత్తవు. ఇవి గడ్డి మొలకలకన్నా ఎక్కువ అమూల్యమైనవి. ఎక్కువ కోమలమైనవి. ఎక్కువ శ్రద్ధ అధ్యయన ఖర్చును కలిగించేవి. అందుచేత తోటమాలి, గడ్డి మొక్కల కలుపు మొక్కల విషయమై ఎక్కువ శ్రద్ధతో జాగ్రత్త వహించాలి. కలుపు మొక్కలు పెరగకుండా చూడాలి. ఒకవేళ పెరిగితే, తక్షణం వాటిని తొలగించే క్రమాల్ని అనుసరించాలి.

కలుపు మొక్కల్ని నశింపజేయడానికి లేదా నిర్మూలించడానికి, ఎన్నో క్రమాలన్నాయి. కాని కలుపు మొలకలు మొలకెత్తిన తర్వాత వాటిని తొలగించడం కన్నా, అవి పెరగకుండా ఉండేటట్లు లేదా వృద్ధి అవ్వకుండా ఉండేందుకు ముందు విచారణ (Prevention) క్రమాల్ని పాటించడమే అత్యుత్తమమైన పని. ఈ క్రమాల్ని అనుసరించాలంటే ఈ కలుపు మొక్కలు రావడానికి (మొలకెత్తడానికి) కారణాలేమిటో ! అవి మొలకెత్తే విధానాలేమిటనే విషయాల్ని తెలుసుకోవాలి.

ఎ. కలుపు మొక్కల విత్తనాలు : మంచి (శ్రేష్ట) మొక్కల జతలో ఈ కలుపు మొక్కలు చేరి తోటలో ప్రవేశిస్తాయి. ఈ విధంగా తోటలో జొరబడకుండా విత్తనాల్ని బాగా ఏరివేయాలి. శ్రేష్టమైన మొక్కల విత్తనాల్ని వ్యవసాయదారుల

విత్తనాల వ్యాపారి దగ్గరే గ్రహించాలి. సొంత విత్తనాల్ని నాటేటట్టుయితే వాటిని బాగా చెరిగి, ఏరి శుభ్రమైన టిన్నులోనో, సీసాలోనో చేర్చి పెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని ఉపయోగించాలి.

బి. కలుపు మొక్కల విత్తనాలు ఎరువుల ద్వారా తోటలోకి వచ్చి చేరుతాయి. సరిగ్గా, శాస్త్రీయంగా తయారు చేసిన వ్యవసాయదారుల కొట్టేలోనే ఎరువులను, కంపోస్టులను కొనుగోలు చేయాలి. వీరి దగ్గరున్న ఎరువులలో కలుపు మొక్కల విత్తనాలు అరుదుగా వుంటాయి. ఈ విధంగా శాస్త్రీయ పద్ధతితో ఎరువులను తయారు చేసేటప్పుడు, గుంట్లో లేదా కుప్పలో, లోపలవున్న కలుపు మొక్కల విత్తనాలు క్రుళ్లిపోతాయి లేదా మొలకెత్తే శక్తిని కోల్పోతాయి. అందుచేత తోటలకు శాస్త్రీయ పద్ధతిలో బాగా తయారు చేసిన ఎరువులనే చేయాలి.

సి. గత సంవత్సరపు కలుపు మొక్కలు లేదా వాటి ద్వారా ఏర్పడిన విత్తనాలు ఆ తోటలో వ్యాపించి వుంటాయి. వీటిని తొలగించడానికి రెండు మార్గాలున్నాయి. కలుపు మొక్కల విత్తనాల్ని వెదజల్లడానికి ముందుగానే ఆ మొక్కల్ని నాశనం చేయడం ఒక మార్గం. సామాన్యంగా విత్తనాలు చల్లిన నేలలో ఆకులను కలుపు మొక్కల్ని పీకి చేయడం కష్టం కానీ సరుగగా చల్లిన విత్తనాల మధ్య కలుపు మొక్కల్ని గుర్తించి చేతితో పీకి పారేయడమో లేదా తోటమట్టి త్రవ్వడానికి ఉపయోగించే పరికరాల ద్వారా పెకిలించి పారేయడం సులభం. ఇది రెండవ మార్గం. మాగిన మట్టిలో మొక్కల్ని నాటడం మంచిది. ఎండచేత కలపు మొక్కలు ఎండి పోయి నాశనమవుతాయి. పెద్ద అగడ్తలు లేదా లోతైన గుంటల లోపలి కలుపు మొక్కలు, విత్తనాలు అడుగునుండి పైకిచ్చి నాశనమవుతాయి

తుమ్మగడ్డ (కొన్నారి గడ్డలు) (Cyperus rotundus) సైపర్స్ రొటండస్: గరిక ఎక్కువైన భూమిలో పరిశోధించడానికి ఒక పెద్ద అగడ్డ త్రవ్వడం వాలా ముఖ్యమైనది ఇటువంటి నేలలో సాధారణంగా దున్ని ఉంచితే తుమ్మ గడ్డలు వ్యాపింపలేవు.

డి. కొన్ని కలుపు మొక్కల విత్తనాలు సైన వుండే చెట్ల ద్వారాను చుట్టు ప్రక్కలను పొలాల నుండి రావడానికి అవకాశముంది. అందుచేత పొలాల అంచులను పెద్ద చెట్ల అంచులను అప్పుడప్పుడు శుభ్రపరుస్తుండాలి. కలుపు మొక్కల్ని నాశనం చేయడం అనేది - సామూహిక పని. కేవలం మన తోటలోని కలుపు మొక్కల్ని పీకివేస్తే చాలదు. ఆ పని ఊరులోని రైతులందరూ, తోటమాలలందరూ ఒకటే ఉమ్మడిగా ఐకమత్యంతో చేస్తే ఈ పని సమర్థవంతంగా సాధింపవచ్చు.

ఇ. మరికొన్ని కలుపు మొక్కల విత్తనాలు వక్షుల రెక్కలకి అంటుకొని, చిత్ర ద్వారా తోటలలో పొలాలలో చేరుతాయి. ఈ వక్షులు దగ్గరలో ఉన్న పొదలలో మొక్కలలో చెట్లలోని పళ్ళని తిని, మల మూత్రాదుల ద్వారా వాటి విత్తనాల్ని బయటకు వ్యాపింప చేస్తాయి. ఈ రకపు కలుపు విత్తనాల్ని రాకుండా చేయటం కష్టసాధ్యమైంది.

ఎఫ్. ఇంకా కొన్ని గాలి ద్వారా కొట్టుకొని వస్తాయి. దీన్ని ఆడ్డుకోడానికి మనం ఎటువంటి క్రమాన్ని అనుసరింపలేము. ఊర్లో అందరూ తమ తోటల్ని, పొలాల్ని శుభ్రంగా చదును చేసుకొని ఉంచుకుంటే కొంతలో కొంత ఈ రకపు కలుపు మొక్కలు రాకుండా అడ్డుకోవచ్చు.

జి. నీటి మూలంగా కూడా ఈ కలుపు విత్తనాలు విస్తరిస్తాయి. బావి నీటి ద్వారా కాదు కానీ, చెరువు, కొలను నీటి ద్వారా, నీటి కాలువ ద్వారా అక్కడక్కడా పెరిగిన కలుపు మొక్కలు ఇతర మొక్కలతో చేరి వస్తాయి. అందుచేత నీటి కాపుల గట్టులను అప్పుడప్పుడూ ఈ కలుపు మొక్కలు రాకుండా శుభ్రం చేయాలి.

కలుపు మొక్కల్ని నాశనం చేయడం : పైన పేర్కొన్న క్రమాలన్నీ, రాకముందే అడ్డుకొని ముందు జాగ్రత్త వద్దతులు అనుసరించినా కూడా తోటలో కలుపు మొక్కలు తలెత్తుతూనే వుంటాయి.

కలుపు మొక్కల్ని నాశనం చేయడానికి కొన్ని క్రమాలు, వద్దతులు ఈ క్రింద వివరించబడినాయి.

1. సాగుబడి క్రమాలు : వరి విత్తనాలు నాటడానికి ముందుగా పొలాల్ని దున్ని శుభ్రపరచటం ఈ కలుపు మొక్కల్ని నాశనం చేయాలి. దున్నడం ద్వారా గుంటలు, అగడ్తలు ద్వారా కలుపు మొక్కల వేర్లను పాతి పారేయవచ్చును. రెండు గుంటలకు మధ్య లేదా అగడ్తలకు మధ్య కొద్దిగా స్థలాన్ని వదిలేస్తే ఈ మధ్య స్థలంలో పుట్టే కలుపు మొక్కల్ని గుంటల ద్వారా అగడ్తల ద్వారా నాశనం చేయవచ్చు. నీటి వసతులున్న తోటలలో ఇంకొక క్రమాన్ని అనుసరించవచ్చు. పొలాన్ని లేదా తోటని దున్ని, నీరు వదిలితే ఆ నీటి సహాయంతో ఎన్నో మొక్కలు మొలకెత్తుతాయి. ఈ మొలకలు మట్టిపైకి వచ్చినప్పుడు, తోటని దున్నేటప్పుడు ఆ దున్నే మట్టితో నొక్కి నాశనం చేయవచ్చు. దీన్ని మట్టి శోధన ద్వారా సాధించే పద్ధతి లేదా చక్కబరచే క్రమమని వ్యవహరించవచ్చు.

ఇదే రకానికి చెందిన ఇంకొక రకపు క్రమాన్ని అనుసరించవచ్చు. నీళ్ళు నిలువ ఉండగలిగిన నేలలో (భూమిలో) ఈ క్రమాన్ని అనుసరించవచ్చు. ఈ తోటలలో పొలాలలో నీరు బాగా పారింది కొంతకాలం నీళ్ళు నిలువ ఉండేటట్లు చేయాలి. నీళ్ళు ఒకటి రెండు వారాలు నిలువ వుంటే కలుపు మొక్కల విత్తనాలు ఆ నీటిలోనికి వెళ్లి నశిస్తాయి. కానీ ఈ క్రమంలో నీరు ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. కానీ కలుపు విత్తనాలు నీటిలో మారి నాశనమవుతాయి.

విత్తనాలు చట్టిన తర్వాత, పైరు నాటిన తర్వాత మొలకెత్తే కలుపు మొక్కల్ని చేతితోనే పారమొదలైన వరికరాల ద్వారానో పీకివేయాలి (పెరికి పారవేయాలి) ఈ విధంగా చేయాలంటే విత్తనాల్ని చల్లడం లేదా మొక్కల్ని కొంత స్థలం వదలి వరుసగా నాటడమయితే అనుకూలంగా వుంటుంది. చిన్న మొక్కల్ని నాటేటప్పుడు కూడా వరుసగా నాటాలి. అప్పుడు కలుపు మొక్కలు ఏరి పారవేయడానికి నీలుగా వుంటుంది.

2. మొక్కల పరివర్తన (Crop rotation) : తోటల్లో, పొలాల్లో మొక్కల్ని ఒకే వరుసలో నాటితే దానివల్ల ఎన్నో లాభాలున్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఒకే రకపు మొక్కల్ని పెంచితే, ఆ తోటలో ఉన్న పారమంతా మొదటి రెండు సంవత్సరాలలో నాటిన మొక్కలు గ్రహించి ఆ తర్వాత వేసిన మొలకలు సరిగ్గా మొలకెత్తవు (చూడండి కృషి పనులు). రోగాలు కాటకాలు ఎక్కువ అవుతాయి. ఒకేరకపు మొక్కల్ని వరుసగా ప్రతి సంవత్సరం నాటడం వల్ల ఒకే రకపు పోషక పదార్థాలు ఖర్చు అయి లేదా క్రమంగా తగ్గి, పెరుగుదల కుంఠపడుతుంది. అదే సమయంలో

కలుపు మొక్కలు మిగిలిన పోషక పదార్థాల్ని గ్రహించి వివరీతంగా పెరిగిపోతాయి. ఈ విధంగా కాకుండా వివిధ రకాల మొక్కల్ని ఒకటైన తర్వాత ఒకటి, రక రకాల మొక్కల్ని పెంచడం చేత మొక్కల పరివర్తన చేత నేలలోని పోషక పదార్థాల్ని అన్ని రకాల మొక్కలు సరిసమంగా గ్రహించి పెరగడంతో కలుపు మొక్కలు తలెత్తవు. అందులోనూ దుంప మొక్కలు వేసే, వాటి కోసం త్రవ్వనప్పుడు కలుపు మొక్కలు పైకి వస్తాయి. వాటితో పాటు వాటి విత్తనాలు పైకి వస్తాయి. వాటిని వీరి పారవేయవచ్చు.

3. ఉత్తమమైన ఎరువులను వేయడం : బాగా మిశ్రమమైన ఎరువులు వేయడం వల్ల వాటిలో మరి ఏ యితర విత్తనాలు చేరడానికి అవకాశంలేదు. కాని కొన్ని సందర్భాలలో కృత్రిమ ఎరువుల్ని లేదా పిండి పదార్థాల్ని లేత మొక్కలకి వేసినప్పుడు అవి సులభంగా విస్తరించి కలుపు మొక్కలు పెరగడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు కలుపు మొక్కలు మొలకెత్తవచ్చు.

4. రసాయనికాల ద్వారా సస్యనాశకాల్ని సంహరించడం లేదా రసాయనికాల ద్వారా మొక్కల శత్రువుల్ని నాశనం చేయడం (Herbicides గుల్మ నాశకం) : కొన్ని రకాల రసాయనిక పదార్థాల్ని వేయడం చేత మొక్కల జతలో పెరిగే కలుపు మొక్కలు నశిస్తాయి. పూర్వకాలంలో క్రిములను నాశనం చేయడానికి, నల్బారిక్ ఆమ్లం, బరన్ సల్ఫేట్, బోరాక్స్ (Borax) సోడియం కార్బనేట్, కాసర్ సల్ఫేట్ (మైలుతుత్తం) సోడియం క్లోరైడ్, వంట ఉప్పు (రాళ్ళుప్పు) (సోడియం క్లోరైడ్) మొదలైన రసాయనిక పదార్థాల్ని వేసేవారు. కానీ ఇటీవల హార్మోన్స్ వత్తు నాశనకారిని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ రసాయనిక పదార్థాల ద్వారా కలుపు విత్తనాలు నశించి, మొలకలు చక్కగా వృద్ధి చెందుతాయి. వీటిలో మొట్ట మొదటగా ఎక్కువ వాడుకలో వస్తుంది. 2, 4-D, MCPA కలుపు మొక్కల నాశకాలు. ఇవి అనేకరకాల విశాల ఆకుల కలుపు మొక్కల్ని నాశనం చేసేరకం కాబట్టి వీటిని గోధుమ, వరి, రాగి మొదలైన తృణ సంతాన (Grass family) మొక్కలకి వేయడం పరిపాటి అయ్యింది.

ఈ నాశక రసాయనిక పదార్థాల్ని మొక్కలకి వేయాలంటే వాటిని తగు పాళ్ళలో ఒక క్రమ వద్దతిలో వేయాలి. ఆ విధంగా వేయకపోతే ఈ రసాయనిక పదార్థాల ద్వారా జరిగే ఉపకారంకన్నా అవకారమే ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఈ రకపు హార్మోన్ నాశనకాల్లను పూదోటలలో గడ్డి పెంచిన తర్వాత వేయడం మంచిది.

ఈ పదార్థాల్ని స్ప్రేయర్ (సంహరణ యంత్రం) ద్వారానో లేదా పూదోటలలో నీళ్ళు పోయడానికి వుపయోగించే చెల్లి పాత్రగాని (రోస్ - Rose) గొట్టం పాత్రగాని నీటి క్యాన్స్ నుగాని (Water Cans) ఉపయోగించాలి. కాని స్ప్రే వేసేటప్పుడు చుట్టుప్రక్కల చెట్లకు పడుతుందనే భయం వుండడంచేత, వీటిని నీటితో కలిపి ఉపయోగించడం మంచిది. ఈ విధంగా వేయడం చేత ఎక్కువ రసాయనిక పదార్థాలు నీరు ఎక్కువ ఖర్చు అవుతాయి. కాని ఇతర మొక్కలు ఎక్కువగా నాశనమవుతాయి.

ఈ రసాయనిక పదార్థాలు మృదు వున్న మొక్కలకు చాలా హానికరాలు. కాబట్టి వీటిని వేసిన తర్వాత నీటి తొట్టెల్లో బాగా శుభ్రపరచాలి. కలుపు మొక్కలు విశాల (వెడల్పు) ఆకుల చెట్లు కాకుండా (non-broad- leafed

were) గడ్డి జాతికి చెందినవైతే ఈ పై పేర్కొన్న కలుపు మొక్కల, నాశనకారి ద్వారా ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు. గడ్డి జాతికి చెందిన కలుపు మొక్కల్ని నాశనం చేయడానికి 'డలాపాన్' (Dalapon) మొదలైన పదార్థాల్ని వేయాలి.

ఇటీవల మార్కెట్లో లభించే కొన్ని కలుపు మొక్కల నాశనకారిల పేర్లు వాటి ఉపయోగాల్ని ఈ క్రింద పట్టిక రూపంలో ఇవ్వబడినాయి. ప్రాణుల ద్వారా ఏర్పడే ఇబ్బందులు (ప్రాణులే శత్రువులుగా పరిగణించడం) పంది, నక్క, మేక, ఆవు, గొట్టె మొదలైన పెద్ద ప్రాణుల ద్వారా ఏర్పడే నష్టాల్ని తోటమాలి ఎంతో కష్టపడి కష్టంతో ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. వీటి నుండి తోటను రక్షించడానికి తోటకు చుట్టూ బలమైన కంచెనో లేదా బలమైన గోడనో కట్టాలి.

కంచె దట్టంగా ఉండడమే కాకుండా, ఎత్తుగా కూడా ఉండాలి. అనుకూలమైన కంచె మధ్యలో ముళ్ళు కంచెను దిగించాలి.

కలుపు మొక్కల నాశన కారిలు


కలుపు మొక్క.	వస్తువు/పదార్థం	తయారు చేసేవారు
గడ్డి వాము	MCPA	ఫేర్డ్, వర్డ్
కలుపు మొక్కలు	2, 4 - D మెకోప్రాప్ (Mecoprop)	(Verdone) డికోబాక్స్ (Dicotox) లోరెనాక్స్ (Lornox) క్లోవోటాక్స్ (Clovotox)
వీధి కాలువదారి మొదలైన చోట్ల	PCP సిమాస్పిన్	ప్రిమక్సి, స్ప్రెక్స్, (Sprex)
వచ్చే కలపు మొక్కలు	(Simazine) మోనూరాన్ (Monuron)	వీడెక్స్, టెల్వార్. టీల్వార్ (Telvar)
గడ్డి వంటి కలుపు మొక్కలు	డాలాపాన్, అమెట్రోల్ (Amitrole) టి.సి.ఎ. (T.C.A.)	డౌపాన్ (Dowpan) విడాల్సెర్

లేదా ముళ్ళ చెట్లను పాలు కురిపించే చెట్లను తోట చుట్టూ పెంచాలి.

కేవలం తీగల కంచె ద్వారా అంత ప్రయోజనం ఉండదు. అనేకమైన ప్రాణులు తీగల మధ్య దూరి వచ్చేయడానికి అవకాశముంది. ముళ్ళ చెట్లను పెంచినా, కొన్ని సమయాలలో దాన్ని కత్తరించో వంచో లోపలికి వస్తుంటాయి. అందువల్ల తీగల రెండు వైపులా త్వరగా పెరగే ముళ్ళ చెట్లను పెంచడం ఉత్తమమైంది. త్వరగా పెరగే కంచె తీగలు, చెట్లు కొన్ని క్రింద వివరించడమైనది.

1. ఇందుగు చెట్టు, ఎనుగిందు కాడు - చాలా కాలం నిలువగల కంచె చెట్టు. దీన్ని ఒక దిబ్బ పైన నాటి, దిబ్బ చుట్టు ప్రక్కల కందకాల్ని త్రవ్వితే మంచిది. ఇందుగు చెట్టు పెరిగే వరకు, ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు ఈ దిబ్బ కందకం తోటకు కొద్దిగా రక్షణనిస్తుంది.
2. పాపాయి చెట్టు, బ్రహ్మ జెముడు (*Prickly pear opuntia dilleni*) చాలా యుక్తమైన కంచె చెట్టు. సులభంగా ఒత్తుగా పెరిగే చెట్టు. దీని ముళ్ళు ఎటువంటి దొంగలనయినా దూరంగా ఉండేట్లు చేస్తుంది. కానీ అదే సమయంలో హద్దు మీరి తోటను ఆక్రమించుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి తోటమాలి ఈ కంచె వేసి తాను కూడా జాగ్రత్తగా తోటను కాపాడుకోవాలి.
3. సీమ చింత చెట్టు, దస్య, బెంటు చెట్టు (*Pithecollobium dulce*) గట్టిదైన కంచె. కాండం లావుగా వుంటుంది. గట్టి ముళ్ళుని కలిగుంటుంది. దీన్ని హద్దులో పెంచుకోవచ్చు. అప్పుడప్పుడూ సరిచేస్తుంటే చిగురిస్తూనే ఉంటుంది. కావల్సినప్పుడు పాడవుగాను పెంచుకోవచ్చు. పెరిగే రెమ్మల్ని స్తంభాలుగా, కంచెలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. రెమ్మలను విభజించి, అడ్డుగానూ వంచి, పెంచుకోవచ్చు. ఈ చెట్టు లేతగావున్నప్పుడు వీటి ఆకుల్ని మేకలు, అవులు తింటాయి కాబట్టి వాటి నుంచి చెట్లను కాపాడుకోవాలి. రెండు మూడు వరుసల్లో దీని బీజాలు నాటి, రెండు అడుగుల ఎత్తుకు పెరిగిన తర్వాత, వీటి పై భాగాన్ని కత్తరించాలి.
4. అడవి కాళికాళు (*Thevetia nerifolia Yellow Oleander*) ఇది సులక్షణమైన చెట్టు. అందుచేత/దీన్ని అలంకారికంగానూ ఉపయోగించుకోవచ్చు. కంచెగానూ వాడుకోవచ్చు. నిత్యకళ్యాణం పచ్చిలోరణంలా ఎప్పుడూ పచ్చగానే వుంటుంది. (నిత్య పచ్చదనం కలిగుంటుంది). దీన్ని కత్తరించకుండా వదిలేస్తే 15 అడుగుల ఎత్తుకు పెరుగుతుంది. ఈ విధంగా పెరగడానికి వదిలేస్తే క్రింది భాగం డొల్లగా అవుతుంది. దీన్ని విత్తనాలు వేసి పెంచుకోవచ్చు.
5. ముళ్ళున్న కొండమాచి (గచ్చకాయ) (*Cammi Phora berryli*) ఒత్తుగా అభేద్యంగా, ముళ్ళతో పెరిగే కంచె. దీన్ని అప్పుడప్పుడూ సరిచేస్తూ ఉండాలి. దీన్ని వర్షాకాలంలో వర్షాలు కురవడానికి ముందే రెమ్మల్ని (కొమ్మల్ని) నాటి పెంచవచ్చు.
6. జెముడు : ఇందులో కొన్ని రకాలున్నాయి. అవి కంచెగా పెంచడానికి ఉపయోగపడతాయి. గుబురు జెముడు (చెదర జెముడు - *Euphorbia antiquorum*) కర్ర జెముడు (బోడి జెముడు - milk hedge - *Euphorbia tirucalli*) దీని పాలు తగిలితే మంట పుట్టడం చేత అవులు మొదలైనవి సులభంగా రావు. వీటిని ముక్కలుగా నరికి లోతుగా పాతి పెంచవచ్చు. కొద్ది కాలమైన తర్వాత క్రింద భాగం డొల్ల అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ముళ్ళు చేత కప్ప పెట్టాలి. లేదా కొత్త ముక్కల్ని (కొమ్మల్ని) నాటాలి.





9.3



9.4

7. గోరంట (సుదరంగి, మొహంది) (*Lawsonia inermis - Henna*) దీన్ని ఒత్తుగా కత్తరిస్తూ పెంచవచ్చు. దీన్ని బీజాల (చిత్తనాలు) ద్వారా లేదా కొమ్మలు నాటడం ద్వారా పెంచవచ్చు. విషమదారి (కుండలి కుక్క, గొడుగు *Clerodendron inerme*) లందరూ కర్మిక పండు చెట్టు (*Carissa Carandas - కరండ్*) గడ్డిని గిల్లే గడ్డ (ముదురు గడ్డ *Arundo donax*) అరుండ్ డోనాక్స్ (దొండ - *Dodonea - Viscosa*) కస్తూరి జాలి - అగస, జీసంగి (*Sesbania aegyptica*) ఎర్ర కృంచకం - దాతనారాయణం - నీరంగి, సుకేశ్వర (*Delonix elata*) ఎర్ర జిగురు చెట్టు (*Cesalpinia pulcherrima - Peacock flower*) నెమలి పింఛం చెట్టు మొదలైనవి తోట కంచెకు ఉపయోగపడే చెట్లు, తీగలు.

కంచెలు కొన్ని ప్రాణులను ఆడ్డగిస్తాయి. కోతి, పక్షులను ఆడ్డగించలేవు. అందుచేత వీటి బారి నుండి తప్పించడానికి చిల్లుల బొమ్మల్ని భయం కలిగించడానికి ఉపయోగించడం, బెదర గొట్టే శబ్దాల్ని (పటాసుల శబ్దం చేయడం) మొదలైన క్రమాల్ని అనుసరించాలి.

పందికొక్క, ఉడతల బెడడ : వీటి ద్వారా ఏర్పడే నష్టాన్ని భరించడం కష్టసాధ్యం కాబట్టి వీటి నుండి నిరంతరం తోటని రక్షిస్తుండాలి. తోటలోని బిలాలు (గుంటలు) సందులు, పంది కొక్కల నివాస స్థానాలు. గుంటలు, బిలాలు, సందులున్నంత కాలం ఈ పంది కొక్కల వల్ల నష్టాలేర్పడుతూనే వుంటాయి. పంది కొక్కలు తోటలో నివాసం ఏర్పరచుకోక మునుపే వాటిని తరిమి కొట్టాలి. తోటలో ఎక్కడ సందులు, గొయ్యలు లేకుండా చూసుకోవాలి. అప్పుడప్పుడూ తోటలోని గొయ్యలకి (గోతులకి) సైయన్ గాస్ (*Cyanogas*) (చిత్రం 9.3) అనే పొగని నింపి లేదా రాటోఫ్ పిక్స్ (*Ratofix*) అనే గుళికలను మేపా గుంటల, సందులను చెత్తాచెదారాలతో (కుప్పతో) మూసివేయాలి. ఈ ఔషధం, గుంటల, సందులలోని మట్టిలోని తేమ ద్వారా విషవాయువును ఉత్పత్తి చేసి, ఎలుకల్ని, పంది కొక్కల్ని నాశనం చేస్తుంది. ఏ ఒక్క గుంటని గాని, సందుల్ని గాని, చిల్లుల్ని, కన్నాలను మందువేయకుండా వదలివేయకూడదు.

9.3 ఎలుక కన్నాలకి 'గ్యాస్' నింపే పంపు సయాన్ గ్యాస్ పంపు.

అక్కడికక్కడే ఎలుక పంది కొక్కలకు వాటికి రుచించే ఆహారపు ముక్కల్ని నూనెతో చేసిన పదార్థాలు వడ, బజ్జీ ఇల్వోడివి బోనులో పెట్టి బోనులను పెట్టాలి. ఇదే కాకుండా విషం కలిపిన ఆహారాన్ని (Bait) పెట్టాలి. ఈ విషాలలో ఎక్కువ చురుకైన విష పదార్థం (Zinc Phosphide) ఇటీవల వార్ఫరీన్ (*Warfarin*) మొదలైన ఇతర రకపు ఎలుకల నాశకాలు (Rodenticides) వాడుకలో వస్తున్నాయి.

ఈ నాశక పదార్థాల్ని హఠాత్తుగా పెట్టి ఎలుక, పంది కొక్కల్ని చంపడం సాధ్యం కాదు. దీనికి కారణం ఏమిటంటే, వీటికి చాలా సూక్ష్మ బుద్ధుంటుంది, సందేహ ప్రాణులు. ఏ కొత్త పదార్థాన్ని త్వరగా ముట్టుకోవు. మొదట ఇవి పరిగెత్తే పరిసరాలలో (కన్నపు రంధ్రాల్లో) ఇవి సామాన్యంగా తినే ఆహారంలో విషం కలవకుండా, మొదట కొన్ని

దినాలు పెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఆ ఆహారంలో విషం కలిపి పెట్టాలి. అప్పుడు ఇవి ఎటువంటి సందేహం లేకుండా ఆ పదార్థాల్ని తిని మరణిస్తాయి.

ఈ విషం కుక్కలకు, పిల్లలకు కూడా విషమవుతుంది కాబట్టి వీటి జోలికి ఆ ప్రాణులు రాకుండా రాత్రులలో పెట్టి వగటి పూట తీసేస్తుండాలి. విషం కలిపిన అన్నం (పదార్థం) మిగిలిన దానిని జాగ్రత్తగా తీసి పెట్టి మార్చుడు ఉపయోగించుకోవచ్చు. కొన్ని సమయాలలో కొన్ని రాత్రిళ్ళు వరసగా పెట్టవలసి రావచ్చు. ఈ విషాన్ని ఆహారంలో కలిపేటప్పుడు, చేతితో కలపకూడదు. ఎలుకలు మనుష్యుల వాసన చాలా సులభంగా గ్రహిస్తాయి. చెమ్మాతో కలపాలి. ఒకవేళ చేతితోనే కలపవలసి వస్తే, చేతికి నువ్వుల నూనె రాసుకొని కలిపితే అప్పుడు దాంట్లో మనుష్య వాసన రాదు.

విషాన్ని సూచించిన ప్రమాణంలోనే కలపాలి. ఎక్కువగా కలిపితే ఎలుకలు ముట్టుకోవు. జింక్ సాస్పైడ్ కాకుండా ఇతర ఎలుక సంహరికాలయిన విష పదార్థాలు బేరియం కార్బోనేట్ (Barium Carbonate) స్ట్రైక్నైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ (Strychnine) మురిటానిల్ (Muritanyl) ఇత్యాదివి.

**కీటకాలు :** తోటలో అనేక రకాల కీటకాలు జొరబడి మొలకల్ని పెరుగుదల లేకుండా చేస్తాయి. ఈ కీటకాలు ఏ రకపు నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి అనే విషయంపై, వీటికి ఉపయోగించే క్రిమి సంహారుల్ని, అనేక సమూహాలుగాను, గుంపులుగాను విభజించవచ్చు.

1. ఆకుల్ని తినే కీటకాలు (క్రిములు) : ఇవి కేవలం ఆకుల్ని మాత్రమే కాకుండా, మొగ్గ, చిగురు మొదలైన లేత భాగాల్ని కొరికి తింటాయి. ఆకులు మొక్కల ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే ప్రధాన భాగం. మొక్కలు వలె విహీన (వలె రహిత)పైతే వాటి పెరుగుదల తగ్గి క్రమంగా మరణించవచ్చు. మిడతలు (Grass-hoppers) గొంగలి పురుగులు, సీతాకోక చిలుకలు, క్యాటర్ పిల్లర్లు (Cater Pillars) భ్రమరాలు, చీడపురుగులు, చెడలు, విపల్లులు (Weevil) ఇవన్నీ ఆకుల్ని నాశనం చేసే కీటకాలు (Chewing insects).
2. మొక్కల రసాన్ని త్రాగే (పీల్చే) కీటకాలు : ఇవి తమ నోటిలోని సూది వంటి కొండీలతో (proboscis) ఆకు, మొగ్గ, పువ్వు మొదలైన మొక్కల భాగాలలో బాగా చేరి మొక్కలోని రసాన్ని పీల్చుకొంటాయి. ఈ మొక్కల రసాలు ఆహార పూరితమైనవి, దీన్ని పీల్చుకొంటే మొక్కలు రసహీనాలౌతాయి. అప్పుడు మొక్కలు తెల్లబారుతాయి. పెరుగుదల కుంటున్నదవుతుంది. మొక్క ముదురుతుంది. ఆహారము లేక వాడీపోతాయి. కొన్ని సందర్భాలలో నశిస్తాయి. రసహీనమైన ఆకులలో ఆకుపైన తెల్ల ఎర్ర మచ్చలు లేదా తెల్లని రంధ్రాలు లేదా మొటికలు, గుళ్ళు వడతాయి. పువ్వుల వళ్ళు రూపాలు చెడుతాయి. మొక్కల పేను (Plant lice or aphids) కీటకాలు (Bugs) నల్లులు, పిండి పురుగులు, పెంకి పురుగు (Mealy bugs) వల్లలు, చివ్వు పురుగులు (Scaly insects) చీడ పురుగు, బిగురు పురుగు (హాపర్ల -hoppers) ఇవన్నీ సస్య రసాన్ని పీల్చుకొనే కీటకాలు (Sucking insects).

3. కాండాన్ని తినే పురుగులు : (బైరిగ శ్రేయ పురుగులు - బోరరు - Stem Borers) ఇవి కాండాన్ని చిగురును కొరికి లోపల చేరి, లోపలను అంగాంశాన్ని తినేస్తాయి. ఈ విధంగా అవ్వడం చేత చివర సంవర్షం లేకుండా విరిగి క్రింద పడుతూ ఉంటాయి. వరి మొక్కల కాండాన్ని కొరికే పురుగులు, చెరకు కాండాన్ని కొరికే మామిడి కాండాన్ని కొరికేవి, మొక్కజొన్న కాండాన్ని కుట్టే పురుగులు ఇవన్నీ ఈ గుంపుకు చేరినవి.
4. సారంగాన్ని తోడే పురుగులు (Leaf miners) : లేదా కుట్టే (కొరికే)వి (రంగోలి పురుగు - ముగ్గు పురుగులు) ఇవి సూక్ష్మ కీటకాలు. ఆకుల పొరల మధ్య దూరి, సారంగాన్ని త్రవ్వ, ఆకుల అంగాంశాన్ని తినేస్తాయి. ఈ విధంగా పురుగులు పట్టిన ఆకులలో ఎండు గడ్డి రంగు ఆక్కిడక్కడ ముగ్గులేసినట్లుగా కనిపిస్తుంది.
5. కట్ పచ్చులు : కత్తెర పురుగులు ఇవి కూడా చాలా సూక్ష్మమైన పురుగులు. ఇవి ఆకుల్ని ఆకు చిగురుల్ని, పైరుల్ని నేల మట్టానికి కత్తరించి వేస్తాయి.
6. మొగ్గ, కాయ, పచ్చి పురుగులు (Budworms, Podborers, Fruit borers) ఈ రకపుకీటకాలు మొగ్గ, కాయ, పచ్చిని కొరికి వాటి అండాన్ని, గుణాన్ని రూపాన్ని, గిరాకీని తగ్గిస్తాయి. కాపుని తగ్గిస్తాయి. కొన్ని సందర్భాలలో మొగ్గలు మొదలైనవి రాలిపోతాయి. వంకాయ పురుగు, దానిమ్మ పురుగు - సీతాకోక చిలుక, కంది కాయల పురుగులు ఈ రకానికి చెందిన కీటకాలు.
7. పండ్ల ఈగలు (Fruit flies) : దోమలు, వీటి పిల్లలు పండులోని గుడ్డని తిని, వ్యాపి చెంది, వాటి గుణాన్ని, వ్యాపారపు ఖరీదుని చెడగొడుతూంటాయి. బోలుగా వుండే బోడి గుండు పండ్లకీ. (కర్పూజ, పుచ్చికాయ మొదలగునవి) ఈ ఈగల నుండి బాధ ఎక్కువ.
8. నేల లోపలండే కీటకాలు : ఇవి వేరు కాండపు భాగం, నేలలోపలి భాగాలను తిని, పచ్చిని, కాయల్ని చెడ గొడతాయి. ఉదా. బొద్దింకలు, చీమలు, పురుగులు ఇవన్నీ ఈ రకపు కీటకాలు.
9. సునములు (థ్రిప్స్) (Thrips) : ఇవి చాలా సూక్ష్మమైన కీటకాలు. చెట్టులోని లేత భాగాలను అంగాంశాన్ని కత్తరించి రసాన్ని పీల్చుకొంటాయి. వీటి బాధ వల్ల నస్య భాగాలు నాశనమవ్వడమే కాకుండా పెరుగుదల మంద కొడిగా జరుగుతుంది. కొన్ని సందర్భాలలో గుంటలు, ఉబ్బుడాలు పెరుగుతాయి. ఉదా. మిరపకాయలకు నుసి తిరిగే రోగం, ద్రాక్షకీ (థ్రిప్స్).
10. రోగవాహకాలు (Disease carriers, vectors) : పై పేర్కొన్న పురుగులు, కీటకాలతోపాటు పేను, జిగి పురుగు (జిగట) నాసములు, తెల్ల నల్లలు, మొదలైనవి ఈ విధంగా వ్యాపిస్తాయి. కీటకాలు కాకుండా కొన్ని జాతుల సూక్ష్మమైన పురుగులు - మైటలు (Mites) కీటకాలలాగే కొన్ని నస్య భాగాలకి హాని కలుగ జేస్తాయి. రసాన్ని

పేల్చుకొంటాయి. పెరుగదలని తగ్గిస్తాయి. ఇంకొక రకపు హానికరమయినవి. నెమటోడ్ (Nematode) అనే వర్గపు జంతువులు - ఇవి భూమిలో పలుంటాయి. భూమి లోపలుండే మొక్కల భాగానికి హాని కలిగిస్తాయి.

చెట్లకు మొక్కలకి చుట్టుకొనే వర్షాకాలపు కీటకాలున్నాయి. కొన్ని చలికాలంలో ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. ఉదా. ఎర్రతల గొంగళిపురుగు, మిడతలు, పండుపై వాలే ఈగలు. ఇవి ఏయే కాలంలో ఏయే చెట్లు పెరుగుతాయో, వాటితో పాటే వస్తాయి. మిగిలిన కాలంలో ఇవి గుప్తంగా (మరుగున) ఉంటాయి. మరికొన్ని సంవత్సరములో 2, 3సార్లు వస్తాయి. ఉదా. కూరగాయల చెట్లు మీద వచ్చే పెంకి పురుగులు, బంగాలా దుంపలకచ్చే ఎపిలక్ష (Epilachna) మంచి పత్తికాయల్ని తినే పురుగులు. వీటికి ఒకే జాతి చెట్లు లేదా ధాన్యాలు అహారం కాదు. ఎన్నో జాతి మొక్కలకి ఈ పురుగులు పట్టవు. మరికొన్నిటికి సంవత్సరములో ఎప్పుడంటే అప్పుడు పురుగులు వడతాయి. వీటికి నిర్దిష్టమైన కాలం లేదు. ఉదా. లోక్స్ట్ (Locust) మిడతల దండు బయట దేశాల నుండి ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి గుంపుగా రావచ్చు. మరికొన్ని కీటకాలు సంవత్సరమంతా ఉంటాయి. ఉదా. నుసములు, మైటు మొదలైనవి.

కీటకాలలో కొన్ని విపరీతమైన నష్టాన్ని కలుగజేస్తాయి. మరికొన్ని అప్పుడప్పుడూ కొద్దో గొప్పో నష్టాన్ని కలుగజేస్తాయి. వీటికి తోడు గాలి, మేత పుష్కలంగా వుండి అనుకూల పరిస్థితులుంటే మొక్కలతోపాటు ఇవి కూడా వృద్ధి చెందుతాయి. దాంతోపాటు మొక్కలకి విపరీతమైన నష్టాన్ని కలుగజేస్తాయి. కొన్ని కీటకాలు సాంక్రమిక (Epidemic) మహమ్మారి రూపాన్ని ధరించి, ఎక్కువ ప్రదేశాలలో వ్యాపించి నష్టాన్ని కలుగ జేస్తాయి. మరికొన్ని చెట్లపైన, మొక్కలపైన అప్పుడప్పుడుండే, కొద్దిగానో, గొప్పగానో నష్టాన్ని, కష్టాన్ని కలుగ జేస్తాయి.

కీటకాల స్వభావం : వ్యాప్తికి అనుకూలంగా వీటిక సరిపడు తోట క్రమాన్ని పద్ధతిని అనుసరించాలి. హాని కలిగించే కీటకాలు కొన్ని సంవత్సరము అంతటనో, లేదా సంవత్సరములో కొన్ని ఋతువులలో ప్రాధాన్యత వహించి పెరిగే మొక్కలకి నష్టాన్ని కలుగజేస్తాయి. ఇవి కనబడగానే నివారణ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టడం కన్నా ఇవి తోటలోకి ప్రవేశించక ముందు నివారణ క్రమాన్ని (prevention) అనుసరించడం ఉత్తమం. కొరకే రకానికి చెందిన ఉడతలు, పళ్ళపై వాలే ఈగలు, దోమలు, కంబలి పురుగులు, మిడతలు మొదలగు రకాలకి ఈ రకపు ముందు జాగ్రత్త అత్యవసరమవుతుంది. ఎందుకంటే ఇవి కనబడిన కొంత కాలానికే వీటి సంఖ్య రెట్టింపవుతుంది. వీటిని నాశనం చేయడానికి ఎక్కువ కాలం మందుల్ని వాడాల్సి వస్తుంది. ఇతర రకపు కీటకాల్ని అవి కనబడగానే నాశనం చేయాలి.

కీటకాల నివారణ లేదా కీటకాల నిర్మూలన స్రమాలు

కీటకాల్ని హద్దులోకి తీసుకు రావడానికి కొన్ని క్రమాలున్నాయి.

1. సరైన వ్యవసాయ పద్ధతుల ద్వారా వ్యవసాయ క్రమాన్ని అనుసరించేటప్పుడు నిర్దిష్ట ధాన్యాల పెంపుదలలో నిర్దిష్ట కీటకాలు వస్తాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఒకే రకపు పంటని పండించినప్పుడూ లేదా అదే జాతికి చెందిన వేరు మొక్కల్ని

పెంచినా ఈ కీటకాల ప్రాబల్యం చేత ఎక్కువ పంటనివ్వదు. అందుచేత అప్పుడప్పుడూ ఒక క్రమంలో ఈ దాన్యాల్ని మార్చి, మార్చి పెంచుతూండాలి. ఈ క్రమాన్ని (Crop rotation) అని అంటారు. మాగేట్లు చేయడం లేదా అగడ్తలు చేసి మట్టిని బాగా ఎండబెడితే అప్పుడు అందులోని కీటకాలు, నాశకాలు ఎండకి ఎండి నాశనమవుతాయి.

అనేక కీటకాలు పంటలు పండించినప్పుడు, భూమిలోనూ, చుట్టుప్రక్కల పెరిగిన పిచ్చి మొక్కల ద్వారా తమ జీవనాన్ని గడుపుతాయి. ఈ అంచు చుట్టు ప్రక్కల మొక్కలు లేకుండా చదును చేసినప్పుడు వీటి ప్రాబల్యం తగ్గి పోతుంది.

కొన్ని మొక్కల క్రింది భాగాలకి, ఈ కీటకాల్ని నిరోధించే లేదా అడ్డుకొనే శక్తి ఉంటుంది. సాధ్యమైనంత వరకు ఈ రకపు మొక్కల్ని పెంచడానికి ప్రయత్నించాలి.

2. హస్త క్రమం(Manual) - చేతితో కీటకాల్ని పట్టి కిరోసిన్ పేసిన నీళ్ళలో అద్ది నాశనం చేయొచ్చు. కీటకాలు రాకుండా ఉండేటట్టుగా మొక్కలకి, వలల్ని (జాలరి) తీగ కంచెల్ని వేయడం, జిగురు పట్టీలు పెట్టి, కీటకాలు, మొక్కలకి అంటుకోకుండా ఉండేటట్టుగా చేయడం, రాత్రి వేళల్లో కిరోసిన్ కలిపిన నీటిని, బాణాల్లో పెట్టి కీటకాల్ని ఆకర్షించేటట్టుగా ఆకులు అలముల్ని కుప్ప చేసి, నిప్పు పెడితే ఆ మంటలో వడి పురుగులు చస్తాయి. కొన్ని రకాల కీటకాలు ఒకచోట నుంచి మరొక చోటుకి వెళ్ళుకుండా వాటి సుధ్య గుంటలు త్రవ్వి, దాని పైన ఇసుక చల్లాలి (అప్పుడు కీటకాలు జారి గుంటలో వడతాయి. వాటిని చేతితో పట్టి నాశనం చేయాలి). ఇవి కొన్ని చేతి ద్వారా చేసే క్రమాలు.

3. కీటకాల శత్రువులని (అంటే వేరే రకపు కీటకాలు) పెంచి తోటలో వదలడం, ఈ జాతికి చెందిన కీటకాలలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి. కొన్ని పరోప జీవులు (Parasites) ఆశ్రయ కీటకాలపై ఎగబ్రాకి వాటి రసాన్ని పీల్చుకొని నాశనం చేస్తాయి. చెరకు కాండాన్ని కొరకే కీటకాలపై ఈ రకపు పరోప జీవి కీటకాల్ని వదులుతారు. మరికొన్ని పరభక్ష కీటకాలు (Predators) ఇవి హానికరమైన కీటకాల్ని ధ్వంసం చేస్తాయి. కొన్ని కాయకూర చెట్లకు వచ్చే కీటకాల్ని ఇటువంటి పరభక్ష కీటకాల ద్వారా హద్దులోకి తీసుకురావచ్చు.

పైన పేర్కొన్న మూడు క్రమాలూ అంత పరిణామకార్థు కావు. (అంత ఎక్కువ శక్తివంతమైనవి కావు). ఇంతకంటే ఎక్కువ శక్తివంతమైంది. త్వరగా హద్దులోకి తీసుకొని రాగల క్రమం - రసాయనిక క్రమం - కీటక ఔషధాల్ని చల్లడం లేదా ధూళి జిమ్మడం (Spraying and dusting). కీటక ఔషధాలు లేదా కీటకసంహారులలో ముఖ్యమైనవి నాలుగు రకాలు.

1. కొన్ని ద్రవ రూపంలో ఉంటాయి : వీటిని నీటితో జతపేసి సరైన ప్రమాణంలో కలిపి స్ప్రేయర్ (పిచికారితో) ద్వారా స్ప్రే చేయాలి.

2. కొన్ని మన రూపంలో ఉంటాయి : పొడి రూపంలో ఉంటాయి. వీటిని బట్టలో కట్టి డస్టర్ (ధూళిని చల్లే యంత్రం)ల ద్వారా వెడజిల్లాల్సి లేదా చిలకరించాలి.

3. కొన్ని గుళికల రూపంలో ఉంటాయి (Granules) : వీటిని మట్టి లోపల వరచాలి. ఇవి కాలక్రమేనా సస్యాల లోపల చేరి, వాటిపైకి ఎక్కే కీటకాల్ని నాశనం చేస్తాయి.

4. ఇంకా కొన్ని బట్ట పురుగులకు పెట్టే నాప్తలిన్ గుళికలు (Naphthalene balls) కర్పూరం, ప్యూరా డై క్లోరో బెన్జీన్ (Paradichloro benzene - PDB.) ఈ రకపు కీటకహారులు. ఇవి కీటకాల్ని వివిధ రీతుల్లో నాశనం చేస్తాయి. కొన్ని ఉదర పాషాణాలు - (Stomach poisons) కీటకాల పొట్టలో చేరి నాశనం చేస్తాయి. ఈ రకపు పాషాణాలు సస్య భాగాల్ని త్రవ్వి తినే లేదా రసాన్ని పీల్చుకొనే కీటకాలను హద్దులోకి తేవడానికి ఉపయోగపడతాయి.

మరికొన్ని నాయు పాషాణాలు : పుమిగెంటు (Fumigant) ఇవి త్వరగా గాలి రూపాన్ని దాల్చి, కీటకాల శ్వాస కోశాల్ని చేరి విషమవుతాయి. చేర్చి పెట్టిన ఉగ్రాణవు గింజలు, ధాన్యాలపైన ప్రాకి వచ్చే కీటకాల్ని నాశనం చేయడానికి వుపయోగిస్తారు.

కీటకహారులను వాటి రసాయనిక నిర్మాణాల ద్వారా ఇంకా కొన్ని వర్గాలుగా విభజించ వచ్చు.

1. సస్య లేదా పాణిజన్య కీటకహారులు : పై రెత్రమ్ (Pyrethrum) డెరిస్ (Derris) మేకు, పొగాకు కషాయం, పొగాకు నూనె, చేప నూనె (Fish Oil) సిట్రో నెల్లా (Citronella) నూనె కర్పూరం మొదలైనవి. ఇవి కీటకాలకు ఔషధమైనా (మందైనా) మనుష్యులకు కలగజేసేటంత విషకారులు కావు.

2. ఖనిజ, జన్య కీటకహారులు (Inorganic insecticides) : లెడ్ ఆర్సినేట్ (led arsenate) ప్యూరిన్ గ్రీన్ (Paris green) సోడియం ఆర్సినేట్ (Sodium arsenate) సోడియం ఫ్లోరైడ్ (Sodium floride) సోడియం ఫ్లో పాసిలికేట్ లేదా సిలికో ఫ్లోరైడ్ (Silico floride) బొరాక్స్ (Borax) గంధకం (Sulphur) సున్నం కలిపిన గంధకం (Lime Sulphur) కిరోసిన్, తారు, సోపు మొదలైనవి.

3. క్లోరినేటెడ్ హైడ్రో కార్బునులు (Chlorinated hydrocarbons) : డి.డి.టి., బి.హెచ్.సి., లిండేన్ (Lindane) టోక్సాఫెన్ (Toxaphene) క్లోరోడేన్ (Chlordane) హెప్టాక్లోర్ (Heptachlor) ఆల్డ్రిన్ (Aldrin) డై ఎల్డ్రిన్ (Dieldrin) ఎండ్రిన్ (Endrin) మెథాక్సిక్లోర్ (Methoxychlor) డి.డి.డి. (DDD) మొదలగునవి.

ఈ వర్గానికి చెందిన కీటకహారులన్నీ అన్ని రకాల కీటకాల్ని పారద్రోలుతాయని చెప్పడానికి వీలులేదు. పేనులు, పెంకి పురుగులు, పొర కీటకాలు మొదలైనవాటిపైన ఇవి ఎక్కువ ప్రయోజనకారిగా ఉండువు. ఈ కీటకహారుల ప్రభావం మొక్కలపై ఎక్కువ కాలం నిలువ ఉంటుంది. మందు జల్లిన రెండు వారాల నుండి రెండు నెలల వరకూ ఉంటుంది.

అయితే వీటి పరివర్తనని చూడాలంటే కొంతకాలం వేచి వుండాలి. ఈ గుంపుకి చెందిన కీటకహారుల కీటక చర్యల ద్వారా లోపలికి చేరుతాయి. కీటకాల నర పూర్వహాన్ని అర్థవంతం చేస్తుంది. ఈ మందు (బైషడం) మనుష్యుల చర్యల ద్వారానూ లోపలికి చేరే అపాయముంటుంది. అందుచేత ఈ రకపు కీటకహారులను ఉపయోగించేటప్పుడు ఇది అంటుకోకుండా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించాలి. ఈ కీటకాలకి మందు ఉపయోగించే విషయమై కొన్ని సూచనలు.

డి.డి.టి. తెల్లపాడి : నీటిలో కరగదు. సూర్యరశ్మి ద్వారా ఎటువంటి విశ్లేషణ చెందదు. సున్నం, సోడా మొదలైన షార్ వస్తువులలో చేరదు (not compatible). దీనిని దోసకాయ జాతి చెట్లపైన చిలకరించరాదు. ఇది పేనులను హద్దులోకి తీసుకొని రాలేదు. ఇంటిలో రంగుతో సున్నపు నీటిలో కలిపి, గోడలకి పూస్తే, ఈగలు, దోమల నివారణకు తోడ్పడుతుంది (సుమారు 2 నెలల వరకు).

బి.హెచ్.సి., బెంసీన్ హెక్సక్లోరైడ్ : మానీన పసుపు రంగు పాడి. ఒక రకంగా మ్రుగ్గడంతో ఇది పురు పాషాణం. అంతేకాకుండా కొంతవరకు కీటకాలకి విష వాయువు కూడా అవుతుంది. గంటు పడడమో, చిల్లు పడడం, చీలడం, వీటి ద్వారా ఘాటు చెల్లనీయదు. ఇంటిలోకి వచ్చే కీటకాలకిది సువ్యక్తమైంది. దీన్ని కూడా దోసకాయ జాతి మొక్కలపైన వేయకూడదు. కీటకాలపై డి.డి.టి., బి.హెచ్.సి.ల కొలత సుమారుగా ఒకే రకంగా వుండాలి, వేయాలి. అప్పుడు అది వణికించడం, ప్రతిధ్వని (మరొక ధ్వని), అడ్డదిడ్డంగా చలించడం సుస్థు నిస్రాణం కలుగజేస్తుంది.

లింథేన్ : శుభ్రపరచిన బి.హెచ్.సి. పూత. కొలత బి.హెచ్.సి.యంతేకావాలి.

టొక్సఫిన్ : అందమైన రంగు కలిగిన జిడ్డు. ముఖ్యంగా ఉదర పాషాణం (విషపూరితం). మిడత లేదా దండుగా వచ్చే పురుగుల్ని ప్రారదోలడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.

క్లోరడేన్ : అంటు ద్రవం, కపిల వర్ణం, టర్పంటైన్ వాసన. ఇవి మిడత, గద్దలు, చీమలు రికెట్ మొదలైన నేలలోపల (భూమిలోపల) ఉండే కీటకాలను తొలగించడానికి, నాశనం చేయడానికి ఉపయోగకరంగా వుంటుంది. ఆకు కూరలపైన, దుంపకూరలపైన దోసకాయ జాతికి చెందిన చెట్లపై వీటిని చల్లరాదు.

హెప్టాక్లోర్ : క్లోరడేన్ నుండి జన్యమైనదానికన్నా 4-5 పాళ్ల హెచ్చు ప్రభావితం చేస్తుంది. మిడతలు, తుమ్మెదలు, క్యాటర్ పిల్లలు, నొసములు మొదలైన వాటికి చాలా విషపూరితమైనవి.

ఆర్ట్రన్ - తెలుపు, నీటిలో కరగదు. భూమిలోని కీటకాలకి మంచిది. దీని ప్రభావం ఎక్కువకాలం మిగిలి వుంటుంది.

డై ఎర్ట్రన్ : తెలుపు, ఉదరపురు పాషాణం (ఉదర విషం). దీని ప్రభావం ఎక్కువ కాలం వుంటుంది. షార్ పదార్థాలలో కలిపి, చిలకరించాలి. లేదా చల్లాలి. నొసములు, బొద్దింకలు, చీమలు, మిడతలు, కొరకే పురుగులకు యిది మంచిది. ఎండ్రీన్ కూడ దాదాపు యిలాగే పనిచేస్తుంది.



4. ఆర్గానో ఫాస్ఫరస్ కీటక హరులు (Organo Phosphorous insecticides organic phosphates) : హెటప్ (HETP) టెప్ (TEPP) స్కరాదాన్ (Schradan) డిమిడాన్ ఫ్యారాథయాన్, మెథిల్ ఫ్యారాథయాన్, మ్యూథాథయాన్, గునథయాన్, డైయాజినన్, డిప్టెరెక్స్, మొదలైనవి - ఈ వర్గానికి చేరిన కీటకనాశనకారిలు. కీటకాలకి ఉదర స్పర్శ పాషాణాలు (విషాలు) ఇవి. విషపూరిత చెట్లపై ఎక్కువకాలం ఉండవు. ఉన్నా ఒకరోజు లోనే హరించుకు పోతాయి. ఈ గుణం ఒక విధంగా అనుకూలమైంది. కూరగాయల మీద వీటిని చల్లితే వీటిని కొయ్యడానికి నాటడానికి, ఎక్కువ కాలం, కానుకోవాలిసిన అవసరము లేదు. అయితే యింకొక విధంగా ఆలోచిస్తే, ఇది అననుకూలం. ఎందుకంటే, దీని ప్రభావం త్వరగా హరించుకుపోవడం చేత వీటిని వడే వడే చల్లాల్సి వస్తుంది.

ఈ గుంపుకు చెందిన కీటకహరులలో కొన్ని మనుష్యులకి హానిని కలుగజేస్తాయి (ఎక్కువ విషపూరితమైనవి). అందుచేత వీటిని కలిపేటప్పుడు ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఈ గుంపుకు చెందిన కీటకహరీల విషయమై కొన్ని సూచనలు, హెటప్, టెప్ - నొసములు, పేనులు, మైటులకు విషపూరితాలు. నీటితో కలిపిననూ షార్ వదాల్తాలతో చేరవు. రెండూ ద్రవరూపంలోనే ఉంటాయి. మానవులకు, ప్రాణులకు చాలా విషపూరితాలు. (ఎక్కువ విషాన్ని కలిగి వనిచేస్తాయి). డిమెథాన్, సిస్టాక్స్ - ఈ కీటకహరులు సస్యపు లోపలి అంగాంశాలకు వెళ్ళి గలుగుతాయి. అంటే వీటిని మొక్కలపై చిలకరించగానే, లేదా చల్లగానే అవి మొక్కల అంగాల లోపల చేరతాయి. ఆ విధంగా చేరి సస్య రసాలతో కలిసి, సస్యపు ప్రతి భాగానికి వెళ్తుంది. ఆ రసాన్ని పీల్చిన కీటకాలు మరణిస్తాయి. ఈ రకపు దేహంతర కీటకహరులు (Systemic insecticides) తోటమాలికి అందులోనూ అలంకార చెట్లను పెంచేవారికి ఇది ఇంకా చాలా అనుకూలం. ఎందుకంటే మందును మొక్క యొక్క (అన్ని భాగాల పైన అంటే ఆకు రెమ్మల క్రింద భాగాలు) చిలకరించడం కష్టము. దూరంగా వున్న రెమ్మలకి, కొమ్మలకి సమర్థవంతంగా కీటకహరులను చల్లడం చాలా కష్టతరమైన పని. ఈ విధంగా చల్లాలంటే ఎక్కువ ఖరీదైన (స్ప్రేయర్ని తీసుకొచ్చి చల్లవలసి వస్తుంది. ఇటువంటి (స్ప్రేయర్లను చిన్న చిన్న తోటమాలలు కొనుక్కోడానికి సాధ్యమయ్యే పని కాదు. ఉండే (స్ప్రేయర్ల ద్వారానే సస్య దేహంతరాన్ని సులభంగా చేరే కీటకాలను నాశనం చేయడానికి వీలౌతుంది. మార్కెట్లో ఇటువంటి కీటకహరులను థిమెట్ (Thimet) మెదాసి ఫ్లోర్స్ - డై సిస్టాన్ అనే పేర్లతో అమ్ముతుంటారు.

ఫ్యారాథయాన్ : పసుపు లేదా కాపిల (కాషాయి) రంగు ద్రవం. తెల్ల ఉల్లిపాయల వాసన. నీటిలో కొద్దిగా కరుగుతుంది. ఇది మానవులకు చాలా విషకరమైనది. అందుచేత ఈ అవగూణాన్ని నివారించడానికి దీని జతకు ఎముల్సిఫయర్ (Emulsifier) అనే పదార్థాన్ని కలుపుతారు. ఈ పదార్థం మందుని పాలులాగా చేసి నీటిలో కలిపేటట్లుగా చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎక్కువ వాడుకలోవున్న ఫాలిడాల్ (Folidol) కీటకహరీయ మూలాంశం. ఫ్యారాథయాన్ ఇది అనేక రకాల కీటకాల్ని నాశనం చేయగలదు. అంతేకాకుండా మిత వ్యయ కీటకహరి. దీని ప్రభావం ఎక్కువ కాలం వుండదు. అందుచేత ఈ మందును చల్లిన మొక్కల ఫలాన్ని రెండు, మూడు వారాల తరువాత గ్రహించవచ్చు.

మైథిల్ ప్యారాథయాన్ (Methyl Parathion) : ప్యారాథయానుని, సున్నం, గంధకం, బొర్డ్ మిశ్రమం - కార్బియం ఆర్సినేట్ మొదలైన ఇతర పదార్థాలతో కలపడానికి వీలులేదు. అయితే మైథిల్ ప్యారాథయాన్ ను అలాగే మొక్కలకి చల్లవచ్చు.

క్లోరోథయాన్ : మైటు, పెంకి పురుగులు, పేమలు, పూలతోటలలో సర్వ సాధారణంగా వుంటాయి. వీటికిది చాలా విషపూరితం. మనుష్యులకు చాలా తక్కువ హానికరం. బ్రెథియానులాగే ఇది కూడా పని చేస్తుంది. దీని ప్రభావం కొంచెం ఎక్కువ కాలం మిగులుతుంది. గుసాథయానికి ఈ గుణముంది.

డైయజీనస్, మాథయాన్ - ఇవి మనుష్యులకి తక్కువ హాని చేస్తాయి (తక్కువ విషం కలిగినవి). అందువేత ఈగలు దోమలు, మొదలైన గృహకీటకాలు తొలగించడానికి వీటిని పూలతోటలలో చల్లవచ్చు.

5. కార్బమేట్ గుంపు (సముూహం) (Carbomate) : ఇందులో సెవిన్ (Sevin) అనే కీటకహరిని ఎన్నో రకాల కీటకాల్ని నాశనం చేయగలదు.

## సస్య రోగాలు (మొక్కల రోగాలు)

మొక్కలకి మరొక శత్రువు రోగాలు - ఈ రోగాలకి ముఖ్యంగా నాలుగు కారణాలున్నాయి.

మొదటిది : సస్య శరీరం వ్యాపారానికి, సస్య సన్నివేశాలకి సంబంధించింది. సస్య పోషణలో ఏదైనా కొరతంటే, కొన్ని సస్య క్రియలు చెడుతాయి. అప్పుడు సస్యారోగ్యం చెడుతుంది. ఈ అనారోగ్య బాహ్య విచ్ఛేదం, లేదా కురుపుల, పురుగుల విషయమై సస్య పోషణ అధ్యాయంలో వివరణ ఇవ్వబడినది.

అలాగే సస్య సన్నివేశ వైపరీత్యాలు కలిగినా, సస్య ఆరోగ్యం చెడుతుంది. మొక్కలు పెరుగుతున్న మట్టిలో నీరు నిలువ వుంటే, మట్టి గట్టిపడినప్పుడు వేళ్ళు శ్వాసించలేక మొక్కలు చాలిపోతాయి. ఆకులు తెల్లబడతాయి, వాడిపోతాయి. అదేవిధంగా మట్టిలో చాలినంత తేమాంశం లేకపోతే ఆకులు వాడిపోవడమే కాకుండా, ముడుచుకోవడమే కాకుండా ఎండిపోతాయి. ఈ విధంగా ఎండినప్పుడు లేదా కరకరలైనప్పుడు మళ్ళీ చిగురించటం కష్టం.

విపరీతమైన ఎండలు, విపరీతమైన గాలి, విపరీతమైన కొరకలవేత మొక్కల పెరుగుదల ఆరోగ్యం చెడుతుంది. నీరు గట్టిపడినప్పుడు, గడ్డ కట్టినప్పుడు గాలి ద్వారా ఉష్ణం తగ్గిపోయి సస్య రసం కూడా గడ్డ కట్టి సస్యపు అంగాంగాలు వగిలి, మొక్కలు నాశనమవుతాయి (చచ్చిపోతాయి). విపరీత గాలి ఉంటే వేళ్ళు తెగి సస్యారోగ్యం చెడుతుంది.

రెండవది : కొన్ని సస్యజంతువులు - బాక్టీరియాలు (Bacteria) సస్యాలకు రోగాల్ని కలుగజేస్తాయి. మనలో ప్లేగు న్యూమోనియ రోగాలలాగే. ఉదా. బంగాళా దుంపల గాజా ఆకార రోగం (Ring disease) ఇత్యాదివి. అయితే అదృష్టవశాత్తూ బాక్టీరియాల ద్వారా మొక్కలకి ఎక్కువ రోగాలు రావు.

**మూడవది :** శిలీంధ్రాలు - ఫంగి (Fungi) అనేక సస్య రోగాలకు ఈ శిలీంధ్రాలే కారణం. ఈ రోగాలలో అకులకాచ్చ రోగాలు ఏవింటే ముక్క రోగం (Leafspot) బూడిద రోగం (Powdery mildew) లేదా పాడి రోగం, తుప్ప రోగం (Rust) బూజు రోగం (Downy mildew) నిప్పు రోగం (వేడి రోగం) (Blast) బొప్పల రోగం (Blotch) అంగమావి (Blight) గజ్జి (Scab) క్యాంకర్ (గడుసు ముక్కలు - Canker).

ఈ రోగాలలో కొన్ని కాండాలకు, రెమ్మలకి వస్తూంటుంది. దీనికి తోడు వచ్చి మావి చివరల క్రింది భాగానికి, రెమ్మల ఎండుబాకుల (Dieback) మురికి వచ్చే రోగాలు మొదలైనవి వస్తాయి. పువ్వు కాయల పై భాగం, కాయలు, చిత్తనాలు, వండ్లు మొదలైన వాటికి ఎర్గట్ (ergot) అకుల ద్వారా అంటుద్రవం, కాండం పాడి (బూడి) రోగం, మురికి ద్వారా వచ్చే మురికి రోగం, కాడ రోగం (Smut), గడ్డి మొదలైనవి వస్తాయి. లేత మొక్కలకి సారగు అనే రోగం లేదా మురికి మొక్క రోగం (Damping off) లేక అర్ధహరణ రోగం వస్తుంది.

పెద్ద మొక్కలు అర్ధ హరణ రోగానికి చిల్లులు వడి వాడిపోవచ్చు. ఈ రోగాలన్నింటికీ కారకాలు శిలీంధ్రాలు. ఈ శిలీంధ్రాలు సస్యనుపుల అర్ధహరణం గాలి ద్వారా, నీటి ద్వారా, దీజాల ద్వారా, మట్టి ద్వారా, ఉపకరణాల ద్వారా మొక్కలకి వ్యాపిస్తుంది.

**నాలుగవది :** వైరస్సులు (Virus) - వీటి ద్వారా చిత్ర వర్ణ రోగం (Mosaic), అకులు ముడుచుకోవడం (Leaf curl), అకులు చిన్నవడం (Small leaf) మొదలైన రోగాలు వస్తాయి. సామాన్యంగా యీ రోగాలు కొన్ని కీటకాల ద్వారా మొక్కలకి వస్తాయి. వివిధ మొక్కలకి సస్యధాన్యాలకు వచ్చే లేదా అంటుకొనే రోగాలు - వివరాలు - నివారణ క్రమాలు ముందు సంపుటిలో ఆ ధాన్యాల పెంపకాల ప్రస్తావన చేసినప్పుడు వివరించబడుతుంది. ఇక్కడ కొన్ని సామాన్య రోగాల గురించి స్థూలంగా తెలుప బడినది.

మొక్క అర్ధ హరణ రోగం (Damping off), పాద రోగం (Foot rot) - ఇవి సామాన్యంగా లేత మొక్కలకి వచ్చే అంటురోగాలు, రోగం వచ్చినప్పుడు మొక్కల క్రింది భాగం మరింతగా క్రుంగి వాడి నశిస్తాయి. ఈ రోగం చిత్తనాలు మొలిచినప్పుడు లేదా కుండలలో పెట్టినప్పుడు మాత్రమే కాకుండా, లేత మొక్కల్ని మిశ్రమ మట్టిలో నాటిన తర్వాత కనిపించవచ్చు. అప్పుడు దీన్ని పాద రోగం అంటారు.

చిత్తనాల్ని ఒత్తుగా నాటడం వేత, మట్టి ఎక్కువ తడిగా (తేమగా) ఉన్ననూ, తడి త్వరగా ఆరకుండా ఉన్నప్పుడూ, ఈ రోగం వస్తుంది. రాకుండా ఉండేటట్లు చేయాలంటే, నీళ్ళు నిలువ ఉండకుండా ఇంకాయే రోగగరూత భూమిలోనే స్పష్టంగా నాటాలి. చిత్తనాలు నాటిన భూమిని (నేలను) రోగగరూతంగా చేయడానికి, నాటే మట్టిని వేరే రకపు మట్టి మిశ్రమాన్ని కలిపి పార్మల్డిహైడ్ (Formaldehyde) మొదలైన రసాయనాల్ని వేసి క్రిమిసంహారము చేయాలి. నాటే మట్టి పైన చెస్నెట్ కాంపౌండ్ (Chestnut compound) అనే శిలీంధ్రహారిని కలిపిన మిశ్రమ నీటిని పూయడంచేత ఈ రోగాల్ని అరికట్టవచ్చు, చిత్తనాల్ని నాటిన తర్వాత తేమ (తడి) లేకుండా చూసుకోవాలి.

పాడిరోగం (బూడిద రోగం) బూడిద తెగులు - పాడి బూజు (Powdery mildew) ఈ రోగం ఆనేక రకాల తోటలోని మొక్కలకి అంటుకొంటుంది. ఆకు రెమ్మల కొన్ని సమయాలలో పండుతుంది. వీటిపైన తెల్లని పొడిలాగ పూత ఏర్పడుతుంది. ఇది ఒకరకపు బూజు (బూజు - Mildew) ఈ బూజు అంగాంగాలకి దిగి, సస్యరసాన్ని వీల్చి వాటి పోషణకు అటంకం కలిగిస్తుంది. ఈ రకపు బూజు గులాబీ, డెల్నినియం, పెరినియల్, ఆస్టర్, బలానీ, ద్రాక్ష అనేక రకాల పువ్వులకు, కాయగూరలకు, పచ్చిక వస్తాయి. ఈ రోగం తేమ/తడి వాతావరణం ఉన్నప్పుడు వేళ్ళకు కావల్సిన నీరు లభించనప్పుడు వస్తుంది. శుభ్రమైన గంధకపు పొడి (పాస్పరస్ పొడి) చల్లడం ద్వారా సోల్ బార్ (Solbar) కరాతేన్ (Karathane) మొదలైన శిలీంధ్రహారులను చల్లడం ద్వారా ఈ రోగాన్ని నివారించుకోవచ్చు. గులాబీకి ఈ రోగాన్ని రాకుండా చేయడానికి ఎప్పమ్ సాల్ట్ మెగ్నీషియం సల్ఫేటు నీటిలో కలిపి చిలకరించాలి.

నూగు పంట బూజు (Downy mildew) - దీనికి బూడిద తెగులుకు వ్యత్యాసం (భేదం) ఉండి, మృదు సున్నితపు బూజులో పేరుకు తగినట్టు ఎంతో నయంగా అందంగా (మనోహరంగా) ఉండేటటువంటి సన్నని వెంట్రుకులు మొక్కలపై పెరిగి లోతునకు దిగి వాటిని రసహీనం చేస్తాయి. ఉల్లిపాయలు, బఠాణి, అంటిరైం మొదలైన వాటిపైన ఈ రోగం ఎక్కువగా వస్తుంది. ఇది కూడా వేళ్ళకు కావలసినంత నీరు లభించక పోయినప్పుడు ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందుతూంటుంది. జైనేబ్ (డిథేన్ - Zineb, Dithane) బోర్డో మిశ్రమం (Bordeaux mixture) మొదలైన ఔషధాల్ని చల్లాలి.

కుంకుమ తెగులు (తుప్పు పట్టే రోగం) (Rust disease) - ఈ రోగాన్ని సులభంగా గుర్తించవచ్చు. ఆకులు, కాండాలపై ఎర్రటి రంగు మచ్చలు వస్తాయి. ఇవి కిరణ జన్య సంయోగ క్రియకే అడ్డుపడతాయి. గులాబీ, పుదీనా మొదలైన వాటిల్లో వీటిని మనం చూడొచ్చు. బోర్డో మిశ్రమం, తామ్ర (రాగి) సంయుక్త శిలీంధ్రహారులను చల్లడం ద్వారా వీటిని ఒకదారికి తీసుకరావచ్చు. ఈ రోగపు అంటు (స్పర్మ) కొన్ని రకాల కొమ్మలకి ఆశ్రయం యివ్వకపోవడం చేత, చుట్టూవున్న జత కొమ్మల్లో అంటుకోకుండా సరైన కట్టుదిట్టం చేసుకొని చక్కబరచుకోవాలి.

ఆకు మచ్చ తెగులు (Leaf spots) : పేరు సూచించేటట్టుగా ఆకులపైన మచ్చలు, వాటి సూచనలు కనిపిస్తాయి. ఈ మచ్చలు, గాత్రంలోనూ రంగులోనూ, అకారంలోనూ, వివిధ రకాలుగా ఉంటాయి. కొన్ని పసుపుగానూ, కొన్ని నల్లగానూ గులాబీకి వచ్చే మచ్చల రోగం (Black spot of Rose) కొన్ని నీలం ఎరుపు కల్గిన మిశ్రమ రంగు (స్లాష్లీలు) - వీటికి తామ్ర సంయుక్తమైన శిలీంధ్రహారులను, క్యాప్టాన్ని (Captan) చల్లి హద్దులోకి తీసుక రావచ్చు.

సస్య రోగాల నివారణ : సస్య రోగాలని, నివారించడానికి తోటని శుభ్రంగా పెట్టడంతోపాటు, సరైన సాగుబడి క్రమాల్ని, అనుకూలమైన, శాస్త్రీయ పద్ధతిలో పెరుగుదల పెంపకాల (అభివృద్ధిని) పరివర్తన అనుసరించడమే కాకుండా జతకి శిలీంధ్రహారిని వేరాలి (వేయాలి). కొన్ని రోగాలకి అందులోనూ సైరస్ రోగాలకి ముందు లేదు. కాబట్టి ఇటువంటి రోగాలొచ్చిన మొక్కల్ని చూసిన వెంటనే పీకే (కత్తరించి) కాల్చివేయాలి. లేకపోతే ఇవి అతి వేగంగా ఇతర మొక్కలకి వ్యాపిస్తాయి. ఈ సైరస్ రోగాల అంటు కొన్ని రకాల కీటకాల ద్వారా వ్యాపించడము చేత కీటకాల నివారణ క్రమాన్ని

అనుసరించి ఈ రకపు రోగాలు తోటలకి రాకుండా చేయవచ్చు. ఇటీవల ఫైరస్ రోగ నిరోధకాలను (టెండ ఇత్యాది) ఉపయోగించి అభివృద్ధిని సాధారు. ఈ రకపు విగురు మొలకల్ని గ్రహించి పెంచడం మంచిది.

అనేక రకాల సస్య రోగాల్ని నివారించగలిగే సమర్థవంతమైన శిలీంధ్రహారులు ఇప్పుడు మార్కెట్టులో లభిస్తున్నాయి. ఇంకా సమర్థవంతమైన రసాయనికాలు వస్తున్నాయి. వీటిని సకాలంలో వ్రైసవరిమాణంలో (కోలత్లో) ముందు నివారణ కోసం రోగాన్ని గుర్తించగానే చల్లడంతో (పూయడంతో) అనేక రకాల రోగాలను అదుపులోకి తీసుకొని రావచ్చు.

తామ్ర యుక్తమైన శిలీంధ్రహారులు : ఇవి చాలాకాలం నుండి పెరుగుదల లేని అనేక సస్య రోగాలకి ఉపయోగకరమైనవి. కొద్ది ఖర్చుతో (తక్కువ వెలతో) అత్యుత్తమ శిలీంధ్రహారులు లభిస్తాయి. బోర్డు మిశ్రమం ఇందులో ఒక భాగం మైలుతుత్తం, కాఫర్ సల్ఫేట్ (Copper Sulphate) ఒక భాగం మున్నం పుంటుంది. దీన్ని 100 భాగాల నీటిలో కలుపుతారు. (ఇతర తయారీలకి చివరి అధ్యాయము చూడండి) మొక్కల గాయాలకి పూయడానికి బోర్డ్ పేస్ట్ - బోర్డ్ మలామును పూయవచ్చు.

ఇంకొకటి చాలా ప్రాచీన కాలం నుండి వాడుకలో నుండే తామ్రయుక్త శిలీంధ్రహారి బర్గండి మిశ్రమం (Burgandy Mixture). ఇది కూడా బోర్డ్ మిశ్రమంలాగే పనిచేస్తుంది. కాని ఇందులో మున్నానికి బదులుగా వాషింగ్ సోడా (బట్టలుతకే సోడా)ని మైలుతుత్తంని జతజేరుస్తారు (ముందు చూడండి).

మొక్కలు వారిపోయే (సారగు) రోగాన్ని అడ్డుకోడానికి ఎక్కువ శక్తివంతమైన మరొక పాత మందు (ఔషధం) చెస్నట్ కాంపౌండు (Chestnut Compound) ఇది మైలుతుత్తం, అమ్మోనియం కార్బోనేట్ వదాల్తా మిశ్రమం (ముందు చూడండి). ఈ శిలీంధ్రహారులు చౌకగా వున్నమా ఎంతో శక్తివంతమైన వాటిని తయారు చేయడం కొద్దిగా క్లిష్టతతో కూడిన పని కొద్దిగా (కష్టతరం). అందుచేత పూర్వం సిద్ధం చేసినవి కాకుండా, నేరుగా ఉండేటటువంటి ఔషధాలు (మందులు) ఇటీవల వస్తున్నాయి.

వీటిలో కొన్ని కాఫర్, ఆక్సి క్లోరైడ్ మిశ్రమం (Copper oxychloride) ఉదా. కుప్రావిట్ మరొకొన్ని కుప్రస్, ఆక్సైడ్ సంయుక్తం (మిశ్రమం) (Cuprous oxide) ఉదా. పెరనాక్స్.

సల్ఫర్ (గంధకం) కలిపిన శిలీంధ్ర హారులు :

వీటిని ముఖ్యంగా బూజా నివారణ కోసం ఉపయోగిస్తారు. దీనికోసం మృదువైన గంధకపు (సల్ఫర్) పొడిని చల్లవచ్చు. అయితే ఈ పొడిని వానకాలంలో (వర్షాకాలంలో) చల్లడానికి వీలులేదు. (పొడి చల్లడానికి వాన కాలం అనుకూలం) అందుచేత (ప్రే) ద్వారా చల్లేటటువంటి వెట్టబల్ సల్ఫర్ (Wettable sulphar) కల్యాణియల్ సల్ఫర్

(Colloidal sulphur) మొదలైన గంధకంతో కూడిన (గంధక సంయుక్త) వదార్తాలు ఇప్పుడు లభిస్తున్నాయి. సోల్బార్ (Solbar) మొదలైన బూజాలు కాకుండా సూక్ష్మ జీడులకు (మైటలకూ ఔషధం) ఇవి రావడానికి ముందే (రాకమునుపే) మున్నం సల్ఫర్ మిశ్రమాల్ని వేస్తూంటారు. (ముందు చూడండి).

**పాదరసం కలిపిన (సంయుక్తమైన) శిలీంధ్ర హరులు :**

వీటిని ముఖ్యంగా విత్తనాల ద్వారా, రాగలిగిన బీజ వాహక రోగాల్ని నివారించడానికి ఉపయోగిస్తారు. పూర్వం ఈ పని కోసం, పాదరసపు క్లోరైడ్ (mercuric chloride - Corrosive sublimate) వేస్తూండేవారు. ఇప్పుడు ఆర్గానోమెరక్యురిక్ సంయుక్తాల్ని (Organo-meracuric Compounds) వేయడం ఆలవాటుయింది. ఉదా. ఆగలాల్ (Agallol) అగ్రోసాన్ (Agrosan GN) ఆరెటాన్ (Aretan) సెరెసాన్ (Ceresan).

వీటిల్లో కొన్నింటిని బీజాల్ని ఉపభరించడానికి మాత్రమే కాకుండా చెరకు మొక్కల్ని, దుంపల్ని, వేరు తీసి నాటే మొక్కల్ని (కత్తిరిపు మొక్కల్ని) ఈ వదార్తాల ద్రావకంలో కొద్దికాలం నానబెట్టి ఆ తర్వాత నాటుతారు. ఆ విధంగా చేస్తే, వాటికి వచ్చే కొన్ని రోగాలు అంటుకోవు.

ఇటీవలి కాలంలో ఇంకా శక్తివంతమైన కొన్ని శిలీంధ్రహరులు మార్కెట్టుకు వస్తున్నాయి. వీటిల్లో ముఖ్యమైనవి ఈ క్రింద యివ్వబడ్డాయి. వీటి వ్యాపారనామాలు (పేర్లు) ప్రక్కన తెలుపబడినాయి.

ఫర్ బ్యామ్ (Ferbam), జైరామ్ (Ziram), కుమాన్ (Cuman), థైరామ్ (Thiram), నబామ్ (Nabam) జినిబ్ (Zineb), డైతేన్ (Dithane), లోనకాల్ (Lonacol), మనబ్ (Manab).

వీటిల్లో కొన్ని రోగాల్ని నివారించడమే కాకుండా, సూక్ష్మ పోషకాలైన ఇనుము, సత్తు, మ్యాంగనీసు మొదలైనవి కలిగి ఉన్నాయి. మరొక ఎక్కువ శక్తి వంతమైన శిలీంధ్రహరి - క్యాప్టాన్ (Captan) దీన్ని అదే పేరుతో లేదా క్యాప్టాఫ్ (Captaf) అనే పేరుతో విక్రయిస్తున్నారు. ఇది అనేక రకాల రోగాలకి ఔషధం, దీన్ని బీజోపచారానికి, మట్టిని శుభ్రపరచడానికి (క్రిమి సంహారానికి) మొక్కలపైన వచ్చే రోగాల్ని అడ్డుకోడానికి చిలకరించడానికి, ఉపయోగించవచ్చు. శిలీంధ్ర హరులను, కీటకహరిలాగే పొడిచి చల్లి లేదా చిలకరిస్తారు. సల్ఫర్ పొడి మొదలైన పొడులను చల్లుతారు. కాని అనేక శిలీంధ్రహరులను సామాన్యంగా చిలకరిస్తారు.

బీజవాహక రోగాల్ని అరికట్టడానికి బీజాలపైన (విత్తనాలపైన) పాదరస, సంయుక్తమైన శిలీంధ్రహరులను, థైరామ్ క్యాప్టాన్ మొదలైన వాటిని పూస్తారు. ప్రతి మొక్క విత్తనం మీద పలుచగా శిలీంధ్రహరులను పూయడానికి దీనికోసం బీజోపచార డ్రమ్ము (Seed dressing drum) (చిత్రం 9.4) వుంటుంది. ఇందులో బీజాలకు సరైన ప్రమాణంలో ఔషధాలను జతచేసి (మిశ్రమం) కలిపిన మిశ్రమాన్ని డ్రమ్ములో పోసి డ్రమ్ము మూతను మూసి 10 నుంచి 30

# WRONG



# RIGHT



నిమిషములవరకు ద్రమ్ముని తిప్పుతారు. ఆ విధంగా చేసినప్పుడు, బొవధం బీజాలపై పేరుకొంటుంది. ఒకే ప్రకారంగా పూతపూయబడుతుంది.

#### 9.4 బీజోపచార ద్రమ్ము (Seed dressing drum)

ఈ ఉపకరణం (ద్రమ్ము) ఎక్కువ బీజాల ఉపకరణకు సరిపోతుంది. కానీ తోటలో విత్తనాల్ని తక్కువ ప్రమాణంలో వేయాల్సి వస్తే ఈ ఉపకరణం ఆవశ్యకత అంతగా వుండదు. దానికి బదులుగా చిన్న సరైన గట్టి మూతగల డబ్బా, గాజు సీసా, లేదా కాగితపు సంపిలలో కొద్దిగా మందును వేసి 10, 15 నిమిషాలు కులికేలే బొవధం సుమారుగా అన్నీ విత్తనాలకు అంటుకొంటుంది. కొన్ని సమయాల్లో బొవధాలు కలిపే పింగాణి గిన్నెలలో బీజాలను కలవడం కష్టం. దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ, చేతితో కలువరాదు.

సస్యోషధీల విషయమై లీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు :

అనేక కీటకవారులు, మరికొన్ని శిలీంధ్రహారులు, కీటకాలకు, రోగాణువులకు మాత్రమే కాకుండా, ప్రాణులకూ, (పిల్లి, కుక్క, గొట్టె, ఆవు ఇత్యాదులు) మనుష్యులకు కూడా ఆపాయకరమైనవి. అందుచేత వీటిని, పూసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త వహించాలి.

బొవధాలను చిలకరించేటప్పుడు, చిరుగాలి ద్వారా, ముక్కులలోకి రావచ్చు లేదా (స్వే) మిశ్రమాన్ని కలిపేటప్పుడు లేదా తయారు చేసేటప్పుడు లేదా చల్లేటప్పుడు చర్మంపై పడి దాని ద్వారా శరీరం లోపలికి పోవచ్చు. లేదా అశ్రద్ధ చేత, ఇవి తినే ఆహార వదార్థాలపై పడవచ్చు. పిల్ల జెల్లా ఉండే ఇళ్ళలో ఈ వదార్థాలు చేతికి అందినంత దూరంలో పెడితే ఇంకా మరింత ఆపాయం హెచ్చుతుంది. కొన్ని రకాల బొవధాల శక్తి ప్రభావం చల్లిన తర్వాత కొద్దికాలం మిగిలి వుంటుంది. ఈ అవధిలో కూరగాయల్ని, పళ్లని కోస్తే విషం నేరుగా శరీరానికి చేరుతుంది.

9.5 బొవధాలని చేర్చిపెట్టి, పూసే క్రమం, ఎడమ వైపు ఇచ్చినవి తప్పు క్రమాలు, కుడివైపు సరైన (ఒప్పు) క్రమాలు. పై నుంచి క్రిందికి సూచించ బడ్డాయి.

1. బొవధాలను పిల్లలకు అందకుండా జాగ్రత్తగా ఒక ఆరలో పెట్టి తాళం వేయాలి.
2. బొవధాలను ఒక సీసాలో/లేదా టిన్ను నుంచి మరొక సీసా/ టిన్నులోకి పోయకండి.
3. తయారు చేసేవారు సూచనలను తప్పనిసరిగా అనుసరించాలి.
4. సరైన ప్రమాణంలో పూయాలి.
5. ద్రవాన్ని తయారు చేయడానికి చేతిని ఉపయోగించడానికి బదులు ఒక, కడ్డీని లేదా గరిటను ఉపయోగించి కలవండి, తయారు చేసిన తర్వాత సోపు వేసి చేతుల్ని కాళ్లని శుభ్రంగా కడుక్కండి.



## WRONG



## RIGHT



9.5

6. వీలైతే స్నానం చేసి, వేరే బట్టలు కట్టుకోండి.

ఈ అపాయాల నుంచి తప్పించుకోవడానికి క్రింద కొన్ని ముందు జాగ్రత్తలు (చర్యలు) సూచించారు. వాటిని తోటమూలీ వాటించి తీరాలి (అనుసరించి తీరాలి చిత్రం 9.5). (బేయర్ కంపెనీ వాళ్ళ కృప చేత)

1. ఔషధాల్ని పిల్లలకు అందనంత ఎత్తులో పెట్టి, లాశం వేయాలి.
2. దీన్ని తినే ఆహారం పెట్టిన సీసాల జతలోనూ, నిత్యం ఉపయోగించే తిండి వదార్థాలు పెట్టే స్థలంలోనూ పెట్టరాదు.
3. కుక్క, పిల్లి మొదలైన ప్రాణులు దొంగిలించకుండా ఉండేటట్టు, ఇవి తిరుగాడే స్థలంలో పెట్టకుండా జాగ్రత్త వదాలి.
4. ఈ మందులుంచిన సీసాల్ని బిన్నులను వేరే వదార్థాల్ని పెట్టడానికి, ఉపయోగించకూడదు.
5. ఈ మందుల్ని తయారు చేసేవారు ఈ ఔషధాల్ని పువయోగించడానికి సూచించిన సూచన ప్రమాణంలో (కొలతలలో) వీటిని కలిపి, చిలకరించండి. ఉజ్జాయింపుగా కొలతలు వేయకూడదు. ఇది ప్రాణులకు చాలా అపాయకరం.

9.5 (స్రీ) చేసేటప్పుడు అనుసరించే క్రమం - ఎడమ వైపు తప్పు - కుడివైపున్నది ఒప్పు.

1. పిల్లలను ఈ మందును చల్లనివ్వవద్దు.
2. ఎండలో చల్లకూడదు (ఎండ కాసేటప్పుడు చల్లకూడదు).
3. నాజిల్ అడ్డుకొని వుంటే నోటి ద్వారా వూదరాదు, సూది ద్వారా గుచ్చండి.
4. గాలికి ఎదురుగా (ఎదురుగాలిలో) చల్లరాదు.
5. కారే (స్రీ)ను చల్లరాదు.
6. చల్లిన తర్వాత కొద్దికాలం వరకు ఆ చెట్ల ఫలాన్ని తినకూడదు.
7. నీరసంగా వుంటే, ఆరోగ్యం చెడితే, తలనొప్పి వస్తే, ఊపిరాడడానికి కష్టమయితే, వెంటనే డాక్టర్ని కలిసి ఏ మందును మీరు చల్లారనేది తెలపండి.
8. మందుల్ని నీటిలో కలిపేటప్పుడు, ఆ మిశ్రమాన్ని చేతితో కలపరాదు. కడ్డీల ద్వారానో, చెమ్మల ద్వారానో కలపాలి.
9. ఈ విధంగా మందులు కలిపేటప్పుడుగానీ, చల్లేటప్పుడు కానీ, దేనిని తినరాదు. తమలపాకులు నమలకండి, బీడి, సిగరెట్టును తాగకండి.

10. మందులు కలిపిన / చల్లిన తర్వాత ముఖం, కాళ్ళు వేతుల్ని సోపు వేసి బాగా కడుక్కోవాలి. లేదా స్నానం చేయండి. బట్టలు మార్చుకోండి. ఇంతకు పూర్వం తోడుకున్న బట్టల్ని ఉతకండి.
11. (స్ప్రే) చేయడానికి లేదా పొడిని చల్లడానికి పెద్దవాల్చినే నియమించండి. చిల్లలకు ఈ పనులను అప్పగించకండి.
12. అనారోగ్యులకు, గాయం, పుండు ఉన్న మనుష్యులకు ఈ పనులు అప్పగించకండి.
13. ప్రొద్దున లేదా సాయంకాలము మాత్రమే ఈ మందుల్ని చల్లండి. మధ్యాహ్నం వేళల్లో ఈ మందుల్ని చల్లితే సూర్యరశ్మి వేడికి ఆకులు కాలిపోవడానికి అవకాశముంది.
14. ఎదురుగాలి ఉన్నప్పుడు మందు కొట్టడమో/చల్లడమో చేయొద్దు. చిరుగాలి వున్నప్పుడు గాలి వీచే దిక్కుకు నిలబడి మందు చల్లండి. గాలికి ఎదురుగా నిలబడి మందు చల్లితే మందు తుంచుకు ముఖంపైన, శరీరంపైన పడతాయి.
15. (స్ప్రే)యర్ నాజల్ (Nozzle) మురికి మొదలైన వాటి ద్వారా మూసుకొనిపోతే నీటి ద్వారా దాన్ని ఊదకూడదు. తీగ ద్వారానో కడ్డీ (పుల్ల) ద్వారానో క్లీన్ చేయండి.
16. ఈ మందు చల్లిన మొక్క, ఆకులు మొదలైన వాటిని, ఆవులు, మేకలు మొదలైన వాటికి వేయకుండా చూసుకోవాలి.
17. మందు కొట్టిన/ పొడి చల్లిన పండ్లు కూరగాయల్ని ఒకటి రెండు వారాల వరకు కోయకండి. ఆ తర్వాత కూడా బాగా శుభ్రపరచి ఉపయోగించాలి.
18. మందు చల్లిన తర్వాత, పొడిని చల్లిన తర్వాత (స్ప్రే)ని సబ్బుతో బాగా కడిగి శుభ్రం చేసి ఆరబెట్టాలి.
19. ఈ హెచ్చరిక క్రమాన్ని అనుసరించిననూ కొన్ని అనుకోని విశేషాలేమైనా ఉంటే వెంటనే వైద్యుడ్ని సంప్రదించండి.

**(స్ప్రేయర్ (మందు చల్లే యంత్రాలు - Sprayers) డస్టర్లు (ధూళి) పొడి చల్లే యంత్రాలు (Dusters)**

సస్యధాలు మొక్కలకి సమర్థవంతంగా ఏకసమంగా త్వరగా వ్యాపించడానికి సరయునివి (స్ప్రే)యర్లు. ఆపాయరహితమైన ఎక్కువ కాలం వచ్చే (స్ప్రే)యర్లు, డస్టర్లను ప్రతి యొక తోటమాలి కొనిపెట్టుకోవాలి. ఔషధాలను నీటితో కలిపి, నీటి తొట్టిలోను, బక్రెట్లలో పెట్టుకొని మగ్గులతో చల్లితే ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది. అంతేకాకుండా మందు కూడా స్వమవుతుంది. దీని ప్రభావం, శక్తి కూడా తక్కువే. సరైన (స్ప్రే)యరు, డస్టర్లకు పెట్టే ఖర్చు లాభకరమైంది.

తక్కువ మొత్తముతో ఔషధాలను వేసి సాధ్యమైనంత ఎక్కువ కీటకాల్ని, రోగాల్ని నాశనం చేసే ఉపకరణమే ఉత్తమమైన ఉపకరణం. ఈవిధంగా చేయడానికి ఈ ఉపకరణాల్ని, ఔషధాల్ని ఎక్కువ సమర్థవంతంగా ఆకులపైన వ్యాపింపగలిగేట్లు చల్లగల్గిన సామర్థ్యముండాలి. ఈ ఉపకరణాలు అనేక రకాలు. మన తోట వైశాల్యానికి తగినట్లు ఎక్కువ కాలం మన్నిక వచ్చేటటువంటి సరిఅయిన సమర్థవంతమైన ఉపకరణాల్ని గ్రహించాలి.

**(స్ప్రే)యరు :** (స్ప్రే)యర్తో ముఖ్యంగా మూడు భాగాలు 1. ఔషధం కలిపిన ద్రవాన్ని నింపే భాగం - ట్యాంకు (Tank) 2. ఔషధ ద్రవాన్ని ఎక్కువ ఒత్తిడి చేత బయటకు తుంచుకునే చల్లే భాగం - పంపు (Pump) 3. ద్రవం సన్నని రంధ్రం

ద్వారా ఎక్కువ ఒత్తిడి చేత బయటికొచ్చి తుంవర్షని (తుషార్లుకి) (Spray) చల్లే భాగం - నాజిల్ (Nozzle) ఈ ముఖ్య భాగాలు కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఇతర భాగాలుంటాయి.

1. హోసు : రబ్బరు లేదా ఫ్లెస్టిక్ తో తయారు చేసిన గొట్టం (Hose).
2. నాజిల్ ను బాగా పట్టుకోడానికి (బిగుసుకోడానికి) లోహపు గొట్టం - లాన్సు (Lance).
3. తుంవర్షని కావలసి వచ్చినప్పుడు నిలవడానికి (ఆపు చేయడానికి) పిడి హండిల్ (Handle) ఇల్పాడింది. కొన్ని స్ప్రేయర్లలో (ఉదా. బకెటు స్ప్రేయర్ - Bucket Sprayer) బ్యాంకు ఉండదు. బావి, బకెట్టు, బ్యాంకు - ద్రవం చేసి పాత్రలు.






స్ప్రేయర్ లోహంతోనో (సామాన్యంగా ఇత్తడి) ఫ్లెస్టిక్ తోనో తయారు చేస్తుంటారు. ఉత్తమ డిజిన్ స్ప్రేయర్, ఎక్కువ ఒత్తిడిని తట్టుకోగల ఫ్లెస్టిక్ షీట్ (Sheet) తో తయారు చేసుండాల్సి. త్వరగా చిల్లు (రంధ్రం) వడకూడదు. తుప్పు పట్టకూడదు. గట్టిగా ఉండి ఎక్కువ కాలం మన్నిక వచ్చేట్టుగా ఉండాల్సి.

తోటమాలికి అనుకూలమైన వివిధ స్ప్రేయర్లను 9.6 చిత్రంలో చూపబడింది. వీటిపురో ముఖ్యమైనవి. కొన్ని ఈ క్రింద ఇవ్వబడినాయి.



1. హేండ్ ఆటో మైజర్ (Hand Atomiser) స్పేట్ వంపు వంటి ఉపకరణం. ఇంటిలోకి వచ్చే కీటక నివారణకు, చిన్న పెరటి తోటకు అనుకూలమైంది. అయితే ఎక్కువ చెట్లుండే, ఎత్తైన చెట్లుండే వాటిపై దీని ద్వారా చిలకరించడం చికాకుతో కూడిన పని. అసమర్థనీయమైన పని.
2. బకెట్టు లేదా స్ప్రేయర్ వంపు (Bucket or Strrup Pump) ఈ ఉపకరణాన్ని బకెట్టు లేదా గంగాలానికి పెట్టి చల్లుతారు. ఇది పొదలకి సరళ తీగలకి, చిన్న చెట్లకు సరిపోతుంది.
3. క్యాప్సాక్ లేదా వీపు కట్టు స్ప్రేయర్ (Knapsack - Sprayer వీపుసంచి) వీపు పైలో బుజానికో వేసుకొని చల్లే ఉపకరణం. చిన్న మొక్కలు, పొదలు, పువ్వు మొక్కలు, కాయగూరల మొక్కలు, నర్సరీలు వీటిపైన చల్లడానికి ఇది అనుకూలమైంది.

ఈ మూడురకాల ఉపకరణాలలో వంపు చేసినప్పుడు మాత్రం, తుంవర్ష (తుషారాలు) బయటకు వస్తాయి. అంటే దీన్ని ఉపయోగించేటప్పుడంతా వంపుచేస్తుండాల్సి. అయితే కొన్ని ఉపకరణాలలో మొదట వంపు చేస్తూ, బ్యాంకుల్లో ఒత్తిడాన్ని ఏర్పరుస్తారు. ఆ తర్వాత లాన్కి తీగలకి పిడిని అదిమితే తుంపరాలు/తుంవర్ష బయటికి చల్లుతుంది. ఇటువంటి ఉపకరణాన్ని ఒత్తిడి కంప్రెసర్ స్ప్రేయర్ (Compression Sprayer) అని అంటారు. ఇది సుమారుగా విస్తరించిన తోటలకు, పొలాలకి పెద్ద నర్సరీలకు ఉపయోగకరం.

ఈ రకపు స్ప్రేయర్లను సామాన్యంగా ఒక్కరే వంపుచేసి చల్లవచ్చును. అయితే ఎత్తుగా పెరిగిన, పెరిగిడి మొక్కలకి దూర దూరంగా పెరిగే మొక్కలకి, పైపైకి పెరిగే మొక్కలకి మందు చల్లాలంటే కొంత ఇబ్బందివుంది.




9.6






9-6





9.7



అటువంటప్పుడు పెద్ద పెద్ద చెక్కుకి మందు చల్లడానికి వీలుగా ఇద్దరు వని చేయగల సమర్థమైన స్ప్రేయర్లున్నాయి. వీటిల్లో ఒకటి. (చిత్రం 9.6).

9.6 వివిధ రకాల స్ప్రేయర్లు 1. చేతి స్ప్రేయర్ ఇంటి కీటకాలకి (గృహ కీటకాలు), 2. పిరంజి, 3. & 4. చేతి స్ప్రేయర్లు, 5. & 6. బకెట్ స్ప్రేయర్లు, 7. స్లైడ్ స్ప్రేయర్, 8. నాన్ సాక్ స్ప్రేయర్ (వీపు వెనుక కట్టుకొనే వీలున్నది), 9. కంప్రెస్డ్ స్ప్రేయర్, 10. పుట్ స్ప్రేయర్ (Pedal) (కాలితో ఒత్తిడి), 11. రాకర్ స్ప్రేయర్ పీడిని ముందుకు వెనుకకు ఆడించ (కదిలించ) గలిగినది, 12. సవర్ స్ప్రేయర్ నూని (Oil) ఇంజన్ జోడించినది.

రాకర్ లేదా రాకింగ్ స్ప్రేయర్. దీని వంపుకు ఒక పెద్ద కర్ర పీడి ఉంటుంది. దీన్ని ముందుకు వెనుకకు ఆడించినప్పుడు తుంపర్లు బయటికి వస్తాయి. ఒకరు వంపుచేయాలి. ఇంకొకరు ఆ గొట్టాన్ని పట్టుకొని మందు చల్లాలి.

చేతితో ఊపే బదులు కాలితో త్రొక్కి ఉపయోగించే ఉపకరణాలు వున్నాయి. దీన్ని పెడల్ లేదా పుట్ వంపు (Pedal or Foot Pump) అంటారు. దీన్ని ఒక్కరే ఉపయోగించవచ్చు. కాలితో పెడల్ త్రొక్కుతూ, చేతితో మందు చల్లవచ్చు.

మరొక రకపు స్ప్రేయరు : స్లైడ్ వంపు (Slide Pump) ఇందులో రెండు గొట్టాలు ఒకదాని లోపల మరొకటి అడుతూంటుంది. ఈ విధంగా ఆడినప్పుడు స్ప్రే డ్రవం లోపలికి పీల్చుకోబడి ఒత్తిడం చేత బయటకు వస్తుంది. ఇది చాలా సరళం, సులభ యంత్రం, పెరటి తోటలకి చాలా అనుకూలమైంది. దీన్ని బకెట్టుకు పెట్టాలి. ఒక రకంలో పైన మందు వేసుకోవడానికి బ్యాంకు ఉంటుంది. పెట్రోల్ ఇంజన్ నుంచి వనచేసే భారీ స్ప్రేయరులు ఉన్నాయి. వీటిని సవర్ వంపు (Power Pump) అని అంటారు. ఇవి పెద్ద పెద్ద తోటలకి (కాఫీ మొదలైన తోటలకి) సరయినది.

ఛస్టర్లు : పొడిని వెదజేమ్మే ఈ ఉపకరణాలలో కొన్ని రకాలు. వీటిని 9.7 చిత్రాలలో చూవబడింది. కొన్ని క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

9.7 వివిధ రకాల ఛస్టర్లు (పొడిని చల్లడానికి) 1. పొడిని నన్నుని బట్టలో వేసి దులవడం (విడిలించడం), 2. పీడి ఉండే ఛస్టరు, 3. ప్లంజర్ ఛస్టర్, 4. రోటరీ ఛస్టర్, 5. సవర్ ఛస్టర్ (ఇంజను జోడించకుండా)

ప్లంజర్ ఛస్టర్ (Plunger duster) : పొడిని నింపడానికి ఒక చాంబర్ (Chamber) పాత్ర ఒక నాళిక - సిలిండరు (Cylinder) దానిలో ఒక పిస్టన్ (Piston) ఇది చిన్న తోటలకు ఉపయోగకరం.

గారొత్తే పీడిగల ఛస్టర్ (Bellows duster) పొడి నింపడానికి ఒక రకపు డబ్బా, దానికి ఒక పీడి జోడించి ఉంటారు. పీడిని ఒత్తిసప్పుడు గాలి చిల్లు ద్వారా గొట్టం గుండా వస్తుంది. దాంతోపాటు పొడిని బయటకు వెదజల్లుతుంది.

రోటరీ ఛస్టర్ లేదా క్రాంకు ఛస్టర్ (Rotary duster of Fan or Crank duster) వీటిల్లో పళ్ళుండే వోట చక్రాలుంటాయి. (గేరు చక్రం - గీర్ వీల్లు) (Gear-Wheels) ఈ చక్రాలకి చాలా చిన్న విసన కర్ర జోడిస్తారు.



చక్రాలని పీడితో పట్టుకొని త్రిప్పినప్పుడు విసన కర్ర తిరిగి పొడిని బయటకి వెదజల్లుతుంది. ఇది చిన్న తోటలకువయోగవడుతుంది. ఇవి కాకుండా, ఇంజన్ తగిలించిన డబ్బరల్లా ఉన్నాయి. ఇవి పెద్ద తోటలకి ఉపయోగపడతాయి.

ఔషధాలను చల్లడం మేలా లేదా పొడిని చల్లడం మేలా అని ప్రశ్నించుకుంటే ఈ రెండు రకాల సంరక్షణ క్రమాలలోను కొన్ని అనుకూలాలు. మరికొన్ని ప్రతికూలాలున్నాయి. పొడిని చల్లడానికి ముందు ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేసుకోవల్సిన అవసరం లేదు. ఔషధాలను నీటిలో కలపవలసిన అవసరం లేదు.

స్ప్రేయర్ల, డబ్బరల నిర్వహణ

1. కొలతలు, వాల్వల్ని బాగా శుభ్రపరచండి.
2. ఉపకరణ వెలుపల భాగాల్ని బాగా కడిగి శుభ్రపరచి, పొడి గుడ్డతో తుడిచి ఎండబెట్టి, ఆ తర్వాత లోపల పెట్టండి.
3. నాజీలు మొదలైన సూక్ష్మ భాగాల్ని క్రింద పడేసి సాఫ్ట్ చేయకండి.
4. వాడకంలో త్వరగా సమసిపోయే, అరిగిపోయే లేదా చెడిపోయే భాగాలకి స్పేర్ పార్ట్స్ తప్పి పెట్టుకోండి. సమయానికి ఇవి లభించకపోతే, సస్యసంరక్షణ పని నిలిచిపోతుంది. నిదానమవుతుంది, మొక్కలు నాశనమవుతాయి.
5. సంరక్షణ పనులను ఆరంభించే కాలానికి ముందే ఉపకరణాలు సరైన కండిషన్లో ఉన్నాయో లేదా అని పరీక్షించి కావల్సిన రిపేర్లను వెంటనే చేసి, ఉపకరణాన్ని సంసిద్ధం చేసుకోండి.
6. స్క్రూలను లాగకండి లేదా త్రిప్పి త్రిప్పి వేయకండి.
7. ఉపకరణాన్ని ఇతర వ్యవసాయ పనిముట్ల జతలో అడ్డ దిడ్డంగా పారేసే బదులు, ప్రతి ఒక ఉపకరణానికొక ప్రత్యేక నిర్దిష్ట స్థలాన్ని నిర్ణయించి, అక్కడే పెట్టెట్టు ఏర్పాటు చేయండి. ఆ స్థలాన్ని అప్పుడప్పుడూ శుభ్రపరచి శుభ్రంగా పెట్టండి. అప్పుడు బ్యాంకు, గొట్టాలు సాఫ్ట్లు పోవు.

కొన్ని తక్కువ ఖర్చుతో ఏర్పరచుకోగలిగిన (తయారు చేసుకొనే) విధానాలు :

**బోర్డో మిశ్రమం (Bordeaux Mixture) 1% శక్తి/బలం** 5-5-50 మైలుతుత్తాన్ని -5 పౌండ్లు లేదా 3 కేజీల కాల్సిన లేదా వేయించిన సున్నం -5 పౌండ్లు లేదా 3 కేజీల నీరు 5 గ్యాలనుల లేదా 300 లీటర్లు.

ఒక్క చెక్క తొట్టెలో 40 గ్యాలనుల నీటిలో 5 పౌండ్ల మైలుతుత్తం కాపర్ సల్ఫేట్ - (Copper Sulphate) రేకుల్ని కరిగించి, మరొక తొట్టెలో 10 గ్యాలనుల నీటిలో 5 పౌండ్ల సున్నుని రాళ్లని నిదానంగా పేసి, మైలుతుత్తం ద్రవాన్ని నిదానంగా సున్నుని నీటిలో పోసి, బాగా కలుపుతుండాలి. అనుకూలమయితే రెండింటిని మరొక తొట్టెలో పోసుకోవచ్చును. ఈ మిశ్రమాన్ని తయారు చేసిన వెంటనే మొక్కలకి చల్లాలి. 3, 4 గంటలు అయితే చల్లినప్పుడు ఈ మిశ్రమం ఆకులకు అంటుకోదు. మైలుతుత్తం ఎక్కువైతే ఆకులు కాలిపోవచ్చు. ఆకులకు మిశ్రమం అంటు కోవడానికి

కొందరు 2-3 పౌండ్ల బెల్లపు జీరాని దీనికి చేరుస్తారు.

బోర్డో మలాము (పేస్టు) (Bordeaux Paste)

4 పౌండ్ల మైలుతుత్తరి పౌండ్లు సున్నం, 6 గ్యాలనుల నీరు ఈ మలాము చేయడానికి కావల్సిన పదార్థాలు. మైలుతుత్తరాన్ని సున్నపు రాళ్ళను వేర్లు చేరుగా కరగించి, ఆ రెండింటిని కలపాలి. ఈ మలాముని తయారు చేసినరోజే మొక్కల గాయాలకి బ్రష్ తో పూయాలి.

లెడ్ ఆర్సినేట్ (Lead arsenate) : కావల్సిన వస్తువులు : ఒక పౌండు లెడ్ (పీసం) ఆర్సినేట్ 5, పౌండ్ల వేయించిన సున్నం, 50 గ్యాలనుల నీరు.

కాల్షియం ఆర్సినేట్ (Calcium arsenate) : దీనికి ఒక పౌండు క్యాల్షియం ఆర్సినేట్, 2 పౌండ్ల వేయించిన సున్నం, 3 పౌండ్ల బెల్లం, 50 గ్యాలనుల నీరు కావల్సి వస్తుంది.

లైమ్ సల్ఫర్ (Lime Sulphur) : దీన్ని కొన్ని కీటకాలకు శిలీంధ్రహరిగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. దీనికి కావల్సిన వస్తువులు : 50 పౌండ్ల కాల్షిం సున్నం, 100 పౌండ్ల గంధకం, 50 గ్యాలన్ల నీరు, సున్నాన్ని కుండలో వేసి వేయిస్తూ మధ్య మధ్యలో దాని జతకి గంధకాన్ని నీటిని వేసి బాగా కలిపి, 15 నిమిషాలు ఉడకడానికి వదలి వేయండి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీటిని వేసి కొంతసేపు మరగించి, అనంతరం మిగిలిన నీటిని చేర్చండి. ఈ మిశ్రమాన్ని తయారు చేయడం కొద్దిగా క్లిష్టమవుతుంది. సరిగ్గా చేయకపోతే ఆకులు కాలిపోవచ్చు. ఈ ద్రవాన్ని ఉపయోగించేటప్పుడు దానికి 3/4 వంతు నీరు కలిపి నిర్భలం చేసి చల్లాలి. ఇటీవల ఔషధాలు మార్కెట్టులో దొరకడంతో దీన్ని సాంతంగా తయారు చేసుకోవడం అంత ప్రయోజనకరమైన పనికాదు.

కిరోసెన్ ఎమల్షన్ (Kerosene emulsion) : ఒక పౌండు సోపుని (సాబూన్) కత్తరించి నాల్గు గ్యాలనుల నీటిని మరగకాచి, సాబూన్ కరగిన తర్వాత కిరోసెన్ను కొద్ది కొద్దిగా పోయండి (2 గ్యాలనులంత). ఉపయోగించేటప్పుడు దీనిని 15-20 అంత నీటిలో కలిపి చల్లండి.

పాగాకు కషాయం (Tobacco Decoction) : 1 పౌండు ఎండిన పాగాకు 4 పౌండ్ల సాబూను 1 గ్యాలన్ నీరు కషాయాన్ని తయారు చేయడానికి కావాలి.

పాగాకును నీటిలో 1/4 గంటపేపు మరగించండి. అనంతరం వడగట్టి, ఆ తర్వాత సాబూన్ వేసి, మళ్ళీ మరగ కావండి. అంటి పెట్టుకొని ఆవతల దీనిని ఉపయోగించేటప్పుడు 6-7 భాగాలు నీటిని కలిపి చిలకరించండి.

## తోట సంవిధానం (విన్యాసం) నిర్మాణం (Garden Design & Layout)

తోట అంటే కేవలం మొక్కల గుంపో లేదా సమూహమే కాదు. అదొక ఉద్దేశ్యపూర్వకమైన నవ్య విన్యాసం, సంవిధానం. తోట యొక్క ప్రధానోద్దేశం కాయగూరలు, పువ్వులు, వండ్లు ఉత్పన్నం చేయడం. తద్వారా లాభాన్ని ఆశించి లేదా కేవలం అలంకారం కోసమో, లేదా సౌందర్యపీఠం చేతనో, గృహ పరిసర షేలాన్ని ఉపయోగకరంగా వాడుకోవడానికి ఉండవచ్చు.

గ్రామాలలో తోట పెంచడానికి ప్రథమోద్దేశం మొదటిది. అటువంటి తోటలు, కూరగాయలు, పువ్వులు, వళ్ళు, కొబ్బరి, వంగ మొదలైన తోటలు. విశాల షేలాలోలో నిర్మించబడే తోటలు నిర్వహించడానికి, ఒక ప్రత్యేక విధమైన కృషి చేయాలి. తోట పని విశాల షేలాలోలో జరగడంతో, ఈ రకపు తోటపనిలో, సామాన్యంగా, వ్యవసాయంలో ఉపయోగించే, ఉపకరణాలు, ఎరువులు అనుసరించే సాగుబడి విధానాలు, మొక్కల సంరక్షణ క్రమాలు నిర్వహణ, ఏర్పాటులు వీటినే కొద్దిగానో, గొప్పగానో అనుసరించవలసి ఉంటుంది. అందుచేత, ఇటువంటి తోటల సంవిధానం రూపేణ, ఇటువంటి వ్యవసాయపు షేలాలోలై సరళమవుతుంది.

ఈ రకపు తోటలకు కావల్సింది గట్టి ముట్టయిన కంచె. గాలిని అడ్డుకోనే శక్తి, నీటి వ్యవస్థ (నీటి పారుదల మొదలుగునవి). చక్కగా నీళ్ళు ఊరడానికి నేలను చదును చేసి, అనుకూలమైన కొన్ని భాగాలుగా విభజించి, నీటి కాలువలుగానూ, నీరుారే కాలువలుగానూ త్రవ్వతారు. మొగ్గల్ని, మొక్కల్ని వృద్ధిచేసుకోడానికి ఒక ప్రక్క నర్సరీ, కొద్దిగా నీడ కోసం ఏర్పాటు, నడవడానికి చాలినంత వెడల్పుయిన గట్టులు (దారి) దస్త్రీకి, చెట్టు పుట్టలకు, ఎరువులకు, విత్తనాటడానికి, విత్తనాలు చల్లడానికి, మొక్కలు నాటడానికి, ఇత్యాది వాటికి పెద్దలు.

ఇక్కడ అలంకారపు తోటల(Ornamental Gardens) రూపాన్ని విన్యాసాన్ని లేదా సంవిధాన విషయమై వివరాలు యివ్వబడ్డాయి. అలంకారపు తోటలు, ఇంటి ముందర గృహ తోటలు, పెరిటి తోటలు, (Home gardens) అయ్యుండవచ్చు. లేదా రోడ్లలో (వీధులలో) అప్పత్రులలో, కర్మాగారాలలో, ఊరిలో నాలుగు దారులు కలిసి మధ్య భాగం చదరంలో వృత్తాలలో, పట్టణాలలో, ప్రజల విహారస్థలాలలో, విలాస, ఉల్లాసాలకు ఏర్పాటు చేసిన సర్వ జనుల తోటలవ్వవచ్చు (Public Gardens) ఉమ్మడి మాటలు అవ్వచ్చు, పూదోటలు కావచ్చు.

ఇటువంటి అలంకారపు తోటలను, పెంచడంలో పలు ఉద్దేశాలుంటాయి. పెరిటి తోటలైతే ఇంటికి, తోటకు, ఒకదానికొకటి పూరకంగా, కూర్చోడానికి, అడుక్కోడానికి, విశ్రాంతి తీసుకోడానికి, ఏకాంతంగా ఉండడానికి, ఇల్లు ఏ విధంగా అనుకూలంగా వుంటుందో అదే విధంగా ఆ గృహం (ఇంటి) తోటకూడా అనుకూలంగా వుండాలి. అనువుగా ఉండేటట్టుగా గృహ తోటను రూపొందించుకోవాలి. అదర్భవంతమైన సంవిధానంతో రూపొందించబడిన ఇంటిలో గృహ జీవనానికి ఎంత అనుకూలంగా ఉంటుందో అంతే

అనుకూలంగా తోటకూడా ఉండాలి. దీనికి తోడు విర్బలమైన గాలి, మితమైన ఎండ, నీడ, చల్లదనం లభిస్తుండాలి. సౌందర్యోపాసనకు ఉత్తేజం కలిగించేట్టుగా ఉండాలి. ఇంటి అందాన్ని, ఇంటిలోని వారి ఉల్లాసాన్ని, ఉత్తేజాన్ని పెంపొందించేట్టుగా ఉండాలి. గృహిణికి, గృహస్థులకు నెమ్మది, శాంతి ఇల్లాదులు లభిస్తుండాలి. ఇటువంటి ఆదర్శవంతమైన తోటని రూపొందించాలంటే తోట, ఇంటిలో ఒక భాగమై ఉండాలి. ఇల్లు తోటలో ఒక భాగమై ఉండాలి. ఈ విధంగా ఉండేటట్టుగా ఈ రెండింటి సామరస్యాన్ని కల్పించాలి. ఈ కల్పనే తోటయొక్క సంవిధాన ఉద్దేశం.

ఈ రకపు సంవిధానానికి తోటమాలి, తోట విషయంలో ఒకరకపు కళా విన్యాసాలను తెల్పుకొని ఉండాలి. అంతేకాకుండా సౌందర్యోపాసకుడుగానూ ఉండాలి. సస్య శాస్త్రపు జ్ఞానాన్ని పొందుండాలి. చేతులకు, కాళ్లకు మట్టైనా పట్టించుకోకుండా తోట వనులను సాంతంగా చేసుకోవడానికి సిద్ధమై ఉండాలి. కొద్దిగా శిల్ప శాస్త్రమూ (architect) తెలుసుకొని ఉండాలి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యం సస్యాల విషయమై - మొక్క, తీగ, పాదలు, చెట్ల విషయమై రోతుగా జ్ఞానాన్ని పొంది (తోట వనులలో నిష్కాతుడై) వాటి జీవన విధానాన్ని ఇంగితాలను బాగా తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం వుండాలి. తోటవని చేసే వారందరూ తత్వాలను, రూపురేఖలను తెలుసుకొని ఉండాలి. అనుష్ఠానికి తెచ్చుకొని ప్రతి ఒకరు తమ తమ తోటలను, ఆదర్శ తోటలతో పాటు ఆదర్శవంతంగా మార్చవచ్చు.

ఈ విధంగా మార్చాలంటే ప్రతి తోటకు, ఒక పథకాన్ని తయారు చేసుకొని దాని ప్రకారం పనిచేయాలనే ఆలోచన ఉండాలి. నా తోట యొక్క ప్రధానోద్దేశం ఏమిటి? నేను ఏ ప్రయోజనాన్ని ఆశించి ఈ పని చేయదలచాను. సౌందర్యం కోసమా ? ఇతరులను మెప్పించి వాళ్ళ ద్వారా పాగడ్డలను పొందడానికా ? లేదా నా తోట నాలో ఒక భాగంగా, నా గృహ జీవనానికి అనువుగానూ, ప్రయోజనకారిగా ఉండడానికి, నాకున్న స్థలంలో ఎంత తోటను తయారు చేసుకోవచ్చు. తోటకు నేను ఎంత ఖర్చు చేయగలిగే స్థితిలో ఉన్నాను. మొత్తంగా ఖర్చు పెట్టగలనా ? లేదా నెల నెల కొంత మొత్తం ఖర్చుపెట్టగలనా ? నేనే నా తోటవనులు చేసుకోగలనా ? ఇతరుల జోక్యం ఎంతవరకు కావల్సి వస్తుంది. ఇతరులు పని చేయడానికి లభ్యమవుతారా ? నా ఇంటిలోని వాళ్ళు తోటపని చేయడంలో నా అంత ఆసక్తి కలిగిఉన్నారా ? తోట తయారు చేయడానికి, నాకెంత అనుకూలముంది? ఎన్ని రకాల ఆనానుకూలాలున్నాయి ? వాటిని ఎదుర్కోగలనా ? పక్షులు, కోతులు, దొంగల బారి నుండి నా తోటను కాపాడు కోగలనా ? తోట వనుల విషయమై నాకు తెలిసింది ఎంత ? ఎక్కువగా తెలుసుకోవడం ఎలాగ ? ఎవరి సలహా ఏ విధంగా లభిస్తుంది. నా తోటలో ఏమి పంటలను, మొక్కల్ని పెంచదలచాను, గడ్డి వరువు ఎంతకుండాలి. చెట్లు ఎన్ని ఎక్కడ, ఏవేవి, ఎందుకు పెంచ దలచాను ? ఏయే వోళ్లలో తోటపని చేయవచ్చు. ఏవేవి వెయ్యాలి ? తోటలో చాలినంత వెలుతురు ఎండ పడతాయా ? నీడ ఎక్కువగా ఉందా ? ఉన్న నీటి వసతి చాలా ? బావి నీళ్ళు ఉన్నా ? లేక తియ్యగా ఉన్నాయా ?

ఈ విధంగా ప్రశ్నలను చేసుకొని ఒక నిర్ధారణకు వచ్చి మనకున్న స్థలంలోని గాలి నేల గుణానికి, మన శక్తికి మన అనుకూల ప్రతికూలాలకు తగినంత తోటను రూపొందించుకోవాలి (ఏర్పాటు చేసుకోవాలి). ఈ ప్రశ్నలను ప్రశ్నించుకోకుండానే తోట చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే, ఆ పనులు విఫలమవ్వక తప్పదు.

ఒక నిర్ధారణకు వచ్చిన తర్వాత తోటకు ఒక ప్రణాళిక సాంకేతిక - వంశ వర్ణ ప్రణాళికను తయారు చేసుకోవాలి. ఈ ప్రణాళికను తయారు చేయడానికి ముందుగా, తోట యొక్క (ప్రణాళిక) సంవిధానపు మూల తత్వాలను, సస్య జీవన క్రమాన్ని తెలుసుకొని కొన్ని తోటలకు వెళ్లిచూసి, అనుభవజ్ఞుల సలహా సూచనలు పొందాలి.

ప్రణాళిక తయారు చేసినా తక్షణం దాన్ని నిశ్చయించి నిర్ధారణ చేసుకొని, తు.చ. తప్పకుండా దాన్ని అనుసరించి, తీరాలనే నిర్బంధ ముండరాదు (పెట్టుకోకూడదు). తోట పనులు పెరిగిన కొలదీ అనుభవాలను అనుసరించి, ఈ ప్రణాళికలో మార్పులను చేసుకుంటూ ఉండాలి.

ఇతరుల తోటలాగే మన తోటనూ రూపొందించాలనే ఆలోచనలుండరాదు. మన తోట మనదనే ప్రత్యేకత నిలుపుకోనేట్టుగా ఉండాలి. మరొకరి తోటకు వ్యతిరేకంగానూ, ఉండకూడదు. మన మనోభిప్రాయాన్ని అనుసరించి, మనకనుకూలంగాను, ఇష్టమైన పద్ధతిలో మన ధ్యేయానికనుకూలంగా మన తోటను రూపొందించుకోవాలి తప్ప, ఇంకొకరి తోట రూపాన్ని, విధానాన్ని అనుసరించడం ఉత్తమ పద్ధతి కాదు. అదే విధంగా ఇతర దేశాలలో తోటల విషయాలు అవరించే విధానాలను చదివి, అదే విధంగా, మన దేశంలో తోటను పెంచాలనుకోవడం, బుద్ధి తక్కువ పని. ఒక్కొక్క దేశంలోనూ, అక్కడున్న వాతావరణం, మట్టి రకాలను అనుసరించి, ప్రజల రీతి, ఇష్టాన్ని అనుసరించి, వారికున్న జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి, దానికి తగినట్టుగా తోటను పెంచుతారు. ఉదాహరణకు ఇంగ్లాండు మొదలయిన చలి దేశాలలో తోటలోని మొక్కలు చలిని ఎదుర్కోగలిగినవే ఉంటాయి. తోట విన్యాసం వివరీత చలిని తట్టుకోగలిగినదిగా ఉంటుంది. ఎండ లావం తక్కువగా ఉండడంతో వర్షము వస్తే ఎదురు నెలలూ కురుస్తూ ఉండడం చేతను, మనలాగే, ప్రత్యేక నీళ్ళ వ్యవస్థను (ఏర్పాటు) చేసుకోవల్సిన అవసరం లేదు.

మన దేశం ఉష్ణ దేశం, ఎండ ఎక్కువ, వర్షాకాలం, కొన్ని నెలలు మాత్రమే. సస్య వృద్ధి అనేక నెలలు జరుగుతూంటుంది. అందుచేత నీటి అనుకూలం ఒకటి ఉంటే మన దేశంలో తోట వనికి ఉండే స్వాభావిక సౌలభ్యాలు ఆ దేశాలలో లేవు. మన దేశంలో ఉండేటట్టుగా సస్యాల సాంపు, వంపు, రంగు, వైవిధ్యం, శీఘ్ర వృద్ధి ఆ దేశాలలో లేవు. అయినా, మన దేశంలోని ఎండ, పొడిగాలిచేత అక్కడ వున్న అనేక మొక్కల్ని మనం బాగా పెంచలేము. అదే విధంగా వారు కూడా మన దేశపు పలు మొక్కలను పెంచలేరు. అందుచేత అన్య దేశ తోటల పెంపకాల అనుసరణ విఫలమవుతుందని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు.

తోటను పెంచడానికి ప్రణాళిక ఎందుకు ? లేదా తోటను పెంచడానికి ప్రణాళిక అవసరమా ?

ప్రణాళిక లేనిదే ఏ వస్తినా సమర్థవంతంగా చేసుకోలేము. అంటే ప్రణాళిక లేని పనులు అసంపూర్ణంగా నిలిచి పోవచ్చు. కష్టం నష్టం, దుబారా, వృధా శ్రమ విఫలతలను తక్కువ చేసుకోవడానికి, తోట పనులు సాఫీగా అడ్డం లేకుండా మిత ఖర్చుతో మిత శ్రమతో సాగించడానికి తోటల ప్రణాళిక ఉపయోగ కరంగా వుంటుంది. అంతే కాకుండా ఎంత చిన్న తోటకైనా, ఒక ప్రణాళిక అవసరం.

ఈ విధంగా ప్రణాళికలు ఏర్పాటు వలన మన నమ్మకం ఉద్దేశాలు పుష్టమవుతాయి. మన ప్రణాళిక విధానంలోనే లోటుపాట్లు తెలుసుకోగలుగుతాము. దాన్ని అనుసరించి మనం చేయాల్సిన ఆచరించవలసిన

వమలను ఖచ్చితంగా నిర్ణయించుకోగలుగుతాము. అంతే కాకుండా, ఖర్చు శ్రమలను తగ్గించుకోగలుగుతాము. తప్పులు చేయడం తగ్గుతుంది.


తోటను కట్టడావలె కట్టిన తర్వాత, ఇల్లు కట్టి పూర్తి చేసిన తర్వాత, ఆ ఇంటి నిర్మాణంలోని లోపాల్ని ఏ విధంగా దిద్దుకోవడం కష్టమో అదే విధంగా తోట వమలలోను కష్టమవుతుంది. ఇంటి సమీపంలో చెట్లను నాటితే, ఆ చెట్లు పెద్ద ఆ ఇంటి పునాదులను కదిలించి వేసి అవకాశముంది. అపాయం కలిగినప్పుడు ఆ చెట్టును కొట్టివేసి అవకాశముండవచ్చు, ఉండక పోవచ్చు. పునాదులలో ఏర్పరిచకుండా అడ్డుకోడానికి సాధ్య కావచ్చు. చౌక కదా అని తక్కువ రకపు మొక్కల్ని చెట్లను నాటి వాటి ఫలితాన్ని, ఫలాన్ని చూసి, అసంతృప్తి వడి వాటిని కత్తిరించి వేయాల్సి వస్తుంది. ఎన్నో సంవత్సరాల శ్రమ ఖర్చు, నీళ్ళపాలపుతాయి. ఇటువంటి చేదు అనుభవాలు రాకుండా చూసుకోవానికి తోటకు ఒక ప్రణాళికను తయారు చేసుకోవడం అనేది చాలా అవసరం.

### ప్రణాళికలు ఏర్పరచుకోవడం (Planning)


మొదట ఇల్లు లేదా తోట యొక్క ఆకారం, విస్తీర్ణత, ఇంటి కాంపౌండు, గ్యారేజ్, పశువుల వావడి, ఇంటి వెనుక భాగం (Out house), పెద్ద, ఉంచుకోదలచిన మొక్కలు, చెట్లు, బండలు మొదలైనవి ఉన్న స్థలం, ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న ఏరులు, కొలనులు, కాలువలు, చెరువులు మొదలైన వివరాలను తెలుసుకోని (Ground Plan) వాటి ద్వారా కాగితంపై ఒక ప్రణాళిక, గీసుకొని పెట్టుకోవాలి (10.1A) ఈ ప్రణాళికను కచ్చితమైన కొలతలలో వీలైనంత పెద్ద కాగితంపైన గీసుకోవాలి.

10.1A ఇల్లు, ఆ తర్వాత ఏర్పాటు చేయదలచిన తోట యొక్క నిర్మాణానికి : ఉదాహరణకు 50' x 100' విస్తీర్ణత, వైశాల్యం, ఉన్న ప్రదేశం, చిన్న ఇల్లు, చిన్న సంసారం, ఒకళ్ళిద్దరు పిల్లలు, తోట ఇంటి యొక్క విస్తీర్ణం గృహ జీవనానికి, అటలకు, పాటలకు, సరస నల్లపాలకు తోటలో అవకాశముండాలి. ఈ బాహ్య గృహ జీవనానికి తోటను ఏ విధంగా నిర్మించుకోవచ్చు ? ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవానికి వీలవుతుంది. 1. ఈ అవసరాలను తీర్చేందుకు వీలుగా పథకాన్ని చిత్రాల ద్వారా చూపబడింది. తిరిగడానికి దారి, 2. వీధి నుంచే కనిపించే తోట (రూపొందించుకోవానికి వీలుగా), 3. రాలి తీన్నెలు - భోజనోపహారాలకు, 4. ఏకాంతానికి కంచె చెట్టు, 5. పిల్లలు ఆడుకోవానికి స్థలం, 6. వేసవిలో నీడ కోసం చెట్టు, 7. ఇనుక దిబ్బ, 8. వండ్ల చెట్లు - భోజనానంతరం తినడానికి వండ్లు, 9. ఇంటి కుక్క ఉండడానికి, సైకిల్స్ స్థలము, 10. గాలిని ఆడ్డుకోవడానికి - గాలి ఏ దిక్కునుందో ఆ దిక్కుగా, 11. బట్టలు ఆరడానికి ఆ స్థలంలో తీగలు కట్టడానికి ఏర్పాటు, 12. ఎండవేయడానికి స్థలము, 13. సామానులు పెట్టుకోవడానికి స్థలం, 14. పూల కుండలు పెట్టడానికి స్థలం (కుండల తోట), 15. మొనుగల వాకిలి (తలుపు), 16. కంచె, 17. చెత్త చెదారపు గుట్టలు వేయడానికి స్థలం, 18. కోణం, 19. శుభ్రమైన స్థలం, 20. వంటిల్లు, 21. భోజనాల, వసించే గదుల మధ్య వావడి, 22. కారు షేడ్, 23. ఇంటి లోపలికి వెళ్ళడానికి దారులు - కడ్డీలతో తయారు చేసుకొని పెట్టుకోవాలి.

ఈ ప్రణాళికలో దిక్కులను సూచించాలి. ఇది ముఖ్యం ఎందుకంటే, మొక్కలలో కొన్నింటికి లేత ఎండ (నీరెండ) మాత్రమే కావాలని వస్తుంది. కొన్ని మధ్యాహ్నపు ఎండని తట్టుకోలేవు. అందువేత ఈ ప్రణాళిక చిత్రంలో దిక్కుని ఉంటే, ఏయే మొక్కలు ఎక్కడెక్కడ వేయాలనేది గుర్తు పెట్టుకోవడానికి వీలుగా వుంటుంది.



10-1 B



రెండోది ఈ ప్రణాళిక చిత్రంలో ఎక్కడెక్కడెంతెంతవెడల్పులో, కాలుదారి, రోడ్డు (దారి) మొదలైనవి కావాలని సూచించుకోవచ్చు. ఇంటికి వెళ్ళి రావడానికి పెడేకి, గ్యారేజీకి మొదలైన వాటికి వాహనాలు సులభంగా వెళ్ళి రావడానికి వీలుండాలి. పెద్ద పరుపుల వానిడికి, అనుకూలమైన ప్రదేశం దొరికేట్టుగా ఉండాలి. చాలినంత వెడల్పు దారులు ఉండేట్టుగా చూసుకోవాలి. (10.1 B చిత్రం.)

10.1 B ప్రణాళిక చిత్రం యొక్క విస్తీర్ణత 1. మూల ప్రణాళిక చిత్రం, 2. సరయున, చక్కటి ప్రణాళిక చిత్రం - రెండూ గీసి పెట్టుకోవాలి. తోట యొక్క సాగసును ఏ విధంగా పెంచవచ్చు. తోట ద్వారా గృహ జీవనాన్ని పుష్టికరంగా ఏ విధంగా మెరుగుచేస్తాము ? శుభ్ర పరచడం ఏ రీతిలో చేయాలి ? ఈ విధంగా ఆలోచించి, తీర్పు దిద్ది, పెంచి, అసలు స్వరూపానికి వజ్రాన్ని కలిగించాలి. ఇంటి ముందు, గడ్డి పరుపులు, పాదలు గుంపు బయట నుంచి చూస్తే చాలా అందంగా ఉంటుంది. ద్వారం దగ్గర ఒక తీవ్ర ఉంటే (సిమెంట్ బెంచి) కూర్చోడానికి వీలుగా వుంటుంది. కావలసిన వస్త్ర పూల కుండీలు పెట్టవచ్చు. గడ్డి పరుపులను చదరంగా ఉండేట్టుగా కాకుండా మూలలో (కోణాలలో) నీసే కొద్దిగా కొత్తరకంగా వుంటుంది. అదే విధంగా కాలుదారిని మూల మూలలకు వేస్తే, చూడడానికి బాగుంటుంది. అంతే కాకుండా దారిలో గుండ్రని రాళ్ళు పేరేస్తే ఇంకా అందంగా వుంటుంది. వర్షాకాలంలోనూ ఈ దారులను ఉపయోగించుకోవచ్చు (అంటే నడవవచ్చు). తోటను తయారు చేసిన తర్వాత తోటకు కావలసిన ఉపకరణాలను గ్రహించాలి. వాటిని పెట్టడానికి స్థలం, కారు షెడ్ లో ఒక గూడును కట్టిస్తే అనుకూలం లేదా ఒక అలమర వివిధ రకాల పరికరాలను పెట్టుకోడానికి వీలుగా కట్టిస్తే మంచిది. ఈ విధంగా ఎన్నో ఆలోచనలు చేసి, దాన్ని అనుసరించి నలైన అసలు, తోట గృహ చిత్ర పట నమూనాలను తయారు చేసుకోవాలి.

1. బయట వాళ్ళు చూడడానికి వీధి తోటగా ఉండాలంటే, 2. అలంకారపు పాదల చెట్లు, 3. సిమెంటు బెంచీలు, 4. వన భోజనాదులకు ఎత్తు దిబ్బలు (Terrace-దాబా-వేదిక - తీవ్ర), 5. కాలిదారిలో నడవడానికి వీలుగా రాళ్ళను పరచడం (చదునుగా ఉండేట్టుగా చూడాలి), 6. పిల్లలు ఆడుకోడానికి వీలుగా గడ్డి పరుపులు (Lawn), 7. కంచె, 8. ఇసుక దిబ్బలు, 9. ఇంటి కుక్కకు, సైకిలుకు ఒక గది, 10. బట్టలను ఆరవేయడానికి పెరడు, 11. సామానులు పెట్టుకోడానికి ఒక గది, 12. వళ్ళ చెట్టు, 13. చెమక వాకిలి, 14. చెత్తకుప్ప వేయడానికొక తొట్టి, 15. లోపలి గది, 16. లైట్స్, బాత్ రూమ్ము (శావ గది, స్నాన గది), వంటిల్లు, 17. భోజన శాల, 18. లివింగ్ రూమ్ (వసించే గది/మధ్యగది), 19. ఉగ్రాణం, 20. ముఖ ద్వారం.


తోటలో అనేక విభాగాలుంటాయి. ముఖ్యంగా వీటిని రెండు భాగాలుగా విభజించవచ్చు. 1. ఉపయుక్త భాగం (Utility features) 2. అలంకారపు భాగం (Ornamental features or division). తూరగాయలు, వళ్ళ మొదలైనవి మొదటి రకానికి (భాగానికి) చెందినవి, గడ్డి పరుపులు, పాదలు మొదలైనవి రెండవ రకానికి (భాగానికి) చెందినవి.

ఇవి కాకుండా తోటలో మరొక అత్యవసర భాగం ఉండే తీరాలి. ఎందుకంటే ఎరువులను కలపడానికి, పూలకుండీలలో మట్టిని మార్చడానికి, పడలిండానికి నర్సరీ-వసులకు (నర్సరీలాదన) ప్రత్యేకమైన స్థలం వుండాలి. దీన్ని ఎల్లప్పుడూ పొడిగానూ, శుభ్రంగానూ ఉంచుకోవాలి. కాని ఇది కష్టతరం కాబట్టి ఈ భాగం





10-3



0-2

ఇంటికి కొంచెం దూరంలో కంటికి కనిపించనంత దూరంలో ఇంటి ముందు (లేదా) వెనుక భాగంలో ఉండేటట్లుగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఈ భాగాన్ని పనిచేసే విభాగం (Service division) అని వ్యవహరించవచ్చు.

అలంకారపు విభాగం సామాన్యంగా ఇంటి ఎదురుగానో మట్టు ప్రక్కలుగానో ఉంటుంది. ఉపయుక్త భాగం ఇంటి వెనుక లేదా ఇంటి కిరుప్రక్కల సామాన్యంగా ఉంటుంది.

పెద్ద తోటలలో యీ విభాగాలే కాక, వెలువల ఉండడానికి, పీల్చల ఆట పాటలకు, బంధు మిత్రులు కలుసుకోవడానికి, ఎండచేయడానికి, ఎండ తాపాన్ని తట్టుకొనేందు కోసం, ఒక భాగాన్ని ప్రత్యేకంగా మిగిల్చి, ఆ భాగం బయట నుండి వచ్చే వారి దృష్టిలో (కంటికి) పడకుండా ఉండేటట్లుగా గోప్యంగా ఉండేటట్లుగా చెళ్ళను, మొక్కల్ని, తీగల్ని ప్రోబ్లాండ్ తోటైలలో పువ్వులను పెంచుతుంటారు. ఈ భాగం సామాన్యంగా ఇంటికి చుట్టు ప్రక్కల (ఎక్కచగా ప్రక్కనే) ఉంటుంది.

### తోట యొక్క ఉపయుక్త భాగం

ఈ భాగపు విన్యాసం యొక్క ముఖ్యోద్దేశం ఇంటికి సమీపమైన కూరగాయలను, పళ్ళను ఉత్పత్తి చేయడం, బట్టలుతీకే, లేక ఎండచేసే స్థలాలు, నీళ్ళ తొట్టెలు ఎరువుల దిబ్బలు (గుండలు) ఎరువును కలిపే స్థలం, విత్తనాలను విడదీసే, ఎండబెట్టే స్థలం, నర్సరీ మొదలైనవి. కూరగాయలు, పళ్ళ విభాగాలను, అలంకారపు విభాగం, మొక్క, సౌందర్యాన్ని చెడవకుండా, బయటనుండి మాస్త్రే కనిపించకుండా ఉండేటట్లుగా (కప్పేట్టుగా) చేయాలి. ఈ చెట్లు కూడా అలంకారికంగా ఉండేందుకు సాధ్యమవుతుంది. అలంకారపు రంగు రంగు ఆకులు కాడలను పొదలు (Shrub) మొక్కలను, పువ్వులనిచ్చే తీగలను చిన్న చెళ్ళను ఒత్తుగా, దట్టంగా మృగ్గా, అప్పుడప్పుడు కత్తిరించినా పెరగదగిన కంచె మొక్కలు ఎన్నుకోవాలి. అకాలిఫ (Acalypha) (క్రోటను, పనాక్స్ (Panax) కోర్డిలైన్ (Cordyline) (డ్రైపేనా Dracaena) సైసోనియ (Pisonia) రక రకాల మందార చెట్లు, గోరవి, సాయం సంధ్యా పుష్పాలు, (ఇక్సోర - Ixora) ఇంద్ర పుష్పం (తీన్ బర్గియ - Thunbergia) కనకాంబరం (బాగ్సివియ Crossandra) దోడినియ (Dodonea) (బోగైన్ విల్లాలు - Bougainvillea) ద్యురాంత (Duranta) బుడేలీయ (Buddleia) గోరంటి (Lawsonia) టీకోమ మొదలైనవి ఈ విధంగా మూయడానికి యుక్తమైన మొక్కలు

కూరగాయల తోట చిత్రం 10.2

10.2 పెరటి తోటకు నమూనా (మాదిరి) 1. పొదులు, 2. గట్టు, 3. పళ్ళ చెట్టు, 4. కంపోస్టు గుంత, 5. కాలుదారి, 6. నీటి కాలువ.

కూరగాయ మొక్కలు కొద్ది కాలంలోనే ఫలాన్ని ఇచ్చే మొక్కలైనందున అవి శీఘ్రంగా పెరగడానికి చక్కగా సూర్య రశ్మి ప్రసరించేట్లు, వాటి కూరగాయల తోటను ఏర్పాటు చేయాలి. ఈ స్థలం చెట్లకు దూరంగా వుండాలి. ఏర్పాకాలంలో ఒకటి తర్వాత ఇంకోకటి మొక్కల్ని/పైరును పెంచాల్సి రావడంతో ఈ తోటకు దగ్గరగా నీటి సౌకర్యం (వ్యవస్థ) ఉండేటట్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. సాధ్యమైనంత వరకు, కూరగాయల మొక్కల్ని ఎండ, చలి కాలాల నుండి కాపాడడానికి, కూరగాయల తోట చుట్టూ గాలిని అడ్డుకోడానికి ఒత్తయిన కంచె మొక్కల్ని పెంచి వాటిని అప్పుడప్పుడూ కత్తిరిస్తూ పొద్దులో పెట్టుకోవాలి.

అన్ని కూరగాయలను తోటలోనే పెంచడానికి సాధ్యం కాదు. అది అంత సులభము కాదు. కొన్ని కూరగాయలు పండేరసైన విస్తరించి, వ్యాపిస్తూ పరుగులాంటివి. మరికొన్ని గుమ్మడి మొదలైనవి నేలపైన వ్యాపించి పెరిగిడివి. ఇటువంటి కూరగాయలను తోటలో పెంచితే చోటు చాలక పోవచ్చు.

ఎటువంటి కూరగాయలయినా లేతగా ఉన్నప్పుడు ఉపయోగించడానికి రుచిగానూ, అందంగానూ ఉంటుంది. లేదా ఏ కూరగాయలు వూరైట్టులో ఎక్కువ ఖరీదో వాటికి కూరగాయల తోటలో ప్రాధాన్యతనివ్వాలి. ఆకు కూరలు, బెండ, బీన్లు, బటాని మొదలైనవి ఈ రకపు మొక్కలు. దుంప కాయలు, క్రొత్తని అయినా పంట చేయడానికి తగినవి కావు. ఇటువంటి వాటిని మార్కెటులోనే కొనుక్కోవడం మంచిది. ఇది సులభం. అలాగని వీటిని గృహ తోటలో పెంచనే పెంచకూడదని కాదు. పందిరి చేయడానికి స్థలం వుంటే లేదా పందిరి కూరగాయలంటే ఎక్కువ ఇష్టం ఉంటే, వాటిని పెంచవచ్చు. ముఖ్య ఉద్దేశ్యం తోట యొక్క ప్రతి చదరపు అడుగులో ఎదైనా ఒక్కొక్క మొక్కను పెంచుతుంటారే. ఈ ఉద్దేశ్యం పూరించడానికి ఎలాగ కూరగాయల తోటను రూపొందించుకోవాలో అలాగ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.



కూరగాయల తోటలో ఒక భాగంలో కొత్తిమీరి ఆకు మొక్కలు వచ్చి మిరపకాయ, కర్రపేపాకు, మొదలైన మసాలా మొక్కల్ని చేయాలి. ఇవి కొత్తగా ఉన్నంత వరకు వాటి వాసన ఎక్కువ. ఆకు కూరల కోసమే కొన్ని మడులను మిగల్పాలి. కోళ్ళను పెంచితే, వాటి కోసం, పశువుల కోసం, గుడ్డాల కోసం, మసాలా ఆకుల్ని Lucerne (లూసర్ను) పెంచాలి.

పెరటి తోటలకు, ఇంటి తోటలకు, ఎంత భాగాన్ని కూరగాయల కోసం వినియోగించాలి అనేది ఆ తోట విస్తీర్ణతను అనుసరించి నిర్ణయించాలి. అనుకూల ప్రతికూలాలను ఇంటిలోని జన సంఖ్య (మనుష్యుల సంఖ్య), ఆ యింటి చుట్టుప్రక్కల, పెనుక లభించే చోటు (స్థలం) మొదలైన వాటికి అనుకూలంగా ఉండేటట్లు చూడాలి. ఇంటి ముందు భాగం కూరగాయలకు సరైన స్థలంకాదు (చోటు కాదు). కాని వాటిని పెంచడానికి వేరే స్థలం లేక పోతే, వీటిని ఎలాగైనా పెంచి తీరాలనే ఆశ, అభిలాష వుంటే, పూలకుండీలలోనే కూరగాయలను పెంచుకోవచ్చు. (చిత్రం 10.3) వివిధ రకాల రంగుల బొమాటో, మిరపకాయలు, వంకాయలు మొదలైన వాటిని కుండీలలో పెంచితే అవి కూడా అలంకారంగా కనిపిస్తాయి.

10.3 కుండీలలోనూ కూరగాయలను పెంచుకోవచ్చు.

సామాన్యంగా ఇంటి ముందు అలంకారిక భాగంలో పెరిగిన పువ్వులను కోసి, పూలకుండీలలో పెట్టడం మంచి వద్దతి కాదు. పువ్వులను మొక్కలలోనే ఉంచి చూసి ఆనందించాలి. ఇదే విధముగా పూజకు కావల్సిన పువ్వుల మొక్కల్ని కాయగూరల తోటలో ఒక చోట ఒక విభాగంలో పెంచడం మంచి వద్దతి.

సాధ్యమైనంత వరకు కూరగాయల విభాగం, ఉచిత రీతులలో ఉంచడం యుక్తం. నీళ్ళు పోయడానికి, కొద్దిగ చల్లడానికి అక్కడిక్కడే కొద్దిగా వెడలైన మడుగులు ఉండేటట్లుగా ఈ భాగాన్ని పాదులుగా విభజించుకోవాలి.



పళ్ళ తోట : స్థలం వాలిసంతుంటే ప్రతి తోటలోనూ, పళ్ళ చెట్ల పెంపకాని కోసం, కొద్దిగా స్థలాన్ని కేటాయించడం మంచిది. చెట్టులోనే పండయితే అప్పుడే కోసిన పండు రుచి, వాసన దానికున్న విలువ మార్కెట్టు రేటు కన్నా ఎక్కువే.

కాని దురదృష్టవశాత్తు పండు రుచిగా వాసనగా, సురూపంలో వున్నా పళ్ళ చెట్లు నలభైరంగా ఉండడం లేదు. అవి సామాన్యంగా వంకర టింకరగా, విరిగిన రెమ్మలతో అనేక సమయాలలో బోడిగా పుండడం సంభవిస్తున్నాయి. అందువేత, వీటికి ఇంటిని ముందు అలంకారిక మొక్కల విభాగంలో పెంచడం అనుచితం. పండ్ల చెట్లకు అగోచరమైన ఇంటి వెనుక భాగం సరైన స్థలం.

కూరగాయలలాగా అన్ని పళ్ళ జాతులను పెంచడానికి ప్రయత్నించ కూడదు. త్వరగా పెరిగేడిది, కొత్తగా కోస్తే రుచిగా ఉండేది, చెట్టులోనే మాగితే ఎక్కువ రుచిగా ఉండే పళ్ళ చెట్టునే ఎన్నుకోవడం యుక్తం (ఉదా. సరంగి). ఇంటికి కావలసినవి నిమ్మ, ఆరటి, సరంగి, (కాయ, పళ్ళ కొరకు) అంజూరం, ఉసిరి కాయ, జామ. ఇంటితోటలో పళ్ళ చెట్లు, ఎక్కువ నీడనివ్వవు. పెద్ద వృక్షాలైయ్యే మామిడి, సపోట మొదలైనవి ఇంటి తోటలో పెంచదగిన చెట్లు కావు.

పట్టణాల తోటలలో పళ్ళచెట్లకు స్థలం చాలా తక్కువ. కాని గ్రామాలలో అందులోనూ పొలాలు, మైదానాలలో పెద్దగా కట్టిన ఇళ్లలో ఎక్కువగా వెనుక స్థలం (చోటు) ఉండడంతో, ఈ రకపు మహా వృక్షాలను నాటడానికి అవకాశముంది. పట్టణపు తోటలలో పళ్ళ చెట్ల కోసము చోటు లేకపోతే కాయకూరలు పెంచే తోటలోనే కాన్ని పళ్ళ చెట్లను దూర దూరంగా అంచులలోనే చేయవచ్చు. నీడ, మిగిలిన చెట్లపై పడకుండా ఉండేటట్టుగా, వేరులు కాయకూరలకు ఇబ్బంది కలిగించేట్టుగా ఉండకూడదు.

**పనుల విభాగం**


ఈ విభాగంలో కుండీల పనులు, నర్సరీ పనులు చేయడానికి నీడ లభించేటట్టుగా, అనుకూలమయితే ఒక పెట్టర్ని (పొలంలో ఒక భాగం నీడ) వేసుకోవాలి. నీడ లేకపోతే, తోటమాలి గానీ, మనము అయినా మధ్యాహ్నపు వేళలో ఎండలో పనులను చేయలేము.


**దారి : కాలి దారులు చిత్రం : 10.4**

10.4 కాలిదారికి (Walk) వివిధ రకాల దారులు (Patterns for path) 1 ఇటుక, గుండ్రటి రాళ్ళు, దారులు.

తోటలో కాలిదారి, దారులు ముఖ్యం. తోట నేలను విభజించకుండా వీటి అవకాశాన్ని పరిశీలించాలి. ఆ విధంగా వేసుకొంటే, మొక్కలు, చెట్లు పెరిగిన తర్వాత తోటలో నడవడానికి, వివిధ భాగాలకు వెళ్ళడానికి, పని చేయడానికి, చెట్లను సంరక్షించడానికి, చూడడానికి, చూసుకోవడానికి పని చేయడానికి, కష్టమవుతుంది. పాదులనూ, గడ్డి పరుపులనూ మొక్కలను త్రొక్కివలసి వస్తుంది. కాబట్టి కాలిదారులు ముఖ్యం. (10.4 చిత్రం.)

10.4 2 రాళ్ళు, ఇటుక, పెంకు, గుండ్రటి రాళ్ళు, గడ్డి, మొసాక్ రాళ్ళతో రూపొందించగల దారులు.





10.6

తోట విస్తీర్ణం తక్కువగా వుంటే, కాలిదారి దారులకు వోటును కేటాయించి, ఆ స్థలాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం ఉచితం కాదు. అటువంటి వోట్లలో పొడవైన చిన్న దారి పువ్వుల లాన్ (పరుపులు) పొదల క్రింద చీలికలను దారిగా చేసుకోవడం యుక్తం, ఉచితం. ఈ దారుల చేత తోట విస్తీర్ణం ఎక్కువైనట్లుగా కనిపిస్తుంది.

చిన్న తోటలలో దారులకు బదులుగా, గడ్డి పరుపుల మధ్య చదునైన రాళ్ళను అక్కడక్కడ చక్కగా అమరేటట్లుగా, అందంగా కనిపించేటట్లుగా పాతవచ్చు. ఈ రకపు తోటలలో మూడు, నాలుగు అడుగుల వెడల్పు - ఇద్దరు నడచి వెళ్ళే గరిగిన దారులను చేస్తే చాలు.

తోట యొక్క నేల ఏటవాలు (ఎగుడు దిగుడు) ఎక్కువగా ఉంటే, దారులను పై నుంచి క్రిందకు దించడానికి బదులుగా, అక్కడక్కడ మెట్లను వేసి అయినంత వరకు దారులను మట్టుంలో పెట్టుకోవడం మంచిది. ఈ విధంగా చేస్తే, దారి, మట్టి రెండింటిలోను, రొచ్చు వుండదు. బీటలు వారపు. నేల అరిగి పోదు.

గేటు నుంచి ఇంటిలోకి వెళ్ళే దారి, నేరుగా వుంటే బాగుంటుంది. కాని ఇంటి ముందు గడ్డిని లాన్ లాగా పెంచితే ఈ రకపు దారి, గడ్డి పరుపులను రెండు భాగాలుగా చేస్తుంది. గడ్డి పరుపుల, గడ్డి లానుల వైశాల్యం తక్కువ అవుతుంది. ఇటువంటి సందర్భాలలో మట్టిదారే ఉచితం, నేరుగా దారివేసి తీరాలంటే, వెడల్పుయిన, చదును రాళ్ళలోని ముక్కలను ఆ రాళ్ళు పైకి లేచి కనబడేటట్లుగా నేల సమ మట్టానికి పాలి.

#### అలంకారిక విభాగం (Aesthetic features)

అలంకారపు తోటలలో ముఖ్యంగా రెండు రకాల విన్యాసాలున్నాయి. 1. సహజం లేదా నైసర్గిక నిర్మాణం లేదా విన్యాసం (Informal or natural layout) 2. కృతకం లేదా క్రమబద్ధ నిర్మాణం (Formal layout).



ఏ తోటను ఏ విధంగా నిర్మించాలి. లేదా రూపొందించాలి అనేది తోటమాలి అభిలాషకు ఇంటి నిర్మాణపు శైలికి, తోట వైశాల్యానికి, తోట మెరుగుదలలపై, ఎగుడు దిగుడులు, బండలు, చెట్లు ఇత్యాదులకు అనుగుణంగా రూపొందించబడుతుంది. కొందరికి ప్రతిఒక్కటి క్రమబద్ధంగా వుండాలి. నిర్ణీత రీతిలో ఉండాలి. కట్టుదిట్టంగా ఉండాలి. అటువంటివారు, వారి తోటకూడా ఆ రీతిలోనే ఉండాలని ఆశిస్తారు. మరి కొందరికి కట్టుదిట్టం, క్రమబద్ధత నచ్చదు. వారి తోట కూడా ఆ విధంగా ఉండాలనే ఆశిస్తారు.

ఏటి కట్టడాలు చదరపు ఇళ్లయితే, వాటి ఇంటి తోట కూడా చదరంగానూ (Square) సమరూపంగా (Symmetrical) అనురూపంగా ఉండాలి వస్తుంది. కట్టడం నిర్మాణ శిల్పానికి తోట మొక్క సంవిధానానికి విరోధముండకూడదు. (విభేదముండరాదు) అభాసంగానూ ఉండకూడదు (10.5 చిత్రం)

10.5 ఇంటి చుట్టూ క్రమబద్ధమైన తోట యొక్క విన్యాసం. తోట విస్తీర్ణత ఎక్కువగా ఉంటే, అటువంటి తోటను, నిర్బంధంగా సహజ లేదా నైసర్గిక రీతిలో రాయి రచ్చ, బండ, చెట్లు పుట్ట మొదలైనవి ఉండేటట్లుగా రూపొందించడం ఉచితం కానీ, విస్తీర్ణత తక్కువగా ఉంటే, చిన్న తోటయితే క్రమబద్ధ నిర్మాణమే యుక్తమైంది, ఉచితమైనదీను. కొన్ని వోట్ల ఈ రెండు రకాల విన్యాసాలనూ ఉపయోగించడం సాధ్యం. (చిత్రం 10.6.)

10.6 తోట యొక్క సంవిధాన (విన్యాస) నిర్మాణం.





ఒకే ప్రదేశములో క్రమబద్ధ రీతిలో తోటను రూపొందించవచ్చు. (A) లేదా సహజ రీతిలో నిర్మించవచ్చు.

Aలో 1.దారి, 2.తెల్లటి నురుగు మట్టితో కాలిదారి, 3.ఇల్లు, 4.పెద్ద, 5.గ్యారేజ్, 6.పువ్వులు, 7.లాన్, 8.చెట్లు, 9.కూరగాయల తోట, Bలో 1.కాలిదారి, 2.కాలిదారి, 3.రాళ్ళు నువ్వులు, 4.పాదలు, 5.బల్బులు, పువ్వులచే చెట్లు, 6.ఇల్లు, 7.పచ్చని ఇల్లు (Green House), 8.గ్యారేజ్, 9.నీటి గుంటలు, 10.లాన్, 11.పువ్వులు, 12.చెట్లు, 13.మిశ్రమ పువ్వుల అంచులు, 14.పువ్వుల పాదలు, 15.కూరగాయల, వళ్ళు తోట.

సహజ విన్యాసం పెద్ద తోటలకు, గ్రామాల తోటలకు సరైనది. నిర్బంధ విన్యాసం అంటే ఆ తోటకు రూపంలేని నిరూప విన్యాసమని అర్థంకాదు. సామాన్యంగా ఈ క్రమంలో వక్రం వక్రకారంగా, డౌంకు వక్ర రేఖలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడును. అక్కడక్కడా నేరు రేఖలున్నమా వరపాలేదు. అయినంత వరకూ నైసర్గికంగా (Natural)గా ఉండేట్టుగా ఈ రకపు తోటలను రూపొందించాలి. (చిత్రం 10.7).


10.7 చెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నచోట తోట యొక్క సంవిధానం నైసర్గికంగా సహజంగా వుంటుంది. 1. గేటు, 2. గ్యారేజ్, 3. మున్నటి తెల్ల మట్టి యొక్క అంకణ స్థలం (కారులకు), 4. మెట్లపైన గులాబీ కమానులు (Arches), 5. కాలిదారి, 6. పాదల చిన్న చెట్లు, 7. పువ్వుల లాన్ (వరుపు), 8. పాదరులు, 9. సిమెంట్ బెంచి (ఆసనం), 10. సహజంగా పెరిగిన చెట్లు, 11. పశువుల పేడ చెత్తా చెదారం ఇల్లాదులను వేసే దిబ్బ, 12. తెల్లటి మట్టి నేల గట్టు, 13. ఇల్లు, 14. తోట యొక్క కొట్టడి, 15.వరండా, 16. రాళ్ళుపెద్ద, 17. పైకి వెళ్ళే దానికి మేడ మెట్లు (Terrace path way) దారి, 18. లాన్ (గడ్డి వరుపులు) సహజ రాళ్ళ అంచు (Rock Bank) (లేదా) 19.కూరగాయల తోట, 20.మట్టపు వంకర, 21.రాతి గూడు, 22.సహజ అంచు, 23.అత్తు పెరిగిన పువ్వుల కొమ్మ, 24. వన్య తోట (Wild garden), 25. ఆకు చెత్తలకు ప్రత్యేక స్థలం కేటాయించడం.

ఈ రకపు తోట యొక్క సౌందర్యం వెంటనే స్పష్టం కాదు. కొద్ది కాలమైన తర్వాత దీని అందచందాలు గోచరమవుతుంది. కాని క్రమబద్ధమైన తోట ఆ విధంగా కాకుండా రంగుబట్టలవలె వెంటనే కంటికి కనిపిస్తుంది. దాని సౌందర్యం దాని కురూపం రెండూ వెంటనే తెలిసిపోతాయి (స్పష్టమవుతాయి).

క్రమ బద్ధ నిర్మాణం సమ మట్టమైన నేలలకు, చిన్న భూములకు, పట్టణపు తోటలకు సరైనది (చిత్రం 10.8) ఈ విన్యాసంలో నేరు రేఖలు, మూలలు, లేచి, పైకి స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.

10.8 క్రమబద్ధ (Formal) సంవిధానపు తోట. ఆగ్రాలో ఇత్మద్ ఉద్దౌల స్మారకపు తోట (మొగలాయి సంవిధానం) 1. ప్రదేశం, 2. నీటి కాలువ, 3. కాలు దారి, 4. డాట్ మొక్కలు, 5. పువ్వు శయ్య (పువ్వుల వరుపు), 6. స్మారకం, 7. వచ్చేదారి (బారు దారి).

ఏ నిర్మాణం లేదా విన్యాసం మేలు ? ఏది మంచిది కాదు ? లేదా ఏది చెడ్డది ? అనే వివాదం (ప్రశ్నలు) అర్థరహితం. తోటను ఏర్పరచుకోవడం తోటమాలి యొక్క స్వ సంకోషం కోసమేగాని ఇతరుల సంకోషార్థం కాదు. తోట, తోటమాలి ఇంటి వెలుపలి విస్తరణ అతని జీవన విధానానికి నమూనా, ప్రతిబింబం, అతని వ్యక్తిత్వానికి మార్గదర్శి. అందుచేత తోట విన్యాసం తోటమాలి యొక్క వ్యక్తిత్వానికి సరిపడేదిగా ఉండాలి, అంతే.



10.9

## అలంకారపు తోటల అంగాలు (Parts of a garden) పిత్రం 10.9

10.9 చిన్న స్థలంలో (కొద్దిగానున్న చోటు) మంచి భూ దృశ్యాన్ని (Landscape) నిర్మించడం, ఇందులో తోట విభాగాలు అనేకాలున్నాయి. అవి 1. గడ్డి పరుపు, 2. బల్బుల తోట, 3. చెట్లు, 4. హాలు, 5. పార్కు, 6. నివసించే గది (Living room), 7. చంటిల్లు, 8. భోజనాల గది, 9. గ్యారేజ్, 10. పువ్వులు పుష్పించే పాదరాలు (పాదరిళ్ళు), 11. అలంకారపు కంచె, 12. ఎత్తయిన చెట్లు, 13. బట్టలు ఎండ వేయడానికి చోటు (స్థలం), 14. అటల మైదానం (అటల స్థలం), 15. ద్రాక్ష, 16. తీగ గులాబి, 17. సాంవత్సరిక పుష్పాలు (వార్షిక పుష్పాలు), 18. సిమెంటు బెంచి (ఆననం), 19. గులాబీలు, 20. కంపోస్టుకు స్థలం, 21. కూరగాయలతోట, 22. పళ్ళ చెట్లు.

తోటకు అనేక అంగాలున్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనవి ఈ క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి. అవి.

1. అలంకారపు పుష్పాల మొక్కలు (Flowering trees), 2. గడ్డి పరుపు (Lawn), 3. పాదల గుంట (Shrubbery) పాదలు (Shrubs), 4. పుష్పశయం లేదా పుష్పాల పాదలు (పుష్ప పరుపులు) (Flower beds), 5. పువ్వులతో జమ భాగం లేదా పువ్వుల పరుపు (Carpet beds), 6. పువ్వుల అంచు లేదా పువ్వుల కొంగు (Flower borders) 7. అలంకారపు అంచులు (Hedges), 8. రాళ్ళు ఒడ్డు, రాళ్ళ తొట్టె (Rokery), 9. సంరక్షణ (Conservatory), 10. కుండీలలో వేసే (పెంచే) మొక్కలు (Pot Plants), 11. తోట ఆభరణాలు (Garden adornments). ఎ. శిల్పం, విగ్రహాలు (Statuettes) బి. నీటి ఊట, కొలను ఫౌంటేన్ (Fountains), సి. మొక్కలను బుట్టాకారంలో (నవ్వు బుట్టలు) వేయడం (Plant baskets), డి. వ్రేలాడే బుట్టలు (Hanging baskets), ఇ. పందెర (Pandal) కమానులు (Arches), ట్రెలిస్సు (Trellis) లతా గృహాలు - పర్గోలా (Pergola) తీగ గూడు - ఆర్బర్ (Arbour) మొదలైనవి. 12. నీటి కొలను (Water Pond).

ఈ అంగాలన్నీ ఒక తోటలో ఉండాలని నిర్బంధం లేదు. ఆ విధంగా ఉండాలంటే తోట చాలా విశాలమైనదిగా ఉండాలి. తోటలోని స్థలాన్ని అనుసరించి దానికి తగినంతగా సాధ్యమైనన్ని అంగాలను కల్పించుకోవడం (ఏర్పాటు చేసుకోవడం) మంచిది.

అన్ని అంగాల్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి వీలులేకపోయినా, ప్రతి యొక తోటలోనూ, కనీసం కొన్ని అంగాలైనా ఉండాలి. ఇది ఏవంటే గడ్డి పరుపు (Lawn), పాడు, తీగ, కుండీ, పువ్వుల అంచు.

పైన పేర్కొన్న 12 అంగాల విషయమై కొన్ని అంశాలను తెలుసుకొంటే తోట విన్యాసాన్ని, నిర్మాణాన్ని చక్కగా ఏర్పరచుకోవడానికి వీలువుతుంది.

అలంకారపు లేదా పువ్వుల మొక్కలు : తోట ఏర్పరచే ముందు ఉన్న చెట్లను అయినంతవరకు అలాగే ఉంచేయడం మంచిది. కారణమేమిటంటే, చెట్లు చాలా సంవత్సరాల నాటి మొక్క. దాన్ని పెంచడానికి చాలా కాలం సమయం ఉంది. అంతేకాకుండా పెంచడం కష్టం గానీ, కత్తరించి వేయడం సులభమే కాకుండా, కొద్ది కాలంలోనే కత్తరించి వేసేయొచ్చు. అందుచేత ఉండే మొక్కలను, చెట్లను సాధ్యమైనంత వరకూ అలాగే ఉండేటట్లుగా చూసుకోవాలి. పాత చెట్లను వదిలేసి, తోటలో మిగిలిన అంగాలను ఏర్పరచుకోవడం తెలివైన పని, యుక్తమైనది కూడా. ఈ

విధంగా సాధ్యం కానప్పుడు మాత్రమే పెరిగి పెద్దదైన చెట్లను కొట్టవేయడం మంచిది. ఎన్నోసార్లు చెట్లు కొమ్మలను కత్తరించి, వాటిని ఒక వ్యవస్థిత రూపానికి తేవడంలో ప్రాచీన చెట్ల నుంచి ఇతర మొక్కలకు కలిగి హానికరాలను, క్షయకారాలను - నీడ, వేరుల వ్యాప్తి, విస్తరణలను, కొంతవరకు నివారించుకోవచ్చు.

తోటను చేసి చోట చెట్ల లేకపోతే, చెట్లను ఒక తోటాంగమని భావించి, వాటిని పెంచాలి. తోట యొక్క సంవిధానంలో చెట్లకు ఒక స్థానముంది. నీటికోసం, అలంకారం కోసం; గాలిని అడ్డుకోడానికి పెంచుతారు. ఇంటి మూలల్లో చెట్లను పెంచితే అవి పదానికి ప్రేమ వేసినట్లుగా ఇంటికి కట్టవేసినట్లుగా ఉంటుంది. ఇంటి రూపం, అందం హెచ్చుతుంది.











కొత్తగా పెంచే చెట్లయితే, అప్పుడప్పుడూ కత్తరిస్తూ హద్దుల్ పెట్టుకొని వాటికి రూపానిచ్చి, పెంచాలి. ఈ విధంగా పెంచే చెట్లు తోట విన్యాసానికి తోట పనులకు కార్యాలకు, తోట పెంచడానికి అనుకూలంగా ఉండాలి. చిన్న తోటలో పెద్ద చెట్లకు చోటు లేదు. వాటి నీడ వేరులు ఇతర మొక్కలకు నష్టాన్ని తెస్తాయి. ఎక్కువగా పువ్వులు, కాయలు, ఆకులను రాబ్బే చెట్లను చేస్తే వాటిని ఊడ్చి, శుభ్రం చేయడమే ఒక పెద్ద పనవుతుంది. అంతేకాకుండా వండ్ల కోసం కోరి, పక్షులను ఆకర్షించే చెట్లవలన ఉపయోగం కన్నా ఇబ్బందులే ఎక్కువ.

తోట యొక్క అలంకారపు విభాగంలో పువ్వులనిచ్చే లేదా సుమారుగా నిత్య పారితిమై పై భాగం చక్కటి రూపమున్న చిన్న లేదా మధ్యమ గాత్రపు (మందమున్న) చెట్లనే నాటడం మంచిది. చిన్న తోటలలో చెట్లకు ఉచితమైన చోటు కాంపౌండు ప్రక్కన.

గడ్డ పరుపులు (Lawns) : ప్రతి యొక అలంకారపు తోటలోనూ ఒక లాన్ ఉండే ఉండాలి. చక్కటి అందమైన పీఠోహనసాలతో అలంకారమైన కోణాలు లేకుండా రత్న కంబలి ఏ విధంగా కోటిల్లదో అదేవిధంగా తోటలో రకరకాల అలంకార మొక్కలతో నిండుగా లాన్ లేకపోతే కోటిల్లదు. అది లేకపోతే ఏదో లోపించినట్లుగా కనిపిస్తుంది. ఎంతో అందమైన స్వచ్ఛమైన నేలకు ఒక చక్కటి చిత్రం ఏ విధంగా సౌందర్యం రెట్టించు చేస్తుందో అదే విధంగా ఇంటి యొక్క, తోట యొక్క అందాలు లాన్ ఉండడంతో మరింత ఎక్కువై కళ కళలాడుతుంటాయి. లాన్ పెంచితే ఇంట్లోనివారు దాన్ని (డ్రాయింగ్ గది (Drawing room) లాగా ఇన్స్టాగ్నీకి, ఏకాంతానికి, ఆటపాటలకు, మనోల్లాసానికి, శ్రమను తగ్గించుకోడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు.

ఇంటి వరండా లేదా ప్రాంగణంలో కూర్చున్నప్పుడు, కంటి ముందు విశాలమైన వచ్చటి బయలును చూసినప్పుడు మనస్సుకు కలిగి ఆనందం, ఉల్లాసం, ప్రశాంతత ఎవరికీ వారు అనుభవించి తెలుసుకోవాలి తప్ప వాటిని మాటలలో వివరించడము సాధ్యం కాదు. ఇంటి నిర్మాణపు వద్దల్లో, నేలలోని గడ్డికన్నా మేలైన మరొక పస్రాలుండవు (బట్టలుండవు). వచ్చటి నీడ నీరెండగా పడినప్పుడు గడ్డిపై పడిన తుంపర, ముత్యాలలాగా మెరుస్తూండగా, గడ్డిపైన నడిచేటప్పుడు మెత్తగా కాలు క్రింద ఆనినప్పుడు, దేహానికి (శరీరానికి) కలిగి హితం, మనస్సుకు లభించే తృప్తి మరే నేల మొక్కలు అనందాన్ని, తృప్తిని కలిగించలేవు. అందవేత తోటను గురించి అలోచించేటప్పుడు, తోటకు కిరీటము వంటిదైన లాన్ కి యుక్తమైన స్థానాన్ని ఇచ్చి తీరాలి. ఈ లాన్ వెడల్పుయిన కొద్దీ ఎంత విభిన్నంగా ఉంటుందో అంత మనసుకు ఆనందం, కంటికి ఇంపు కలిగిస్తుంది.

10101



## పాదలు - పాదల గుంపు

అలంకారపు విభాగంలో పాదల ద్వారా రకరకాల ఉపయోగాలున్నాయి. ఏదైనా భాగాన్ని దాచాలంటే స్ప్రీన్ లేదా తెరలాగా కొన్ని భాగాలను పైకి కనిపించడానికి లేదా ఆకుల కోసం, పువ్వుల కోసం పాదలను పెంచుతారు. ఇంట్లో అడుగు పెట్టగానే, లాన్ బయటి ఆవరణలో, కాయగూరల తోట, నర్సరీ మొదలైనవి చుట్టూ మూలలో కాంపౌండు ప్రక్కలలో కనబడాలి. అలోచించి నాటితే పాదల ద్వారా సంవత్సరపు అన్ని కాలాలలోనూ ఏమయినా కొన్ని పువ్వులతో నిండుంటాయి. తోటలో పాదలు శ్రమను తగ్గించే ముఖ్య సాధనాలు. ఒకసారి నాటిన తర్వాత వాటిని పెంచడానికి ఎక్కువ కృషిగాని సర్వ కాలం చూసుకోవలసిన బాధ్యత గాని ఉండదు.

పాదల మొక్కలను వేరుగానో, గుంపుగానో పెంచవచ్చు, విశాలమైన లాన్లలో అక్కడక్కడ కొన్ని పాదల మొక్కలను పెంచితే గడ్డివరుపుల ద్వారా ఏర్పడే, చిత చితలను ఒక సమమట్టానికి తీసుకొని రావచ్చు. కొంతలో కొంత నీటి ఆవసరం నివారించవచ్చు.

పాదలను పెంచడానికి యుక్తమైన చోటు - ఇంటి పునాదుల దగ్గర (Foundation Planting). చిత్రం 10.10 (i - vi) పునాదిని అందులోనూ ఎక్కువ ఎత్తుకు పునాదులు వేసిన ఇళ్ళ రాళ్ళు మొదలైన వాటిని మూయడానికి పాదలు చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి.

10.10 i - vi, 10.10 iవ భాగం - చిత్రాలు.

10.10 iవ భాగం - పునాదుల చుట్టూ మొక్కలు ఈ పై చిత్రపు వరుసలలో 6 భాగాలున్నాయి. అన్ని భాగాలలోనూ కొన్ని సంఖ్యలు (గుంపు సంఖ్య) చూపబడినవి. 1వ సంఖ్య ఉంటే ఇక్కడ పైకి ప్రాకే మొక్కల్ని (Vines) వేయవచ్చు అని అర్థం. 1-a. ఉంటే కంచెలకు, జాలరి (ట్రేలిస్)లను పైకి ఎగబ్రాకేట్లు వేయవచ్చు. తిరిగిడి తీగలు Twiners 1-b- గోడలకు అంటుకొని పెరిగిడి పైకి ప్రాకే మొక్కలు (Climbing vines) 2 నేలను కప్పిడి (మూసిడి) మొక్కలు (Ground Covers)- అలిసం - డయాంథస్ - పెడలా (ఐవి Ivy.) లొనిసిర, ప్లాక్కు - వింక ఇత్యాదులు. 3 =  $\frac{1}{2}$  - 1 మీ. (పాడవుగా) పెరిగిడి పొట్టి పాదలు. జూనిఫరస్ (Juniperus) 4 =  $1\frac{1}{4}$  -  $1\frac{1}{2}$  మీ. ఎత్తుకు (పాడవుగా) పెరిగిడి పాదల మొక్కలు. బుడ్లయి మొదలైనవి 5 = 2 -  $2\frac{1}{2}$  మీ. ఎత్తుకు పెరిగిడి పాదల మొక్కలు - మందార, రేకు మందారం, ముద్ద మందారం (ల్యాగర్స్ట్రోమియ) ఇత్యాదులు. 6 =  $2\frac{1}{2}$  - 5 మీ. ఎత్తుకు (పాడవుగా) పెరిగిడి పాదల మొక్కలు 7. చిన్న చెట్లు, క్యాషియో టిబీబుయి మొదలైనవి (వీటిని తర్వాత 1, 2, 3,.....గుంపుల మొక్కలు అని వ్యవహరిస్తారు).

10.10 i భాగం ఇంటి ముందున్న ముఖ ద్వారం వైపు (Entrance) a. వాకిలి నుంచి సమ దూరంలో కిటికీలున్నప్పుడు 3వ గుంపు మొక్కలను పునాది నుంచి 2 అడుగుల దూరంలో ద్వార పీఠం నుంచి 3 అడుగుల దూరం యిరువైపులా వేయాలి.

b. వాకిలి దగ్గర ఒక కిటికీ, ఇంకొకటి ఇంకొంచెం దూరంగా ఉన్నప్పుడు కిటికీ - వాకిలి మధ్య గోడలపైన 1a లేదా 1b గుంపు ప్రాకే మొక్కల్ని (తీగలను) వేయాలి.

c. ఇక్కడ ముఖద్వారం వెడల్పుగా ఉంటే, ఆ ద్వార పీఠం వెడల్పుగా ఉండడం చేత దాని ప్రక్కలలో ఎక్కువ మొక్కలను వేయాలి. కిటికీలు దూరదూరంగా ఉండడం చేత, 2, 3, 4వ గుంపుల మొక్కలను వేయాలి. (చిత్రంలో చూపినట్లుగానే).

d. ఇక్కడ ముఖద్వారం ఇంటి మూలలో ఉంటే చిత్రంలో చూపినట్లుగా 2, 3, 5 లేదా 6వ గుంపుల మొక్కల్ని వేయాలి.

e. 4 లాగి (వలె), కాని మూలదారికి లేదా కారు వెళ్ళే దారికి చాలా దగ్గరగా ఉండడంతో 5 లేదా 6వ గుంపులు బదులుగా 2వ గుంపు మొక్కలను ఎన్నుకోవాలి.

f. ఇక్కడ ద్వారం ముందర వున్నాదికీ దూరంగా, ద్వార పీఠపు ప్రక్కన గుంపు పాదలను, ద్వారపు కుడివైపు తీగలను పెంచవచ్చు.

చిత్రం 10.10 II భాగం చిత్రం. డాబా (Terraces) చుట్టూ ఇంటి ముఖద్వారానికి కొద్దిగా ఎత్తుకు టెర్రస్ కడతారు. (గార, సెమెంటు, రాళ్ళు కలిపి) అప్పుడు వున్నాది చుట్టూ మొక్కలను పెంచడానికి వీలుగాదు. టెర్రస్ చుట్టూ పెంచాలి. ఇక్కడ 3వ డిజైన్లు (Design - చిత్రాలు) చూపబడ్డాయి.

g. ఇక్కడ వాకిలి (తలుపు) దగ్గర టెర్రస్ లోనే మొక్కల్ని నాటడానికోసం, రెండు గుంటల్ని వదిలితే, ఇందులో 3వ గుంపు మొక్కలను నాటవచ్చు. టెర్రస్ కుడి వైపు, వోటు వుండడంతో తీగ, పాదలను వేసి మూలను మూయాలి. ఎడమ వైపు ఒక పాదమొక్క చాలు.

h. ఇక్కడ టెర్రస్ నేరుగాలేదు. డౌంకగా, వంకరగా ఉంది. వాకిలికి కొద్దిగా దూరంగా, ఎదురుగా, ఏడకోసం, వెళ్ళున వేయడానికి (7వ గుంపు) టెర్రస్ లో 1 మీ. వ్యాసపు గుంటను (లోతు) కట్టేటప్పుడే వదలాలి.

i. ఇక్కడ టెర్రస్ ఇంఫీల్డ్ ఒక మూలగా ఉంది. ఇటువంటప్పుడు పొడవైన సుమారుగా 60 సెం.మీ. వెడల్పు గుంటని వదలాలి. మూలలో పెద్ద గుంట (లోతు) వదిల్చే, పెద్ద పాదలు వేయవచ్చు, పొడవు గుంటలో వున్నవి మొక్కల్ని పెంచవచ్చు.

10.10 (III) భాగం పెద్ద తల వాకిలి మసారా Porch - కట్టడపు ద్వారమండపం, మొగసాల చుట్టూ.

j. ఇక్కడ మసారా మధ్యలో ద్వారముంది. ద్వారము ప్రక్కన  $\frac{1}{2}$  - 1 మీ. ఎత్తుగల పాదలను (3వ గుంపు) ఏటి ప్రక్కన నేలను మూసెడి మొక్కల్ని (2వ గుంపు) మసారపు మూలలో, వున్న 3వ గుంపు మొక్కలను, ఇంటి మూలలో 5వ గుంపు పాదల మొక్కలను వేయవచ్చు.

k. ఇక్కడ మసారాలో ఒకవైపు ద్వారం ఉంది. మసారపు కుడివైపున ఏడ/మరుగు కోసం 1వ గుంపు మొక్క తీగలను మసారంపైకి పెంచవచ్చు.

l. ఇక్కడ ద్వారపు మెట్లు ఒకవైపుకు ఉన్నాయి. మసారం ముందున్న నేలను మూసే మొక్కల తీగను వేయాలి. అలాగే ఇంటి మూల వైపు మరొక తీగను ప్రాకించవచ్చు.





గ. ఇక్కడ మసారా ఇంటికి ఒకవైపుంది. ఇంటి ముందరవైపు మూలలో తీగను ప్రాకించి మసారం చుట్టూ పొదలు, నేలను మూసెడి మొక్కలను వేయాలి. ఇంటి మరొక మూలలో ఎత్తయిన పొదలు (5వ గుంపు నుంచి) వేయాలి.

10.10 iv ఈ భాగంలో ఇంటి మూలలో పునాది చుట్టూ ఎటువంటి మొక్కల్ని వేస్తే సరయినది అనే విషయాన్ని చూపబడింది. మూలలో ఈ విధంగా కొన్నింటిని పెంచితే ఇంటి అందం రెట్టించుతుంది.

గ. చిత్రంలో కిటికీలు మూలల నుండి సమాంతరంగా వున్నాయి. కిటికీ మూతబడకుండా మొక్కల్ని నాటాలి. కిటికీ క్రింద నేలమూసే మొక్కల్ని వేస్తే, కిటికీలు మూసుకోవు.

o. చిత్రంలో ఒక కిటికీ దూరానికి ఉంది. 5వ గుంపుకు చెందిన పెద్ద పొద గోడ్లవైపుగా వుండాలి.

p. చిత్రంలో అదేవిధంగా ఇక్కడ పొద దూరపు కిటికీ వైపున గోడ్లవైపుకుండాలి.

q. చిత్రంలో కిటికీలు చాలా పెద్దవి. మూలకు దగ్గరగానే ఉన్నాయి. అందువేత మూలలో 3వ గుంపుకు చెందిన చిన్న పొదలకు చూత్రమే చోటుంది.

r. చిత్రంలో p లాగే జతకు 7వ గుంపుకు చెందిన చెట్లను వేస్తే, ఇది కిటికీలకు నీడనిస్తుంది.

10.10 v భాగం. ఈ భాగంలో మూల రోవలగా వుంది. ఈ విధంగా మొక్కల్ని వేయాలనేది చూపబడింది. మూల ఎంత రోవలకుంది ? కిటికీలు ఎక్కడున్నాయి? అనే వాటిని గమనించి మొక్కల్ని నాటాలి.

s. చిత్రంలో కిటికీ మూలకు దగ్గరగా ఉండడం వేత చిన్న పొదలను నేలను మూసే మొక్కలు మాత్రం (2వ, 3వ గుంపు) మొక్కలు వేయాలి.

t. చిత్రంలో కిటికీలు దూరంగా ఉండటంతో మూలకు ఎదురుగా పెద్ద పొదలను (4వ గుంపు), చుట్టు ప్రక్కలలో 3వ గుంపుకు చెందిన పొదలను నాటవచ్చు.

10.10 vi భాగం ఇంటి చుట్టూ పునాదుల దగ్గర ఏ మొక్కల్ని పెంచాలనేది v, u చిత్రాలలో చూపబడింది. u ఒక మేడ ఉండే ఇల్లు. v మీద, ఒక డాబా ఇల్లు ఉంది. కానీ, నిర్దిష్టమైన ఆకారం లేనిది, గ్యారేజ్ కూడా వుంది.

ఈ పనుల కోసం సాధ్యమైనంత వరకు నిత్యహరిత పొదలనే ఎన్నుకోవడం ఉచితం, మధ్య, మధ్య రంగు రంగు ఆకులు లేదా పువ్వులున్న పొదలు గుంపులో చేర్చవచ్చు. ఈ విధంగా పునాదుల చుట్టూ వీటిని పెంచితే, ఇవి నిర్మాణాన్ని, తోటని ఒకటిగా చేర్చే పూసల సరంలాగుంటుంది.

జపాన్, మొదలైన జాతీయత పాతలను అలంకారపు కంచెలుగా పెంచుతుంటారు. సామాన్యంగా ఈ కంచెలలో ఒకే రకపు మొక్కల్ని వేయడం సరిపాటి. కానీ జపాన్ లో రంగు-రంగు పొదలను మొక్కలను చేర్చి, అప్పుడప్పుడూ కత్తరిస్తూ హద్దులో పెట్టుకొంటారు. ఇటువంటి వాటిని కింకాపు లేదా బ్రోకెడ్ అంచు (Bricade hedge) అంటారు.

పెద్ద వర్ష రంజిత పొదలను వెడల్పుయిన గడ్డి పరుపు వెనుక (లాన్ వెనుక) దానికి వెనుకటి ఆధారంగా పెంచుతుంటారు. అప్పుడు లాన్ పైకి కనబడుతుంది. విశాలంగా కనిపిస్తుంది.

పునాదుల చుట్టూ మొక్కలు (Foundation Planting). ఈ మొక్కలను నాటేటప్పుడు కొన్ని అంశాలను గుర్తు పెట్టుకోవాలి. పునాది ఎత్తుగా ఉంటే ఈ మొక్కలు పునాది రాళ్ళను మూసి, నిర్మాణానికి ఒక రూపాన్ని ఇవ్వాలి. కాని పునాది ఎత్తుగా లేనిచో, ఈ పాదాలు కిటికీ ఎత్తులకు పెరిగి, వెలుతురు, గాలి రావడానికి అడ్డు తగులుతాయి. అందుకోసం కిటికీ దగ్గర తక్కువ ఎత్తుకు పెరిగే పాదాలను వేయాలి. లేదా దానికి బదులుగా పువ్వుల మొక్కల్ని పెంచవచ్చు. వసారు (Porch కట్టడద్వారం - లేదా మొగసాల) చుట్టూ గుబురు మొక్కల్ని వేయడం ఉచితం లేదా అక్కడ వలచగా పెరిగే తీగలను ప్రాకించవచ్చు. దీనివలన కొద్దిగా మరుగు లభిస్తుంది. ఇంటి ముఖద్వారపు ప్రక్కన మెట్ల ప్రక్కలలో గుబురు పాదాలను వేయాలి. ఇంటి మూలలు ఎత్తుకు, పైకి పాడవుగా పెరిగే పాదాలను వేయాలి. చిత్రం 10.10.

కిటికీలున్న వైపు, పునాదుల చుట్టూ మధ్యమ ఎత్తుకు పెరిగే పాదాలను పెంచడం మంచిది. ఒకే రకపు పాదలు ఏనుగు తెప్పస్తాయి. అందుచేత పునాదుల చుట్టూ కొద్దిగా వైవిధ్యం ఉండేటట్లుగా మొక్కల్ని పెంచడం మంచిది.

## పువ్వులు

పువ్వుల మొక్కలు లేని అలంకారపు తోటలు తోటలే కావు. సంవత్సరం పాడవునా ఒకటి కాకపోతే మరొక రకపు పువ్వులను పెంచడమే ఈ రకపు పెంపకంలో ప్రధానాంశం.

పువ్వులను అనేక చోట్ల పూజకోసం, పువ్వులకోసం - కుండీలలో, పాదులలో, లాను అంచులలో, కాయగూరల తోటలలో, ప్రైవేట్ కుండీలలో, టబ్బులలో, నీటి తొట్టెలలో, పందెరపైన, స్టంబాలపైన, చెట్లపైన, గోడలపైన, చావడీలపైన, వసారాలలో అనేక స్థలాల్లో పెంచవచ్చు.

పువ్వుల మొక్కలలో ముఖ్యంగా వార్షికాలు (Annuals), దై వార్షికాలు బహువార్షికాలు (Perennials) ఉన్నాయి. వార్షిక పువ్వుల మొక్కల చిత్రాలు చట్టిన కొన్ని నెలలలోనే మనోహరమైన పువ్వులను పుష్పించ వేస్తాయి. అందుచేత కొత్తగా తోటను ఏర్పరచుకొనే వారికి, ఈ రకపు పువ్వుల మొక్కలు ఎక్కువ ఉపయోగకరము, సులభం కాని ఈ రకపు మొక్కల పెంపు సౌభాగ్యం, వైభవం కేవలం కొన్ని రోజులు మాత్రమే. లేదా కొన్ని వారాలు మాత్రమే. పువ్వులు పుష్పించిన తర్వాత, ఈ మొక్కలు వికారంగా ఉంటాయి. తోటకు అవలక్షణంగా ఉంటాయి.

కాని బహువార్షిక మొక్కలు చాలా సంవత్సరాలు జీవించడమే కాకుండా, సంవత్సరంలో అనేక నెలలు పువ్వులనిస్తాయి. తోటలో సదా సర్వకాలంలోను ఒకటి కాకపోతే మరొక రకపు పువ్వులుంటూనే ఉంటాయి. అంతే కాకుండా వార్షికాలలోలాగా ముగిసిన తర్వాత వాడి, ఎండి, తోట సౌందర్యానికి కళంకం తీసుక రాదు. అందుచేత అనుభవమున్న తోటమాలి వార్షిక పువ్వు మొక్కల కోసం తన తోటలో చోటును, వాటికివ్వ ఇష్టపడక పోవడమే కాకుండా ఎటువంటి ఆసక్తి చూపడు.

అలాగని తోటలలో వార్షిక పువ్వులకు అసలు స్థానం లేదని అర్థం కాదు. పువ్వుల కోసం పాదలు పువ్వులన్నవి కాలంలో పువ్వులను పొందడానికి వార్షిక పువ్వుల మొక్కలను కుండీలలో పెంచుతుంటారు.

కాని, సుమంగళి నుదుట కుంకుమ ఉన్నట్లుగానే, తోటలో నిరంతరం కోర్కెగానికే బహువార్షిక పువ్వుల మొక్కల్ని పెంచే తీరాలి. చిన్న తోటలలో తప్పనిసరిగా ఈ రకపు పువ్వుల మొక్కల్ని పెంచే తీరుతారు. చిన్న తోటలు వీటికి ప్రసిద్ధి నొందినవి. పెద్ద తోటలలో ఏదో ఒక చోటును వార్షిక పువ్వుల కోసమే కేటాయించవచ్చు.

రెండు రకాల పువ్వుల మొక్కలను పెంచుకోవచ్చు. వర్షాకాలంలోనూ పువ్వులుండేటట్లుగా ఆలోచించాలి. కానీ ఈ రకపు క్రమం చిన్న తోటలలో సాధ్యం కాదు. అందుచేత, చిన్న తోటను ఏర్పరచుకొనేవారు తోట ఏ కాలంలోనూ పువ్వులు ఉండేటట్లుగా బహువార్షిక పువ్వుల మొక్కలనే నాటాలి.

అంతేకాకుండా వార్షిక పువ్వులు త్వరగా పుష్పించి త్వరగా పెరిగి, త్వరగా వికసించి, తమ జీవనావధిని త్వరగా ముగించుకొంటాయి. అందుచేత వీటికి సూర్యరశ్మి కావాలి. వార్షిక పువ్వులు సూర్యరశ్మి ప్రేమరులు (Sun lovers). చిన్న తోటలు కట్టడాలకు సమీపంలో ఉండడం చేత రోజులో ఎక్కువకాలం సూర్య కాంతి మొక్కలపై పడటం తక్కువ. బహువార్షిక పువ్వుల మొక్కలకు వెలుతురు అంతగా అవసరం లేదు.

**పువ్వుల పాదులు (Flower Beds) పుష్ప శయ్య**

వీటికి తోట సంవిధానంలో స్థలాన్ని కేటాయించేటప్పుడు కొన్ని విషయాలను గమనించాలి. సామాన్యంగా అనేక పువ్వుల మొక్కలకు అందులోనూ వార్షిక పువ్వులకు సూర్యుని వెలుతురు (సూర్యరశ్మి) అత్యవసరం. నీడలో పువ్వులను పుష్పించే మొక్కలు చాలా తక్కువ. అందుచేత పువ్వుల పరుపులను సూర్యరశ్మి వడేవైపుకు త్రిప్పాలి. చెట్లు, గోడ, పాదల గుంపు లేదా తీగల నీడలు ఎక్కువగా ఉంటే ఆవైపు పువ్వుల మొక్కలు తలెత్తలేవు.

అనేక వార్షిక బహువార్షిక, పువ్వుల మొక్కలు సమశీతోష్ణ స్థితిని (Temperate) కోరే మొలకలు. గాలి విపరీతంగా ఉండే చోట - ఎక్కువ వర్షాలు - ఎక్కువ ఎండ ఉండే స్థలాలలో ఈ రకపు పువ్వులు బాగా పెరగలేవు. అదృష్టవశాత్తు మైసూరులో మలేనాడు వదిలేస్తే, అనేక చోట్ల - అందులోనూ పాత మైసూరు బయల సీమలో అనేక రకాల వార్షిక బహువార్షిక పువ్వుల మొక్కలు బాగానే పెరుగుతున్నాయి. అందుచేత వీటిని తోట సంవిధాన పరిధిలో చేర్చుకోవచ్చు.

**పువ్వుల పరుపులు, పాదులు, అంచులు (Borders)**


ఇవి దగ్గర దగ్గరగా ఉంటే వీటిని మానుకోవడం సులభం అవుతుంది. అవి భవనానికి దగ్గరగా వుంటే, ఇంకా సౌలభ్యమవుతుంది. అందుచేత, తోట సంవిధానంలో వీటిని భవనానికి దగ్గరగానే గుంపులు గుంపులుగా ఉండేటట్లుగా ఏర్పాటు చేయాలి.

అనేక పువ్వుల మొక్కలకు ప్రాధ్వన్నే (ఉదయం) సూర్యరశ్మి చాలా అవసరం, కొన్ని మధ్యాహ్నపు ఎండ ఉంటే పెరగలేవు. ఇటువంటి వాటికి మధ్యాహ్నపు ఎండ వడని చోటు కేటాయించాలి. కొన్ని మధ్యాహ్నపు ఎండలోనే పెరగగలవు. వాటికి మధ్యాహ్నపు ఎండ వడేచోటు కేటాయించాలి.


10.11



10.12



10.13



289A

అనేక రకాల పువ్వుల మొక్కలు విడి విడిగా ఉండడంకన్నా గుంపుగా వుంటేనే అందం. అప్పుడు పువ్వుల రాశి - పువ్వు శయ్య వైభవం కన్ను కుట్టేట్టుగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్క రాశిలోనూ ఒకే రకము ఒకే రంగు పువ్వులుండేటట్టుగా పెంచితే ఇంకా అందంగా ఉంటుంది. అంటిరైసమ్, ప్లాక్సు, దర్జీన్ మొదలైనవి ఈ రకపు శయ్యలకు చక్కగా వుంటాయి. ఈ శయ్యలకు నీలం రంగు కొద్దిగా, ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ రంగు పైకి కనిపించేట్టుగా పసుపు లేదా తెలుపు పువ్వుల రాశికి దగ్గరలో వుండాలి.

కొందరు ఉత్సాహపాతులు ఈ పరువులను రక రకాల ఆకారాలలో - త్రికోణం - నక్షత్రం - మొదలైన ఆకారాలలో నిర్మిస్తారు. ఈ రకపు పరువులను కాపాడుకొని రావడం కష్టం అయినా, నక్షత్రపు ఆకారాన్ని బాగా పెంచితే చాలా అందంగా ఉంటుంది. కొన్ని ఆకారాలు అంత హితంగా వుండవు. సరళ ఆకారం - గుండ్రని లేదా బాదామి (Oval) ఆకారం ఈ పువ్వు శయ్యకు ఉచితంగా వుంటుంది. అక్కడక్కడ వైవిధ్యత కోసం చదరం లేదా బాణాకారపు పరువులను విభజించవచ్చు. (చిత్రం 10.11).

10.11 వివిధ అలంకారపు పువ్వు శయ్యల (పరువుల)కు మొక్కల్ని పెంచాలి. 1. బాదామి ఆకారపు పరువు. ఎ. గులాబి, బి. నీలి పువ్వు లార్క్స్ప్రైర్, సి. నీలం, తెలుపు వర్చీలు. 2. గుండ్రని (వర్తులాకారం) పరువు ఎ. ఒక రంగు పసుపు బి, డి. ఎరుపు, సి, ఇ. ఆరంజి (కమలా వండు) రంగు పువ్వులు, 3, 4, 5, 6, ఈ ఆకారాల పరువులలో ఎత్తి చూపే రంగు పువ్వులు.

పువ్వుల పరువులు చిన్నవిగా నన్నుగా ఉండకూడదు. అలాగని పువ్వుల రాశులగాను ఉండకూడదు. గడ్డి పరువుల అంచులలో, మూలలలో (10.12) మధ్యలో పువ్వు పరువులుంటే, గడ్డి పచ్చదనానికి, పువ్వుల రంగుకూ వైవిధ్యం ఏర్పడి అవి పైకి స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. పరువులను (లాన్) కొద్దిగా పైకి లేపితే పువ్వుల మొక్కలు మరుగు పడడానికి ఒక వేదిక లేదా రంగస్థలం కల్పించినట్టుగా అవుతుంది. ఇంకా చాలా ఎక్కువగా పైకి లేపితే కోన్ మట్టిలో తేమ త్వరగా ఎండిపోవచ్చు. నీళ్ళు తగ్గవచ్చు. కొందరు వెడల్పయిన గడ్డి లాన్ మధ్య, పెద్ద గుండ్రని లాన్ ప్రత్యేకించి, లాన్ మధ్యలో ఎత్తుగా పెరిగేడి పువ్వుల మొక్కలను చుట్టూ గుంపుగా పెరిగేడి మొక్కల్ని పెంచుతారు. పువ్వుల మొక్కలు మధ్య గడ్డి లాన్ ఆకర్షణీయంగా వుంటుంది. ఈ రకపు పువ్వు శయ్య బాగా పెరిగి గడ్డి లాన్లో చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.

10.12 మూలల్లో (మూల లాన్) వార్షిక పుష్పాలు. ఈ ఆకారపు లాన్లో a. కారన్ ప్లవర్, b. లార్క్స్ ప్రైర్, c. మీరిము, d. క్యాలాండులా, e. క్యాండీబిప్టు. లాన్ అంచులలో పసుపు రంగు కుబ్జ చెండు మల్లె (మేరీ గ్లాబ్).

మరికొందరు, పువ్వుల లాన్ వెడల్పుగా ఉంటే లాన్ మధ్య లోపల హోలిహాక్ (Holly hock) సూర్య కాంతి, డేలీయ, కాన, జనియ (Zinnia) మొదలైన ఎత్తయిన మొక్కలను పెంచి రెండు వైపులా దించుతారు. ఈ రకపు లాన్ని రెండు వైపుల పువ్వు శయ్యలు (Two faced flower beds) అని, ద్విముఖ పువ్వు శయ్యలని అంటారు.

**స్వర్ణ శయ్యలు బొషడాల పరువు - Herbaceous borders లేదా గుల్మ్యాకారపు పరువులు**

హెర్బాకస్ డేశాలలో బహు వార్షిక పుష్పపు మొక్కలనే పొడవుగా, వెడల్పుగా అంచులలో పెంచుతారు. వీటిని స్వర్ణ శయ్య హార్బేషియన్ (గుల్మ్యాకారపు) బార్డర్ (Herbaceous Border) అని వ్యవహరిస్తారు. ఈ రకపు

గుల్మకారపు లానులను సమర్థవంతంగా పెంచడానికి మన దేశంలో అనేక చోట్ల శీతోష్ణ స్థితి అడ్డాస్తోంది. దీనికి బదులుగా మనం వార్షిక బహువార్షిక పువ్వుల మొక్కల మిశ్రమాన్ని ఒక రకపు గుల్మకారపు పరుపులను అంచులలో పెంచవచ్చు. వీటిని మిశ్రమ పరుపులు, మిశ్రమ శయ్య, మిక్స్డ్ బార్డర్ (Mixed Border) అని అంటారు. (10.13 చిత్రం.)

10.13 మిశ్రమ గుల్మకారపు శయ్య 1. ఎత్తయిన మొక్కలు, 2. మధ్యస్థంగా ఎత్తువి, 3. చిన్న మొక్కలను త్రికోణాలుగా విభజించి వివిధ త్రికోణాలలో వివిధ ఎత్తుల మొక్కలను పెంచడానికి బదులుగా వివిధ రంగుల మొక్కలను పెంచవచ్చు.







ఈ గుల్మకారపు పరుపులు సుమారు 2-3 మీటర్ల వెడల్పు ఉండాలి. దానికన్నా చిన్నదయితే పువ్వులంచులు నిండినట్లుగా కనిపించవు. వీటిని మొక్కలతో నింపడానికి చెయ్యి అడిచినదానికి (చేతితో పని చేయడానికి) కష్టమవుతుంది. వెడల్పుయిన లాన్లను గోడ లేదా కంచె అంచులలో పెంచాలి. ఎత్తయిన మొక్కల ముందు, పొట్టి మొక్కలను పెంచితే, ఈ లాన్లు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. వెనుకటి మొక్కలకి చెట్టు లేదా గోడ నీడపడకుండా లాన్ కొద్దిగా దూరంగా పెంచాలి. కొందరు ఈ పరుపులకు ముందర ఒక చిన్న గడ్డి లాన్ వట్టిని పెంచుతారు. ఇది పరుపుల వైభవాన్ని మరింత పెంచుతుంది.

**గట్టుల చుట్టూ అలంకారపు మొక్కలు (Ornamental Hedges)**








తోటలో కంచెల మొక్కల రక్షణ కొరకు గాలిని అడ్డుకోవడానికి, ఒక భాగం నుంచి మరొక భాగాన్ని వేరు చేయడానికి, పువ్వుల మొక్కలు బాగా కనిపించడానికి, భద్రత కొరకు పెంచుతారు.

కంచె మొక్కల్ని - రక్షణకు దొంగల బారి నుంచి పశువుల, మేకల బారి నుంచి తోటను రక్షించడానికి మధ్య ముళ్ళున్న తీగలను కట్టి వాటికి రెండు వైపులా కంచె మొక్కల్ని నాటుతారు. ఆ విధంగా చేయడం మంచిదే. అప్పుడు దీనిలో దూరదానికి కష్టమవుతుంది. 3-4 మీ. ఎత్తుకు పెంచితే, అప్పుడు కంచె గాలిని అడ్డుకోగలుగుతుంది. గాలి తోట మొక్కలకు శత్రువు. అందుచేత ఈ మొక్కల్ని రక్షించడానికి ఎత్తయిన కంచెను తోట చుట్టూ పెట్టడం మంచిది. ఈ విధంగా పెంచితే గాలిని అడ్డుకోవడం, రక్షణ లభించడమే కాకుండా, తోటకు మరుగు దొరికి (లభించి) ఏకాంతంగా ఉండటానికి, ఏకాంతంగా పెట్టడానికి (Privacy) అనుకూలమవుతుంది.

కంచె మొక్కలు త్వరగా పెరిగిడివిగా ఉండాలి. విస్తరించేగినా, పైకి ఎగబ్రాకి పెరిగిడివిగా ఉండాలి. ఆకులు చిన్నవిగా ఉండి చూడడానికి లక్షణంగా ఉండాలి. చిన్న పువ్వులేవే జాతి మొక్కలు మంచివి. పాములను ఆకర్షించేవిగా ఉండరాదు. వర్షపు నీటితో పెరిగిడివిగా ఉండాలి. ఎండ వేరిస్థితి వస్తే, ఎదురించి నిలిచేవిగా ఉండాలి. రోగ కీటకాలను నిరోధించే శక్తిని పొందుండాలి. కంచెను హద్దులో, అలంకారప్రాయంగా పెట్టుకోవలసి వుండటంతో దానిని కత్తరిస్తూండాలి. కాబట్టి కంచె మొక్కలు కత్తరింపులకు తట్టుకోగలిగివిగా వుండాలి. తోటలోపల ఒక భాగాన్ని మరొక దాని నుండి వేరు చేయడానికి సుమారు 30 - 75 సెం.మీ. ఎత్తుకు కంచెలను కత్తరించాలి. తోటపాదుల ప్రక్కలలో పువ్వుల మొక్కల అంచులలో అంచు మొక్కల్ని (edging plants) కొందరు












10.14

201B

(13)



పెంచుతారు. ఇది కూడా ఒక రకపు గట్టు చుట్టూ కంచె వేయడమే. దారిని, పువ్వుల మొక్క, వరువుల అంచులను ప్రశ్యేకించడానికి లేదా వేరు వేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.

**రాళ్ళొడ్డడం, రాతి తొట్టె (Rockery) రాకరి**

తోటలో సహజంగానే ఉండే రాతి భాగాలలో లేదా బయట నుండి తెచ్చే రాళ్ళను పాతి కృతక రాళ్ళొడ్డి వాటి మధ్య మొక్కలను పెంచి, రాతి తొట్టెలను వేయడం వరిపాటి. ఇటువంటి రాతి తొట్టె తోటకు ఒక రకపు నైసర్గిక రూపాన్ని (Naturalness) తెస్తుంది. ఈ రాతి తొట్టె లేదా రాకరీలను సూర్యరశ్మి బాగా పడేచోట నిర్మించాలి. మొక్కల, చెట్లపాలు, లేదా చూరుల రసాలు వడని చోట ఈ రకపు తోటల్ని ఎన్నుకోవడం ఉచితం. కావలసిన వస్త్రే ఇంటి నిర్మాణపు వెలువలున్న మూలక దానిలో ఈ రాతి తొట్టెలను రూపొందించుకోవచ్చు. కృత్రిమ రాకరీలకు సాధ్యమైనంత వరకు ఆ చోటకు తగిన రాళ్ళు ఎన్నుకోవాలి.

**తోట అలంకారాలు (Garden Ornaments)**

1. ఆసనాలు : చిత్రం 10.14 వీటిని సామాన్యంగా తోట యొక్క ఏకాంత స్థలాలలో, నీడలో వేయాలి. ఈ ఆసనాలు చెక్కతో చేసినవి లేదా రాతితో లేదా కాస్త సిమెంటుతోనైనా చేసినవిగా ఉండవచ్చు.

10.14 తోటలోని ఆసనాలు 1-4 చెక్కతో చేసినవి. 5-6 మేజా, 7. ఇనుప కుర్చీ, 8-9 వరుపు వేసినది. మేకుకు తగిలించరాదు. 10. సిమెంటుది

10-14 చిత్రం 11. చెట్టు చుట్టూ వేసేలావి, 12-14 కంట్రీ ఆసనాలు (Rustic), 15- 16 పెద్ద పార్కులకు సరిపోయే ఆసనాలు, 17. మేజా, పార్కులకు. వీటిని చెక్క, ఇనుము లేదా సిమెంటులతో చేయవచ్చు.

2. పీఠాలు : పెద్ద తోటలలో తీగలను ప్రాకించిన చందెర (జాలరీ (ట్రెలిస్) లేదా చదరం క్రింద ఆసనాలును వేయవచ్చు. ఈ ఆసనాలలో నుంచి చూస్తే తోట కనిపించేటట్టుగా ఉండాలి. వీటిని లతాగృహ పీఠం లేదా పర్గోలా (Pergola) అని అంటారు. కొన్ని తోటలలో తీగలను తీగపైన్, వేరే ఏదో ఒక రీతిలోనో ప్రాకించి, లతాగృహ తీగ విధానాన్ని (Arbour) నిర్మించుకోవచ్చు. (10.15) ఈ లతాగృహాన్ని పెర్ను మొదలైన సస్యాలను పెంచే పర్నర్ (Fernery)గా వేయవచ్చు.

10.15 రకరకాల లతా గృహాలు.

3. పక్షుల తొట్టె (Bird bath) : తోటకు పక్షులు జీవకళని ఇస్తాయి. నైసర్గిక స్వభావాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. పక్షులు తోటపై ఆకర్షించబడడానికి, అవి వచ్చి కూర్చోని, నీటిలో ఆటలాడుకోడానికి, ఎక్కువగా తిరగని చోట ఒక పీఠంపైన చిన్న తొట్టెను నిర్మించవచ్చు. వీటిలో అనేక రకాలు, (చిత్రం 10.16).

10.16 పక్షుల తొట్టె/పక్షుల స్నానానికి పక్షుల బెంచీలు.



4. నీటి కొలనుల మడుగు (Pool) : రంగు రంగు చేవలను వదలడానికి లేదా నైసర్గికతను రెట్టింపు చేయడానికి కన్నీటి అకులు మొదలైన జలసస్యాలను పెంచడానికి నీటి మడుగులుండేతోట అందం మరింత ఎక్కువ అవుతుంది.



10.19



10.18



10.17



10.20

తోట క్రమబద్ధమైన సంవిధానంలో ఏర్పరచుకుంటే (Formal design) ఈ నీటి మడుగులను సామాన్యంగా తోట మధ్య నిర్మిస్తారు. సైసర్గిక సంవిధానంలో (Informal design) దీన్ని తోటలో ఒక కొనలో (చివరలో) పొదలు మొదలైన వాటి మధ్య నిర్మించవచ్చు. (చిత్రం 10.17).

10.17 నీటి మడుగులు (Pools).

A. అలంకారిక మడుగులు టెర్రేస్ట్ గడ్డిలాన్ చివరలో లేదా ముఖ్య కేంద్రంగా మడుగులను నిర్మించవచ్చు. మూలలో పువ్వుల కుండీలను పెట్టవచ్చు. కనీసపు లోతు 35 - 60 సెం.మీ.

B. మొగలాయి తోటలలో నిర్మించే నీటి మడుగులు.

C. నిర్దిష్ట ఆకారం లేని నీటి మడుగులు.

5. పైన పేర్కొన్న అలంకారాలు కాకుండా కొందరు తోటమాటలు శిల్పాలను, విగ్రహాలు, సన్డయల్ (Sundial) నీడ గడియారం, బోపియరి (మొక్కల పొదలను మృగాలను పోలినట్టు అలంకారికంగా కత్తరించడం) (Topiary work) పెట్టడము కలదు. (10.18 & 10.19 చిత్రాలు) బోపియరి చాలా కుశలతతో - చాక చక్కంతో చేయవలసిన పని, ఎక్కువ కాలం పడుతుంది. అందుచేత దీన్ని అనుభవజ్ఞులు మాత్రమే చేస్తుంటారు. (10.20) లేకపోతే తోటకి అలంకారికంగా ఉండడానికి బదులుగా దిప్తి బొమ్మలలాగుంటాయి. విగ్రహాలు సైసర్గిక తోట సంవిధానంలో పొందుకోవు (క్రమబద్ధ సంవిధానానికి సరిపోతాయి).

10.18 సన్ డైయలు (నీడ గడియారాలు) వీటిని రాళ్ళు ఇటుక పెంకులతో కట్టవచ్చు. A. ఇటుక పెంకులతో కట్టినవి (2వ వరుస), B. ఇటుక రాళ్ళు, C. రాళ్ళు, D. ఇటుక.

10.19 శిల్పాలు అలంకారిక వస్తువులు (Statuary and decorative pieces)

10.20 బోపియరి మొక్కల పొదలు (పొదల మొక్కలు మృగాల ఆకారంలో అలంకారికంగా కత్తరించడం).

ఈ తోట అలంకారాలు ఇతర అలంకార, ఆభరణాలు వలె అయితే వేడే జరుగుతుంది. మితంగా ఉంటేనే మేలు. సహజమైన చోట ఉంటే చూడడానికి తోటకి రెండింటికీ అందం, ఉచితం కూడా. చిన్న తోటలలో ఒకటో రెండో అలంకారానికి అవకాశమున్ననూ, అవి తోట సంవిధానానికి పొందుకొనేట్టుగా ఉండాల్సి. తీగల రకాలు, పీఠాలు, పక్షుల తొట్టెలు మొదలైనవి ఇంటి ముందరుండరాదు. పక్కలలోనో, కాంపౌండు తీగలలోనో నిర్మించాలి.

పైన తోట భాగాలు ఏవేవి? వాటిని ఏ ఆధారం లేదా విధానంతో వినియోగించాలో వివరించడమైనది.

మన సొంత తోటలో ఏయే భాగంలో మొక్కలు పెంచడానికి, అనుకూలంగా వుంది, ఏ భాగంలో పెంచితే మనకు సరిగ్గా ఉంటుందని నిర్ధారించుకొని, వట్టిక తయారు చేసుకొని, ఈ భాగాలు ఎక్కడెక్కడ ఉండాలనేది తోట ఏర్పరచుకోడానికి తయారు చేసిన నమూనాలో (Garden Plan) చూపించాలి. ఆ తర్వాత ఈ స్థలంలో (నమూనాలో) చూపించిన భాగాలకు దారి (బాట) మొదలైన వాటి సాధక బాధకాలను బాగా ఆలోచించి ఈ భాగాల పొడవు, వెడల్పులను నిర్ధారించి నమూనా (పథకాన్ని)ని తేలిసిన వారికి చూపించి, వారి

సలహాని పొంది ఆనంతరం, ఖచ్చితమైన కొలతలను గ్రహించి, సరయిన వివరాలతో మరొక నమూనా చిత్రాన్ని ఎనిమిది అడుగులకు ఒక అంగుళం ఉండేట్టుగా (Scale 1" for 8 ft.) నమూనా చిత్రాన్ని తయారు చేస్తే, అందులో అనేక వివరాలను చూపించవచ్చు. మిశ్రమ పువ్వుల లాన్ (పువ్వుల పరుపు) మొదలైన వాటిల్లో ఏయే మొక్కల్ని, ఎంతెంత, ఎక్కడెక్కడ వేయాలి అనే వివరాలను చూపించడానికి నమూనా చిత్రం పెద్దదిగా ఉండాలి. అంతేకాకుండా ఈ రకపు నమూనా చిత్రం ప్రతి సంవత్సరం తయారు చేసుకోంటూ వుండాలి. వేరొక పెద్ద నమూనా చిత్రంలో 4-5 సంవత్సరాలలో తోటను, తోట యొక్క భాగాలనూ ఏవిధంగా రూపొందించాలనే దానిని చూపించడం ఉచితం.

నమూనా చిత్రాన్ని అనుసరించి, కర్ర, దారాలతో తోటలో వివిధ భాగాలను, తోట స్థలపు హద్దును గుర్తించి దాని ప్రకారం దారులను, పరుపులను (లాన్స్) అంచులను సిద్ధపరచాలి. తోట నమూనా చిత్రాన్ని కార్య రూపానికి తేవాలి. ఏ మొక్కలను ఎప్పుడు వేయాలి అనే వివరాలు నమూనా చిత్రంలో ఉండవు. దీనికోసం ఒక మొక్కలను వేసి (Planting Plan) నమూనా చిత్రాన్ని తయారు చేయాలి. దీనికి కూడా ఒక పథకం - నాటే నమూనా చిత్రం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇందులో ఏ మొక్క ఎక్కడ, ఎప్పుడు ఎంతెంత పెంచాలనే విషయాలను గుర్తించాలి. నమూనా చిత్రంలో ఒక్కొక్క మొక్క భేదాలను ఒక్కొక్క రంగు చుక్కల ద్వారా సూచిస్తే, చిత్రం స్పష్టమవుతుంది. ఈ చుక్కల ప్రక్కన అంశాలను రాసి, వేరే చోట ఏ అంశం, ఏ మొక్కని సూచిస్తుందనే ఒక విషయ సూచిక రాసి పెట్టుకోవాలి.

మన దేశంలో అనేక రకాల మొక్కలు, ఉష్ణ దేశపు శీతోష్ణాలలో పెరగలేవు. వీటిలో, మన తోటకు ఏది ఉచితం, ఏది అనుకూలమనేది పరిశోధించి, తెలుసుకోవడం చాలా కష్టసాధ్యమైన పని. దీనిని ఎన్నుకోవాలనే దానికి బదులుగా ఏ మొక్క జాతిని త్యజించాలని నిర్ణయించుకోవడం సులభం. మన తోటకు ఏయే జాతి మొక్కలు, పొందుకోవు, (సరిపోవు) అనే విషయాలను పట్టిగా తయారు చేసుకొని, అందులో లేని, మిగిలిన జాతులలో మనకు కావల్సిన వాటిని ఎక్కువ కష్టం లేకుండా ఏరుకోవచ్చు.

ఏయే మొక్కల్ని, ఏయే జాతికి చెంది మొక్కల్ని త్యజించాలి. ఏ మొక్కలనైతే మనం మన తోటలో సులభంగా పెంచలేమా, వాటిని అంటే ఏ మొక్కలైతే మన తోటలోని మట్టికి, గాలికి, నీడకు, సంవిధానానికి, వ్యతిరేకమైనవో వాటిని, ఏ మొక్కలకి, మన తోటలో, వాతావరణం చోటు వెలుతురు, నీరు లభించవో వాటిని త్యజించాలి. ఈ విధంగా త్యజించగా మిగిలిన మొక్కలలో మనకు ఉపయోగపడేవాటిని క్రింద వివరించిన విశేష లక్షణాలను కలిగినటువంటి మొక్కలను మాత్రం ఎన్నుకోవాలి.

1. సౌందర్యం : మొక్క రూపం, ఆకు, పువ్వులు అన్నీ అందంగా ఉండాలి.
2. ఉపయోగం : మనకు నచ్చిన రుచిలో, రంగులో ఉండాలి. అనే వార్షిక పువ్వుల మొక్కలు, పుష్పించే కాలంలో చాలా అందంగా ఉండి, కంటికింపుగా ఉంటాయి. కానీ పువ్వుల కాలం ముగిసిన తర్వాత ఈ మొక్కలు చూడడానికి వికారంగా ఉంటాయి. అప్పుడు తోట ఎక్కువగా అవలక్షణంగా కనిపిస్తుంది. తోట యొక్క అంద చరణాలు నదా సర్వకాలం ఉండి తీరాలి. కాబట్టి కేవలం వార్షిక మొక్కలనే ఎన్నుకోకుండా బహు వార్షిక మొక్కలను, వివిధ కాలాలలో పువ్వులను పుష్పించనేసే మొక్కలను, సరిపోయే ఆకులున్న మొక్కలని

(Foliage) ఎన్నుకోవాలి. గోడ, కాంపౌండు, మొదలైన వాటిని మూసే (దాచే) పాదలను, ఇంటి ముందు భాగాలలో ఇంటి సొందర్యం రెట్టింపు చేసే మొక్కలను, వైశాల్యపు ప్రాంతాని కలిగించే మొక్కలను, తోట యొక్క విభాగాలను అందంగా స్పష్టంగా విభజించే కంచె మొక్కలను, నీటిలో పెరిగిడి నీడ సస్యాలను ఎన్నుకోవాలి.

అపురూప సస్యాలను పెంచడానికి చాలినంత వాకచక్యం, జ్ఞానం, ఆసుభవం, సహనం ఉండాలి. ఇవి మనలో లేకపోతే, వాటి జోలికి పోకూడదు. పువ్వుల మొక్కలను ఎన్నుకొనేటప్పుడు కేవలం రంగే ప్రధానంగా ఎంచుకోకూడదు. పువ్వు నిర్మాణం, రూపం, గాత్రం (మందం) వాసన (గంధం) మొదలైన లక్షణాలను గమనించాలి.

ఈ విధంగా మొక్కలను ఎన్నుకొన్న తర్వాత ఏయే మొక్కల్ని ఎక్కడెక్కడ వేస్తే అంద చందాలు రెట్టింపు అవుతాయని ఆలోచించి మొక్క విన్యాసం (Plant Arrangement) క్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. మొదట చెట్లకు చోటు, రెండవది పునాదుల చుట్టూ ఉండవలసిన మొక్కలు (Foundation Planting) ఆ తర్వాత పొదలు, కంచెలు, దాచే (మరుగువరచే) తీగలు, చివరగా చిన్న అలంకారపు మొక్కలు - ఇది క్రమం. తోట యొక్క సంవిధానంలో కొన్ని మూల తత్వాలు (Basic Principles of Garden layout)

తోట సంవిధానాన్ని గురించి ఆలోచించేటప్పుడు సంవిధానపు మూలాధార సూత్రాలను జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. మూలతత్వాలు ఏవంటే 1. సమతులం (Balance), 2. వైవిధ్యం (Variety), 3. ప్రాధాన్యత (Accent), 4. అఖండత (Unity).

**సమతుల్యం - సమానత (సమానత్వం)**

మొక్కలు - ఇంటి కాంపౌండు - ఎత్తు, మందం, గాత్రం, లక్షణం, రంగు మొదలైన వాటికి సమానంగా ఉండాలి. సమంజసంగా వుండాలి. విరోధ భాసకు చోటుండకూడదు. ఇవి ఒకదాని కొకటి పూరకంగా ఉండాలి. ఈ రకపు సామరస్యం అవసరం.

**సమానత్వాన్ని రూపొందించడం ఎలా ?**

సమానత్వంలో (సమానతలో) రెండు రకాలు. 1. క్రమ బద్ధమైన సమానత్వం లేదా సమరూపమైన సమానత్వం (Symmetrical) అంటే రెండు వైపుల ఒకదానికొకటి అనురూపంగా ఉండడం. ఉదా. దారి నుండి ఎడమవైపుకు 1 మీటరు దూరంలో కొన్ని పువ్వుల పాదులు చేస్తే - కుడి వైపుకు, కూడా అంతే దూరంలో అదే రకపు పువ్వుల పాదులను అదేవిధంగా చేయడం - సమరూపం లేదా అనురూప సమానత్వం (Formal or Symmetrical balance). 2. అనురూపం లేకుండానే పొందుకునేట్టుగా ఉండడం లేదా సమానత్వాన్ని రూపొందించే క్రమం - అసమతులనం (Informal or Asymmetrical balance) అసమానత్వం.

**తోట సంవిధానంలో - పాదులు పరుపులు, అంతులు దారి మొదలైన వాటి నిర్మాణాల్లో నేరుగా**


ఉండే రేఖలు గుండ్రటి గుంపు రేఖలు, ఏక కేంద్ర రేఖలు (Concentric) చదరం, వంపులు, బాజాకారం, త్రికోణాలు, కేంద్రాలు ఇత్యాదులు ప్రాధాన్యత హించివుండే, వాటి అంతరం, వీడ్పడం, రూపం ఇత్యాదులన్నీ అడ్డాలలో రెండు బొమ్మలున్నట్టు చింబ ప్రతి చింబాలుగా వస్తు (వదార్దం) ప్రతి చింబాలవలె ఒకదానికొకటి అనురూపంగా ఉండేటట్టుగా వీటిని కొలిచి, క్రమబద్ధంగా సమానత్వాన్ని నిర్మించుకోవాలి (ఏర్పరచాలి). ఇదేమంత కష్టమైన పనికాదు. ఈ రకపు సంవిధానంలో కొన్ని సమయాలలో తలక్రిందులువుతుంటుంది. ఏదైనా ఒక మొక్క క్రుల్చిపోవడమో, ఎండిపోవడమో లేదా చచ్చిపోతే దాని అనురూప స్థానంలో ఉండే మొక్కని పీకేయాలి వస్తుంది. లేదా ఒకవైపు మొక్క ఏపుగా నిండుగా పెరిగి, దాని అనురూపం, చిన్నదిగా ఉంటే దాన్ని (ఈ మొక్కని) అనురూప మొక్క యొక్క గాత్రానికి తెచ్చుటకు రెండు మొక్కల్ని వేయాలి వస్తుంది. అదే విధంగా కత్తరించేటప్పుడు, మొక్కల్ని అలంకారిక మొక్కలుగా కత్తరించేటప్పుడు, వాటి జత మొక్కల్ని, ఏకప్రకారంగా చేయడమనేది తలనిచ్చి వ్యవహారం. ఏపుగా పెరిగిన మొక్కల్ని జత చేయడానికి ఎక్కువగానే కత్తరించాలి వస్తుంది. ఒకవైపు చెడిపోతే రెండోవైపున్న భాగాన్ని కూడా చెడవలసి వస్తుంది.

క్రమబద్ధంలేని అసమానత్వ సంవిధానంలో ఈ తొందర, ఇబ్బందులు అంతగా ఉండవు. కానీ ఈ రకపు వాటిలో ఇబ్బందులు వస్తే ఎక్కువ తెలివి తేటలు, ఆలోచనలు, బుద్ధి కుశలత, సమయస్ఫూర్తి కావలసి వస్తుంది. క్రమ బద్ధ సంవిధానంలో ఉండేటట్టుగా నేరుగా ఉండే రేఖలు, చదరాలు, మొదలైనవి లేకపోయిననూ, తోటలోని మొక్కల ఎత్తు, రంగు, మొదలు ఒకదాని నుండి మరొక దానికి మెల్లగా జారాలి (Gradually and smoothly merge). ప్రవాహం ప్రాకినట్టుగా ప్రవాహం నేరుగా పారక పోయినా, అది మెల్లగా నిదానంగా పై మట్టు నుండి క్రింది మట్టానికే పారుతుంది. ఈ ప్రవాహంలో కర్కశం ఉండదు. విరోధముండదు. అదే విధంగానే అసమానత్వం లోనూ తోటలోని మొక్కల ఆకారం, గాత్రం, ఎత్తు, రంగు, రూపాలలోనూ ఒకదానితో మరొకటి పొందుకొని (కుదురుకోని) జారాలి. పాదల అంచులు, పాదల డొంకు మూల మూలల్లో ఉండకుండా, సరాగంగా (సరాసరిగా) ఉండాలి. ఒక పాద లేదా పాదు రంగు ప్రక్కనున్న పాదల రంగుకు ఇంద్ర ధనుస్సు రంగులలో ఉండేటట్టుగా ఏర్పరచుకోవాలి. అదేవిధంగా ఎత్తు, గాత్రం ఏర్పరచుకోవాలి. ఈ రకపు సంవిధానంలో ఒక మొక్క లేదా మొక్కల సమూహం ఒకదానికి, మరొకటి పూరకంగా ఉండాలి. ఈ రకపు తోట నిర్మాణంలో వార్షిక బహు వార్షిక పుష్పాలకు స్థానముంది. ఇవి ఒక దానికొకటి పూరకంగా వుంటాయి.



ఈ సంవిధానంలో ఇష్టం లేని, కుదురుకోని, కంటికి కొట్టవచ్చేటట్టుగా ఉన్న మొక్కలను, పాదలను, తీగలను, అవసరం లేనప్పుడు (ఆక్సిడెన్సువున్నాడు) తీసివేయవచ్చు. కొత్త వాటిని పెంచుకోవచ్చు. ఈ విధంగా చేసినా తోట సంవిధానం చెడదు. తోట రూపం చెడుతుందనే భీతి (భయం) ఉండదు. ఈ విధంగా ఉండటంతో ఈ రకపు తోట గడ్డి పరుపులు అనేక ఉద్దేశాల కోసం - ఆడుకోడానికి - విశ్రాంతి తీసుకోడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఎక్కిడ, ఆ స్థలం అందం చెడిపోతుండేమో అనే గాబరా ఉండదు.

ఏతయినా పాదలు పొంపుగానో, ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అడ్డదిడ్డంగా పెరిగుంటే దాన్ని వెంటనే కత్తరించవలసిన ఆవశ్యకత లేదు. వెనుక ముందరగా కత్తరించినా తోట రూపం అందం చెడిపోదు.





10.21



10.21

## వైవిధ్యత :

అలంకారక తోటలు, పళ్ళు, కూరగాయలు, కొబ్బరి ఇత్యాది తోటల వంటివికావు. ఈ తోట ఒకేరకం లేదా కొన్ని రకాల గుంపు/సమూహం కాదు. వెలుగు నీడల కళాత్మకమైన సస్య సంకలనం, సమంజస, సామరస్యతతో కూడిన సస్య సమ్మేళనల సంయోగం.

తోటలో సుందరమైన వైవిధ్యం - ఆకారంలో, గాత్రంలో పెరుగుదలలో, రంగులలో వైవిధ్యం లేకపోతే అది అలంకారిక తోట కానేరదు. అందుచేత, తోట సంవిధానంలో ఈ వైవిధ్యానికి పూర్ణావకాశముందాలి.

వైవిధ్యం ఒకటి మాత్రమే ఉంటే చాలదు. దీని రుచిని, భారాన్ని పెంచేట్టుగా, ఉప్పు రుచిని పులుపు ఎక్కువ చేసేట్టుగా విందు భోజనంలో, దబ్బకాయ, ఊధగాయ, కాకరకాయ గుళ్ళా అవసరమైనట్లే, ఈ సస్య వైవిధ్యంలో అక్కడక్కడ విభిన్నత, విరోధభేదం (Contrast) ఉంటే తోట ఎక్కువ సాగసుగా, చూడ సాంపుగా ఉంటుంది. ఈ విరోధం ఆకారంలోనూ, ఆకులలోనో, లేదా, పువ్వుల రంగులలోనూ ఉండవచ్చు.

**ప్రాధాన్యత (Accent) చిత్రాలు 10.21, 1-3**

10.21 (1-3) తోటలో ఒక ముఖ్యమైన చోటును దృష్టిలో పెట్టుకొని దాని చుట్టూ, తోటను రూపొందించాలి. ఈ అంగం తోట యొక్క ముఖ్య కేంద్రం (Focal Point) : 1లో క్రమబద్ధమైన తోట కేంద్రం, 2లో నిర్దిష్ట ఆకారం లేని నీటి మడుగు కేంద్రం.





10.21 చిత్రం 3లో నీడ గడియారం, మెట్లు, చెట్లు క్రింద ఆసనం కేంద్రాలు.

ప్రతి తోట కన్ను మిరుమిట్టు గొలిపేటట్టుగా, కంటికింపుగా నుండి, ఆకర్షిస్తూ ఇది ఈ తోట విశేషం అని చెప్పే, ఏదో ఒక భాగం ఉండేటట్టుగా తోట సంవిధానాన్ని నిర్మించాలి. ఈ భాగం ఇంటి ముందర భాగమై వుండవచ్చు, పెద్దయి వుండవచ్చు, నీటి తోట్టియి ఉండవచ్చు. పువ్వుల పొదలు కావచ్చు, లేదా పాదులు కావచ్చు, ఈ ప్రధాన అంగాన్ని ఆకర్షణీయమైన అంగంగా చేసుకొని తోటను నిర్మిస్తే అటువంటి తోటకు ఒక వ్యక్తిత్వం (Personality) లభిస్తుంది (ప్రత్యేకత లభిస్తుంది).

**సామరస్యం ఏకత్వం (Unity) అభివ్యక్తి**

తోట ఒక రళ్ళు కంటిబిలాగా కంటిబియ పరుపులు (లానులు) ఏ విధంగా నిర్మించవచ్చు? వివిధ రకాలుగా నిర్మించుకోవచ్చు. వివిధ రంగులతో కూడి వుండవచ్చు. కాని ఇవన్నీ కలిసి ఒక రూపానికి (Pat-tern) వచ్చేట్టుగా, వివిధ వర్ణాలు, వివిధ రేఖలుచేరి, ఒక చిత్రమయ్యేట్టుగా, వివిధ స్వరాలు, చేరి సంగీతమయ్యేట్టుగా తోట అంగాలు, వివిధ భాగాలు, వైవిధ్యాలు అన్నీ చేరి, సమ్మేళనమై, సామరస్యత నొంది అభివ్యక్తిగా, ఏకత్వమునందాలి. తోటమాలి వ్యక్తిత్వం వ్యక్తీకరించాలి. అప్పుడే అది ఒక తోట కాకుండా ఒకరి ప్రత్యేక తోటగా గుర్తించబడుతుంది. తోటమాలి యొక్క ప్రత్యేకత, నైపుణ్యం వెల్లడి అవుతుంది.

ఈ మూలాధారంపై తోట సంవిధానాన్ని నిర్మించుకోవాలి. దానికి కొన్ని సూచనలు సలహాలు.



చిన్ని తోటల విన్యాసం కొద్దిగా మొలకెత్తే ఎక్కవ మొక్కలను వేస్తే, సమూహంగా పొవుగా కనిపిస్తుంది. ఈ రకపు తోటలలో వైశాల్య భ్రాంతిని కలిగించడానికి కొన్ని ఉపాయాలు.

మొదటిది - చిన్న తోటలను సాధ్యమైనంత వరకు, సరళంగానే ఉంచాలి. ఎక్కవ మొక్కల్ని పెంచకూడదు.

రెండవది - తోట మధ్య భాగంలో మొక్కలను పెంచకుండానే ఒకవేళ పెంచితే ఒకటో రెండో పెంచి తెరచినట్టుగా (Open) పెట్టాలి.

మూడవది - దృష్టి భ్రాంతి (Optical illusion) కలిగించడానికి కొన్ని క్రమాలను ఆచరించాలి. ఇంటి ముందర వీధిలో వరుసగా (పాలుగా) చెట్లుంటే, ఆ వీధి చెట్టు తోటలోనే ఉండేమో అనేట్టుగా కాంపౌండు తీగ, కాంపౌండు మూసేట్టుగా పొదల చెట్టు వైపు పైకి ప్రాకేట్టుగా పొదలు, మొక్కలు, చెట్లు పెంచవచ్చు. అప్పుడు తోట లోపల నుంచి చూస్తే చెట్టు తోటలోని భాగంగా ఉన్నట్టుగా భాసిస్తుంది. కాంపౌండులు, కంచెలు, కనిపించకుండా పెద్ద పొదల మొక్కలను పెంచవచ్చు. ఎత్తుగా పెరిగి పొదల మొక్కలను వెడల్పుగా ఉన్నచోట గుంపుగా పెంచవచ్చు. తీగ లేదా, జాగ్రేడ వంటి దాని ద్వారా బయట నుండి చూస్తే, తోట కనిపించేట్టుగా ఏర్పాటు చేయవచ్చు. దూరంగా ఉన్న భాగంలో చిన్న పొట్టి మొక్కలను దగ్గరగా ఉన్న వైపు (చోట) ఎక్కవ వెడల్పుగా ఉన్న సుమారు పెద్ద మొక్కలను వరుసగా వేస్తే తోట చాలా పొడవుగా ఉన్నట్టుగా భ్రాంతిని కలుగజేస్తుంది. అదేవిధంగా చిక్కిటి చక్కిటి రంగులున్న పువ్వుల మొక్కలు ముందు, లేత రంగులున్న పువ్వులున్న మొక్కల్ని, మడుగులో సాతీతే అంచులు పెద్దవిగా ఉన్నట్టుగా భాసిస్తాయి.

తోట సంవిధానం లేదా విన్యాసం, అనేక రీతులలో కట్టడము లేదా ఇంటి సంవిధానాన్ని (Design) పోలుతుంది. తోట కాంపౌండు, కంచె మొదలైనవి ఇంటి వెలువల గోడవలె శుభ్రంగా ఉండాలి. లక్షణంగా ఉండాలి. వ్యక్తిత్వాన్ని వ్యక్తీకరించాలి. ఎండ వేడిమి, గాలి హోరుకు తట్టుకొని అటుపోట్లను ఎదుర్కొనేట్టుగా ఉండాలి.

ఇంటి ముఖ ద్వారం (వాకిలి) దాటిరాగానే ఒక విశాలమైన హాలు (వరండా - ముంగిట) ఉండే మాదిరిగా తోట లేదా కాంపౌండు గేట్ నుంచి రాగానే తోట విశాలంగా ఉండాలి, అలంకారికంగా ఉండాలి.

కట్టడంలో (ఇంటి నిర్మాణంలో) దివాన్ భాన - డ్రాయింగ్ రూమ్ (Drawing Room) అత్యంత సుందరమైన ఆకర్షితమయ్యే చోట - బంధు మిత్రులను రప్పించి, కూర్చోని సత్కరించి మాట్లాడుకొనేందుకు సరసు సల్లాపాలు జరుపుకోడానికి వీలైన చోటు. అదే విధంగా తోటలోను ఒక అత్యంత సుందరమైన భాగముండాలి. ఈ భాగంలోనే వివిధ రకాల పువ్వుల పాదులు, పువ్వుల లాన్ (Carpet beds) నీటి తొట్టెలు ఉండాలి. డ్రాయింగ్ రూమ్ (10:22 చిత్రాలు).

10.22 గులాబీల తోట వివిధ సమూహాలు.

1. సరళ సమూహ - చిన్ని తోటకి  $x =$  హైబ్రిడ్ గులాబీ.

(x) ఫ్లోరి బండ 0 స్టాండర్డ్ గులాబీ n కమాను

2. పై సమూహానే కాని చదరపు నిర్మాణాన్ని విభజించడానికి మధ్య గుండ్రటి పాదులు నూచించబడ్డాయి.

10.22 చిత్రం 3. పెద్ద తోటలకు సుమారు 12 x 12 మీ. చోటలో గులాబీ, ఎక్కువ స్థలముండటం చేత ఎక్కువ రకాల గులాబీ జాతులను పెంచవచ్చు. స్థంభంపైన లేదా కమానుపైన, ఇంటిపైన తీగ గులాబీని, ప్రాకించవచ్చు. గోడలకు అక్కడక్కడ తగిలించిన చిత్రాలవలె, తోటలోని భాగాల అంచులో (10.22 4-9 చిత్రాలు).

10.22 4-9 వివిధ నమూనా గులాబీ తోటలు.

10.22. 10 చిన్న గులాబీ తోట.

సూచనగా ఈ గులాబీ వైరెటీలను వేయవచ్చు. 1. మిషన్ స్క్వామే మెగ్రిడి, 2. క్రిస్టోనర్ స్ట్రోన్, 3. క్రిమిసన్ గ్లోరి, 4. ఈన్ హార్వెన్, 5. ప్రెసిడెంట్ హోవర్, 6. పీస్.

10.22. 11 వివిధ నమూనాలు.

రంగు రంగుల సులక్షణమైన ఆకులున్న పాదలకు, చిన్న చెట్లు ఉంటే, ఈ భాగం ఎక్కువ అందంగా కనిపిస్తుంది.

ఇల్లు అన్న తర్వాత వంటిట్లు, స్నానాలగది ఉండే తీరాలి. అదే విధంగా తోటలో కూరగాయల విభాగం పనులు చేయడానికొక ప్రత్యేక విభాగముండాలి. నారులను తయారు చేసే నర్సరీ ఉండాలి. ఇంటిలోని ఉగ్రాణం లాగా తోటలో పెద్ద - ఎరుపు ఉపకరణాలను మొదలైన వాటిని జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవడానికి ఒక భాగముండాలి.

తోట గురించి ఆలోచనలు ఇంతకు ముందు పుటలలో తెలిపినట్లుగా పథకాన్ని ఏర్పరచుకొని, కార్య రూపానికి తేవడానికి ముందు ఒక్కసారైనా చేసిన ఆలోచనలను భిన్న దృష్టితో పునర్విమర్శతో అవలోకించడం ఉత్తమం.

ఏ ఉద్దేశ్యం కోసం మనం తోటను ఏర్పరచుకోవాలని, అనుకున్నామో ఆలోచనలను వెదచెప్పుకోవడమే దీని ప్రధానోద్దేశ్యం. ఈ ఆలోచనలతో పూర్తిగా మళ్ళీ చూడడం సాధ్యమవుతుందా, సఫలమవుతుందా, అని ప్రశ్నించుకొని వాటికి జవాబులు పొందాలి.

ఇంతకు ముందు తెలిపిన ఉద్దేశాలే కాకుండా సామాన్యంగా ఏ తోటకైనా కొన్ని లక్షణాలు ఖచ్చితంగా ఉండే తీరాలి.

1. ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి (Attractive).
2. ఆసక్తికరంగా లేదా సామరస్యంగా ఉండాలి (Interesting).
3. అనుకూలంగా ఉండాలి (Convenient).
4. ఉపయోగకరంగా ఉండాలి (Useful).

ఆకర్షణీయత - ఇంటి ముందు తోట ఉంటే దారినపోయేవారిని ఆకర్షిస్తుంది. దీనితో ఆ ఇంటి విలువ పెరుగుతుంది. ప్రజలు సామాన్యంగా ఒక వ్యక్తి అంతస్తులను బేరీజు వేయడం, అతనిపై ఒక అభిప్రాయానికి

రావడం, అతని బాహ్య లక్షణాలను బట్టి - అంటే అతని నడవడిక, ధరించే బట్టలు, వేషాధారణలతో విలువవచ్చినట్లే ఒకరి ఇంటిపై సదభిప్రాయం రావడానికి ఆ తోట బాహ్య సౌందర్యమే కారణం. తోట ఇంటికి అలంకార ప్రాయమైనది.

తోట బాటసారులకే కాక ఇంటిలోని వారికి కూడా ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి. మానవులకు కేవలం వేష భాషలు వుంటే చాలవు, వాటిని సమర్థించే గుణం, నీతి, నడవడికలూ కావాలి గదా ! అదే విధంగా తోట బాహ్య ప్రపంచానికి అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటే చాలదు. ఇంటిలోని వారికి మనోహరంగా మానసోల్లాసాన్ని కలిగించి స్వాభిమానాన్ని పెంచేటట్టుగా ఉండాలి. వారి వ్యక్తిత్వానికి తోట బాహ్య సూచికగా ఉండాలి.

సారస్వత - చేతిలోని అన్ని వేళ్ళు ఒకే సమంగా ఉండవు. అన్ని రుచులూ ఒకేరకంగా ఉండవు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకం, లోకోభిన్నులు: కాబట్టి రుచులు వేరు, వ్యక్తిత్వాలు వేరుగా ఉంటాయి. అందుచేత వారి తోట కూడా అసామాన్యంగా ఉండాలనే ప్రత్యేకంగా ప్రత్యేక లక్షణాలు కలిగినదిగా ఉండాలనే ఆశిస్తుంటారు. ఈ ఆశకు తోడు, మన వ్యక్తిత్వం, అభిరుచి, అభిలాషలు అత్యున్నతంగానూ, చురుకుగానూ ఉండాలి. అంటే తోట నిర్మాణంలో, మొక్కల ఎన్నికలో వాటిని జతపరచడంలోనూ, మన సొంత రుచులను అలోచనలను, అభిప్రాయాలను ప్రదర్శిస్తుండాలి. అప్పుడే మన తోట మనకి ఇతరులకు సారస్వతను కలిగిస్తుంది (సారస్వంగా ఉంటుంది).

అనుకూలత - తోట విన్యాసం, వృధా శ్రమకు ఖర్చుకు చోటివ్వకూడదు. తోట పనిని దీక్షతో చేసుకొంటూ సోవాలి. నడవడానికి, చూసుకోడానికి, వసులు చేసుకోడానికి అనుకూలంగా వుండాలి.

ఉపయోగాలు: తోట ఉపయోగకరంగాను ఉండాలి. విశ్రాంతి, నెమ్మది, సౌందర్యోపాసన, ఏకాంతత, ఉత్సాహం కలిగించాలి. బాహ్య జీవనానికి పువ్వులు, పళ్ళు, కూరగాయల ఉత్పత్తి, ఇవి తోట ద్వారా మనం పొందాలనుకొనే ఉపయోగాలు, ప్రయోజనాలు. ఈ కోరికలు, ఆశయాలు, నిరీక్షణలు, మనం తయారు చేసుకొన్న తోట నిర్మాణం, పథకాలు సాధించగలవంటే అప్పుడు దాన్ని కార్య రూపానికి తీసుకొని రావడానికి ప్రారంభించాలి. ప్రత్యేక రకాల తోటలు :

క్రమబద్ధ నైసర్గిక తోటలేకా కొన్ని ప్రత్యేక రకాలైన తోటలను మనం రూపొందించుకోవచ్చు. వీటిలో కొన్ని :

1. శ్రీమతి ఉద్యాన వనం (My lady's garden)
2. నీడ తోట (Shade garden)
3. కుండీల తోట (Pot Garden)
4. గులాబీ తోట (Rose Garden)
5. నిత్య పుష్పాల తోట (Perennial Flower Garden)
6. కల్తబ్బీ (Rock Garden)
7. సుగంధోద్యానవనం (Scented Garden)
8. డాబా తోట (డాబా గార్డెన్ - Roof Garden)
9. పిల్లల తోట (Children's Garden)
10. పాఠశాల తోట (School Garden).

1. శ్రీమతి ఉద్యాన వనం : తోటలో ఒక చిన్న చోటు ఇంటిలోని స్త్రీల విలాసానకోసం, మిగిల్చి ఆక్కడికి వెళ్లి రావడానికి గుప్త (రహస్య) దారులుంటేటట్టుగానూ, పాదలు, తీగలు మొదలైన వాటితో మూసేట్టు

(కప్పట్టుగా) ఉండాలి. లోపల ఒకటి రెండు కుర్చీలు వేసి కొన్ని అందమైన మొక్కలను పెంచాలి. వెలుపల (బయట) చూడడానికి కేవలం, పాదలు, తీగలు కనిపిస్తాయే తప్ప లోపలున్న చిన్న తోట కనిపించదు.

2. **నీడ తోట :** దీనిని ఫర్నరీ (Fernery) కన్సర్వేటరీ (Conservatory) లేదా వచ్చని పందెర ఇల్లు అని వ్యవహరిస్తారు. ఈ తోటలో తీగలను పందెరపై ప్రాకించి లోపల రాళ్ళు బెంచీలను జోడించి, దానిపై ఫర్న్లు, అంతూరియం (Anthurium) అలోకేషియ (Alocacia) మరాంట (Maranta) డ్రెసీనా (Dracaena), రెక్స్ బోగోనియ (Rex Begonia), మొదలైన నీడను కోరే మొక్కలను కుండీలలో పెంచవచ్చు. వేసవి కాలంలో ఈ పందెర ఇళ్ళు మంచి ఆశ్రయ స్థానాలుగా కావల్సి వస్తే కొన్ని పీఠోపాసనాలను వేసి, బంధు మిత్రులతో, ఎండ తాపాన్ని తీర్చుకోవచ్చు. సామాన్యంగా ఈ ఇల్లు పూర్వ దిక్కున లేదా పూర్వోత్తరానికి తిరిగి యుండడం ఉచితమైంది. యుక్త స్థలమందు వళ్ళిమ భాగంలో తీగలను పెంచి, వళ్ళిమ ఎండని, వేడిమిని తగ్గించుకోవచ్చు. వీటిని కొద్దిగా ఎత్తయిన స్థలంలో ఇంటితో చేరుండేటట్టుగానే ఇంటి నిర్మాణానికి శిల్పానికి అనుగుణంగా ఉండేటట్టుగా నిర్మించుకోవాలి (ఏర్పాటు చేసుకోవాలి). పందిరపైన ప్రాకించే తీగ దట్టంగా ఉండాలి (చిక్కగా ఉండాలి). అప్పుడప్పుడూ పలుచనేస్తుండాలి. వెలుతురు దూరేట్టుగా (సూర్యరశ్మి వడేటట్టుగా) ఉండాలి.



3. **కుండీల తోట :** అనేక గృహాలలో వరండా లేదా ముందున్న అంకణం తప్ప, తోటకు ప్రత్యేక స్థలం లేక పోవచ్చు. అటువంటప్పుడు, పువ్వులు, ఆకుల మొక్కలను, కుండీలలో పెంచి, జోడించి, ఒకరకపు కుండీల తోటను రూపొందించుకోవచ్చు. కుండీలలో అన్ని రకాల పువ్వులను పెంచుకోవడానికి సాధ్యం కాదు. పెంచడానికి ప్రయత్నించరాదు. కుండీలలో బహువార్షిక పుష్పాల మొక్కలను పెంచేటయితే, ఆకులు రాలి కొంత కాలానికి బోడయ్యే మొక్కల్ని పెంచకూడదు.

కుండీలలో పెంచినా, వాటికి కూడా సూర్యరశ్మి కావల్సి ఉంటుందనే నిషయం మరచకూడదు. వెలుతురు (సూర్యరశ్మి) బాగా పడేచోట రసభరిత మొక్కల్ని (succulents) వార్షిక పుష్పాల మొక్కలను గట్టి ముట్టయిన పువ్వుల పాదల మొక్కలను పెంచవచ్చు. కొద్దిగా బీడున్న చోట ఫర్న్లు, బెగోనియ మొదలైన వాటిని పెంచాలి.



కుండీలంటే, మట్టి కుండీలేకాక (మట్టి తొట్టెలే కాకుండా), జాజికాయ పెట్టె, డ్రమ్ము, బకెట్టు మొదలైన వాటిలోనూ మొక్కల్ని పెంచవచ్చు. నీళ్ళు ఇంకడానికి వీటి క్రింద చిల్లులు ఉండాలి (కన్నాలుండాలి).

స్థలం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కుండీలలో, తొట్టెలలో, మొక్కల్ని పెంచాలని నియమం లేదు. అనేక సందర్భాలలో అలంకారం కోసం, ప్రదర్శన కోసం (Flower show) పువ్వుల మొక్కల్ని కుండీలలో పెంచాల్సి వస్తుంది. ఈ విధంగా పెంచాల్సి వచ్చినప్పుడు లేదా, పెంచేటప్పుడు, వీటిని నేలపై పెరిగిడి మొక్కల కన్నా ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది.


**కుండీల/తొట్ల తోటలలో (Pot Garden)** వైవిధ్య ఆవశ్యకత వుంది. జోడించే దానిలోనూ (చేర్చిపెట్టే విధానంలోనూ) క్రమ పద్ధతుండాలి.




10-22. 12-17



10-22-18



10-22



10-22



#### 4. గులాబీ తోట 10.22

10.22 12-17 ఏల్రాలు.

10.22 వివిధ నమూనాలు - గులాబీ మొక్కలను అనేక స్థలాలలో పెంచవచ్చు. అయినా వాటి సాగసు పైకి లేచి, ప్రత్యేకంగా కనిపించేది గడ్డి లాన్లో మధ్య పెంచినప్పుడే. రాళ్ళు ఇటుకలు వేసిన గట్టులలో (Pavement) (నడిచే బాట) మధ్య వేసినా, చాలా బాగుంటుంది. అందువేత గులాబీ తోటలను ఏర్పరచాలంటే గడ్డిలాన్, నడిచే బాటలు, రాళ్ళు పరచిన బాట అవసరమవుతాయి. అవి పెరిగేడి చోట సూర్యరశ్మి బాగా వడేటట్టుగా ఉండాలి. చుట్టూరా నీడనిచ్చే చెట్లు, ఇళ్ళ కాంపౌండు గోడలు, ఎత్తుగా పైకి పెరిగే పొదలు ఉండకూడదు. అందులోనూ గాలి అంతగా రాని స్థలాన్ని గులాబీల కోసం ఎన్నుకోవాలి.

గులాబీలలో వలు రకాలున్నాయి. కొన్ని గోడలు, చౌకట్టులను, స్థంబాలను ఎక్కి పైకి ప్రాకి పెరగ గలిగినవి. కొన్ని తీగల వలపైన విస్తరించగలవి. మరి కొన్ని గులాబీలు 2-3 అడుగుల పొడవుగా, నేరుగా నిట్టనిలువుగా తాళుపై వెడల్పుగా వ్యాపిస్తూ పెరిగేడి నిలబడే స్థంభ గులాబీలుగా పెరుగుతాయి (Standard Roses). ఇంకా కొన్ని పొట్టిగా, చిన్నవిగా క్రింద నేల వంక వంగి గులాబీలాన్గా పెరుగుతుంటాయి.

10.22. 18 మరొక నమూనా

గులాబీ పువ్వులు రాశి పువ్వులు కావు. దాని సౌందర్యం, వైయ్యక్తికం (Individual). ఒక మొక్కలో ఒకటో రెండో ఉన్నా దాని సాగసు తగ్గదు. ఇంకా చక్కగానే ఉంటుంది. అందువేత గులాబీ లాన్స్ (గులాబీ పరుపులను) పెంచడం అంత సరైన వద్దతి కాదు. అవి విడి విడిగా ఉంటేనే బాగుంటాయి.

5. నిత్య పూతోట : చిత్రం 10.23 నిత్యం అంటే సంవత్సరపు అన్ని కాలాలలోనూ, వలు సంవత్సరాలు పువ్వులనిచ్చే మొక్కలు కావు. ఇటువంటి రకాల మొక్కలు లేనే లేవు అని చెప్పవచ్చు. ఒకవేళ ఉన్నా వాటి సంఖ్య చాలా తక్కువ. నిత్య పుష్పాలు అంటే సంవత్సరంలో ఎక్కువ కాలంలో ఒకటైన తర్వాత మరొకటి పెరిగే పూల మొక్కలు. ఈ మొక్కలు బహువార్షికాలు అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు జీవించగలిగినవి.

10.23 నిత్య పూతోట 1. స్టాండర్డ్ గులాబీ, 2. చిన్న పొట్టి గులాబీ, 3. పెరినియల్ ఆఫ్టర్ గోల్డెన్ రాడ్ (సాలిడిగో), 4. జర్మెర, 5. పువ్వుల పొదలు, మందార, మల్లెలు, కనకాంబరం, 6. రాకరీ, 7. ఆననం, 8. వేసవి గృహం (ఇల్లు) పై తీగలను ప్రాకించడం.

ఈ తోటలోని, మొక్కలు నేలలో (భూమిలో) చాలాకాలం ఉండడం చేత, వీటిని నాటడానికి ముందుగా మట్టిని చక్కగా త్రవ్వి, ఎరుపులు కలిపి, సారవంతంగా చేయాలి. నాటేటప్పుడు అవి ఎంత ఎత్తుకు పెరుగుతాయో అంతాన్ని గమనించి, ఎత్తుగా పైకి పెరిగే మొక్కల్ని వెనుకగా, చిన్న పొట్టి మొక్కలను ముందుకు, ఒకదానితో ఇంకొకటి పోటీలేకుండా, ఇబ్బంది లేకుండా పెరగడానికి దూర దూరంగా నాటాలి. అప్పుడప్పుడూ అంటే సంవత్సరానికి రెండు మూడుసార్లు వీటిని విభజించాలి (వేరు చేయాలి). ఒత్తుగా ఉన్న చోట (వైపు) వలువలరచాలి. నాటేటప్పుడు పువ్వుల రంగులు ఒకదానితో మరొకటి విరోధులుగా ఉండకుండా, సమాన




1024 : a



1024 : b



1024 : c



1023

రంగుల మొక్కలను జతపరచాలి. ఎండిన పువ్వులను కత్తరించాలి. చుట్టూ మొగ్గ తొడిగిన చెట్టు ఎక్కువకాలం పువ్వులనిస్తుంది.

## 6. రాళ్లబండ (Rock garden) 10.24

10.24 చిత్రం a, b, c. -a. చిన్న రాకరీ క్రమేణ దిగుతుంది. పైన ఒక చిన్న కోనిఫర్ని పెంచవచ్చు. b. రాళ్ళను మట్టిపైన పేర్చి రాకరీని వేసివుండడం. c. రాకరీని, నిర్మించే రీతి.


అల్పైన్ తోట (Alpine Garden) ఈ తోటకు ఎక్కువ స్థలం కావల్సి వస్తుంది. సన్నని రాతి మొక్కలు (రాళ్ళ మధ్య పెరిగే మొక్కలు - Rock Plants) చక్కగా, అందంగా బాసేస్తాయి. కాబట్టి, వీటిని పెంచడానికి ఎక్కువ కష్టపడవలసిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఈ రకపు తోటను ఎక్కువ మంది తోటమాలలు పెంచడానికి ఇష్టపడతారు.

ఈ తోటను ఎక్కువ ఎండ పడే చోటు, చెట్ల పాలుకారకుండా ఉండే చోట ఏర్పరచాలి. కొన్ని రాళ్ళ మొక్కలు లేమ వరిష్టితులలో లేదా వీడలో పెరగగలవు. కానీ నీళ్ళు చెట్టు నుంచి బొట్లు బొట్లుగా పడుతూ వుంటే, అవి మొలకెత్తలేవు, పెరగలేవు. మన దేశంలో కొందరు చెట్ల క్రింద మట్టిని చేర్చి రాళ్ళను పొతి, కొన్ని మొక్కల్ని పెంచి, దాన్నే రాళ్ళ తొట్టి (కరోడ్డు) అని అంటారు. ఇటువంటి వాటికి ఆ పేరు తగదు.

కరోడ్డును వేసేటప్పుడు అది కృత్రిమంగా కనిపించరాదు. సన్నివేశానికి తగినట్లుగా ఆనేలలోని రాళ్ళే సుమారు అనే భ్రాంతిని కలిగించేదిగా ఉండాలి. దీనికోసం ఆ స్థలాల్లో రాళ్ళనే తీసుకొచ్చి వేయాలి. ఈ రాళ్ళొడ్డులు నేల నుండి బయటపచ్చినట్లుగా కనిపించడానికి పడునైన మూలలున్న రాళ్ళను ఉపయోగించరాదు. నున్నగా, గుండ్రంగా, బోడిగా పడున్న ప్రాచీన (పాత) రాళ్ళనే తెచ్చి వేయాలి.


కొన్ని వోళ్ళు, కొన్ని సందర్భాలలో అందులోనూ, విశాలమైన గడ్డి లానులలో కొద్దిగా దిబ్బగా (ఎత్తుగా) ఉన్నచోట రాళ్ళను రాశిగా వేసి, రాళ్ళరాశి మధ్య గడ్డి పెరిగేటట్లుగా మట్టి వేసి, రాళ్ళ మొక్కల్ని నాటితే అటువంటి వాటిని రాళ్ళ తోట (కరోట్) అంటారు. అది చాలా సహజంగా, నైసర్గికంగా కనిపిస్తుంది. కృత్రికంగా రాళ్ళతోట ఏర్పరచినట్టే కనిపించదు.

రాళ్ళతోట అంటే సామాన్యంగా రాళ్ళను పేర్చడమే కాదు. దీనికంటే ముందు రాళ్ళతోట ఏర్పరచాలనుకొన్న చోటును (స్థలాన్ని) బాగా శ్రద్ధ, ఎరువులువేసి, చదును చేసి, సారవంతమైన నేలగా మార్చి అనంతరం రాళ్ళని సహజరీతిలో పొతాలి. ఈ స్థలంలో నీళ్ళు నిలువకుండా మట్టిలో ఇంకిపోయేట్లుగా వేయాలి. రాళ్ళ తోట పేరుకు మాత్రమే. రాళ్ళొడ్డులు, బాహ్య దృష్టికీ, రాళ్ళపైన లేదా రాళ్ళ మధ్య మొక్కలు పెరిగేటట్లు కనిపించిననూ, అవి పెరిగేది మట్టిలోనే. రాళ్ళ మధ్య క్రిందున్న మట్టిలోనే పెరుగుతాయి. రాళ్ళ తోటకు నిత్య పారిత మొక్కల్ని ఎన్నుకోవాలి. పెద్ద రాళ్ళ తోటలలో కెరేడియం, ఆలోకేషియం, అమారిలీస్, అంతూరియం, డ్రైసివా మొదలైన పెద్ద మొక్కల్ని వేయవచ్చు.



10.25 a





## 7. సుగంధోద్యానవనం :

సుగంధం, రంగు, రూపం, సౌగండు ఒకే పువ్వులో ఉండడం అపురూపం. సామాన్యంగా వర్ణరంజిత పువ్వులకు - డేలీయ, గ్లాడియోలసు, మొదలైన వాటికి సుగంధం (వాసన) ఉండదు. వాసనగల (సువాసన గల) పువ్వులకు - సుగంధ రాజం, పారిజాతం, మల్లెలు మొదలైన వాటికి రంగున్ననూ ఇది చాలా అపురూపం. కొన్ని వర్ణ రంజిత పువ్వులు - ఫ్లాక్సు - పింక్స్ (స్వీట్ విలియం - Sweet William) స్వీట్ పీ (Sweet Pea) వర్ణిన మొదలైన వాటిలో మాత్రమే కొద్దిగా ఉంటుంది. సంద్యా సంజల నన్ను జాజులలో చక్కటి సువాసన వుంటుంది.

అనుకూలముయితే, సుగంధ పుష్పాలే ఉండేటట్టుగా ఒక ప్రత్యేక తోటను పెంచితే మంచిది. రంగు కంటికింపుగా వుండి, సాసికకు, మనస్సుకు హితాన్ని, పాత స్మృతులు స్ఫురికి తెచ్చే గుణం సువాసనలకే ఉంది. సంవత్సరములో సర్వకాలంలోనూ పుష్ప పరిమళాన్ని అనుభవించాలంటే అనేక రకాల మొక్కలను, వార్షిక, బహువార్షిక పుష్పల మొక్కలను, పుష్పల పొదలను, తీగలను సుగంధభరిత ఆకు మొక్కలను పెంచాలి.

తోటకు ఒకవైపు ప్రత్యేకంగా ఈ తోటను నిర్మించవచ్చు. దీన్ని తీగ పొదలతో మూయడం మంచిది. ఈ తోటలో ఒక నీటి తొట్టెను నిర్మించి, అందులో పరిమళాన్ని వెదజల్లే జల సస్పాల్సు పెంచవచ్చు. సుగంధోద్యాన వనం పరిమళాన్ని వెదజల్లేది సాయం సంద్య లేదా రాత్రి. అందుచేత ఈ తోటలో ఆ సమయంలో నడవడానికి ఉండడానికి వెలుతురు ఉండేటట్టుగానూ, కూర్చోవడానికి కొన్ని ఆసనాలను వేయాలి (సిమెంటు బెంచీలు వేయాలి).

## 8. డాబా గార్డెన్ (డాబా తోట) ఏప్రిల్ 10.25 a - c

10.25 a, b, c కొన్ని డాబా తోటలు.

డాబాపైన ఉన్న స్థలంలోనే తోటను ఏర్పరచుకొనే అలవాటు అనేక వట్టణ వాసులకున్నది. ఇటీవల కాలంలో అందులోనూ పెద్ద వట్టణాలలో తోటను ఏర్పరచుకోవడానికి చాలినంత స్థలం దొరకడం చాలా కష్టమవుతున్నది. అటువంటి చోట, మొక్కలంటే ఇష్టపడే వాళ్ళు, తోటను ఏర్పరచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఉత్సాహం ఉన్నవారు తమ కోరిక తీర్చుకోవడానికి ఈ డాబా తోటలువయోగపడుతున్నాయి.

విశాలమైన చోటు, డబ్బు, తోటమాలి, మనుష్యులు ఉంటే, ఎంతటి మొద్దుగాదు అయినా తోటను ఏర్పరచవచ్చు. చోటి లేనప్పుడు తోట కోసం ఎక్కవ ఖర్చు పెట్టడం కూడా చీలుకాదు. మనుష్యులు లేకుండా సొంతంగా తానే ప్యయంగా తోట వేసుకోవడానికి ఎక్కవ అసక్తి, ఉత్సాహం ప్రతికూలాలను ఎదిరించగలిగే ధైర్యం, పుష్పల మొదలైన వాటి వట్ల ఎక్కవ ఆరాధన, అదరణ, మమత, కుతూహలత, మొక్కలను పెంచటంలో ఎక్కవ జాగ్రత్త ఉండాలి. డాబా తోటలకు ఈ రకపు మనో భావాలు ఉండి తీరాలి.

దాబా తోటను పెంచడం ఒక ఉల్లాసకరమైన హాబీ (Hobby) (విరామ కాలపు పని). ఈ తోట విషయంలో ఎక్కువ కల్పనా వాతవ్యం ఉన్న కొద్ది దాబా తోటలు అత్యంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయని చెప్పడానికి వీలులేదు. జయప్రదమవుతుందనియూ చెప్పలేము. అదే విధంగా లాభదాయకమై ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. మేడపైన (దాబాలోనే) వివిధ రకాల పళ్ళ, పువ్వుల, కాయగూరల మొక్కల్ని పెంచుకోవచ్చు. నేలపై తోటలను ఏర్పరచి ఏ విధంగా సుఖాన్ని సంతోషాన్ని పొందవచ్చో అందులో కొద్దిపాటి సుఖ సంతోషమలను దాబా తోటల ద్వారా పొందవచ్చునని కొందరు సాహసవరులు సాధించి నిరూపించి యున్నారు.

దాబా తోటలను చక్కగా పెంచడానికి మొదట బోడిగొట్టాలకు తీగ పాదలను ప్రాకించి, పచ్చదనాన్ని కాపాడాలి. ఈ రకపు పచ్చదనం, వెనుక చక్కటి ఆకులు లేకపోతే, ఏ అలంకారిక మొక్క శోభించదు.

రెండవది, దాబా తోటకి, గాలి ప్రధాన శత్రువు. గాలి దుమారాన్ని అడ్డుకోవడానికి కాంపాండుగానీ, కంచెలుగానీ, చెట్లుగానీ, కట్టడాలుగానీ దాబాలలో ఉండవు. అందుచేత ఈ దాబా తోటలను రక్షించడానికి దాబా అడ్డుగోడలపైన చెక్క, జాలరినో, తీగలనో, తడికెలనో వేసి దానిపై తీగలను ప్రాకించి గాలిని అడ్డుకో గలగాలి.


దాబా పైన మట్టిని పేర్చి మట్టి తగ్గిపోకుండా ఉండేటట్లుగా ఇటుక పిమ్మంటు గట్టులను కట్టి అందులో మొక్కల్ని నాటవచ్చు. ఈ విధంగా నాటడానికి కనీసం 20-30 సెం.మీ. మందానికి మట్టిని వేయవలసి ఉంది. ఈ మట్టికి అప్పుడప్పుడూ నీళ్ళు పోయవలసి ఉండడం చేత మట్టి నీటి భారాన్ని అనేక దాబాలు భరించలేవు. ఒకవేళ భరించగలిగివి అయితే ఈ క్రమం చాలా అనుకూలం. లేకపోతే మొక్కలను, పెట్టెలలో, కుండీలలో, డబ్బాలు మొదలైన వాటిలో పెంచాలి.

పాదలు, పెద్ద మొక్కలవుతాయి. అందుచేత చాలా కాలం జీవించదగినవి కాబట్టి నీటిని పెద్ద కుండీలలోనే పెంచి అప్పుడప్పుడూ నీళ్ళు ఎరువు (Liquid manure) (ఎరువు కలిపిన నీళ్ళని) పోయ్యాలి. ఎండు రక్తపు పాడి, గోకన కొమ్మల పాడి, ఎముకల పాడిని పాతుతూ, చాలినంత నీటిని క్షుణ్ణంగా పోస్తూ ఉండాలి. నీటిని పైపైన చల్లితే చాలదు. దాబాపైన ఎండ, గాలి ఎక్కువగా ఉండడం చేత, మట్టిలోని తేమ త్వరగా ఎండిపోతుంది. అందుచేత మట్టి క్రింది పొరలు బాగా తడిసేట్లుగా నీరు పోయ్యాలి.

దాబా మొక్కలపైన దుమ్ము చేరడం వలన ఆకులు తమ కిరణజన్య సంయోగ క్రియను నవ్వంగా జరుపుకోలేవు. ఈ దుమ్మును కడగడానికి మొక్కల్ని తడిగా ఉంచడానికి మొక్కలపై అప్పుడప్పుడూ నీటిని చల్లుతూనే ఉండాలి. దీనికోసం హోస్ పైపులు (Hose Pipes) అవసరమవుతాయి. దాబా పైన మొక్కలే కాకుండా కొన్ని తోటల అలంకారాలను చేర్చడానికి, కూర్చోవడానికి, పీచోపాసనాలకన్నా ఇనుప కుర్చీలు వేయడం ఉచితం. విద్యుత్ సౌకర్యం ఉంటే దీపాలను అక్కడక్కడ వరోక్షంగా (Indirect) ఉండేటట్లుగా మే తోటను ప్రకాశవంతం చేసుకోవచ్చు. తోటలో పెట్టదగిన శిల్పాలు పెట్టవచ్చు.







డా॥ తమ్మిణ్ణ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము ఉద్యానవన విభాగం ప్రారంభం నుండి దాదాపు 30 సంవత్సరాలపాటు విభాగ అధిపతిగా పనిచేశారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరునికి సేవచేస్తూ కొండల, గుట్టలమయమైన తిరుమలలో సుందర నందనోద్యాన వనములను తీర్చిదిద్దినారు. వాటి శిల్పరచన, పోషణ, కళాకృతి అనితర సాధ్యమైనది. ఆ నర్సరీలలో లేని పూలమొక్కంటూ ఏదీలేదు. ఒక్క రోజాపుష్పాలలోనే ఆరువందల రకాలు ఉన్నాయి. హైబ్రిడ్ పద్ధతుల ద్వారా బోగన్ విల్లాలలో, క్రోటనులలో, మందారాలలో నూతన మొక్కలను సృష్టించి వాటిని శ్రీ వేంకటేశ్వరునికి ఇష్టులైన భక్తుల పేర్లు పెట్టి విడుదల చేశారు. వాటితోపాటు అనేక కరపత్రాలు, ముప్పైదాక కొత్తమొక్కలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు ప్రచురించారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యానవనముల సలహాదారుగా పనిచేస్తున్నారు.

ఆయన కుమారుడు డా॥పి.టి. శ్రీనివాస్ రోజాపూల ఉత్పత్తిలో డాక్టరేట్ తీసుకొని ప్రస్తుతం ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తున్నారు. వీరు ఇద్దరు కలసి ఈ పుస్తకం “తోటవనులు (ఉద్యానవన శిల్పం)” రచించారు.

మొక్కల పెంపకం గురించి సవివరంగా తెలిపే గ్రంథం ఇది. తోట పెంచుకోవాలని అనుకునేవారికి ఎన్నో ఆసక్తికర విషయాలను తెలుపుతుంది. ఇందులో మొత్తం పది అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. ఏ కాలంలో ఏ మొక్కలు నాటాలి, వాడవలసిన మట్టి, వాడవలసిన ఎరువుల గురించే కాకుండా కీటకాల బారినుండి మొక్కలను సంరక్షించుకొనే విధానం తోటలు పెంచుకునేవారికి సులభంగా అర్థం అయ్యే విధంగా వివరించారు. తోటకు కావలసిన ఉపకరణాలు చిత్రాలతో సహా తెలిపారు.

